

FLORA

REPUBLICII POPULARE ROMANE

II





ACADEMIA REIPUBLICAE POPULARIS ROMANICAE

FLORA

REIPUBLICAE POPULARIS ROMANICAE

REDACTORE PRINCIPALI
ACAD. TRAIAN SĂVULESCU

II

COLLABORATORES TOMI II:
ST. CSÜRÖS, E. GHIŞA, GH. GRINŢESCU, M. GUŞULEAC,
A. NYÁRÁDY, I. PRODAN, EM. ŢOPA.

EDITIO ACADEMIAE REIPUBLICAE POPULARIS ROMANICAE

1 9 5 3

ACADEMIA REPUBLICII POPULARE ROMÂNE

Isa se impru-
mută acasă.

F L O R A

REPUBLICII POPULARE ROMÂNE

REDATOR PRINCIPAL
ACAD. TRAIAN SĂVULESCU

II

BIBLIOTECA DOCUMENTARA
ST. CSEROS, E. G.
A. NYAR

9.254.

COLLABORATORI VOL. II:

ST. CSÜROS, E. GHIŞA, GH. GRINȚESCU, M. GUȘULEAC,
A. NYÁRÁDY, I. PRODAN, EM. TOPA.

EDITURA ACADEMIEI REPUBLICII POPULARE ROMÂNE

1 3 5 3

K. III. 1723

FLORA REPUBLICII POPULARE ROMÂNĂ

REDACTOR PRINCIPAL

ACADEMICIAN TR. SĂVULESCU

COLECTIVUL DE REDACȚIE: Academician E. I. NYÁRÁDY (Responsabil);
L. ALEXANDRESCU, M. GUȘULEAC (limbă și nomenclatură);
AL. BELDIE (redacția tehnică și corecturi).

PREFAȚA

În volumul de față, în afară de cinci familii mai mici, în mare parte compuse din specii cultivate, s'au prelucrat trei mari familii: *Caryophyllaceae*, cu 28 genuri și 206 specii, *Euphorbiaceae*, cu 3 genuri și 62 specii și *Ranunculaceae*, cu 25 genuri și 154 specii.

Câteva genuri polimorfe au fost prelucrate în mod amănunțit și după concepții noi. Astfel, genul *Silene* a fost despărțit în trei genuri: *Silene*, *Polyschemone* și *Behen*. S'au prelucrat cu deosebită atenție genurile *Dianthus*, *Euphorbia*, *Aconitum* și *Ranunculus*. Atât aceste genuri, cât și altele, tot critice, ca de ex. *Pulsatilla*, *Caltha*, *Paeonia*, etc., au fost prelucrate pentru prima oară în mod unitar pentru teritoriul R.P.R. Pentru unele genuri (*Pulsatilla*, etc.) nu am avut material suficient din toate provinciile țării, din care motiv prelucrarea acestor genuri urmează a fi complectată ulterior.

Unele genuri foarte polimorfe în Carpații noștri, au fost prelucrate în mod amănunțit, pe baza materialului de herbar existent în țară. Astfel, s'a constatat că în Carpații noștri sunt 12 specii de *Aconitum* dintre care 3 specii sunt comune cu cele din Flora U.R.S.S.

Volumul de față cuprinde numeroase forme noi pentru știință, care sunt descrise și în limba latină în capitolul « Addenda ».

S'a acordat o deosebită atenție problemelor de nomenclatură și avem credința că s'a reușit să se facă o nouă și corectă orânduire în cele mai multe cazuri.

În Volumul II al Florei R.P.R. s'au prelucrat în total 63 genuri și 443 specii.

REDACTIA

ENUMERAREA SISTEMATICĂ A SPECILOR

Ord. CÆNTROSPÉRMAE

Fam. 27. Caryophylláceae Juss.

Subfam. Alsinoídeae (DC.) A. Br.

Genul 74. *Stellaria* L.

	Pag.
258. <i>S. aquática</i> (L.) Scop.	27
259. <i>S. nemorum</i> L.	28
260. <i>S. média</i> (L.) Cyr.	32
<i>S. pallida</i> Piré	33
<i>S. Hólostea</i> L.	33
<i>S. longifolia</i> Mühlenb.	34
<i>S. graminea</i> L.	37
<i>S. Alsine</i> Grimm	37
<i>S. palústris</i> Ehrh.	38

Genul 75. *Cerástium* L.

	<i>C. Cerastoides</i> (L.) Britt.	41
	<i>C. anómalum</i> W. et. K.	41
	<i>C. glomerátum</i> Thuill.	42
270.	<i>C. brachypétalum</i> Desp.	45
	<i>C. semidecándrum</i> L.	46
	<i>C. púmulum</i> Curt.	49
	<i>C. caespitósium</i> Gilib.	50
	<i>C. fontanum</i> Baumg.	54
	<i>C. bulgáricum</i> Uechtr.	55
	<i>C. silváticum</i> W. et K.	55
	<i>C. banáticum</i> (Rochel) Heuff.	56
	<i>C. alpinum</i> L.	56
	<i>C. lanátum</i> Lam.	57
280.	<i>C. latifólium</i> L.	58
	<i>C. transsilvánicum</i> Schur	61
	<i>C. arvénse</i> L.	61
	<i>C. Lerchenfeldianum</i> Schur	63

	Pag.
× C. triculinum Nyár. et Prod.	64
— C. Boissieri Gren.	64
— C. grandiflorum W. et K.	64
— C. candidissimum Correns	64
— C. tomentosum L.	65
— C. Biebersteinii DC.	65
Genul 76. <i>Holosteum</i> L.	
284. H. umbellatum L.	65
Genul 77. <i>Moenchia</i> Ehrh.	
M. mántica (L.) Bartl.	69
Genul 78. <i>Sagina</i> L.	
S. procumbens L.	70
S. apétala L.	71
S. ciliáta Fries	71
S. saginoides (L.) D.T. Presl	72
290. S. subuláta (Sw.) Presl	75
S. nodósa (L.) Fenzl	75
Genul 79. <i>Buffonia</i> L.	
B. tenuifolia L.	76
Genul 80. <i>Minuartia</i> L.	
M. sedoides (L.) Hiern	78
M. fasciculáta (L.) Hiern	79
M. setácea (Thuill.) Hay.	79
M. laricifolia (L.) Schinz et Thell.	80
M. graminifolia (Ard.) Jáv.	83
— M. austriaca (Jacq.) Hay.	84
M. vérna (L.) Hiern.	84
M. Gerardii (Willd.) Hay.	86
300. M. frutescens (Kit.) Tuzson	87
M. cataractarum Jka.	87
M. recurva (All.) Schinz et Thell.	87
M. tenuifolia (L.) Hiern	88
M. viscosa (Schreb.) Schinz et Thell.	88
M. glomeráta (M.B.) Deg.	89
Genul 81. <i>Arenaria</i> L.	
A. serpyllifolia L.	93
A. leptoclados Guss.	94
A. graminifolia Schrad.	94
A. biflóra L.	95
310. A. tenella Kit.	95
A. rotundifolia M.B.	96
A. rigida M.B.	96

		Pag.
Genul 82. <i>Moehringia</i> L.		
313. M.	trinervia (L.) Clairv.	99
M.	péndula (W. et K.) Fenzl	100
M.	muscosa L.	101
M.	Grisebachii Jka.	102
M.	Jankae Gris.	102
Genul 83. <i>Spérgula</i> L.		
S.	arvensis L.	105
S.	vernalis Willd.	106
320. S.	pentándra L.	106
Genul 84. <i>Spergulária</i> (Pers.) J. et C. Presl		
S.	rúbra (L.) J. et C. Presl	107
S.	salina J. et C. Presl	108
S.	margináta (DC.) Kitt.	109
x S.	salontana I. Pop.	109
Genul 85. <i>Paronýchia</i> Adans.		
P.	cephalótes (M.B.) Bess.	110
Genul 86. <i>Herniária</i> L.		
H.	incána Lam.	114
H.	glábra L.	115
H.	hirsúta L.	116
Genul 87. <i>Scleránthus</i> L.		
S.	perénis L.	119
S.	ánnuus L.	121
330. S.	polycárpus Torn.	122
S.	uncinátus Schur	122
S.	negléctus Roch.	123
Subfam. Silenoideae A. Br.		
Genul 88. <i>Agrostemma</i> L.		
A.	Githágo L.	124
Genul 89. <i>Viscária</i> Röhl.		
V.	vulgáris Röhl.	127
V.	atropurpúrea Gris.	128
Genul 90. <i>Lychnis</i> L.		
L.	Coronaria (L.) Desr.	129
L.	Flos-cúculi L.	129
— L.	chalcedónica L.	130
Genul 91. <i>Béhen</i> Mnch.		
B.	Csereii (Baumg.) Guşul.	131
B.	vulgáris Mnch.	132
340. B.	alpinus (Lam.) Guşul.	140
Genul 92. <i>Polyschémone</i> Schott, Nym. et Ky.		
P.	nivális Schott, Nym. et Ky.	141

Genul 93. *Silene* L.

	Pag.
342. S. cónica L.	150
S. rupēstris L.	151
S. Saxifraga L.	151
S. flavēscens W. et K.	155
S. Lerchenfeldiana Baumg.	155
S. dinárica Spreng.	155
S. acáulis L.	159
S. Arméria L.	160
350. S. compácta Fisch.	161
S. dichótoma Ehrh.	161
S. trinervia Seb. et Mauri	162
S. gállica L.	165
S. péndula L.	165
S. longiflóra Ehrh.	166
S. chlorántha (Willd.) Ehrh.	167
S. multiflóra (Ehrh.) Pers.	168
S. póntica Brandza	168
S. supina M.B.	171
S. itálica (L.) Pers.	172
360. S. viridiflóra L.	173
S. nútans L.	174
× S. pseudonútans (Panč.) Guşul.	178
× S. Grecescui Guşul.	178
S. dúbia Herb.	178
S. Otites (L.) Wib.	180

Genul 94. *Heliospërma* (Rchb.) Pax

H. quadrifidum (L.) Rchb.	184
--------------------------------	-----

Genul 95. *Melándrium* Röhl.

M. rúbrum (Weig.) Garcke	189
M. álbium (Mill.) Garcke	190
M. eriocalýcinum Boiss.	193
M. nemorále (Heuff.) A. Br.	193
M. noctiflórum (L.) Fries	194
370. M. viscósum (L.) Čelak.	194
M. Zawadzki (Herb.) A. Br.	197
× M. dúbium Hampe	197
× M. subnemorále Simk.	198

Genul 96. *Cucúbalus* L.

C. báccifer L.	198
---------------------	-----

Genul 97. *Gypsophila* L.

G. murális L.	202
G. répens L.	203

	Pag
375. G. fastigiata L.	203
G. scorzonrifolia Ser.	204
G. paniculata L.	204
G. glomerata Pall.	207
— G. acutifolia Fisch	208
G. altissima L.	208
380. G. petraea (Baumg.) Rehb.	208

Genul 98. *Tunica* Scop.

T. prolifera (L.) Scop.	212
T. saxifraga (L.) Scop.	212
T. illyrica (Ard.) Fisch. et Mey.	215

Genul 99. *Vaccaria* (DC.) Medik.

V. pyramidata Medik.	216
---------------------------	-----

Genul 100. *Dianthus* L.

D. Armeria L.	223
D. armeriastrum Wolfn.	224
D. pseudarmeria M.B.	224
D. barbatus L.	227
D. compactus Kit.	228
390. D. trifasciculatus Kit.	231
D. deserti Prod.	232
D. glabriusculus (Kit.) Borb.	233
D. Piatra-Neamtzui Prod.	234
D. puberulus (Simk.) Kern.	237
D. diutinus Kit.	238
D. Pontederæ Kern.	241
D. urziceniensis Prod.	242
D. giganteiformis Borb.	242
D. banaticus (Heuff.) Borb.	245
400. D. giganteus D'Urv.	246
D. pinifolius Sibth. et Sm.	248
D. Henteri Heuff.	249
D. carthusianorum L.	250
D. tenuifolius Schur	255
D. pseudobarbatus Bess.	256
D. dobrogensis Prod.	257
D. capitatus Balb.	258
D. kladovanus Deg.	261
D. Vandasii Velen.	262
410. D. superbis L.	262
D. serotinus W. et K.	263
D. spiculifolius Schur	264
D. Simonkaianus Péterfi	267
D. Kitaibelii Janka	268

	Pag.
415. D. collinus W. et K.	271
D. deltoides L.	271
D. Racovitzae Prod.	272
D. guttatus M.B.	272
D. campestris M. B.	277
420. D. Șerbani Prod.	277
D. nardifórmis Janka	278
D. pallens Sibth et Sm.	279
D. leptopétalus Willd.	279
D. glaciális Haenke	280
D. gélidus Schott, Nym. et Ky.	280
D. callizónus Schott et Ky.	283
× D. mureșensis Prod.	283
× D. subtrifasciculátus Prod.	284
× D. szebenensis Kárp.	284
× D. Grintzescui Prod.	284
× D. Jávorkae Kárp.	284
× D. Cománae Prod.	284
× D. banaticifórmis Prod.	287
× D. várciorovensis Prod.	287
× D. Tzopae Prod.	287
× D. Borzaeanus Prod.	287
× D. Caliacrae Prod.	288
× D. Domuglédi Prod.	288
× D. Julii-Wolfii Péterfi	288
× D. Emilii-Popii Prod.	289
× D. Burciae Pét. et Gürtl.	289
× D. carpáticus Borb.	289
— D. Caryophýllus L.	289
— D. chinensis L.	290

Genul 101. *Saponária* L.

S. officinális L.	293
S. bellidifólia Sm.	294
S. púmila (St. Lag.) Janch.	294
430. S. glutinósa M.B.	295

Ord. TRICOCCAE

Fam. 28. *Euphorbiaceae* J. St. Hil.Genul 102. *Euphorbia* L.

E. nútans Lag.	302
E. Péplis L.	305
E. humifúsa Willd.	305
E. Chamaesýce L.	305

	Pag.
435. E. maculāta L.	306
— E. Lathyris L.	309
E. villōsa W. et K.	309
E. valdevillosocarpa Arv. et Nyár.	313
E. palūstris L.	313
E. carpatica Wol.	313
440. E. polychrōma Kern.	314
E. angulāta Jacq.	317
E. lingulāta Heuff.	318
E. dulcis L.	318
E. verrucōsa L.	321
E. carniōlica Jacq.	321
E. platyphyllos L.	322
E. stricta L.	325
E. helioscōpia L.	325
E. exigua L.	326
450. E. Péplus L.	329
E. graeca Boiss. et Sprun.	329
E. falcāta L.	330
E. lūcida W. et K.	333
E. salicifolia Host	334
E. virgāta W. et K.	334
E. leptocāula Boiss	337
E. Ésula L.	338
E. Cyparissias L.	341
E. Seguieriana Neck.	342
460. E. pannonica Host	345
E. steppōsa Zoz	346
E. bazārgica Prod.	349
E. dobrogēnsis Prod.	349
E. Cadrilateri Prod.	350
E. agrāria M.B.	351
E. basarābica Prod.	355
E. Parālias L.	355
E. amygdaloides L.	355
E. Myrsinites L.	356
470. E. segetālis L.	356
— E. variegata Sims	359
× E. angustifrons Borb.	359
× E. Procopianii Săvul. et Rayss.	359
× E. paradōxa (Schur) Podp.	360
× E. pseudoésula Schur.	360
× E. pseudolūcida Schur	363
× E. angustāta (Roch.) Borza	363
× E. pseudovirgāta (Schur) Soó	363
× E. Wagneri Soó	363

	Pag.
× E. Wimmeriana Wagn.	363
× E. Peisónis K. Rech.	364
× E. Schurii Simk.	364
× E. jucula Prod.	364
× E. Guşuleacii Prod. et Soran	364
× E. măciniensis Prod.	367
× pseudovillósa Prod.	367
× E. Csatói (Simk.) Borza	367

Genul 103. *Mercurialis* L.

471. M. ánnua L.	368
M. perénis L.	371
M. ováta Sternb. et Hoppe	371

Genul — *Ricinus* L.

— R. communis L.	372
-----------------------	-----

Fam. — **Buxáceae** Dumort.Genul — *Pachysandra* L. C. Rich.

— P. terminális Sieb. et Zucc.	374
-------------------------------------	-----

Genul — *Buxus* L.

— B. sempervirens L.	375
---------------------------	-----

Fam. 29. **Callitricháceae** Lindl.Genul 104. *Callitriche* L.

— C. autumnális L.	377
C. stagnalis Scop.	377
— C. hamuláta Kütz.	378
C. polymórpha Lónnr.	381
C. vérna L.	382

Ord. RANÁLES

Fam. — **Calycantháceae** Lindl.Genul — *Calycanthus* L.

— C. flóridus L.	386
— C. occidentális Hook. et Arn.	387

Fam. — **Lauráceae** Lindl.Genul — *Laurus* L.

— L. nóbilis L.	388
----------------------	-----

Fam. — **Magnoliaceae** Jaume St. Hil.Genul — *Magnolia* L.

	Pag.
— <i>M. acuminata</i> L.	392
— <i>M. obovata</i> Thunb.	393
— <i>M. Kóbus</i> DC.	393
— <i>M. stellata</i> Maxim.	394
— <i>M. glauca</i> L.	394
— <i>M. Soulangeana</i> Soulange-Bodin	394
— <i>M. macrophylla</i> Michx.	395
— <i>M. tripétala</i> L.	395
— <i>M. liliiflora</i> Desr.	395
— <i>M. Yulan</i> Desf.	395

Genul — *Liriodendron* L.

— <i>L. Tulipifera</i> L.	395
--------------------------------	-----

Fam. 30. **Ranunculaceae** A. L. Juss.Genul 105. *Paeonia* L.

477. <i>P. corallina</i> Retz.	403
— <i>P. triterinata</i> Pall.	403
— <i>P. peregrina</i> Mill.	404
— <i>P. officinalis</i> L.	407
480. <i>P. tenuifolia</i> L.	408

Genul 106. *Tróllius* L.

<i>T. europaeus</i> L.	412
-----------------------------	-----

Genul 107. *Cáltha* L.

<i>C. cornúta</i> S. N. et Ky.	417
<i>C. laéta</i> S., N. et Ky.	417
— <i>C. palústris</i> L.	420

Genul 108. *Helleborus* L.

<i>H. purpurascens</i> W. et K.	423
<i>H. odórus</i> W. et K.	426
<i>H. dumetórum</i> W. et K.	429

Genul — *Eránthis* Salisb.

— <i>E. hiemális</i> (L.) Salisb.	430
--	-----

Genul 109. *Nigélla* L.

<i>N. arvénsis</i> L.	431
— <i>N. satíva</i> L.	432
— <i>N. damascéna</i> L.	435

Genul 110. *Isópyrum* L.

<i>I. thalictroides</i> L.	436
---------------------------------	-----

	Genul 111. <i>Actaea</i> L.	Pag.
489.	<i>A. spicata</i> L.	437
	Genul 112. <i>Cimicifuga</i> L.	
490.	<i>C. europaea</i> N. Schipcz.	441
	Genul 113. <i>Aquilegia</i> L.	
	<i>A. transsilvanica</i> Schur	445
	<i>A. vulgaris</i> L.	446
	Genul 114. <i>Delphinium</i> L.	
	<i>D. Consolida</i> L.	451
—	<i>D. Ajacis</i> L.	453
	<i>D. orientale</i> J. Gay.	454
	<i>D. fissum</i> W. et K.	457
	<i>D. intermedium</i> Soland.	458
	<i>D. Simonkaianum</i> Pawl.	459
	Genul 115. <i>Aconitum</i> L.	
	<i>A. Anthora</i> L.	462
	<i>A. romanicum</i> Wol.	468
500.	<i>A. tauricum</i> Wulf.	471
	<i>A. callibotryon</i> Rchb.	476
	<i>A. variegatum</i> L.	483
	<i>A. gracile</i> Rchb.	484
	<i>A. paniculatum</i> Lam.	486
	<i>A. toxicum</i> Rchb.	489
—	<i>A. Stoeckianum</i> Rchb.	491
—	<i>A. maximum</i> Pall.	492
	<i>A. moldavicum</i> Hacq.	495
	<i>A. Hosteanum</i> Schur	499
	<i>A. excelsum</i> Rchb.	499
	<i>A. lasiostomum</i> Rchb.	500
510.	<i>A. velutinum</i> (Rchb.) G. Grinț.	503
	<i>A. vulpina</i> Rchb.	503
	<i>A. puberulum</i> (Ser.) G. Grinț.	504
	<i>A. lasianthum</i> (Rchb.) Simk.	505
	<i>A. dasytrichum</i> (Deg. et Gáy.) G. Grinț.	506
— ×	<i>A. Zenoniae</i> Wol.	508
— ×	<i>A. abnorme</i> G. Grinț.	508
— ×	<i>A. Baumgartenianum</i> Simk.	508
— ×	<i>A. aberratum</i> G. Grinț.	508
— ×	<i>A. setiferum</i> G. Grinț.	509
— ×	<i>A. patentipilum</i> (Gáy.) G. Grinț.	509
— ×	<i>A. Simonkaianum</i> (Gáy.) G. Grinț.	509
— ×	<i>A. triste</i> (Fisch.) Gáy.	510
— ×	<i>A. erronatum</i> G. Grinț.	510

	Pag.
× A. setosum G. Grinț.	510
× A. sturiense G. Grinț.	510
Genul 116. <i>Anemone</i> L.	
515. A. ranunculoides L.	512
A. nemorosa L.	513
A. baldensis L.	514
A. silvestris L.	514
A. narcissiflora L.	518
— A. japónica Sieb. et Zucc.	519
— A. coronaria L.	519
Genul 117. <i>Hepatica</i> Mill.	
520. H. nobilis Mill.	520
H. transsilvanica Fuss.	522
× H. media Simk.	523
Genul 118. <i>Pulsatilla</i> Mill.	
P. alba Rchb.	524
— P. nigricans Störk	527
— P. pratensis (L.) Mill.	528
P. montana (Hoppe) Rchb.	528
P. patens (L.) Mill.	530
— P. grandis Wender.	531
× P. Gayeri Simk.	532
Genul 119. <i>Atragene</i> L.	
A. alpina L.	532
Genul 120. <i>Clématis</i> L.	
C. integrifolia L.	536
C. vitalba L.	538
C. recta L.	539
— C. flammula L.	540
— C. viticella L.	540
× C. Jackmannii Jackm.	543
Genul 121. <i>Myosurus</i> L.	
M. minimus L.	543
Genul 122. <i>Ceratocéphalus</i> Mnch.	
530. C. orthoceras DC.	547
C. falcatus (L.) Pers.	547
Genul 123. <i>Callianthemum</i> C. A. Mey.	
C. coriandrifolium Rchb.	548
Genul 124. <i>Batrachium</i> (DC.) S. F. Gray	
B. Giliberti V. Krecz.	549

	Pag.
534. B. triphýllum (Wallr.) Dumort.	550
B. aquátile (L.) Dumort.	553
B. foeniculáceum (Gilib.) V. Krecz.	553
B. divaricátum (Schränk) Schur	553
B. carinátum Schur	555
B. trichophýllum (Chaix) Bossche	555
540. B. Rionii (Lagg.) Nym.	556
B. flúitans (Lam.) Wimm.	556

Genul 125. *Ficária* Adans.

* F. vérna Huds.	559
-----------------------	-----

Genul 126. *Ranúnculus* L.

R. platanifólius L.	566
R. glaciális L.	567
R. alpéstris L.	567
R. crenátus W. et K.	568
R. polyphýllus W. et K.	571
R. Língua L.	572
R. Flámmula L.	575
550. R. ophioglossifólius Vill.	576
R. binatus Kit.	577
R. auricomus L.	578
R. cassúbicus L.	581
R. flabellifólius Heuff.	585
× R. fállax (W. et Gr.)	586
× R. alliariifólius (Rchb.)	586
× R. auricomoides A. Nyár	589
× R. ambiguus (Schur)	589
× R. variifólius (Schur)	590
× R. silvicolus (W. et Gr.)	590
R. scelerátus L.	591
R. Thóra L.	592
R. híbridus Biria.	595
R. répens L.	595
R. oreophílus M. B.	597
R. montánuš Willd.	598
560. R. polyánthemus L.	601
R. nemoróšus DC.	605
R. bulbóšus L.	606
R. sardóšus Cr.	607
R. constantinopolitánuš D'Urv.	608
R. lanuginóšus L.	611
R. ácer L.	612
R. Stevenii Andrž.	615
R. carpáticus Herb.	619
R. lateriflóruš DC.	620

	Pag.
570. R. arvensis L.	621
R. muricatus L.	622
R. oxyspermus M.B.	622
R. pedatus W. et K.	625
R. illyricus L.	625
R. millefoliatus Vahl.	626
× R. malomvolgyensis Nyár.	627
× R. intercédens Domin.	627
× R. pseudoacris Schur.	627

Genul 127. *Thalictrum* L.

Th. aquilegiifolium L.	629
— Th. petaloidéum L.	630
Th. alpinum L.	630
Th. foetidum L.	633
Th. minus L.	634
580. Th. simplex L.	642
Th. flavum L.	645
Th. lucidum L.	646
× Th. subcorymbosum Borb.	653
× Th. iodostemon Borb.	653

Genul 128. *Adonis* L.

A. vernalis L.	654
A. volgensis Stev.	657
A. flammæ Jacq.	658
A. aestivâlis L.	659
587. A. autumnâlis L.	660
× A. hybrida Wolff.	660
Addenda	663
Index alphabeticus	689

SEMNE CONVENȚIONALE ȘI PRESCURTĂRI

III - X.	la sfârșitul descrierii, indică lunile în care înflorește planta descrisă	Mții	munții
○	plantă anuală	Mt.	muntele
⊙	plantă bianuală	Obs.	observațiuni
⊥	plantă perenă (vivace)	Pl.	planșa
h	arbore	Păd.	pădurea
h	arbust	Pâr.	pârâul
*	plantă cățărătoare	Răsp. gen.	răspândirea generală
♂	floare masculă	r.	raionul
♀	floare femelă	Reg.	Regiunea
♀	floare hermafrodită	Vf.	vârful
×	specie hibridă	V.	valea
±	mai mult sau mai puțin	N	Nord, miazănoapte
*	plantă cultivată	S	Sud, miazăzi
○	buruieni, a căror existență este legată de terenurile cultivate sau protejate de om	E	Est, răsărit
●	plante din ținuturile calde, cultivate la noi în camere	V	Vest, apus
?	plante dubioase	tab.	tabula
- 7 mm	până la 7 milimetri	FRE	Flora Romaniae Exsiccata. Un herbar întocmit la Cluj, de la 1921 - 1947, în 70 de exemplare și trimis în schimb la diferite centre universitare din țară și din străinătate. S'au editat 2900 numere.
alt.	altitudine	FEAH	Flora Exsiccata austro-hungarica. Un herbar întocmit cu același scop ca și FRE, la Viena, dela 1881 - 1913, cuprinzând și plante din țara noastră. S'au editat în total 4000 numere.
DI.	dealul		
diam.	diametru		
Exs.	exsiccata		
fig.	figura		
Fânt.	fântâna		
Herb.	herbar		
Ic.	iconografie, ilustrație		
m.	monstruoșitate		
Mrea	mănăstirea		

FHE	Flora Hungariae exsiccata. Un herbar întocmit în centrul, la Budapesta, dela 1912 — 1932, cuprinzând și plante din țara noastră. S'au editat 1000 numere.	Fl. NÖ	Flora von Niede
HN	Herbarium Normale, editat de I. Dörfler la Viena, cuprinde peste 5000 plante, câteva colectate din România.	MBL	Magyar Botanikai Lapok, Budapest.
ABZ	Allgemeine Botanische Zeitschrift	MNL	Magyar Növénytani Lapok, Cluj
A. et G. Syn.	Ascherson et Graebner: Synopsis der Mitteleur. Flora	MTK	Mathematikai és Természettudományi Közlemények, Budapest.
Bul. Grăd. Bot. Cluj	Buletinul Grădinii Botanice și al Muzeului Botanic dela Univ. din Cluj.	ÖBZ	Österreichische Botanische Zeitschrift, Wien.
BK	Botanikai Közlemények, Budapest.	Verh. SVN	Verhandlungen u. Mittheilungen d. Siebenbürgische Vereins für Naturwissenschaft, Hermannstadt.
		Verh. ZBG	Verhandlungen u. Mittheilungen d. Zoologische-Botanischen Gesellschaft, Wien.

Obs. La răspândirea în țară a speciilor, localitățile despărțite prin virgulă aparțin aceluiaș raion. Prin punct și virgulă se despart localitățile aparținând la raioane sau regiuni deosebite.

Ordinul [CENTROSPERMAE *)

Fam. 27. CARYOPHYLLACEAE ¹⁾ Juss.

in Hort. Trian. (1759) ord. 44, ap. A. L. Juss. Gen. (1789) 299, p.p., Rehb. Consp. (1828) 206, Torr. et A. Gray Fl. N.-Amer. I (1838-40) 175, Pax et Hoffm. in Engl. et Prantl Nat. Pflzfam. XVI. c, ed. II (1934) 275.

Plante ierboase anuale, bianuale sau perene, rareori subfrutescente. Frunze simple, opuse, rar alterne. Stipelele lipsesc, uneori prezente și membranoase. Inflorescențe cimoase, bogate în flori. Flori de obicei hermafrodite, uneori prin avortare unisexuate, radiare, cu înveliș floral dublu, rareori simplu. Caliciu cu 5 sau 4 sepale libere sau concrescute, uneori membranos, rareori umflat. Corolă cu 5, 4 sau 10 petale, deseori purtând o coronulă formată din apendiculi ce se găsesc pe linia de unire a laminei petalelor cu unguicula. Stamine 5 sau 10. Stile 2 — 5. Ovar superior (rar semiinferior), unilocular sau \pm septat, deseori așezat pe o prelungire a axei numită ginofor, la maturitate devenind carpofoar. Fruct capsular, unilocular sau cu 2—5 loji incomplete, polisperme, rar oligosperme, deschizându-se prin valve sau dinți în număr egal sau dublu decât acel al stilelor, rareori monosperm, indehiscent sau baciform. Seminte dispuse pe o placentă centrală, cu funicul evident, de obicei campilotrope (rar anatrop), rotunde, reniforme sau piriiforme, uneori apendiculate sau aripate, deseori aculeate sau papiloase. Embrioul îndoit, rareori drept, cu cotiledoane înguste.

Determinarea genurilor

- 1 a Caliciu cu sepale libere sau abia unite la bază, în cazul din urmă cu ovar semiinferior. Ovar lipsit de ginofor, resp. carpofoar (Alsinoideae) 2
- 1 b Caliciu cu sepale unite, cel puțin în jumătatea lor inferioară, formând

*) Continuare dela pag. 631 din Vol. I.

¹⁾ Prelucrată de I. Prodan excl. genurile *Behen*, *Polyschemone*, *Silene* și *Heliosperma*.

un tub, de obicei alungit, în partea superioară cel mult dela jumătate bidentat sau lobat. Petale de obicei lung unguiculate. Ovar cu ginofor, resp. carpofoar (Silenioideae) 15

2 a Frunze cu stipele scarioase 3

2 b Frunze nestipelate 6

3 a Toate frunzele alterne 4

3 b Cel puțin frunzele inferioare opuse sau în verticil 5

4 a Sepale \pm verzi, pe dos cu o țeapă (aristă) mică. Flori în glomerule terminale. Bracteolele florilor argintii 85. *Paronychia*

4 b Sepale fără țeapă. Flori în glomerule axilare. Bracteole negrăzinate 86. *Herniaria*

5 a Frunze opuse. De obicei 3 stile. Corolă roșietică 84. *Spergularia*

5 b Frunze fasciculate sau verticilate. Stile 5. Corolă albă 83. *Spergula*

6 a Fructul o nukulă monospermă. Petale lipsă. Stile 2—3 87. *Scleranthus*

6 b Fructul o capsulă polispermă. Petale existente (except. unele sp. de *Stellaria* și *Minuartia*). Stile 2—5 7

7 a Capsulă bivalvă. Sepale și petale 4 79. *Buffonia*

7 b Capsulă cu 3—6 valve 8

8 a Petale întregi, cel mult la partea anterioară subtil emarginate 9

8 b Petale crenat denticulate sau bifide (până la mijloc sau până la bază) 13

9 a Stile 3, rar 2 10

9 b Stile 5, rar 4. Semințe nearipate 12

10 a Frunze liniare sau filiforme. Flori după tipul 5. Capsula se deschide prin 3 valve. Semințe reniforme 80. *Minuartia*

10 b Frunze mai late. Capsula se deschide prin 4 sau 6 (—10) valve 11

11 a Capsula se deschide prin valve până la bază. Semințe prevăzute cu apendice scamos (elaiosom). Sepale acuminate, cu margini membranoase. Flori uneori după tipul 4 82. *Moechingia*

11 b Capsula se deschide prin 6 valve, cel puțin la început foarte scurte, dentiforme. Semințe neapendiculate 81. *Arenaria*

12 a Sepale 4—5, de 1—3 mm lungime. Petale 4—5, uneori absente. Stamine 4—5 sau 10. Stile opuse petalelor. Capsula se deschide până la bază, prin 4—5 valve. Plante mici, tufoase, erecte sau prostrate, cu frunze \pm filiforme 78. *Sagina*

12 b Sepale 4—5, mai mari. Petale 4—5. Stamine 4, 8 sau 10. Stile așezate între petale. Capsula se deschide cu 10 dinți. Plante anuale, nu formează tufe, cu frunze liniare sau liniar lanceolate 77. *Moenchia*

13 a Petale crenat denticulate. Stamine 3—5. Capsulă cilindrică, deschizându-se în afară prin 6 dinți recurbați. Semințe hastate. Plante

- anuale, cu dichazii grupate în formă de umbel și cu tulpina foliată numai spre bază 76. **Holosteum**
- 13 b Petale profund bifide 14
- 14 a Petale bifide sau bisectate. Stamine 10. Capsula globuloasă sau ovată, deschizându-se prin 6 valve până la mijloc sau mai jos. Stile 3, rar 5 sau 2. Semințe reniforme. Frunze late sau liniere . . . 74. **Stellaria**
- 14 b Petale despicate până la mijloc. Capsulă cilindrică sau cilindro-conică, deschizându-se la vârf prin 6 sau 10 dinți. Stile 5, mai rar 3. Semințe mărunte 75. **Cerastium**
- 15 a Fructul o bobită globuloasă, la început albastră, mai târziu neagră. Caliciu larg campanulat, umflat, la maturitate mai lat decât lung. Stile de obicei 3. Pedunculii inflorescenței patenți . . . 96. **Cucubalus**
- 15 b Fructul capsulă. Caliciul mai lung decât lat 16
- 16 a Stile 2 17
- 16 b Stile 3 sau 5, rar 6—7 22
- 17 a Caliciu la bază, pe partea externă, cu scvame 18
- 17 b Caliciu la bază fără scvame 20
- 18 a Caliciu verde sau colorat, cilindric, fără dungi (strij) membranoase, multinervat (7—11). Lamina petalelor continuată la bază într'o unguiculă lungă, liniară 100. **Dianthus**
- 18 b Caliciu cu 5 dungi (strij) membranoase, longitudinale. Aceste dungi separă sepalele verzi ale tubului. Caliciu 5-nervat 19
- 19 a Caliciu campanulat, la bază cu 4 scvame, mult mai scurte decât caliciul. Petale albe sau rozee, unguiculate. Flori capitate sau dispuse în corimbe paniculate sau în capitule. Frunzeliniare . . . 98. **Tunica**
- 19 b Caliciu cu altă structură 20
- 20 a Caliciu cu 5 dungi aripate. La mijlocul unguiculelor petalelor se află o dungă îngustă. Plante anuale cu frunze late 99. **Vaccaria**
- 20 b Caliciu fără dungi aripate 21
- 21 a Caliciu scurt (—5 mm), cu 5 dungi membranoase. Plante perene, cu unguicula petalelor plană și cuneată 97. **Gypsophila**
- 21 b Caliciu mare (10—20 mm lungime), cilindric, fără dungi membranoase. Lamina petalelor deseori emarginată, se continuă într'o unguiculă, care la mijloc poartă o dungă îngustă. Capsula uniloculară, la bază cu semințe reniforme sau subgloboase 101. **Saponaria**
- 22 a Capsulă uniloculară. Stile 3 sau 5 23
- 22 b Capsulă 3- sau 5—7-loculară. Stile 3—5—7 26
- 23 a Semințe reniforme, cu margini paleaceu pectinat-ciliate. Plante mici, de munte, asemănătoare cu *Silene Saxifraga*, însă cu flori mai mici și petale de obicei 4—6 dințate, rar emarginate. 94. **Heliosperma**
- 23 b Semințe cu margini netede sau puțin tuberculate 24

- 24 a Stile 3 sau 5. Capsula se deschide la vârf cu 6 sau 10 dinți 95. *Melandrium*
- 24 b Stile 5. Capsula se deschide prin 5 dinți 25
- 25 a Laciniile caliciului foarte alungite, liniar lanceolate, verzi, alternând cu dinții caliciului. Stigmat de jur-împrejur păros. Plante anuale, de semănături, cu flori foarte lung pedunculate 88. *Agrostemma*
- 25 b Laciniile caliciului de lungimea corolei sau mai scurte, stând în fața sepalelor. Plante glabrescente sau îndesuit lanat-tomentoase 90. *Lychnis*
- 26 a Capsulă 5—7-loculară. Stile 5—7. Caliciu \pm umflat, cilindric campanulat. Plantă endemică în regiunea alpină din Munții Rodnei 92. *Polyschemone*
- 26 b Capsulă 5- sau 3-loculară 27
- 27 a Stile 5. Capsulă 5-loculară la bază, se deschide cu 5 dinți, care mai târziu se despică 89. *Viscaria*
- 27 b Stile 3. Capsulă 3-loculară, cu 6 dinți 28
- 28 a Caliciu umflat, larg deschis, cu 10—20 nervuri anastomozate. Acoperirea petalelor în mugure neregulat imbricată 91. *Behen*
- 28 b Caliciu atașat la capsulă sau dacă este umflat, atunci închis la vârf. Acoperirea petalelor în mugure contortă 93. *Silene*

Subfam. Alsinoideae (DC.) A. Br.

in Aschers. Fl. Prov. Brand. I (1864) 60. — *Alsineae* DC. in Lam. et DC. Fl. fr. IV. 2, ed. III (1805) 766, pro trib., p.p.]


Sepale libere sau abia unite la bază; în acest din urmă caz, ovarul semi-inferior. Stile și stigmat libere sau unite. Ovar lipsit de ginofor, respectiv carpofofor.

Genul 74. STELLARIA*) L.

Sp. pl. ed. I (1753) 421, Gen. pl. ed. V (1754) 193, nr. 504. — Rocoțea Rocoină, Steluță.

Plante ☉ sau 4, ierboase, cu tulpini ascendente, rare, alteori dispuse în tufe dese, glabre sau păroase, fragile la nodurile inferioare. Frunze opuse, la bază uneori cordate. Flori hermafrodite, dispuse în dichazii rare, nefoliolate sau \pm foliate. Sepale 5, ierboase, stând lipite de fruct în timpul maturității acestuia. Petale 5, adânc emarginate, bipartite, bisectate, albe, rareori lipsind. Stamine 10. Stile 3. Capsulă globuloasă sau eliptică, uniloculară, cu multe semințe, deschizându-se prin 7 valve. Semințe rotund reniforme, indeosebi spre margini sgrăbunțoase.

*) După latinescul stella = stea, referitor la forma florii deschise.



Determinarea speciilor

- 1 a Tulpină cilindrică, păroasă de jur împrejur sau numai pe o latură... 2
 1 b Tulpină 4-unghiulară, glabră sau cel mult scabră 5
 2 a Stile 5 (rar 4). Capsula se deschide prin 5 valve. Frunze late, ovate. Prin tufişuri umede, pâraie, râuri 1. **S. aquatica**
 2 b Stile 3. Capsula se deschide prin 6 valve 3
 3 a Tulpină în partea superioară de jur împrejur păroasă. Plantă perenă, cu petale mai lungi decât sepalele (mai lungi de 1 cm) . . . 2. **S. nemorum**
 3 b Tulpină păroasă numai pe o latură. Petale cel mult de lungimea caliciului, rar ceva mai lungi, despicate până la bază 4
 4 a Stamine 2—5 (10). Stile lungi de 1,5—2 mm. Plantă de un verde viu. Petale prezente. Infloreşte tot timpul anului 3. **S. media**
 4 b Stamine 1—3. Stile lungi de 0,3—0,5 mm. Plantă palid verde. Petale lipsă sau rudimentare. Infloreşte primăvara 4. **S. pallida**
 5 a Petale numai cât jumătatea caliciului de lungi. Frunze lanceolat eliptice sau obovate. Plante de izvoare şi mlaştini . . . 8. **S. Alsine**
 5 b Petale de lungimea caliciului sau cu mult mai lungi 6
 6 a Petale despicate aproape până la mijloc, de 2 ori mai lungi decât caliciul. Bractei ierbacee. Frunze lanceolate, lung acuminate, pe margini scabre. Plantă de pădure, cu tulpina dreaptă, rigidă . 5. **S. Holostea**
 6 b Petale despicate aproape până la bază, de lungimea caliciului. Bractei ± membranoase sau membranos marginate. Frunze îngust lanceolate sau liniare 7
 7 a Tulpină în partea superioară şi frunze pe margini scabre, acoperite cu papile foarte scurte. Caliciul în stare proaspătă neînsemnat nervat, lung de 2—3 mm 6. **S. longifolia**
 7 b Tulpină şi frunze glabre. Caliciul trinervat, lung de 3—8 mm . . 8
 8 a Bractei, sepale şi baza frunzelor ciliate. Petale lungi de 5 mm. Plantă de un verde viu 7. **S. graminea**
 8 b Toate frunzele şi sepalele cu margini glabre. Petale lungi de 10 mm. Plantă ± brumată (glaucă) 9. **S. palustris**

1. **S. aquatica** (L.) Scop. Fl. carn. I, ed. II (1772) 319. — *Cerastium aquaticum* L. Sp. pl. ed. I (1753) 439. — *Malachia aquatica* Fries Fl. halland. (1817) 77; Muravjeva in Fl. U.R.S.S. VI (1936) 430. — *Malachium aquaticum* Rechb. Fl. germ. exc. III (1832) 795. — Pleşcaită. — Vizi csillaghúr. — Gemeiner Wasserdarm. — Мягковолосник водяной. — **Exs.:** FRE nr. 2651 sub *Malachio*. — **lc.:** Pl. 1, fig. 1.

4. Plantă înaltă de 15 — 45 cm. Axa bazală stoloniformă, târătoare, alburie, fragilă, radicană la noduri, producând lăstari fertili şi sterili. Tulpini târătoare, simple sau ramificate, în partea inferioară, ca şi frunzele, glabre,

în cea superioară glanduloase. Frunze moi, cordat rotunjit-ovate sau ovat oblongi, cu margini adeseori ondulate, lungi până la 8 cm, cele inferioare scurt pețiolate, cu pețiolul ciliat, cele superioare sesile. Flori disjuse în dichazii rare. Pedunculii florali delicați, dens glandulos-păroși, erecți, dușă înflorire nutanți. Scvame ierboase, în partea anterioară puțin membranoase, glandulos păroase. Sepale ovate, obtuze, lungi de 5 — 10 mm. Petale albe, despicate aproape până la bază, cu jumătate mai lungi decât caliciul. Stamine 10, cu antere gălbui sau liliachii, uneori atrofiate. Stile 5, rar 4. Capsulă ovată, ceva mai lungă decât caliciul, deschizându-se prin 5 valve emarginate la vârf. Semințe brune, late de 0,4 mm, acoperite cu papile umbeliforme, purtând dinți răsfrânți în jos. Endosperm negru. VI—IX.

Stațiunea. Pe lângă pâraie, râuri, prin tufișuri și aninișuri umede, ziduri și locuri cultivate, umede.

Răsp. în țară: *Reg. Baia Mare:* Borșa pe V. Morii (r. Vișeu). *Reg. Cluj:* Rodna, Năsăud; Bistrița; Lechința, Chiochiș (r. Beclean); Canciu (r. Dej); Gherla, Sântioana, Tașa (r. Gherla); Cluj, Florești, Cojocna; Turda, Cheia Turzii, Poșaga; Abrud, Vidra (r. Câmpeni). *Reg. Aut. M.: Reghin;* Sovata; Odorhei; frecvent în r. Ciuc. *Reg. Stalin:* Blaj; Mediaș; Valea Lungă, Șeica Mare, Cenade (r. Mediaș); Sighișoara; Predeal; Sibiu, Cristian, Brad, Sadu (r. Sibiu); V. Arpașului (r. Făgăraș). *Reg. Hunedoara:* Tăuț pe V. Ampoiului (r. Alba Iulia); V. Secașului, între Sebeș și Miercurea (r. Sebeș); Zam, Deva; între Hunedoara și Teliuc pe V. Cernei; între Rus și Râul Alb pe V. Streiului, Mții Retezatului pe Galbena (r. Hațeg). *Reg. Oradea:* Oradea. *Reg. Arad:* Arad, Pecica; Cladova, Radna, Șoimuș, Săvârșin (r. Lipova); Arăneag (r. Ineu), pe V. Crișului Alb între Ineu și Iosășel; Dezna, Hălmașiu (r. Gurahonț). *Reg. Timișoara:* V. Dunărei la Cazane. *Reg. Craiova:* Vârciorova, Turnu Severin; M-rea Tismana; Craiova; Govora (r. Balș). *Reg. Pitești:* Călimănești, M-tele Cozia; Curtea de Argeș; Câmpulung. *Reg. București:* Titu (r. Răcari); București, Chitila, Pantelimon. *Reg. Ploiești:* Sinaia; Cernesti (r. Văleni); Buzău; Cotorca (r. Urziceni). *Reg. Constanța:* Hamangia (r. Babadag); *Reg. Galați:* Tulcea, M-rea Cocos, Delta Dunării. *Reg. Bacău:* Slănic (r. Tg. Ocna); Piatra Neamț. *Reg. Suceava:* Agafton, Botoșani; Câmpulung.

Răsp. gen.: Europa, Asia temperată.

2. *S. néorum* L. Sp. pl. ed. I (1753) 421; Schischk. in Fl. U.R.S.S. VI (1936) 394. — *Cerastium nemorum* Cr. Inst. II (1766) 401. — Steluță. — Ligeti csill. ghúr. — Wald-Sternmiere. — Звездочка лесная. — Exs.: FRE. nr. 1471. — Ic.: Pl. 2, fig. 1, 1a.

4. Plantă înaltă de 25—50 cm, cu axă târătoare, ramificată, palidă, fragilă, emițând stoloni supratereștri foliați și subterani, de culoare albă, solzoși,

Planșa 1. — 1. *Stellaria aquatica* (L.) Scop., 1 a. ovar cu 5 stigmat. — 2. *S. graminea* L., 2 a. ovar cu 3 stigmat. — 3. *S. longifolia* Mühlb. — 4. *S. media* (L.) Cyr., 4 a. ovar cu 3 stigmat. — 5. *S. graminea* L., floare cu bractei și caliciu ciliate la margini. — 6. *S. palustris* Retz., părți florale neciliate.



lungi până la 15 cm. Tulpini lungi până la 1 m, culcate în parte, sau ascendente, rotunde, ramificate, \pm păroase. Frunze verzi-gălbui, lungi până la 7,5 cm, late până la 4 cm, ciliate, la bază cordate sau obtuze, cele inferioare pețiolate, cele superioare sesile. Flori dispuse în dichazii rare. Pedunculi florali glandulos păroși, după înflorire aplecați în jos. Sepale ovate lanceolate, obtuze, glabre sau glanduloase spre bază, cu o margine subțire albă. Petale albe, adânc despicate, de 2 ori mai lungi decât caliciul, în partea anterioară obtuze. Stile 3. Stamine 10, cu antere alburii. Capsulă lunguiață, ceva mai ungă decât caliciul, deschizându-se prin 6 valve. Semințe rotunde, late până la 1,3 mm, la margine cu papile rotunde. V — IX.

Stațiunea. Comună prin păduri, locuri umbroase și umede, pe sub stânci umede.

Răsp. în țară: *Reg. Baia Mare*: Repedea. *Mt. Pietrosul Mare* (r. Vișeu). *Reg. Cluj*: între Rodna și Năsăud; Bistrița; Canciu (r. Dej); *Mții Meseș* la Osoiul Ursului; Cluj; Roșia Montană. *Mt. Detunata* (r. Câmpeni); în tot ținutul văilor Arieșul Mare și Arieșul Mic. *Reg. Aut. M.*: Borsec, Toplița; Reghin, Gurghiu; *Mții Gurghiului* (Mt. Saca); Sovata; Odorhei; *Mții Harghita*; *Mții Giurgeului* (Mt. Hăghimașul Mare, Mt. «Öcsém»); Tușnad, Bicsad; Covasna. *Reg. Stalin*: Mediaș; Orașul Stalin, Săcele; Mt. Piatra Craiului; *Mții Făgărașului*; *Mții Sibiului*. *Reg. Hunedoara*: Deva, Zam; Orăștie; Petroșani, Petrila; *Mții Retezatului*. *Reg. Oradea*: Oradea: Ciucea, Pădurea Neagră, Stâna de Vale (r. Aleșd); *Mții Bihorului*. *Reg. Arad*: Arad; Arăneag (r. Ineu); Șoimoș, Troiaș (r. Lipova); Moneasa, Nădălbesti, Hălmagiu (r. Gurahonț); *Mții Zarandului* (Dl. Drocea). *Reg. Craiova*: *Mții Mehedinților* (Piatra Cloșanilor); Mrea Tismana; Mrea Lainici. *Reg. Pitești*: Corbeni (r. Curtea de Argeș); Câmpulung, Nămăești. *Reg. București*: Comana (r. Vidra). *Reg. Ploiești*: *Mții Bucegi*; *Mții Buzăului* (Penteleu). *Reg. Bârlad*: Tecuci. *Reg. Bacău*: Mt. Ceahlău, Cheile Bicazului, Lacul Roșu. *Reg. Suceava*: Schitu Rarău.

Variabilitatea speciei

var. *typica* Beck in Glasnik Zemaljskog Muzeja Bosn. Herc. XVIII (1906) 479 — Frunzele inferioare la bază slab cordate, cele superioare (îndeosebi cele de sub inflorescență), cu baza rotunjită, sesile sau foarte scurt pețiolate. Semințe de un bruniu spălăcit. — *Mții Codrului*.

f. *latifolia* (Hagenb.) — *S. nemorum* β . *latifolia* Hagenb. Fl. Basil. I (1821) 405. — Frunzele superioare ovate, aproape sesile. Pedicelii fructelor reflecti. — *Mții Codrului*.

ssp. *Reichenbachii* Wierzb. in Rechb. Ic. V (1842) 36. — *Cerastium tetragonum* Baumg. En. stirp. Transs. I (1816) 424.

Diferă de tip prin frunzele glabre, cele tulpinale superioare slab ovate rotunjite sau ovate lanceolate. Petale mai puțin profund bifide și laciniile lor mai înguste, de 2 ori mai lungi decât sepalele păroase. Semințe compri-mate, pe margini puțin scabre. Statură mai robustă și mai decumbentă.

Mții Rodnei (Ineu); *Mții Bucegi*: Predeal, V. Albă, V. Urlătoarei, V. Peșului, Obârșia, Doamnele; *Mții Iezer-Păpușa* (Dâmbovicioara); *Mții Făgărașului* (Capra Budei, Negoiu);

Mji Retezatului: Lacul Gemenea spre Poarta Bucurii (2000 m), V. Zlătuia, Lacul Zănoaga (2000 m).

Răsp. gen.: Europa, Caucaz.

3. *S. média* (L.) Cyr. De ess. pl. char. comm. (1784) 36; Schischk. in Fl. U.R.S.S. VI (1936) 395, tab. XX, fig. 2. — *Alsine media* L. Sp. pl. ed. I (1753) 272. — Rocoină. — Gyenge csillaghúr. — Vogelmiere. — Звездочка мокрица. — Exs.: FRE nr. 2649, 2648 sub ssp. *pallida*. — Ic.: Pl. 1, fig. 4, 4 a.

☉, ☉. Rădăcină fusiformă. Tulpini subțiri, rotunde, procumbente sau ascendente, până la 40 (80) cm, păroase numai pe o latură și radicante la nodurile inferioare. Frunze ovate, scurt acute la vârf, glabre sau ciliate la bază. Flori dispuse în dichazii rare, glomerate. Pedunculi florali păroși pe o singură parte. Flori de cca 4 mm în diam. Sepale lungi de 4—5 mm, obtuziuscule, de lungimea corolei sau puțin mai lungi. Petale albe, lungi de 3 mm, adânc despicate. Stamine 2—5, rar până la 10, cu nectarii la bază și antere violetă sau purpurii. Stile 3, erecte, lungi de 1,5 — 2 mm, încovoiate la vârf în forma unui arc. Capsulă mai lungă decât caliciul, deschizându-se prin 6 valve. Seminte rotunde, reniforme, brune sau negre, late până la 1,4 mm, pe spinare aculeate. Infloarește tot anul.

Stațiunea. Comună prin locuri umbroase, cultivate sau necultivate, mai ales în apropierea așezărilor omenești, dela câmpie până la munte.

Variabilitatea speciei

- 1 a Stamine 10, cu antere purpurii. Plantă robustă, mai flacidă, înaltă de 30—80 cm. Frunze mari, lungi de 4—5 cm, la bază adeseori cordate. Pediceli florilor de cca 3—8 ori mai lungi decât caliciul. Petale mari, egalează sau întrec cu puțin separele
 var. *neglecta* (Weihe) Weihe ap. Mert. et Koch in Röhl. Deutschl. Fl. III, ed. III (1831) 253. — *S. neglecta* Weihe in Bluff et Fingerh. Comp. Fl. germ. I, ed. I (1825) 506. — *S. decandra* Schur En. pl. Transs. (1866) 116. — Comună în întreaga țară prin locuri umbroase și umede de pădure.
- 1 b Stamine 2—5 2
- 2 a Petalele lipsesc sau când sunt, cât jumătatea lungimii caliciului 3
- 2 b Petalele există, mai lungi decât jumătatea caliciului 4
- 3 a Petale mici de tot, rudimentare sau lipsesc
 f. *apétala* (Ucria) Mert. et Koch in Röhl. Deutschl. Fl. III, ed. III (1831) 253. — *S. apétala* Ucria in Roem. Arch. I. 1 (1796) 68. — Reg. Cluj: Desmir, Pața, Cojocna (r. Cluj).
- 3 b Petalele cât jumătatea lungimii caliciului, bifide până la bază, la a doua înflorire lipsesc. Frunze mici, mai scurte decât articulele tulpinii. Pedunculii florilor de 2—4 ori mai lungi decât caliciul
 f. *intermedia* Guss. En. pl. Inarim. (1854) 54. — Reg. Cluj: Cheia Turzii.

- 4 a Stamine 3. Plantă robustă, cu tulpini numeroase, culcate, lungi de 3,5—4,5 dm. Frunze ovale, acute, lungi de 2,5—3 cm, cele inferioare mai mici, de lungimea pedicelilor floriali. Prin portul ei robust aduce atât cu var. *neglecta*, cât și cu *S. aquatica*.

f. *măxima* (Schur). — *Alsine media* e. *maxima* Schur En. pl. Transs. (1866) 116. — Comună în întreaga țară

- 4 b Stamine 3—5. Plante de statură mijlocie, cel mult de 1—4 dm înălțime. Frunze mai scurte decât articulele tulpinii. Pedicelii florilor de 5 ori mai lungi decât caliciul. Petale de lungimea separelor sau puțin mai scurte. Sepale lungi de 3—5 mm.

f. *genúina* Čelak. Prodr. Fl. Böhm. (1874) 500. — Comună în întreaga țară.

Intrebuințări. Constitue alimentul proaspăt de predilecție al păsărilor ținute în colivie. Este o buruiănă invadantă în grădini.

Răsp. gen.: Pe întreg globul pământesc.

4. *S. pállida* (Dumort.) Piré in BSB Belg. II (1863) 43; Schischk. in Fl. U.R.S.S. VI (1936) 397. — *Alsine pallida* Dumort. Fl. Belg. (1827) 109. — *S. Boraean* Jord. Pugill. (1852) 33. — *S. media* ssp. *pallida* A. et. G. Fl. N. Ostd. Flachl. (1898) 310; A. et G. Syn. V. 1 (1916) 536. — Exs.: FRE nr. 2648.

⊙. Tulpini numeroase, ± solide, cu frunze mici. Pedicelii florilor pubescenti. Petalele lipsesc sau rudimentare. Sepale acute. Stamine 1—3 (rar 5). Stile lungi de 0,3 — 0,5 mm, chiar dela bază orizontal patente. Capsulă oblong cilindrică. Seminte late de 0,5 — 0,8 mm, palide, cu un rând de verucozități. Plantă de un verde palid. III—IV.

Stațiune e. Locuri uscate.

Răsp. în țară: Comună prin păduri uscate, în locuri nisipoase, în întreaga țară.

Răsp. gen.: Europa, Asia Mică, Africa de Nord.

5. *S. Holóstea* L. Sp. pl. ed. I (1753) 422; Schischk. in Fl. U.R.S.S. VI (1936) 402, tab. XX, fig. 5. — Iarbă moale. — Olocsán csillaghúr. — Grossblumige Sternmiere. — Звездочка ланцетовидная. — Exs.: FRE nr. 2650. — Ic.: Pl. 2, fig. 2, 2 a, b, c.

4. Plantă înaltă de 15—60 cm, formând tufe rare, cu tulpini scurte, sterile și altele ascendente, florifere. Tulpini florifere simple, în partea inferioară 4-unghiulare, puțin umflate la noduri, glabre sau răzleț păroase, ramificate dela bază. Frunze sesile, rigide, aproape orizontale, lanceolate sau liniar lanceolate, lung acuminate, pe margini și pe nervura mediană scabre, lungi de 4—7 cm și late de 5—7 mm. Flori lung pedunculate, dispuse în dichazii rare, bogate; pedunculi floriali lungi, scurt păroși, după înflorire cu vârfurile aplecate. Bractei ierbacee, de consistența frunzelor. Flori până la 30 mm în diametru, cu separe ovate, acute, lungi de 8 mm, fin pielos margi-

nate, slab nervate. Petale albe, despicate, până aproape de mijloc, aproape de 2 ori mai lungi decât caliciul. Capsulă globuloasă, de lungimea caliciului, deschizându-se prin 6 valve. Semințe mici, late până la 2 mm, rotunde, ruginii, acoperite cu asperități. IV—VI.

Stațiunea. Prin păduri uscate, tufișuri, pe lângă garduri, dela câmpie până în regiunea montană.

Răsp. în țară: Plantă de primăvară, comună prin tufișurile și pădurile din regiunile de câmpie și dealuri.

Variabilitatea speciei

f. genuina (Rouy et Fouc.). — *S. Holostea* β. *genuina* Rouy et Fouc. Fl. Fr. III (1896) 232. — Înaltă de 10—30 cm, cu frunze late de 5—8 mm. — Frecventă.

f. elătior (Peterm.). — *S. Holostea* β. *elätior* Peterm. Fl. Lips. (1838) 324. — Robustă, înaltă de 30—60 cm, cu frunze lungi de 10—15 cm și late de 10—15 mm. Poartă relativ puține flori. — Cluj (Păd. Hoia).

Răsp. gen.: Aproape în întreaga Europă, Africa de N, Asia Mică, Armenia, Transcaucazia.

6. *S. longifolia* Mühlenb. ex Willd. Enum. Hort. Berol. (1809) 479. — *S. Friesiana* Ser. in DC. Prodr. I (1824) 397. — *S. mosquensis* M. B. ex. Schlecht. in Magaz. Ges. Naturf. Freund. Berlin VII (1816) 195. — *S. diffusa* Willd. ex Schlecht. l. c. — **lc.:** Pl. 1, fig. 3.

24. Tulpini delicate, fragile, ascendente, până la 25 cm, 4-unghiulare, cu dungi papilos aspre. Frunze verzi deschise, sesile, liniar lanceolate, îngustate spre bază, lungi de 3 cm și late de 1—3 (4) mm. Marginea și nervura dorsală a frunzelor scabre. Inflorescență paucifloră. Bractei membranos marginate, neciliate. Flori mărunte, mai mici decât la *S. graminea*. Sepale ovate lanceolate, acute, neînsemnat nervate, lungi de 2—3 mm. Petalele de lungimea caliciului, adânc despicate. Capsule ovate, mai lungi decât caliciul și mai groase decât la *S. graminea*. Semințe netede sau fin scobite. VI—VIII.

Stațiunea. Prin păduri umede, mlaștini turboase, înierbate. Rară.

Răsp. în țară: *Reg. Aut. M.:* «Korondăga» deasupra Com. Corund (r. Odorhei); Sântimbru în turbării, «Vărpatak» sub Băile Harghita, turbăria Luci deasupra Com. Sâncrăieni, Tușnad la Lacul Sf. Ana și turbăria Mohoș (r. Miercurea Ciuc); Cașinul Nou la «Veresviz» (r. Tg. Săcuesc). *Reg. Sibiu:* deasupra Com. Rășinari spre M-tele Frumoasa, Boița (r. Sibiu).

Răsp. gen.: Europa de N. Rară în Alpi, Tatra.

Planșa 2. — 1. *Stellaria nemorum* L., 1 a. fruct tânăr. — 2. *S. Holostea* L., 2 a. o petală, 2 b. fruct deschis, 2 c. sămânță. — 3. *S. Alsine* Grimm., 3 a. floare mărită.



7. *S. graminea* L. Sp. pl. ed. I (1753) 422; Schischk. in Fl. U.R.S.S. VI (1936) 404. — *Cerastium gramineum* Cr. Inst. II (1766) 40. — Exs.: FRE nr. 1470. — Ic.: Pl. 1, fig. 2, 2a, 5.

4. Plantă înaltă până la 50 cm, cu tulpini glabre și netede, ascendente, răsfirate în toate părțile, 4-unghiulare, simple sau ramificate. Frunze liniare, sau liniar lanceolate, verzi strălucitoare, acute, îngustându-se spre bază, unde sunt puțin ciliate, în rest glabre. Flori lung pedunculate, formând diehazii rare. Pedunculi florali glabri, 4-unghiulari, în timpul fructificației orizontali sau înclinați în jos. Bractee uscat pieleose, membranoase, ciliate la bază. Floarea deschisă până la 12 mm în diametru. Sepale eliptic lanceolate, acute, lungi de 3—8 mm, trinervate, evident pielos marginate. Petale de lungimea caliciului sau numai cu puțin mai lungi decât acesta, albe, despicate până mai jos de mijloc. Capsulă lunguiată, îngustă, mai lungă decât caliciul. Semințe roșcate, cu asperități. Plantă otrăvitoare. V—VII.

Stațiunea. La marginea pădurilor, prin tufișuri, livezi, locuri înierbate, semănături, dela câmpie până în etajul montan, mai ales pe soluri silicioase.

Răsp. în țară: Comună în întreaga țară.

Răsp. gen.: Europa, Siberia, Transcauzia, Afganistan, Tibet, China.

8. *S. Alsine* Grimm in Nova Acta Leopold. III (1767) 313; Schischk. in Fl. U.R.S.S. VI (1936) 409. — *S. uliginosa* Murr. Prodr. stirp. Goetting. (1770) 55. — Exs.: FRE nr. 2647 a, b. — Ic.: Pl. 2, fig. 3, 3a.

4. Plantă înaltă până la 40 cm. Tulpini numeroase, ramificate, ascendente, glabre, 5-unghiulare. Frunze lanceolat eliptice sau obovate, sesile, cu margini netede, uninervate, la bază reticulat nervate și ciliate, lungi până la 25 mm și late de 4—6 mm. Inflorescență paucifloră, cu flori dispuse în parte la subțioara frunzelor. Bractee albe, de obicei pielos uscate, cu o nervură mediană verzuie, glabre pe margini. Pedunculi florali filiformi, îngroșați sub caliciu. Flori până la 7 mm diametru. Sepale lanceolate, subulate, acute, lungi de 3 mm, evident trinervate. Petale cu mult mai scurte decât caliciul (cât 1/2 caliciului), despicate până la bază. Capsulă alungit ovată, aproximativ de lungimea caliciului. Semințe sbârcite. V—VI.

Stațiunea. Pelângă izvoare, pâraie, în locuri umede, dela câmpie până la munte.

Răsp. în țară: Reg. Baia Mare: Rona de Sus la Cuzi (r. Sighet); Repedea pe Petricea, Vișeu de Sus pe Preluca Șoimului, Borșa (r. Vișeu). — Reg. Cluj: Gilău (r. Cluj); Mții Meseșului (V. Poenitiș). — Reg. Aut. M.: Mții Giurgeului (deasupra Com. Borsec); Tușnad (Lacul Mohoș, Mt. «Büdös»); Lueta, Vlahița (r. Odorhei). — Reg. Stalin: Valea

Lungă (r. Mediaș); Mții Făgărașului; Sibiu, Rășinari. *Reg. Hunedoara*: Mții Retezatului (Gura Zlata). *Reg. Oradea*: Pădurea Neagră (r. Aleșd). *Reg. Ploști*: Mt. Penteleu. *Reg. Bacău*: Băile Slănic pe Mt. Dobrului (r. Tg. Ocna). *Reg. Suceava*: Mt. Rarău; Coșna (r. Vatra Dornei).

Variabilitatea speciei

f. *transsilvanica* (Porc.) Borza Consp. I (1947) 87. — *S. uliginosa* β. *transsilvanica* Porc. En. pl. phan. distr. *Năsăud* (1878) 11. — Tulpină debilă, glabră. Frunze glabre sau la bază slab ciliate, liniar lanceolate. Capsulă de 2 ori mai lungă decât caliciul. — În locuri rovinoase din Mții Rodnei (în Valea Vinului și în drumul spre Izvorul Roșu).

Răsp. gen.: Europa, Asia temperată, Indii, America Nordică.

9. *S. palustris* Ehrh. Beitr. V (1789) 176 n. nud. ex Retz. Fl. Scand. Prodr. ed. II (1795) 106; Schischk. in Fl. U.R.S.S. VI (1936) 406. — Ic.: Pl. 1, fig. 6.

4. Tulpini puțin ramificate, erecte, până la 45 cm înălțime, glabre, ușor dungate. Frunze liniar lanceolate, auriu verzi, sesile, acute, cele inferioare alungit ovate, lungi până la 35 mm și late de 2—4 mm, cu marginile glabre. Inflorescență paucifloră. Pedunculi floralți după înflorire răsfirați. Bractei pieleose, cu margini glabre, rareori ierboase. Sepale lungi de 5—7 mm, fin acute, nervate, cu marginile glabre. Petale albe, de cca 10 mm lungime, aproape până la bază despicate, mai lungi sau de lungime egală cu caliciul. Semințe castanii, aspre. V—VII.

Stațiunea. Prin locuri umede, pe lângă pâraie, marginea apelor, în mlaștini turboase, pe sol liștit de calcar.

Răsp. în țară: *Reg. Baia Mare*: Mții Maramureșului; Borșa la Lelici, 1143 m (r. Vișeu). *Reg. Stalin*: Orașul Stalin; Sibiu. *Reg. Hunedoara*: Alba Iulia în șanțurile Prater. *Reg. Oradea*: Marțihaz (r. Salonta). *Reg. Craiova*: Vârciorova pe V. Bahnei spre Ilovița (r. Tr. Severin); Burila Mică (r. Vânu Mare). *Reg. Pitești*: Mții Făgărașului (V. Argeșului la confl. cu V. Buda). *Reg. Suceava*: Dorohoi.

Variabilitatea speciei

var. *Laxmannii* (Fisch.) Simk. En. Fl. Transs. (1886) 137. — *S. Laxmannii* Fisch. ex DC. Prodr. I (1824) 397. → *S. Barthiana* Schur Phytogr. (1876) 142. — Frunze câteodată tari, lucitoare, liniare sau îngust liniare. Petale adeseori cu puțin mai lungi decât jumătatea caliciului. — *Reg. Aut. M.*: Vlahița (r. Odorhei); Tușnad la Lacul Sf. Ana și Lacul Moș (r. Miercurea Ciuc). *Reg. Stalin*: Biertan (r. Mediaș); Comandău (r. Tg. Săcuesc); Predeal; Poplaca (r. Sibiu). *Reg. Oradea*: Marțihaz în șanțurile orezăriilor (r. Salonta); Pociovaște (r. Beiuș). *Reg. Craiova*: Vârciorova pe V. Bahnei spre Ilovița (r. Tr. Severin). *Reg. Bacău*: Mții Giurgeului la Lacul Roșu (Ghilcoș).

Răsp. gen.: Europa centrală și nordică, Asia temperată.

Genul 75. **CERÁSTIUM** L. *)

Gen. plant. [ed. I (1737) 134, nr. 376], ed. V (1754) 199, nr. 518. — **Cornuț, Struna cocoșului.**

Plante ierbacee, anuale sau perene, cu ramuri simple sau bifurcate. Frunze opuse, întregi, sesile. Flori hermafrodite, dispuse de obicei în dichazii terminale, rare, rareori solitare, de obicei 5- sau 4-mere. Bractei ierboase sau cu margini membranoase. Sepale cu margini membranoase. Petale albe, până la mijloc despicate sau acut emarginate. Stamine de obicei 10 (rar 5 sau 4), dispuse pe un inel glandulos. Stile 5, rar 4, sau 3. Placenta nu este umflat buretoasă între ovule. Capsulă cilindrică sau conică, adeseori curbă, mai lungă decât caliciul, deschizându-se la vârf prin 10 dinți erecți sau recurbați în afară. Ovar glabru, rareori păros în partea inferioară. Seminte numeroase, ovat reniforme, comprimate, aspre. Embrion aproape inelar.

Determinarea speciilor

- | | | |
|-----|---|----------------------------|
| 1 a | Stile de obicei 3. Capsula se deschide prin 6 dinți | 2 |
| 1 b | Stile de obicei 5, mai rar 4 | 3 |
| 2 a | Pedunculi fructiferi penduli. Bractei și caliciu glabre sau aproape glabre. Plantă perenă, glabră, de munte | 1. C. Cerastoides |
| 2 b | Pedunculi fructiferi erecți. Bractei și caliciu glanduloase. Plantă anuală de locuri ± sărate | 2. C. anomalum |
| 3 a | Petale numai cu puțin mai lungi decât caliciul, adeseori mai scurte, excepțional lipsesc | 4 |
| 3 b | Petale aproape de 2 ori, sau chiar de 3 ori mai lungi decât caliciul. Capsula se deschide prin 10 dinți | 10 |
| 4 a | Bractei și caliciu la vârf barbulate. Bractei verzi. Perii frunzelor mai lungi de 1 mm. Plante anuale | 5 |
| 4 b | Bractei și caliciu glabre la vârf, deoarece perii sunt cu mult mai scurți decât vârful | 6 |
| 5 a | Fructe galben-verzui. Fruct încă odată atât de lung cât caliciul. Filamentele staminelor glabre. Pedunculi fructiferi cel mult de lungimea caliciului, de obicei cu mult mai scurți | 3. C. glomeratum |
| 5 b | Plante cenușiu-verzui. Fruct numai cu puțin mai lung decât caliciul. Filamentele staminelor ciliate. Pedunculi fructiferi de 2—3 ori mai lungi decât caliciul | 4. C. brachypetalum |
| 6 a | Bractei la vârf lat membranoase, pe o distanță de cel puțin 1/4 din lungimea lor | 7 |
| 6 b | Bractei la vârf verzi, ierbacee sau cel mult foarte îngust membranoase. Perii frunzelor mai scurți de 1 mm | 9 |

*) Numele derivă dela kēras = corn, referitor la fructul său îndoit în formă de corn.

- 7 a Frunze ovate sau ovat eliptice, abia mai lungi de 1 cm, la vârf obtuziuscule. Pedunculi fructiferi la început refracți. Bractei la vârf lat membranoase, eroziuscule (roase) 5. **C. semidecandrum**
- 7 b Frunze oblongi sau îngust oblongi, obtuziuscule, lungi de 1—3 cm. Baza tulpinii radicanță. Plantă cu tulpini sterile și fertile 8
- 8 a Perii de pe marginea frunzelor lungi de 1 mm. Tulpină scurt păroasă, uneori glanduloasă. Fruct lung de 10 mm. Sepale cca de 6 mm. Inflorescență multifloră 7. **C. caespitosum**
- 8 b Perii de pe marginea frunzelor mai lungi de 1 mm. Tulpină lipsită de glarde, dens-lung-petul păroasă. Fruct de 7—20 mm. lungime. Inflorescență compusă din 3—7 flori. Petale mai lungi decât caliciul 8. **C. fontanum**
- 9 a Plantă verde închisă, cu flori albe. Sepalele nu sunt evident 3-nervate. Pedunculi fructiferi mai lungi decât caliciul. . 6. **C. pumilum**
- 9 b Intreaga plantă mică, foarte îndesuit glanduloasă și foarte ramificată, cu flori puțin rozee. Sepale evident 3-nervate 9. **C. bulgaricum**
- 10 a Plantă perenă, multifloră, cu frunze inferioare acute și petiolate. Petale mai lungi decât sepelele 10. **C. silvaticum**
- 10 b Plante perene, tufoase, de obicei rupestre, deseori cu frunze înguste . 11
- 11 a Frunze mai lungi de 3—5 cm, îngust liniare, late de cca 1 — 2 mm, plane sau cu margini revolute, la bază scurt ciliate. Tulpină fin păroasă, uneori glanduloasă, împreună cu caliciul. Bractei lat membranos-marginate, argintii 11. **C. banaticum**
- 11 b Frunze mai scurte și deseori mai late 12
- 12 a Bractei verzi, ierbacei, numai cu puțin mai mici decât frunzele obișnuite. Frunze ovate sau lanceolate, late de 5—10 mm, uneori aproape rotunde și albăstrui-verzi. Tulpini 1- rar biflore sau triflore. Petale mari, adeseori de 2—3 ori mai lungi decât caliciul . 14. **C. latifolium**
- 12 b Bractei cu mult mai mici decât frunzele obișnuite, membranoase, sau cel puțin la vârf membranoase 13
- 13 a Frunzele inferioare nu poartă la subțioară fascicule de frunze sterile 14
- 13 b Frunze inferioare la subțiori cu fascicule de frunze sterile și periscurți sau numai cili, în rest glabre. Tulpină păroasă pe o latură . 16
- 14 a Frunze lungi de 2 (— 5) cm, acute, lanceolate sau îngust lanceolate, mai late la mijloc (de 4—7 mm). Flori lung pedunculate, dispuse în inflorescențe compuse din 3—16 flori 15. **C. transsilvanicum**
- 14 b Frunze lungi de 0,5 — 1,2 cm, invers ovate sau lanceolate, late de 3—8 mm, lanate, cu peri lungi (1—3) mm, sau sbârilit păroase . 15
- 15 a Plantă îndesuit lung-lanată. Frunze eliptice sau invers ovate cel puțin cele inferioare la vârf rotunjite. Rozetele de frunze la vârf des și alb lănoase 13. **C. lanatum**

- 15 b Plantă sbârlit păroasă. Frunze ovate sau lung lanceolate, \pm acute, \pm răzleț păroase 12. *C. alpinum*
- 16 a Tulpină acoperită cu peri reflecti, cu 5—15 flori. Frunze peste tot scurt păroase, liniare sau lanceolate, late de 1—5 mm .. 16. *C. arvense*
- 16 b Tulpină paucifloră, păroasă numai pe o latură și adeseori glarduloasă împreună cu pedunculii. Frunze glabriuscul. Pedunculi cu peri scurți, glanduliferi, fără peri simpli 17. *C. Lerchenfeldianum*

1. *C. Cerastoides* (L.) Britt. in Mem. Torr. Bot. Club V (1894) 150; Schischk. in Fl. U.R.S.S. VI (1936) 435, tab. XXII, fig. 8. — *Stellaria Cerastoides* L. Sp. pl. ed. I (1753) 422. — *Cerastium trigynum* Vill. Prosp. (1779) 48. — Exs.: FRE nr. 397. — Ic.: Pl. 3, fig. 2.

4. Plantă înaltă de 5—15 cm, cespitoasă, cu tulpini scurt repente, uneori radicante, aproape glabre. Frunze glabre, lanceolate sau liniar lanceolate, cele superioare aproape ovate, lungi până la 9 mm, la bază uneori ciliate. Flori dispuse în dichazii terminale rare. Bractei foliacei, ovat lanceolate, glabre. Pedunculi floriferi glardulos păroși, după înflorire penduli. Florile deschise de 12—18 mm în diam. Sepale ovat lanceolate, lungi de 5—6 mm, glabre, verzi, cu marginea membranoasă, transparentă. Petale adânc bifide, până la de 2 ori mai lungi decât caliciul. Stile de obicei 3, rar 4 sau 5. Capsulă cilindrică, de 2 ori mai lungă decât caliciul, deschizându-se prin 6 dinți terminali; pedunculii fructiferi penduli. Seminte rotunde, sgrăbuntoase, late până la 0,8 mm. VII—VIII.

Stațiunea. Prin locuri stâncoase, umede, în etajul alpin.

Răsp. în țară: *Mții Maramureșului*: Pop Ivan. *Mții Rodnei*: Pietrosul, Ineul, Obârșia Rebri. *Mții Buzăului*: Penteleu (Miclăuș, Fundul Milei). *Mții Bucegi*: Jepi, Caraiman, Coștila, Omul. *Mții Făgărașului*: Coltii Brezii, Podul Giurgiului, Capra Budei, Vârtopul, Creasta Tărăța, Arpașul, V. Bălei, V. Doamnei, Negoiu, Ciortea, Surul. *Mții Sibiului*: Iezerul Căminului. *Mții Sebeșului*. *Mții Parângului*: Mândra, Cârja, Gruicul. *Mții Retezatului*: Zănoaga, Custura, Stâna din Râu, Mt. Șerpului. *Mții Țarcu-Godeanu*: Godeanu, Țarcu, Murariu, Călianul.

Variabilitatea speciei

var. *glandulosum* (Fenzl). — *C. trigynum* β . *glandulosum* Fenzl in Ldb. Fl. ross. I (1842) 397. — Întreaga plantă, dar în special pedunculii floraliglanduloși. — *Mții Retezatului*: Mt. Borăscu și Galbina. (1800—1900 m).

var. *angustifolium* (Baumg.). — *C. alpinum* β . *angustifolium* Baumg. En. stirp. Transs. I (1816) 423. — Cu satură mai mică, mai densă și frunze înguste. — *Mții Rodnei*: Vf. Inău.

Răsp. gen.: Europa, Caucaz, Altai, Himalaia, America de N.

2. \odot . *C. anomalum* W. et K. in Willd. Sp. pl. II (1799) 812; W. et K. Pl. rar. Hung. I (1802) 21, tab. 22; Schischk. in Fl. U.R.S.S. VI (1936) 436

tab. XXII, fig. 9. — *Stellaria viscida* M. B. Fl. taur. - cauc. I (1808) 342. — *S. anomala* Rehb. Fl. germ. exc. III (1832) 785. — Exs.: FRE nr. 400, FEAH nr. 3250. — Ic.: Pl. 3, fig. 1; W. et K. l. c. tab. 22.

○. Plantă înaltă până la 30 cm, cu rădăcini fibroase, fusiforme. Tulpini erecte, simple, spre vârf bifurcate, cilindrice, brăzdate, glandulos păroase, ca și întreaga plantă. Frunze liniare sau lanceolate, lungi până la 20 mm, cele inferioare mai late, îngustându-se într'un pețiol lung, cele superioare sesile, glandulos ciliate. Tulpini multiflore. Pedunculi floralii erecti, glandulos păroși, lungi până la 8 cm. Bractei verzi, glanduloase. Florile deschise de cca 9 mm diametru. Sepale alungit lanceolate, obtuze, verzi, cu o dungă membranoasă îngustă, lungi de 4—5 mm. Petale aproape de 2 ori mai lungi decât caliciul. Stilele aproape totdeauna 3. Capsula alungit cilindrică, mai lungă decât caliciul. Pedunculi fructiferi erecti. Seminte brune, sgrăbunțoase, late de 0,5 mm. IV—VI.

Stațiunea. Prin locuri joase, umede, la câmpie și în regiunea de luroasă. Mai adesea în locuri semialcaline și sărate.

Răsp. în țară: Reg. Cluj: Rodna, Năsăud; Bistrița; Chiociș (r. Beclean); M. Meseșului pe podișul Zalăului; Cluj, Florești, Dezmir, Apahida, Boj (r. Cluj); Turda pe V. Botorom, Valea Florilor (r. Turda). Reg. Aut. M.: Tg. Mureș. Reg. Stalin: Mănăradei, Valea Lungă, Cenade (r. Mediaș); Sighișoara, Saschiz, Sedriaș (r. Sighișoara); Sibiu, Brad, Șura Mare, Ruși (r. Sibiu). Reg. Hunedoara: V. Secașului (între Sebeș și Miercurea); Orăștie; Zim (r. Deva). Reg. Arad: Arad, Șiria; Păuliș (r. Lipova); Mocrea (r. Ineu); Buteni, Sebiș (r. Gurahonț). Reg. Timișoara: Lugoj. Reg. Craiova: Între Craiova și Piatra Olt; Zăvalu (r. Bechet); Caracal. Reg. Pitești: Piatra Olt, Slătioara în sărături (r. Slatina). Reg. București: București, (Herăstrău); Comana în lunca Câlniștei spre Grădiștea (r. Vidra); Brănești; Ghimpați (r. Mihăilești). Reg. Galați: Delta Dunării; Galați, Barboși.

Variabilitatea speciei

f. *glabriusculum* (M.B.). — *Stellaria viscida* β. *glabriuscula* M.B. Fl. taur. - cauc. III (1819) 307. — *Cerastium anomalum* b. *glabriusculum* (M.B.) Gürke in Richter - Gürke Pl. eur. II (1897) 214. — Plantă mai puțin păroasă. — Iași.

Răsp. gen.: Europa sudică, sud-vestică, mai rar în Europa centrală, Asia de SV

3. *C. glomeratum* Thuill. Fl. env. Par. ed. II (1799) 226; Schischk. in Fl. U.R.S.S. Vol. VI (1936) 450. — *C. viscosum* L. Sp. pl. ed. I (1753) 437, p.p. — Ic.: Pl. 4, fig. 1, 1 a.

Planșa 3. — 1. *Cerastium anomalum* W. et K. — 2. *C. Cerastoides* (L.) Britt. — 3. *C. transsiloanicum* Schur. — 4. idem, var. *Nyárádyanum* Borza. — 5. idem, var. *acufolium* Borza. — 6. idem, var. *lanatifolium* Borza.



☉, ☉. Plantă înaltă până la 45 cm, patent păroasă, galben-verzuie, în partea superioară glanduloasă. Tulpini ascendente sau erecte, ramificate, distanțat foliate, rareori simple. Frunze lat eliptice, cele tulpinale subrotunde sau ovate, cele inferioare îngustate într'un pețiol lat. Perii frunzelor mai lungi de 1 mm, alipiți. Flori glomerulate. Bractei verzi, la vârf barbutate, cu deosebire în partea anterioară pe margini patent păroase. Pedunculi florali glanduloși, cel mult de lungimea caliciului, de obicei cu mult mai scurți, penduli, după înflorire din nou erecti. Sepale lanceolate, acute, păroase, lungi de 4 mm. Petale albe, aproape de lungimea caliciului, pe $1/4$ despicate. Filamentele staminelor glabre, neegale în lungime. Capsulă aproape de 2 ori mai lungă decât caliciul galben-verde; pedunculii fructiferi cel mult de lungimea caliciului, de obicei mai scurți decât acesta. Semințe brun deschise, late de 0,4 mm. III — IX.

Stațiunea. Prin locuri umede, dela câmpie până în regiunea montană.

Răsp. în țară: Comună în întreaga țară.

Variabilitatea speciei

var. *corollinum* Fenzl in Ldb. Fl. ross. I (1842) 404. — *C. glomeratum* α *corollinum* Rouy et Fouc. Fl. Fr. III (1896) 213. — Planta, afară de peri glanduloși, are și peri patenți simpli, iar din loc în loc peri lănoși. — Reg. Hunedoara: Paroș (f. Hațeg). — Reg. Timișoara: Svința (r. Mehadia). — Reg. Craiova: între Gura Văii și Vârciorova (r. Tr. Severin).

f. *macrophyllum* Zap. Consp. Fl. Galic. crit. III (1911) 66. — Înaltă de 20 cm. Frunze mari, lat eliptice, cele mijlocii mai lungi de 2 cm și late de 1—2 cm. — Reg. Craiova: Gura Văii (r. Tr. Severin).

f. *elongatum* A. et G. Syn. V. 1 (1918) 677. — Pedunculi florali alungiți. Plantă mare, ramificată. — Reg. Constanța: Cheia (r. Medgidia).

Răsp. gen.: Aproape pe tot globul.

4. *C. brachypetalum* Desp. in Pers. Syn. I (1805) 520. — *C. viscosum* Poll. Hist. pl. Palat. I (1776) 448, non L. — Ic.: Pl. 5, fig. 3, 3a.

☉. Plantă cenușiu-verzuie, moale păroasă, în partea superioară glanduloasă, rar neglanduloasă. Tulpini erecte, simple sau ramificate, distanțat foliate. Frunze oblongi sau oval oblongi, obtuze, \pm acute, alipit cenușiu-păroase, cu margini ciliate. Inflorescență laxă. Bractei verzi, la vârf barbute. Pedunculi floriferi dens păroși, la fructificare de 2—3 ori mai lungi decât caliciul, ușor patenți și spre vârf recurbați. Sepale ovat lanceolate, acute, lungi până la 4 mm, cu margine îngust membranoasă, păroase până la vârf. Petale albe, de lungimea caliciului sau ceva mai scurte, ciliate spre bază. Filamentele staminelor ciliate. Capsulă aproape dreaptă, numai cu puțin mai lungă decât caliciul. Semințe brun-roșcate, late de 0,3 mm. IV—VI.

Stațiunea. Pe locuri înierbate, cultivate, pe lângă ziduri și drumuri.
Răsp. în țară: Foarte comună în întreaga țară.

Variabilitatea speciei

- 1 a Plante de obicei lipsite de peri glanduliferi, rar se găsește câte unul împreună cu alte feluri de peri 2
- 1 b Plante bogat glandulos-păroase 3
- 2 a Tulpina rigidă. Frunze inferioare alungite, cele mijlocii alungit lanceolate, acute. Caliciu lung de 5—6 mm. Capsulă lungă de 7—8 mm. Plantă complet lipsită de peri glanduliferi
f. *firmum* (Velen.). — *C. brachypetalum* β *firmum* Velen. Fl. bulg. Suppl. I (1898) 51. — Reg. *Timișoara*: Băile Herculane pe Mt. Domogled.
- 2 b Tulpina slab rigidă. Frunze mijlocii eliptice până la ovate, obtuze. Caliciul lung de 3 mm. Capsulă lungă de 6 mm. În inflorescență se găsesc uneori și câțiva peri glanduliferi
f. *strigosum* Fries Fl. halland. (1817) 78. — *C. brachypetalum* α *eglandulosum* Fenzl in Ldb. Fl. ross. I (1842) 404. — Reg. *Cluj*: Bistrița; Chiochiș (r. Beclean); Cluj, Dezmir. Reg. *Aut. M.*: Tg. Mureș. Reg. *Pitești*: Corbeni, Mt. Ghițu (r. Curtea de Argeș). Reg. *București*: București (Herăstrău); Ghimpați (r. Mihăilești); Comana (r. Vidra).
- 3 a Filamentele staminelor glabre
f. *interpositum* Nyár. et Prod. f. nova in Add. pag. 663. — Reg. *Constanța*: între Stupina și Crucea (r. Hârșova).
- 3 b Filamentele staminelor păroase
f. *tauricum* (Spr.). — *C. tauricum* Spreng. Nov. prov. (1819) 10. — *C. brachypetalum* β *tauricum* Kern. Sched. FEAH I (1832) 81, pro var. — Reg. *Cluj*: Cluj (V. Plecica); Cheia Turzii. Reg. *Stalin*: Gușterița (r. Sibiu). Reg. *Hunedoara*: Simeria; Deva; Mții Retezatului. Reg. *Arad*: Arad și în tot raionul. Reg. *Craiova*: Vârciorova, Tr. Severin, Hinova. Reg. *Pitești*: Govora; Câmpulung. Reg. *București*: București (Chitila, Băneasa); Ghimpați (r. Mihăilești); Pasărea (r. Brănești); Lăhliu. Reg. *Constanța*: Ciucurova, Nicolae Bălcescu (r. Babadag).

Răsp. gen.: Europa centrală și sudică. Africa de Nord, Asia Mică, Transcaucasia.

5. *C. semidecandrum* L. Sp. pl. ed. I (1753) 438; Schischk. in Fl. U.R.S.S. VI (1936) 450. — Ic.: Pl. 4, fig. 2, 2a.

☉, ☉. Plantă înaltă până la 15 (30) cm, de obicei gălbui-verzuie, glandulos păroasă, cu 1 sau mai multe tulpini erecte sau culcate, întotdeauna fer-

Planșa 4. — 1. *Cerastium glomeratum* Thuill. 1a. fruct mărit. — 2. *C. semidecandrum* L., 2 a. fruct mărit. — 3. *C. caespitosum* Gilib., 3a. floare, 3 b. fruct mărit. — 4. *C. fontanum* Baumg. — 5. *C. pumilum* Curt., 5 a. bractee. — 6. *C. pumilum* Curt. ssp. *pallens* (F. W. Schultz), 6 a. bractei membranoase.



tile. Frunze ovate sau ovat eliptice, cele inferioare scurt pețiolate și repede ofilite, puțin mai lungi de 1 cm, la vârf obtuziuscule; perii mai scurți de 1 mm. Inflorescență puțin ramificată. Pedunculi floriferi glanduloși, după înflorire răsfrânți în jos. Bractei lat membranoase la vârf, pe o lungime de cel puțin $1/4$ din lungimea lor, la vârf glabre. Flori de 5 mm în diametru. Sepale ovate, acute, lungi de 3 mm, lat membranoase, glanduloase, pe margini și la vârf glabre, cu vârful uneori dințat. Petale albe, de lungimea caliciului sau puțin mai scurte. Stamine abia pe jumătate din lungimea caliciului, glabre. Capsulă aproape de două ori mai lungă decât caliciul. Seminte brun deschise, de 0,3—0,6 mm lățime. III — VI.

Stațiunea. Prin ogoare, locuri ierboase, pe țeline nisipoase, în păduri uscate, dela câmpie până la munte, în întreaga țară.

Răsp. în țară: Comună.

Variabilitatea speciei

1. *nānum* Grec. Cons. Fl. Rom. (1898) 119. — Tulpină simplă, subțire și scundă. — Prin locuri pleșuve, prin livezi. — Reg. Stalin: Predeal.

Răsp. gen.: Europa centrală și sudică (spre N până în Scandinavia), Africa de Nord, Asia Mică, Transcauzia.

6. *C. pūmulum* Curt. Fl. Lond. VI (1777—1787) tab. 30. — *C. glutinosum* Fries Novit. Fl. suec. ed. I (1814) 51. — Exs.: FRE nr. 1475 sub ssp. *glutinoso*. — Ic.: Pl. 4, fig. 5, 5a.

☉, ☉. Plantă înaltă până la 20 cm, fără lăstari sterili, de culoare verde închisă, în partea de jos roșcată, lipicios glandulos păroasă. Frunze oblongi sau oblong ovate, ± acute, păroase (perii frunzelor mai scurți de 1 mm), mai scurte decât internodiile tulpinii. Flori dispuse în dichizii 3-multiflore. Bractei verzi, ierbacei sau ușor membranoase pe margini. Pedunculi florali glanduloși, puțin mai lungi decât caliciul. Sepale ovate, acute, lungi de 4—5 mm, scurt păroase, glanduloase, cu marginea și vârful membranoase, glabre. Petale albe, de lungimea caliciului sau puțin mai scurte. Pedunculi fructiferi de 2—4 ori mai lungi decât caliciul. Capsula aproape de 2 ori mai lungă decât caliciul. Seminte brun închise, lungi de 0,8 mm. IV—VI.

Stațiunea. Prin locuri ierboase, însoțite, prin ogoare, la câmpie.

Răsp. în țară: În regiunea de câmpie, cunoscută în întreaga țară.

Variabilitatea speciei

ssp. *obscūrum* (Chaub.) Schinz et Thell. in Bull. Herb. Boiss. 2 sér. VII (1907) 402. — *C. obscurum* Chaub. in St. Amans Fl. Agen. (1821) 180. — *C. pūmulum* Curt. α. *typicum* Beck in Glasn. XVIII (1906) 487.

Petale puțin mai lungi decât caliciul. Stamina de regulă 10. Plantă verde închisă. Semințe brun închise. — Frecventă.

ssp. *pallens* (F. W. Schultz) Schinz et Thell. l.c. — *C. pallens* F. W. Schultz Fl. Gall. Germ. exs. Cent. I. Introd. (1836) 6. — *C. glutinosum* Fr. Novit. Fl. Suec. ed. I (1814) 51, s. str., Fl. U.R.S.S. VI (1936) 452. — *C. pumilum* Curt. β. *glutinosum* (Fr.) Beck l. c. — **Ic.**: Pl. 4, fig. 6a.

Petale cel mult de lungimea caliciului. Stamina de obicei 5. Plantă verde deschisă. Semințe de culoare mai deschisă. — În întreaga țară.

Răsp. gen.: Europa centrală și sudică (spre N până în Scandinavia), Africa de N, Asia de V. Introdusă în Caplanda și Australia.

7. *C. caespitosum* Gilib. Fl. lith. V (1781) 159; Schischk. in Fl. U.R.S.S. VI (1936) 455. — *C. viscosum* L. Sp. pl. ed. I (1753) 267, p.p. — *C. vulgatum* L. Sp. pl. ed. II (1762) 627, p.p. — *C. triviale* Link Enum. Hort. Berol. I (1821) 433. — **Ic.**: Pl. 4, fig. 3, 3a, b.

Tulpini până la 30 (60) cm, culcate, ascendente sau erecte, la bază adeseori radicante, simple sau ramificate, scurt păroase, uneori glanduloase, în partea inferioară uneori roșcate. Frunze oblongi sau îngust oblongi, obtuze sau acute, de 1—3 cm lungime și până la 9 mm lățime. Perii de pe marginea frunzelor lungi de 1 mm. Flori în dichazii, la început adunate, mai târziu răsirate, multiflore. Pedunculii floriferi dens și scurt păroși, după înflorire de lungimea fructului sau până la de 3 ori mai lungi decât acesta. Bracteele inferioare verzi sau cu dungi membranoase, cele superioare cu margini membranoase. Sepale ovate lanceolate, acute, lungi de 5—6 mm cu margini membranoase, păroase pe spinare. Petale albe, de lungimea caliciului sau puțin mai lungi, rareori mai scurte decât acesta. Capsulă cilindrică, până la de 2 ori mai lungă decât caliciul. Semințe brune, lungi de 0,8 m. IV—X.

Stațiunea. Prin fânețe, locuri cultivate, la marginea pâraielor, a drumurilor, pădurilor.

Răsp. în țară: Dela câmpie până la munte, în întreaga țară. La câmpie este mai rară și deseori lipsește.

Variabilitatea speciei

ssp. *eucaespitosum* A. et G. Syn. V. 1 (1918) 638.

Plante de statură mijlocie, dens păroase, dar fără peri glanduloși, îndeosebi la partea superioară.

Planșa 5. — 1. *Cerastium bulgaricum* Uechtr. cu fructe, 1 a. idem, cu flori. — 2. *C. arvense* L. — 3. *C. brachypetalum* Desp., 3 a. o stamină cu filament păros. — 4. *C. silvaticum* W. et K.



1 a Inflorescență răsfirată

f. *angustifolium* (Schur) Gürke in Richt.-Gürke Pl. eur. II, 2. (1899) 225. — *C. triviale* b. *angustifolium* Schur Enum. pl. Transs. (1866) 119. — Înaltă de 25 cm, cu frunze înguste. — *Reg. Aut. M.*: Sovata. *Reg. Cluj*: Cluj.

f. *elátius* Peterm. Fl. Lips. (1838) 329. — *C. macrocarpum* Schur in Verh. SVN II (1851) 177, n. nud., X (1859) 131, Enum. pl. Transs. (1866) 120. — Plantă înaltă de 30 cm sau chiar mai mult, cu frunze mai late. Se deosebește de f. *nemorale* Uechtr. prin lipsa glandelor în partea superioară. — *Reg. Aut. M.*: « Délhegy » în Mții Gurghiuului; Sovata la Lacul Ursului; Zetea (r. Odorhei). *Reg. Cluj*: Feleac.

f. *hirsutum* (Fries). — *C. vulgatum* α. *hirsutum* Fries Novit. Fl. suec. ed. II (1828) 125. — *C. vulgatum* α *typicum* Beck Fl. NÖ I (1890) 367. — Lăstari puțini sau lipsesc. Părțile verzi ale plantei ± dens hirsute. Caliciu de 5 mm, în fruct de 7 mm lungime. Capsulă cât jumătatea caliciului sau de 2 ori mai lungă. Seminte dispers verucoase, late de 0,7–0,8 mm. Frunze inferioare spatulate, cele mijlocii alungite, cele superioare ovate. — *Reg. Stalin*: Orașul Stalin; Făgăraș; Sibiu. *Reg. Hunedoara*: Ciopea (r. Hațeg). *Reg. Pitești*: Râul Vadului (r. Râmn.-Vâlcea); Căineni (r. Brezoiu); Câmpulung. *Reg. București*: Ciocănești, Bufta (r. Răcari); București (Chitila); Pasărea (r. Brănești); Comana (r. Vidra); Lehliu. *Reg. Constanța*: Babadag. *Reg. Bârlad*: Mții Vrancei.

f. *lanceifolium* (Schur). — *C. triviale* α. *lanceifolium* Schur Enum. pl. Transs. (1866) 119. — Tulpină de 4–6 dm lungime, cu frunze inferioare spatulate sau ovate lanceolate, lungi de 35 mm și late de 100 mm, foarte îndesuite păroase, obtuze, cele superioare lanceolate. Capsulă mai lungă decât caliciul cu încă o jumătate din lungime. — *Reg. Cluj*: Sălicea (r. Cluj). — *Reg. Ploști*: Mții Bucegi în Valea Albă.

f. *pseudonemorale* Zap. Consp. Fl. Galic. tit. III (1911) 73. — Multicaulă. Tulpină ascendentă, aproape erectă, înaltă de 3 dm. Frunze tulpinale eliptice, lungi de 2–3 cm. Inflorescență foarte răsfirată. Pedunculi subțiri. Petale puțin mai lungi de 5 mm. — *Reg. Aut. M.*: Zetea (r. Odorhei).

f. *alpinum* (Koch). — *C. triviale* Link var. δ *alpinum* Koch Syn. ed. I (1835) 122. — *C. vulgatum* β *alpinum* Ldb. Fl. ross. I (1842) 409. — Plantă dens păroasă cu peri lungi și scurți. Tulpini și lăstari radicali numeroși, ascendenți, cu frunze numeroase, late. Capsulă îngustă și întrecând caliciul cu încă 1/2 din lungime. — *Reg. Ploști*: Mții Gârbova (Cumpătul și Gagul); Mții Bucegi pe Caraiman. *Reg. Stalin*: Predeal. Mai este citat de Heuffel din Banat, fără localitate.

f. *ramosissimum* (Kittel) Gürke in Richt.-Gürke Pl. eur. II (1897) 225. — *C. triviale* var. *ramosissimum* Kittel Taschenb. Fl. Deutschl. ed. II (1844) 977. — Tulpină ramificată dela bază, cu ramuri numeroase și foarte alungite. Petale mai lungi decât sepelele. — *Reg. Cluj*: Valea Vinului (r. Năsăud).

1 b Inflorescență contrasă, adunată, ± capituliformă

f. *holosteoides* (Fries). — *C. holosteoides* Fries Novit. Fl. suec. ed. I (1814) 32. — Tulpini și frunze până aproape de inflorescență glabrescente sau glabre sau abia unilateral slab păroase. — *Reg. Stalin*: Mt. Piatra Mare. *Reg. Ploști*: Sinaia. *Reg. Suceava*: Mt. Rarău.

f. *alpêtre* (Schinz et Keller). — *C. caespitosum* var. *alpêtre* Schinz et Keller Fl. Schweiz II, ed. II (1905) 69. — Intreaga plantă dens păroasă, cu peri lungi. Tulpină aproape culcată. Frunze tulpinale alungit lanceolate, de 4 ori mai lungi decât late. — Mții Rodnei pe Ineu (1800 m).

ssp. *glandulosum* A. et G. Syn. V, 1 (1919) 643.

Plante în partea superioară glanduloase, robuste.

f. *glandulosum* (Boenningh.) Wirtg. Fl. preuss. Rheinl. (1870) 315. — *C. viscosum* β. *glandulosum* Boenningh. Prodr. Fl. Monast. (1824) 565. — Tulpină puternică, lungă de 60 cm sau mai lungă. Frunze mari, lungi de 3–6 cm și late de 2–5 cm. — Reg. Ploști: Vulcana (r. Pucioasa). Comun în Transilvania.

f. *polesiacum* Zap. Consp. Fl. Galic. crit. III (1911) 74. — Plantă mai debilă, dreaptă, de obicei numai de 1,5–3,5 dm înălțime. Frunze tulpinale eliptice, cele mijlocii de 1–2 cm lungime. Flori în general mari, cu petale adeseori mai lungi de 5,5 mm. — Reg. Stalin: Mt. Postăvarul.

Răsp. gen.: Pe tot globul.

8. *C. fontanum* Baumg. En. stirp. Transs. I (1816) 425. — *C. caespitosum* Gilib. b. *fontanum* Gürke in Richt.-Gürke Fl. eur. II, 2 (1899) 223. — Ic.: Pl. 4, fig. 4.

24. Tulpini la bază radicante, lung patul păroase, cu peri lungi de 1 mm, fără glande, la bază cu tulpini laterale sterile. Frunze ovate sau alungite, adeseori acute, cu perii de pe margini mai lungi de 1 mm. Bractei cu margini pielose. Pedunculi fructiferi erecți. Inflorescența cu 3–7 flori mari. Sepale lungi de 6,5–8 mm. Petale \pm încă pe 1/2 mai lungi decât caliciul. Capsulă de 12–16 mm lungime, spre vârf de obicei conic subțiată. Semințe verucoase, late de 1 mm. V — X.

Stațiunea. În regiunea subalpină, prin fânețe și prin alte locuri ierboase.

Răsp. în țară: *Mții Maramureșului*: Pop Ivan, Pecialu. *Mții Rodnei*: Pietrosul Mare, Corhele Pietrosului, Vf. Puzdrelor, Piatra Albă, Vf. Ineu, între Rodna și Năsăud. *Mții Țibleșului*: Țibleșul. *Mții Giurgeului*: Suhardul, Cheile Bicazului, Hăghimașul Mare, Mtele « Ōcsém », Mtele « Terkő ». *Mții Bistriței*: Ceahlău. *Mții Gurghiului*: Saca. *Mții Harghita*. Reg. Aut. M.: Toplița; Băile Tușnad. *Mții Buzăului*: Penteleu. *Mții Ciucașului*: Ciucaș. *Mții Bârsei*: Piatra Mare. *Mții Bucegi*: Sinaia (Poiana Stânei), Bușteni, Predeal, V. Babei, Jepii Mari. *Mții Făgărașului*: Ghițu, Capra Budei, Arpașul, Negoiu, Surul. *Mții Parângului*: Mândra, Gruicul. *Mții Retezatului*: Lacul Zănoaga. *Mții Țarcu-Godeanu*: Țarcu. *Mții Semenicului*: Sub Vf. Gozna.

Variabilitatea speciei

f. *geniculatum* (Grec.). — *C. fontanum* Baumg. β *geniculatum* Grec. Consp. Fl. Rom. (1898) 117. — Plante cu tulpini foarte numeroase, în treimea inferioară geniculate, apoi erecte, striate. Pedunculi floralți și întrenoduri foarte lungi. — *Mții Bucegi* în V. Babei și la Poiana Stânei (Sinaia).

f. *saxigenum* Zap. Consp. Fl. Galic. crit. III (1911) 74. — Plantă mică, lanat păroasă, verde sau slab surie, erectă sau ascendentă, de 10–15 cm înălțime, cu 1–3 flori. — Mt. Ceahlău.

f. *glabrēscens* (Grec.). — *C. font.* Baumg. γ. *glabrescens* Grec. l.c. — Plantă stufoasă, înaltă de 10 cm. Tulpini biserial sau foarte răzleț și mărunț pubescente. Frunze și sepale glabre. — Mții Bârsei (Vf. Piatra Mare).

ssp. *Schurii* Borza Consp. Fl. Rom. I (1947) 88. — *C. macrocarpum* Schur in Verh. SVN (1859) 131 p.p.

Capsulă de 1—1,5 ori mai lungă decât caliciul, lungă de 6—7 mm. Semințe late de 1 mm. Frunzele pot fi mari (f. *macrophyllum* Zap.) sau mici (f. *microphyllum* Zap.). — Pe șisturile cristaline din Carpații meridionali, în locuri umbrite și pe lângă pâraie.

9. *C. bulgaricum* Uechtr. in ÖBZ XXVI (1876) 221. — **Ic.:** Pl. 5, fig. 1, 1a.

☉, ☉. Plantă scundă, erectă, foarte ramificată, indesuit glanduloasă, de obicei lipsită de peri simpli. Frunze tulpinale ovate sau îngust ovate, obtuziuscule. Bractei ierboase. Pedunculi florali dens și scurt glanduloși, după înflorire nutanți, pe urmă erecți, de lungimea caliciului sau mai scurți. Sepale lățite spre bază, la bază lat trunchiate, evident trinervate, îngust scarios-marginate, dens glanduloase. Petale de culoare rozee, de lungimea sepalelor. Capsulă lungă de 10 mm, îngustată spre vârf și îndoită. IV—VI.

Stațiunea. Prin locuri însorite, pe stânci cu iarbă, în amestec cu *C. tauricum* și alte specii.

Răsp. în țară: *Reg. Timișoara:* Svinița (r. Mehadia). *Reg. Craiova:* Vârciorova, Gura Văii (r. Tr. Severin). — *Reg. Galați:* Greci, Cerna, între Greci și Nifon la poalele Mtelui Suluc (r. Tulcea).

Răsp. gen.: Balcanii răsăriteni, U.R.S.S. sudică, Asia vestică.

10. *C. silvaticum* W. et K. Pl. rar. Hung. I (1802) 100, tab. 97. — *C. microcarpum* Kit. in Schult. Österr. Fl. I, ed. II (1818) 696; Add. (1814) 291. — **Exs.:** FRE nr. 1683. — **Ic.:** Pl. 5, fig. 4; W. et K. l. c. tab. 97.

4. Plantă înaltă până la 60 cm, cu lăstari repenți, stoloniformi, rar foliați. Tulpini ascendente, aproape glabre în partea inferioară, în cea superioară sericeu păroase și glanduloase, cu frunze distanțate. Frunze moi, cele inferioare ovate, la vârf acute, îngustate în pețiol, cele superioare oblong lanceolate, sesile. Inflorescență laxă, glanduloasă. Bractei inferioare mari, verzi, cele superioare ovate lanceolate, cu margini membranoase, păroase. Pedunculii florali scurt păroși și glanduloși. Floarea de 13 mm în diam. Sepale lungi de 6 mm, acute, cu margini membranoase și spinare glanduloasă. Petale albe, cea de 2 ori mai lungi decât sepalele. Capsulă ușor îndoită, mai lungă decât caliciul. Semințe ovate, late de 1,2 mm. VI—VII.

Stațiunea. Prin păduri umbroase, umede, pe marginea pâraielor, în dumbrăvi umede.

Răsp. în țară: Răspândită sporadic în întreaga țară, cu excepția șesurilor bărănelor.

Variabilitatea speciei

f. typicum (Beck). — *C. silvaticum* α . *typicum* Beck Fl. NÖ I (1890) 368. — Petale de 2 ori mai lungi decât caliciul. — *Reg. Ploesti*: Masivul Penteleu.

f. umbrósum (Beck). — *C. silvaticum* β *umbrosum* Beck l.c. — Petale numai cu puțin mai lungi decât caliciul. — *Reg. Aut. M.*: Praid (r. Sângeorgiul de Pădure).

11. **C. banáticum** (Rochel) Heuff. Enum. pl. Banat. in Verh. ZBG Wien VIII (1858) 76, Sep. pag. 41. — *C. grandiflorum* W. et K. b. *banaticum* Roch. Pl. rar. Banat. (1828) 33. — **Exs.**: FEAH nr. 3240, FHE nr. 147, FRE nr. 40. — **Ic.**: Pl. 6, fig. 1; Roch. l. c. t. & b. II, fig. 6.

4. Tulpini radicante, cespitoase, repente, emițând tulpini florifere de 40 cm înălțime, fin păroase, uneori glanduloase. Frunze glabre, numai la bază scurt ciliate, alungit liniare, plane sau cu margini revolute, cele mai lungi până la 3—5 cm lungime și 1 (2) mm lățime, rigide, cele inferioare adeseori la subțioară cu fascicule sterile. Inflorescență multifloră, cu pedunculi florali relativ scurți. Bractei lat argintiu, membranaceu marginate. Sepale ovate lanceolate, lungi de 7—9 mm, lat membranaceu marginate. Petale albe de 2 ori mai lungi decât sepelele. V—VIII.

Stațiunea. Prin locuri pietroase, stâncoase și ierboase.

Răsp. în țară: *Reg. Timișoara*: Mții Semenicului (Štaierdorf—Anina); Mehadia Băile Herculane, Mții Cernei (Mt. Arsana, Peștera Columbaci), Mt. Domogled (V. Prolazului, V. Șoimului); Moldova Veche, Coronini, Drencova (r. Moldova Nouă). *Reg. Craiova*: Vârciorova, Porțile de Fier, Gura Văii, Turnu Severin, Hinova pe Dl. Stârmina (r. Tr. Severin); Mții Mehedinților (Cheile Topolniței, Piatra Cloșanilor); Peștera Polovragi (r. Novaci).

Răsp. gen.: Balcanii estici, Asia Mică.

12. **C. alpinum** L. Sp. pl. ed. I (1753) 438; Schischk. in Fl. U.R.S.S. VI (1936) 458. — *C. latifolium* Lam. Encycl. I (1783) 680, non L. — Cornuț de munte. — Havasi mädärhür. — Alpen-Hornkraut. — Ясколка альпийская. — **Ic.**: Pl. 6, fig. 6.

4. Plantă înaltă până la 20 cm, cu lăstari sterili așezați în rozetă, cei fertili ascendenți, sbârliți păroși cu peri moi, glanduloși sau neglanduloși. Tulpini ascendente sau erecte, dens și scurt păroase. Frunze ovate sau alungit lanceolate, obtuze sau acute, până la 10 mm lungime, de 4—8 mm lățime, pe ambele fețe păroase. Inflorescențe pauciflore. Bractei membranoase la vârf, cele inferioare adeseori verzi. Pedunculi floriferi cca de lungimea

florilor, scurt păroși și răzleț glanduloși. Floarea deschisă de cca 20 mm diametru. Sepale ovat lanceolate, acuminate, lungi de 7—8 mm, viloase, cu margini membranoase. Petale albe, aproape de 2 ori mai lungi decât caliciul. Capsulă lunguiată, mai lungă decât caliciul. Seminte \pm reniforme, brune, late de 1,2 mm, solzoase. VI—IX.

Stațiunea. Pe stânci și grohotișuri alpine, mai ales pe granit.

Răsp. în țară: *Mții Rodnei*: Pietrosul Mare, Vf. Puzdrelor, Ineu, Corongiș, Mihăiasa, Stiol, Galați, Gemenea. *Mții Călimani*, *Mții Gurghiului*. *Mții Bistriței*: Ceahlău. *Mții Giurgeului*: Hăghimașul Mare. *Mții Bucegi*: Caraiman, Coștila. *Mții Bârsei*: Piatra Mare. *Mții Făgărașului*: Colții Brezii, Arpașul, V. Doamnei, Capra Budei, Vârtopul, Negoiu. *Mții Sebeșului*: Izvorul Frumoasei. *Mții Parângului*: Cârja. *Mții Retezatului*: Vf. Peleaga, Căstura, Lacul Bucura, V. Pietrile. *Mții Țarcu-Godeanu*: Mt. Țarcu la Izvorul Hidegului și deasupra Groapei Bistra, Mt. Godeanu.

Variabilitatea specie

f. *Cârjae* Borza in BK XII (1913) 50. — Plantă unifloră, mică, cu frunze mici. — *Mții Parângului* pe Vf. Cârja.

f. *băleănum* Borza l.c. 51. — Plantă mai robustă, înaltă de 20 cm, cu bractei aproape rotunde. Frunze eliptice, răzleț hirsute. — *Mții Făgărașului* la Lacul Bălea.

var. *glanduliferum* Koch Syn. ed. I (1835) 123. — *C. viscosissimum* Schur Herb. Transs. et Enum. pl. Transs. (1866) 123, sec. Borza l.c. — Inflorescență glanduloasă. Frunze ovat lanceolate. — *Mții Făgărașului*: Vârtopul, Arpașul. *Mții Bucegi*: Vf. Obârșiei.

Răsp. gen.: Eurasia, America de N.

13. *C. lanatum* Lam. Encycl. I (1783—84) 680. — *C. villosum* Baumg. Enum. stirp. Transs. I (1816) 424. — *C. alpinum* L. ssp. *lanatum* (Lam.) A. et. G. Syn. V. 1 (1917) 619. — Lâna caprelor. — Gyapjas madárhúr. — Wolliges Hornkraut. — Exs.: FRE nr. 1476, 1477 sub f. *litigioso*. — Ic.: Pl. 6, fig. 2; Roch. Pl. Ban. rar. tab. II, fig. 5.

4. Plantă lax cespitoasă. Tulpini erecte sau ascendente, de 12—15 cm înălțime, indesuit și lung lanate. Frunze dens patent viloase, în tinerețe aproape tomentoase, lungi de 0,5—1,5 cm, eliptice sau invers ovate, cele superioare late de 3—5 (—8) mm, lanate sau sbârlit păroase cu peri lungi de 1—3 mm. Vârful frunzelor sterile dens alb lanat. Inflorescența cu 1—5 flori. Pedunculi viloși. Bractei membranos marginate. Sepale lungi de 8 mm, alungit ovat lanceolate, acute, membranos marginate. Petale mari, întrec cu mult sepelele în lungime. VI—IX.

Stațiunea. Pe culmile alpine.

Răsp. în țară: *Mții Rodnei*: Iezerul Pietrosului, Ineu, Lacul Lala, Corongiș, Gemenea, Sângeorz-Băi. *Mții Giurgeului*: Hăghimașul Mare, Curmătura, Piatra Singuratică, Mt. «Öcsém», Cheile Bicazului. *Mții Bistriței*: Ceahlău. *Mții Ciucașului*: Zăganul

Mții Bucegi: Caraiman, Coștila, Omul, Strunga, Guțanu, V. Mălăești. *Mții Bârsei*: Piatra Craiului. *Mții Iezer-Păpușa*: Păpușa. *Mții Făgărașului*: Capra Budei, Colții Brezii, Vârtoful, Căprăreasa, Arpașul, Lacul Bălea, Negoiu, Surul. *Mții Sibiului*: Piatra Albă. *Mții Parângului*: Gruiu, Mândra. *Mții Retezatului*: Slăveiu, Bucura, Borăscu. *Mții Țarcu-Godeanu*: Godeanu, Țarcu, Groapa Bistra.

Variabilitatea speciei

f. *litigiosum* Borza in BK XII (1913) 53. — *C. alpinum* L. d. *squalidum* Ram. ap. Grec. Plant. vasc. Ceahlău (1906) 26. — *C. Soleirolii* Auct. plur. Transs. et Romaniae, non Ser.; non *C. litigiosum* De Lens in Lois. Fl. Gall. I. ed. II (1828) 323; Hay. Prodr. Fl. balc. I (1927) 212. — Exs.: FRE nr. 1477. — Plantă de un verde suriu. Inflorescență și tulpină dens glandulos păroasă. Caudiculi decumbenți, foarte văcoși. Flori dispuse câte 3–9 în cime dichaziale. — *Mții Giurgeului*: Mt. «Öcsém». *Mții Bistriței*: Ceahlău la Panaghia. *Mții Bucegi*: Vf. Obârșiei, Strunga. *Mții Retezatului*: Zănoaga.

f. *deminutum* (Schur) Borza l.c. (1913) 52. — *C. lanatum* Lam. b. *deminutum* Schur Enum. pl. Transs. (1866) 123. — *C. Soleirolii* Ser. ap. Simk. En. Fl. Transs. (1886) 134, p.p. — Frunze mai mici, oblongi sau obovate, viloase. Plantă mai înaltă decât forma tipică. — *Mții Bucegi* (V. Mălăești). *Mții Făgărașului*: Arpașul, Podrăgelul, Negoiu. *Mții Țarcu-Godeanu*: Mt. Țarcu.

f. *pietrosuânium* (Zap.) Borza l.c. 53. — *C. pietrosuanum* Zap. in Bull. int. Acad. Cracov. (1910) 436. — Tulpină înaltă cu flori și capsule mici. Bractei ierbacee. — *Mții Rodnei*: Mt. Pietrosul Mare. *Mții Bucegi*.

Răsp. gen.: Regiunile muntoase din Europa.

14. *C. latifolium* L. Sp. pl. ed. I (1753) 439, ed. II (1762) 629. — Ic.: Pl. 6, fig. 3.

24. Tulpini erecte, de 4–8 cm înălțime, cu 1 (3) flori. Lăstari lungi, ascendenți, fertili și sterili, bogat foliați. Frunze ovate sau lanceolate, obtuze sau acute, sericeu păroase și glanduloase sau aproape glabre, lungi până la 3 cm și late de 5–10 mm. Pedunculi florali lungi de 10–25 mm. Bractei verzi. Floarea de cca 30 mm în diam. Caliciul glandulos și cu margini membranoase. Petale albe, de 2–3 ori mai lungi decât caliciul. Capsulă cilindrică, de 2 ori mai lungă decât caliciul. Semințe mari, lungi de 2,5 mm, brune, puțin comprimate. VII–VIII.

Stațiunea. Pe stânci sau grohotișuri alpine calcaroase sau granitice, cu totul sporadic la noi.

Răsp. în țară: *Mții Făgărașului*: Râiosul, pe brănele ce străjuiesc Drumul lui Vodă lângă Porțița.

Răsp. gen.: Alpi, Carpați, Caucaz, Scandinavia sudică.

Plansa 6. — 1. *Cerastium banaticum* (Roch.) Heuff. — 2. *C. lanatum* Lam. — 3. *C. latifolium* L. — 4. *C. Lerchenfeldianum* Schur. — 5. *C. arvense* L. var. *ciliatum* (W. et K.) Borza. — 6. *C. alpinum* L. — 7. *C. arvense* L. ssp. *calcicolum* (Schur) Borza.



15. *C. transsilvanicum* Schur in Verh. SVN II (1851) 117, n. nud.; Gris. et Schenk Iter Hung. in Wieg. Arch. (1852) 305; Schur Enum. pl. Transs. (1866) 121. — **Ic.**: Pl. 3, fig. 4,5,6; Veröff. d. Geob. Inst. Rübel Zürich (1933) tab. fig. 1—7.

4. Plantă cespitoasă, cu numeroase tulpini culcate la bază, apoi erecte, înalte până la 40 cm, glandulos hirsute. Frunze lungi de 2—5 cm, oblongi sau oblong lanceolate, acute, de obicei mai late la mijloc (4—7 mm), puțin păroase, cu margini viloase, aproape scarioase, în stare adultă glabre. Bractee scarioase, naviculate, obtuze, păroase. Flori dispuse câte 3—12 în cime ditrichotomice, lung pedunculate. Sepale oblong lanceolate, ierbacee, acute, lungi de 8—10 mm, cele interne lat hialin marginate. Capsulă oblongă, mai lungă decât caliciul, cu dinți erecți, obtuși. Semințe lungi de 2 mm. V—VIII.

Stațiunea. În locuri înierbate, pe stânci umede, umbroase, în regiunea subalpină și alpină, între 1500—2400 m.

Răsp. în țară: *Mții Bistriței*: Ceahlău. *Mții Bârsei*: Piatra Craiului, Piatra Mare, Postăvarul, *Mții Bucegi*: Jepii Mari, Jepii Mici, Caraiman, Coștila, Morarul, Colții Obârșiei, Strunga, V. Horoabei, Guțanul. *Mții Făgărașului*: V. Zărnei, V. Pojortei, Vf. Moșului, Vf. Trăsnita, Lăița.

Variabilitatea speciei

f. typicum Borza in Veröff. Geobot. Inst. Rübel in Zürich 10 Heft (1933) 60. — Plantă viguroasă, păroasă, acoperită cu peri lungi, groși. — Crește pe roci cristaline și calcaroase.

f. Nyárádyanum Borza l.c. 60. — **Ic.**: Pl. 3, fig. 4; Veröff. l.c. tab. fig. 3. — Diferă de tip prin frunzele îngust lanceolate și mai lungi. — *Mții Bucegi*: Sub Mt. Grohotișul între Vama Guțanu și Strunga (1600—1900 m). *Mții Bistriței*: Ceahlău (1700—1800 m).

f. lanatiforme Borza l.c. 60. — **Ic.**: Pl. 3, fig. 6; Veröff. l.c. fig. 2. — Aduce cu tipul însă este mult mai hirsut lanat păroasă. Frunzele rozulare seamănă cu cele dela *C. lanatum*. — *Mții Bucegi*: Vf. Omul.

var. acutifolium (Schur) Borza l.c. 61. — *C. acutifolium* Schur Enum. Pl. Transs. (1866) 122. — **Ic.**: Pl. 3, fig. 5; Veröff. l.c. fig. 5, 7. — Diferă de tip prin glabrescența frunzelor. Frunze mari, adeseori înguste și lipsite de peri glanduloși, de obicei ciliate numai pe margini, sau pot avea și peri lungi, însă răzleți. — *Mții Bucegi*: Frecventă în tot cuprinsul. *Mții Bârsei*: Piatra Mare, Postăvarul.

var. petrosum (Schur) Borza l.c. 61. — *C. petrosum* Schur Enum. pl. Transs. (1866) 122. — *C. transsilv.* var. *Paxianum* Borza l.c. 54. — Infățișarea plantei ca la tip, însă pedunculii floriferi și caliciul, împreună cu bracteele, acoperite cu peri glanduloși pluricelulari. — *Mții Bârsei*: Postăvarul, Piatra Mare, Piatra Craiului. *Mții Bucegi*: V. Ialomiței la Schitul Peștera.

Răsp. gen.: Endemic.

16. *C. arvense* L. Sp. pl. ed. I (1753) 438; Schischk. in Fl. U.R.S.S. VI (1936) 460. — Cornuț. — Mezei mędárhúr. — Acker-Hornkraut. — Ясколка луговая. — **Exs.**: FRE nr. 398, 399, 1474, sub formis div.

4. Plantă înaltă până la 30 cm, cu lăstari sterili și fertili. Tulpini erecte, acoperite cu peri reflecti, în partea superioară de obicei glanduloși. Frunze liniare sau lanceolate, scurt păroase, lungi până la 25 mm, late de 1—5 mm, acute sau obtuze. Inflorescențe cu 5—15 flori. Bractei păroase, ovate lanceolate cu margini membranoase late. Pedunculi floral glandulos păroși. Floarea deschisă de 12—30 mm diametru. Sepale ovate, late de 8 mm, cu margini membranoase, pe partea dorsală glanduloase. Petale de lungimea separelor sau de 2 ori mai lungi decât acestea. Capsulă mai lungă decât caliciul. Pedunculi fructiferi de 2—4 ori mai lungi decât caliciul. Semințe brune, late de cca 1 mm, pe margini aculeate. IV—IX.

Stațiunea. Prin livezi, locuri înierbate și cultivate, pe lângă drumuri și căi ferate, pe stânci și coaste pietroase, dela câmpie până în regiunea alpină.

Răsp. în țară: *Reg. Baia Mare:* Vișeu de Sus, Borșa pe Râul Cizla, Mții Mara-mureșului (Piatra Șoimului). — *Reg. Cluj:* Cluj (Dl. Hoia); Râmeți (r. Aiud). *Reg. Aut. M.*: Reghin, Gurghiu; Izvorul Mureșului (r. Gheorghieni); Tomești, Sâncrăieni, Mții Harghita (r. Miercurea Ciuc); Reci (r. Sf. Gheorghe). *Reg. Stalin:* Orașul Stalin; Sighișoara; Racoșul de jos (r. Rupea); Sibiu, Gușterița, Șura Mare, Cașolț, Tâlmaci (r. Sibiu). *Reg. Hunedoara:* Alba Iulia. *Reg. Oradea:* Ciucea (r. Aleșd). *Reg. Ploști:* Mt. Penteleu. *Reg. Bârlad:* Mrea Mera (r. Focșani). *Reg. Bacău:* Mrea Neamțului (r. Tg. Neamț).

Variabilitatea speciei

ssp. *arvum* (Schur) Corr. in Schinz et Kell. Fl. Schw. ed. II (1905) 182. — *C. arv.* var. *arvum* Schur in Verh. NV Brünn XV, 2 (1877) 152.

Plantă relativ robustă, de obicei înaltă, cu peri retrorși, glanduliferi. Frunze înguste, de 3—10 ori mai lungi decât late. Inflorescență multifloră.

Reg. Aut. M.: Băile Tușnad. *Reg. Stalin:* Blaj.

f. *angustifolium* (Fenzl) Borza Cons. Fl. Rom. I (1947) 89. — *C. arvense* L. β . *angustifolium* Fenzl in Ldb. Fl. ross. I (1842) 413. — *C. arvense* α . *typicum* Beck Fl. NÖ (1890) 368. — **Exs.:** FRE nr. 1474. — *Sepale acute*, de 6—9 mm lungime. Frunze liniar lanceolate, rar alungit lanceolate, late de 1—4 mm, împreună cu tulpina bogat păroase. — *Reg. Aut. M.*: Băile Tușnad la Lacul Sf. Ana, Sâncrăieni (r. Miercurea Ciuc). *Reg. Stalin:* Blaj; Orașul Stalin, Timișul de Jos. *Reg. Hunedoara:* Sântimbru (r. Alba Iulia).

ssp. *calcicolum* (Schur) Borza l.c. — *C. arvense* var. *calcicolum* Schur Phytogr. in Verh. NV Brünn XV (1877) 152. — *C. coronense* Schur l.c. 154. — *C. matrense* Kit. ex Spreng. Pugill. I (1813) 33 — **Exs.:** FRE. nr. 398. — **lc.:** Pl. 6, fig. 7.

Pedunculi floral glanduloși. Frunze superioare cu baza ovată, alungit lanceolate, late de 2—4 mm.

Reg. Baia Mare: Mții Rodnei (Pietrosul Mare, Arsicioara Pietrosului). *Reg. Cluj:* Mții Trăscăului (Colții Trăscăului, 1120 m). *Reg. Stalin:* Sânpetru (r. Stalin). *Reg. Bacău:* Ghimeș (r. Moinești).

f. *turfósum* Nyár. et Prod. f. nova in Add. p. 663. — Diferă de tip prin tulpina înaltă de 30 cm și frunzele liniare. — *Reg. Cluj*: Mții Gilăului (Mtele Mare); Mții Trascăului (Colții Trascăului). *Reg. Aut. M.*: Mții Giurgeului (Hăghimașul Mare); Tușnad; Băile Malnaș, Reci (r. Sf. Gheorghe). *Reg. Stalin*: Orașul Stalin (Tâmpa, Poiana Stalin, Stejăriș). *Reg. Hunedoara*: Mții Retezatului (Stănulete). *Reg. Bârlad*: Mții Vrancei. *Reg. Bacău*: Mții Giurgeului pe Suhard.

var. *eglandulosum* Borza in Bul. de Inf. Cluj IV (1924) 56. — **Exs.**: FRE nr. 399. — Plantă lipsită de peri glanduliferi. — *Reg. Cluj*: Colții Trascăului, alt. 1120 m.

ssp. *rigidum* (Scop.) Hegi Fl. Mitt.-Eur. III (1909—12) 376. — *Centunculus rigidus* Scop. Fl. carn. I, ed. II (1772) 322, tab. 19, fig. 552. — *Cerastium rigidum* Witm. Summa Pl. III (1789) 136 s.s.

Tulpină destul de înaltă. Frunze tari, cele inferioare scurt rotunjite, cele superioare alungite, deseori acute. Pedunculi florali și axa inflorescenței dens scurt păroase. — Carpații meridionali. (Dubioasă sec. Borza Consp. 89).

var. *ciliatum* (W. et K.) Borza in BK (1913) 72. — *C. ciliatum* W. et K. Pl. rar. Hung. III (1812) 250. — **lc.**: Pl. 6 fig. 5; W. et K. l.c. tab. 225. — Tulpină și frunze glabre. Frunze numai pe margini ciliate, oblong lanceolat-liniare, la bază ovate, la vârf acute. Pedunculi indesuit lung-păroși, fără peri glanduliferi. — *Reg. Timișoara*: Mehadia pe Mt. Arjana.

var. *Beckianum* (Hand. - Mazz. et Stadelm.) Borza l.c. 70. — *Cerast. Beckianum* Hand. - Mazz. et Stadelm. in ÖBZ LV (1905) 433. — Partea inferioară a tulpinii, pedunculii florali și sepalele foarte dens și scurt glandulos păroase. — *Reg. Timișoara*: Băile Herculane.

Răsp. gen.: Aproape în întreaga Europă, Africa nordică, Asia temperată, America de N. și centrală.

17. *C. Lerchenfeldianum* Schur Enum. pl. Transs. (1866) 122. — *C. arvense* L. ssp. *Lerchenfeldianum* A. et G. Syn. V. 1 (1917) 611. — *C. glandulosum* (Kit.) Jáv. Icon. fl. Hung. (1934) 135 nr. 1073. — *Stellaria glandulosa* Kit. ap. Schult. Österr. Fl. I (1814) 673, cf. Jáv. Herb. Kit. in Ann. Mus. Nat. Hung. pars bot. V (1936) 68. — *C. Tatrae* Borb. in MBL. I (1902) 319. — **lc.**: Pl. 6, fig. 4.

4. Tulpini ascendente, în partea inferioară numai pe o parte scurt păroase, spre vârf glanduloase. Frunze inferioare oblongi, acutiuscule, atenuate în petiol, ciliate, cele superioare sublanțolate, acute, glabriuscule, cu margini ciliat scabre. Flori puține, de mărimea celor de *C. arvense*, cu petale obcordate, glabre, de 2 ori mai lungi decât caliciul. Bractei scarios marginate, ciliate. Pedunculi glanduloși. Capsulă cilindrică, de 2,5 ori mai lungă decât caliciul. Semințe late de 1,5 — 1,7 mm, sgrăbunțoase. VI—IX.

Stațiunea. Prin locuri ierboase și pietroase din etajul subalpin și alpin.

Răsp. în țară: *Mții Rodnei*: Pietrosul Mare, Corongiș, Saca. *Mții Giurgeului*: Hăghimașul Mare, Mtele «Öcsém». *Mții Bodocului*: Mtele Ciomad (la Tușnad). *Mții Ciucașului*: Ciucașul. *Mții Bucegi*: în tot cuprinsul. *Mții Bârsei*: Postăvarul, Piatra Craiului, Orașul Stalin pe Tâmpa. *Mții Făgărașului*: Colții Brezii, Vârtopul, Arpașul, Buteanu, Râiosul, Capra Budei. *Mții Retezatului*: Paltina, Păpușa, Piatra Iorgovanului. *Mții Tarcu-Godeanu*: Tarcu. *Mții Gilăului*: Mt. Scărișoara (la Poșaga de Sus). *Mții Trascăului*: Colții Trascăului.

Variabilitatea speciei

f. **ciarcanense** (Zap.). — *C. ciarcanense* Zap. Consp. Fl. Galic. crit. III (1911) 90. — *C. Lerchenfeldianum* Schur var. *ciarcanense* Borza in BK (1913) 69. — Tulpină neglanduloasă, lungă de 14 cm. Frunze late de 2,5 mm. — *Mții Maramureșului*: Mt. Ciarcanul (1600—1700 m).

f. **Simonkaianum** Borza l.c. (1913) 70, fig. 5. — Frunze ovate lanceolate, lungi de 2 cm și late de 8 mm. — *Reg. Stalin*: Mții Bucegi.

Răsp. gen.: Alpii estici.

× ***C. triculinum*** Nyár. et Prod. sp. hybr. nova in Add. pag. 663 = *brachypetalum* var. *tauricum* × *glomeratum*.

Dela *C. brachypetalum* var. *tauricum* are inflorescența mai laxă, capsula mai scurtă, care abia se ridică din caliciu, florile puțin mai mari și glandulozitatea în partea superioară a tulpinii. Prin pedunculii fructiferi mai scurți și filamentele glabre ale staminelor, aduce cu *C. glomeratum*.

Reg. Timișoara: între ruinele Tricule și comuna Tisovița, pe marginea pădurilor (r. Mehadia).

O b s. În afară de speciile spontane de *Cerastium* enumerate, adesea mai găsim câteva specii de origine sudică, cultivate ca plante ornamentale în grădini și mai ales în cimitire, care sunt folosite mai ales din cauza înfățișării lor alb tomentoase. Cele mai frecvent cultivate dintre aceste specii tomentoase sunt următoarele:

1 a Caliciu de 6—7 mm lungime, verde, împreună cu pedunculii și părțile superioare ale tulpinii, des glandulos (nu tomentos). Frunze surii-argintii sau surii-verzi, lanuginoase sau glabrescente, alungit lanceolate, lungi de 10—20 mm. — Originară din Spania, Corsica și Sardinia, Africa de N.

× ***C. Boissieri*** Gren. Monogr. Cerast. 62 in Mém. Soc. Émul. Doubs I (1841).

1 b Caliciu alb tomentos sau lanuginos și neglandulos

2 a Frunze liniare, până la 4 cm lungime și 1 (1,5) mm lățime, rar lanuginoase, uneori ± glabrescente. Caliciu de 7 mm lungime. Corolă lungă de 16—18 mm. Bractei inferioare (ca și cele superioare) foarte lat membranoase. — Originară de pe litoralul adriatic al Peninsulei Balcanice

× ***C. grandiflorum*** W. et K. Pl. rar. Hung. II (1805) 183, tab. 168.

2 b Frunze dela lat lanceolate până la îngust lanceolate, gros lanuginoase. Bractei mai puțin membranoase. 3

3 a Toment compus din peri lungi, ramificați. — Originară din Grecia

× ***C. candidissimum*** Correns in ÖBZ LIX (1909) 171. — *C. grandiflorum* Auct. — *C. tomentosum* Auct.

- 3 b Toment compus din peri lungi, șerpuitori, simpli, neramificați. 4
- 4 a Plante des cespitoase. Frunze lanceolate sau lat lanceolate. Bractei ovate lanceolate. Petale lungi de 10—13 mm, \pm lent atenuate în unguicule, bifidate până la 1/2 parte, de 1,5—2 ori mai lungi decât caliciul. — Originară din Italia de mijloc și de S.
- * **C. tomentosum** L. Sp. pl. ed. I (1753) 440.
- 4 b Plantă cespitoasă, fragilă. Frunze liniar lanceolate. Bractei liniare, tomentoase. Sepale asemănătoare cu bractele. Petale obcordate, lent atenuate, de 2 ori mai lung de cât caliciul. — Originară din Crimeea.
- * **C. Biebersteinii** DC. Mém. Soc. Phys. Genève I (1823) 436; Schischk. in Fl. U.R.S.S. VI (1936) 463.

Genul 76. **HOLÓSTEUM**¹⁾ L.

Gen. pl. [ed. I (1737) 376, nr. 928 in App.], ed. V (1754) 39, nr. 98. — Cuișoriță.

Plante anuale cu tulpină foliată numai la bază și inflorescența terminală grupată în formă de umbelă. Frunze opuse, nestipelate. Flori de tipul 5. Petale crenat denticulate. Stamine 3—5. Stile 3—5. Capsulă cilindrică, deschizându-se înafară prin 6 dinți recurbați. Semințe hastate, cu o proeminență pe una din laturi (radicula), pe cealaltă latură prezentând un șanțuleț. Embrion încârligat, cu radicule pe partea dorsală, despiciând albumenul.

○ **H. umbellatum** L. Sp. pl. ed. I (1753) 88; Muravjeva in Fl. U.R.S.S. VI (1936) 466. — Cuișoriță. — Tavaszi olocsány. — Gemeine Spurre. — Костенец зонтичный. — Exs.: FRE nr. 396, 956 a, b. — Ic.: Pl.7, fig. 1.

○. Plantă albăstruie, cu rădăcini fusiforme, scurte, emițând tulpini sterile și fertile. Tulpini erecte, cilindrice, de 25—30 cm, glabre sau în porțiunea superioară lipicios glanduloase, cu internodii scurte la bază și lungi în partea superioară. Frunze întregi, acute, glabre sau glandulos ciliate, lungi până la 15 mm, cele inferioare obovate, îngustate în pețiol, cele superioare oblong ovate sau lanceolate, sesile și concrescute la bază. Inflorescență paucifloră. Pedunculi floralii glabri sau glandulos păroși. Sepale 5, oblong ovate, acute, cu margini membranoase, glabre sau glandulos păroase. Petale 5, albe, rar rozee, mai lungi decât caliciul, obovate, la vârf dințate. Stamine 5 sau 3, rar 4, mai scurte decât petalele. Ovar oblong ovat, cu 3 (rar 4) stile. Capsulă oblong ovată, mai lungă decât caliciul, deschizându-se prin 6, (rar 5 sau 10) dinți reflecti. Semințe brun-roșcate, papiloase. III—V.

Stațiunea. Comună prin ogoare, pe lângă ziduri, locuri înierbate, drumuri, în deosebi la câmpie.

¹⁾ Holósteon, nume de plantă la Dioscorides (sec. I e. n.)

Răsp. în țară: Comună în întreaga țară prin locuri de cultură, grâne, porumbiști, miriști vechi, drumuri, din regiunea de câmpie și montană.

Variabilitatea speciei

f. *typicum* (Beck). — *H. umbellatum* a. *typicum* Beck Fl. NÖ I (1890) 363. — *H. ciliatum* Opiz Naturalientausch (1825) 128. — **Exs.**: FRE nr. 956 a, b. — Mijlocul internodiilor și marginea frunzelor glanduloase. Pedunculi florali și caliciu glabri. — *Reg. Stalin*: Blaj. *Reg. Cluj*: Cheia Turzii; Aiud. *Reg. Iași*: Iași.

f. *glutinósum* (M.B.). — *Arenaria glutinosa* M.B. Fl. taur.-cauc. I (1808) 344. — **Exs.**: FRE nr. 396. — Toate părțile glanduloase, cu excepția laminei frunzelor. — *Reg. Cluj*: Rodna; Sântioana (r. Gherla). *Reg. Constanța*: Dumbrăveni (r. Băneasa).

f. *parciglandulósum* Schur in Verh. NV Brünn XV (1877) 138. — Toate părțile verzi ale plantei foarte dispers glanduloase. — *Reg. Craiova*: Popoveni, Balta Verde. (r. Craiova).

f. *transilvânicum* Schur Enum. pl. Transs. (1866) 114. — *H. umbellatum* a. *transilvânicum* Schur l.c. — Plantă mare, cărnoasă. Tulpina până la mijloc frunzoasă, culcată sau ascendentă, de 30–40 cm înălțime. Frunze late, ovate, pe margini glanduloase. Pedunculi și sepale glanduloase. — *Reg. Cluj*: Nimigea (r. Năsăud); Cluj.

f. *semicálvum* Schur in Verh. NV Brünn XV (1877) 138. — Glanduloasă în părțile inferioare, în cele superioare ± glabră. — *Reg. Cluj*: între Gilău și Cluj pe malul Someșului.

f. *glabrum* (Schur). — *H. umbellatum* a. *glabrum* Schur Enum. pl. Transs. (1866) 114, n. nud. ex O. Kuntze Taschenfl. Leipz. (1867) 226. — Marginea frunzelor glabră. — *Reg. Cluj*: Cluj, Feleac.

f. *subglábrum* Nyár. Kv. fl. III (1942) 195, c. diagn. hung. et in Bul. șt. Acad. R.P.R. Sect. șt. biol. tom. III, nr. 1 (1951) 29. — Numai pedunculii florali glabri. — *Reg. Cluj*: Cluj.

f. *Heuffelii* (Wierzb.). — *H. Heuffelii* Wierzb. in Flora XXV. I (1842) 264. — Întreaga plantă acoperită cu peri glanduloși. — În întreg Banatul.

Genul 77. MOENCHIA *) Ehrh.

Beitr. II (1788) 177.

Plante anuale, erecte, netufoase, cu frunze liniare sau liniar lanceolate. Petale 4–5. Sepale 4–5. Stamine 4, 8 sau 10. Stile 5, mai rar 4, așezate între petale. Petale întregi, cel mult ușor emarginate. Capsulă polispermă, deschizându-se la vârf prin 10 dinți.

*) După numele lui Conrad Moench (1744–1805), profesor de botanică la Marburg.

Pl anș a 7. — 1. *Holosteum umbellatum* L. — 2. *Sagina procumbens* L., 2 a. Caliciu cu 4 diviziuni. — 2. *S. ciliata* Fries, 3 a. o pereche de frunze, 3 b. caliciu cu 4 diviziuni. — 4. *S. Linnaei* Presl, 4 a. caliciu și fructul deschis. — 5. *S. nodosa* (L.) Fenzl. — 6. *Minuartia sedoides* (L.) Hiern. — 7. *M. fasciculata* (L.) Hiern, 7 a. o floare puțin mărită. — 8. *M. tenuifolia* (L.) Hiern. — 9. *M. viscosa* (Schreb.) Schinz et Thell. — 10. *Sagina subulata* (Sw.) Presl, o pereche de frunze, 10 a. o floare deschisă, 10 b. fructul.



*M. mântica*¹⁾ (L.) Bartl. Cat. Hort. Goett. (1839) 5. — Exs.: FHE nr. 145 I, FRE nr. 233 a. b. — Ic.: Pl. 8 fig. 7.

○. Rădăcini fusiforme, simple sau ramificate. Tulpini erecte, până la 30 cm, simple, subțiri, rotunde, glabre, cu 5—6 perechi de frunze. Frunze opuse, liniar lanceolate, acute, glabre, albastrii, sesile, concrescute la bază. Inflorescență dichotomică sau trichotomică. Pedunculi florali lungi, erecți, glabri, cu bractei lanceolate, având margini lat membranoase. Flori de 10 — 12 mm în diam. Sepale 5, lungi de 6—9 mm, ovate lanceolate, cu margini membranacee. Petale 5, albe (rar azurii), cca de 2 ori mai lungi decât sepelele. Stamine 10 (rar 8), mai scurte decât caliciul. Stile 5, (rar 3 sau 4), de 2 ori mai lungi decât ovarul ovoid. Capsule de lungimea caliciului, deschizându-se prin 5 dinți dubli. Semințe de 0,5—0,8 mm lungime, reniforme, adânc brăzdate la margini. V—VI.

Stațiunea. Prin livezi, locuri ierboase, foarte comună în părțile sudice din țară.

Răsp. în țară: *Reg. Timișoara*: fânețele din lungul văi Mehadica, (foarte abundentă), Topleț, Orșova, Băile Herculane, Dubova (r. Mehadia); Mărul (r. Caransebeș). *Reg. Craiova*: Vârciorova spre Gura Cerovățului și spre Gura Văii, între Marga și Cireșul (r. Tr. Severin). *Reg. Galați*: între Tulcea și Babadag.

Răsp. gen.: Europa sudică, Asia Mică, Armenia.

Obs. Simonkai în En. Fl. Transs. (1866) 136, amintește după Baumgarten, ca plantă dubioasă pe *Moenchia erecta* Gaertn., Mey. et Scherbius Fl. Wett., din Transilvania dela Deva și Sâmbăta (r. Făgăraș). Această specie se caracterizează prin tulpina înaltă de 10 cm, erectă, frunze lanceolate, acute și flori tetramere iar nu pentamere ca la *M. mântica*.

Genul 78. SAGINA²⁾ L.

Gen. pl. [ed. I (1737) 118 nr. 336], ed. V (1754) 62, nr. 162. — Grășătoare.

Plante anuale sau perene, cu tulpini culcate, ascendente sau erecte, glabre sau glandulos păroase. Frunze opuse, concrescute la bază, glabre sau ciliate, liniare, ± filiforme sau lanceolate, fără stipele, adeseori cu muguri foliari sterili în axile. Flori mici, dispuse solitar în axilele frunzelor sau reunite în inflorescențe rare. Sepale 4 sau 5, erecte sau răsfrânte. Petale 4 sau 5 (adesea 6), foarte mici, până la de 2 ori mai lungi decât caliciul, albe, ovate sau obovate, uneori lipsă. Stamine 4, 5, 8 sau 10. Ovar ovat, cu 4—5 carpele. Ovule pe funicul lung. Capsulă ovată, deschizându-se până la bază prin 4 sau 5 valve înguste. Semințe numeroase, reniforme, brun închise, foarte

¹⁾ După numele pădurii Mantica, de lângă Verona.

²⁾ După latinescul sagina = îngrășământ, nutreț, deoarece cândva se cultiva ca plantă furajeră.

mărunte, cu un șanț pe spinare. Embriion îndoit, aproape încârligat. Placenta neburetoasă între rândurile de semințe.

Determinarea speciilor

- 1 a Stile 4. Capsulă 4 - valvulară. Stamine 4. Petale 4, mai scurte decât caliciul sau lipsesc. Sepale 4 2
- 1 b Stile 5, capsulă 5 - valvulară. Stamine 10. Petale și sepale 5 4
- 2 a Toate sepalele obtuze, aproape rotunjite la vârf, ovale. Plantă perenă, tufosă, culcată, cu capsula cu mult mai lungă decât caliciul
1. **S. procumbens**
- 2 b Cele 2 sepale externe scurt mucronate, ovate sau îngust ovate. Plante anuale, cu petale mici, care uneori lipsesc 3
- 3 a Pedunculi întotdeauna erecți. Sepale obtuze, patente, cu mult mai scurte decât capsula, glabre. Petale albe, uneori lipsesc . . 2. **S. apetala**
- 3 b Pedunculii aplecați după înflorire, la maturitate din nou erecți, împreună cu caliciul adeseori glanduloși. Sepale erecte. Capsulă comprimată, adeseori glanduloasă 3. **S. ciliata**
- 4 a Petale ovate, cu mult mai lungi decât caliciul. Frunze superioare lungi de 1 — 1,5 mm, mult mai scurte decât întrenodurile
6. **S. nodosa**
- 4 b Petale cel mult de lungimea caliciului 5
- 5 a Frunze scurt mucronate, cu mucronul mult mai scurt decât lățimea frunzei. Capsulă aproape încă odată atât de lungă cât caliciul; acesta de obicei glabru 4. **S. saginoides**
- 5 b Frunze lung mucronate, cu mucronul lung aproape cât lățimea frunzei. Capsula numai cu puțin mai lungă decât caliciul glandulos 5. **S. subulata**

1. **S. procumbens** L. Sp. pl. ed. I (1753) 128, ed. II (1762) 185; Steinberg in Fl. U.R.S.S. VI (1936) 474. — Grășătoare. — Heverō zoldhúr. — Liegendes Mastkraut. — Мшанка лежачая. — Exs.: FRE nr. 2522 a, b. — Ic.: Pl. 7, fig. 2, 2 a.

4. Plantă scundă, de 2—5 cm, cu rozete foliare desvoltate și tulpini ascendente, radicante, lungi până la 15 cm, simple sau ramificate, glabre și subțiri. Frunze îngust liniare, aproape filiforme, scurt mucronate, lungi de 5—12 mm, egal de lungi sau mai scurte decât internodiile, ciliate la bază. Flori de tipul 4, de 4—7 mm în diam., pe pedunculi lungi de 2—3 cm, subțiri și îngroșați la vârf, pornind solitari din axilele frunzelor. Sepale 4, lungi de 2 mm, lat ovate, obtuze, cu margini pergamentoase, subțiri. Petale 4 (sau lipsesc), albe, ovate, pe jumătate de lungi cât caliciul, alternând cu sepalele, de scurtă durată. Stamine 4, mai scurte decât ovarul. Stile 4, mai scurte decât ovarul, la înflorire reflecte. Capsulă ovată, de 2 ori mai lungă decât

caliciul, deschizându-se prin 4 dinți obtuși. Semințe brune, de 0,3—0,5 mm lungime, papilos scabre, purtând un șanț pe spinare. V—IX.

Stațiunea. Comună prin locuri cultivate umede, pe lângă drumuri, ziduri, locuri nisipoase, prundișuri, locuri stâncoase, etc.

Răsp. în țară: Comună în întreaga țară, dela câmpie până la munte.

Răsp. gen.: Eurasia, America, Australia.

2. **S. apétala** Ard. Animadv. bot. spec. II (1764) 22, tab. 8, fig. 1; Steinberg l. c. — *S. apetala* L. Mant. II (1771) 559, in Append.

○. Plantă de 3—15 cm, fără rozetă foliară bazală, glabră, erectă, cu tulpini ramificate dela bază, delicate, glabre sau glandulos ciliate în partea superioară. Frunze opuse, liniar filiforme, aristat mucronate, la bază ciliate, de lungimea internodiilor sau mai scurte. Pedunculi întotdeauna erecți, subțiri, glabri sau ușor glandulos-ciliați, Flori mici, cu 4 sepale oblong ovate, cu margini albe sau violete, glabre, obtuze, patente, cu mult mai scurte decât capsula; cele 2 externe scurt mucronate. Petale 4, mici, uneori lipsesc, de culoare albă. Capsulă ovată, deschizându-se prin 4 dinți obtuși. Semințe aspre, rareori aproape netede. V—IX.

Stațiunea. Prin câmpuri și locuri umede, păduri, în regiunea de câmpie.

Răsp. în țară: Cu totul sporadică. — *Reg. Oradea:* Mții Codrului.

Răsp. gen.: Sporadică în Europa, în Orientul apropiat, Africa de N, America de S.

3. **S. ciliáta** Fries in Liljeb. Utk. til. en Sv. Fl. ed. III (1816) 713. — *S. depressa* C. F. Schultz Prodr. Fl. Starg. Suppl. I (1819) 10. — *S. apetala* Ard. ssp. *ciliata* A. et G. Syn. V. 1 (1918) 799.

○. Tulpină înaltă până la 10 cm, cu lăstari principali erecți, ramificați dela bază, cei laterali ascendenți, neradicantși, cu internodii lungi. Frunze opuse, liniar subulate, aristat mucronate, ciliate, rar glabre, mult mai scurte decât internodiile. Pedunculi nutanți după înflorire, la maturitate din nou erecți, împreună cu caliciul adeseori glanduloși. Sepale 4, erecte, ovate, lipite de capsulă, de obicei slab glandulos păroase, cele 2 externe acute, cele interne obtuze. Petale 4, albe, mai scurte decât sepalele, caduce. Capsulă puțin mai lungă decât caliciul, deschizându-se prin 4 dinți obtuși. Semințe brun închise, aproape glabre, rareori papiloase. IV—VII.

Stațiunea. Prin locuri uscate, ogoare, margini de lacuri.

Răsp. în țară: Sporadică și rară. — *Reg. Oradea:* în jurul orașului Oradea: Băile Felix, Betfia, Săldăbagiu. *Reg. Timișoara:* Moldova Nouă; Orșova. *Reg. Ploști:* Mții Bucegi pe Jepii Mari.

Variabilitatea speciei

var. *depressa* (C. F. Schultz) Peterm. Fl. Lips. exc. (1838) 139. — *S. depressa* C. F. Schultz Prodr. Fl. Starg. Suppl. I (1819) 10, s. str. — Frunze ciliate cel mult la bază. — Comună. — *Reg. Cluj*: Șanț lângă Someșul Mare (r. Năsăud). *Reg. Stalin*: Ozun (r. Sf. Gheorghe); Râul Timiș sub Predeal (r. Stalin); Avrig, Tâlmăciu, Șelimbăr, între Mândra și Ocna Sibiului (r. Sibiul). *Reg. Ploiești*: Mții Bucegi pe Jepii Mari. *Reg. Suceava*: Mții Călimani pe Pâr. Timeului din V. Neagra (r. Vatra Dornei).

Răsp. gen.: Eurasia, America de N.

4. *S. saginoides* (L.) D. T. Anl. Beob. Alpenpfl. (1882) 189; Steinberg in Fl. U.R.S.S. VI (1936) 472. — *Spergula saginoides* L. Sp. pl. ed. I (1753) 441. — *S. Linnaei* Presl Rel. Haenk. II (1835) 14.

4. Plantă înaltă de 2–20 cm, cespitoasă, cu tulpini ascendente, rădicante la bază și stolonifere, neramificate, de obicei uniflore. Frunze opuse, liniar filiforme, scurt mucronate, (mucronul mult mai scurt decât lățimea frunzei), glabre, rar glanduloase, cu nervura mediană evidentă. Pedunculii mai lungi decât internodiile tulpinale, subțiri, glabri, după înflorire nutanți, mai târziu iarăși erecti. Sepale 5, ovate, obtuze, adeseori roșu marginate, alipite de fruct. Petale 5, albe, de obicei mai scurte decât caliciul sau cel mult de lungimea caliciului. Stamine 10 (rar 5). Capsulă oblong ovată, mai lungă decât caliciul (până la încă odată lungimea caliciului) deschizându-se prin 5 valve. Semințe cu rânduri regulate de papile, pe spinare cu un șanț. VI–VIII.

Stațiunea. Prin locuri umede și stâncoase din Carpați.

Răsp. în țară: *Mții Maramureșului*: Mt. Pecialu (1330 m alt.). *Mții Rodnei*: Pietrosul Mare (1710 m alt.), Cimpoeșul, Ineu. *Mții Bucegi*: Babele, Coștila, Obârșia Ialomiței. *Mții Bârsei*: Postăvarul. *Mții Făgărașului*: Arpașul, Buteanu. *Mții Sibiului*: Iezerul Cibinului. *Mții Parângului*: Mândra, Prislop. *Mții Retezatului*.

Variabilitatea speciei

f. *micrantha* (Bge.) Fenzl in Ldb. Fl. ross. I (1842) 339. — *Spergula micrantha* Bge. in Ldb. Fl. alt. II (1830) 183. — Flori mai mici, cu pedunculi mai subțiri și glanduloși. — *Mții Bârsei*: Piatra Mare.

Răsp. gen.: Europa. Asia de N, Africa de N, America de N.

Planșa 8. — 1. *Minuartia glomerata* (M.B.) Deg. — 2. *M. graminifolia* (Ard.) Jáv. — 3. *M. setacea* (Thuill.) Hay. — 4. *M. Gerardii* (Willd.) Hay. — 5. *M. laricifolia* (L.) Schinz et Thell. — 6. *M. verna* (L.) Hiern f. *leptophylla* (Rechb.) A. et G., 6 a. caliciu cu 3 nervuri (mărit), 6 b. var. *subnivalis* (Hegetschw.) Rüb. — 7. *Moenchia mantica* (L.) Bartl. — 8. *Minuartia austriaca* (Jacq.) Hay., o ramură.



5. *S. subulata* (Sw.) Presl Fl. sic. I (1826) 158. — *Spergula subulata* Sw. in Vet. Acad. Handl. Stockh. (1789) 45, tab. 1, fig. 2. — **Ic.**: Pl. 7, fig. 10, 10 a, 10 b.

4. Plantă înaltă până la 10 cm, puternic ramificată dela bază, emițând lăstari sterili și fertili, fin glanduloasă. Tulpini erecte sau ascendente, 1—3-flore. Frunze liniar subulate, lung mucronate (mucronul aproape cât lățimea frunzei), cu margini ciliate. Pedunculi foarte lungi, subțiri, erecti, glanduloși. Sepale 5, lungi de 2 mm, ovate, obtuze, îngust marginate și glanduloase. Petale 5, albe, ovate, puțin mai scurte decât caliciul. Stamina 10, mai scurte decât caliciul. Ovar cu 5 stile îndoite spre exterior. Capsulă puțin mai lungă decât caliciul, deschizându-se prin 5 dinți lanceolați. Semințe brun-roșcate, cu un șanț pe spinare. VI—VIII.

Stațiunea. Prin locuri umede, fânețe, poieni, margini de păduri pe marginea pâraielor și a râurilor, în turbării, etc.

Răsp. în țară: *Reg. Aut. M.*: Praid (r. Sângeorgiul de Pădure); Tușnad (la Lacul Sf. Ana, Lacul Mohoș, Mt. «Büdös»). *Mții Bucegi. Mții Tarcu-Godeanu.*

Răsp. gen.: Europa centrală și sudică (spre N până în nordul Norvegiei și Ins. Faer-Oer).

6. *S. nodosa* (L.) Fenzl Verbr. Alsin. (1833) tab. synopt. ad pag. 18; Steinberg l. c. 472. — *Spergula nodosa* L. Sp. pl. ed. I (1753) 440. — **Ic.**: Pl. 7, fig. 5.

4. Tulpini procumbente, ascendente, mai rar erecte, până la 15 (35) cm, puțin ramificate, glabre, sau în partea superioară glanduloase, cu noduri îngroșate, la bază de obicei cu rozetă de frunze. Frunze opuse, scurt aristate, cu margini slab ciliate, cele inferioare liniare, mai lungi decât internodiile, cele superioare de 1 — 1,5 mm lungime, mult mai scurte decât internodiile, în axile cu muguri foliacei sterili, scurți, care dau tulpinilor aspectul noduros. Flori de 0,5 — 1 cm în diam., cu pedunculi întotdeauna erecti, glabri sau glanduloși. Sepale 5, de 3 mm lungime, oblong ovate, inegal de lungi, erecte, ușor marginate, glabre sau puțin glanduloase. Petale 5, ovate, albe, de 2 ori mai lungi decât caliciul. Stamina 5 (8) sau 10, ceva mai scurte decât petalele. Capsulă ovată, ceva mai lungă decât caliciul, deschizându-se prin 5 dinți. Semințe numeroase, de culoare violetă sau brună închisă, pe marginea dorsală cu un șanț. VI—VIII.

Stațiunea. Prin locuri umede, nisipoase, marginea râurilor, prin turbării.

Răsp. în țară: *Reg. Aut. M.*: Praid (r. Sângeorgiul de Pădure); Tușnad (la Lacul Sf. Ana, Lacul Mohoș, Mt. «Büdös»). *Mții Bucegi. Mții Tarcu-Godeanu.*

Răsp. gen.: Europa.

Genul 79. **BUFFÓNIA**¹⁾ L.

[Nova pl. gen. Diss. Dass. (1747) 2, in Amoen. acad. I (1749) 112], Gen. pl. ed. V (1754) 17, nr. 41.

Plante anuale sau perene, cu tulpini erecte și frunze subulat setacee, alipite de tulpină. Flori tetramere, dispuse în cime laxe, spiciforme. Sepale 4. Petale 4, mici, spars-bidentate. Stamine 4 sau 8, sau mai puține. Capsulă lenticular comprimată, 2—4 - valvulară, netedă, cu 2 semințe.

B. tenuifolia L. Sp. pl. ed. I (1753) 123. — *B. parviflora* Griseb. Spicil. Fl. rumel. (1843) 197. — **Exs.:** FRE nr. 1931. — **Ic.:** Pl. 9, fig. 4, 4 a.

○. Tulpină erectă, glabră, racemiform ramificată, cu ramuri erecte. Frunze subulat setacee, concrescute la bază, cu margini scabre, cele superioare mai scurte, scvamiforme, cu pețiole puberuli la vârf. Sepale de 2 ori mai lungi decât petalele, trinervate, cu nervurile confluențe cu mult înainte de vârful separelor. Stamine 2—3. Semințe de 1 mm lungime, carenate pe dos. Capsulă ovată, pe jumătate mai scurtă decât caliciul. VII—VIII.

Stațiunea. Prin stepe calcaroase, în locuri pietroase, sfărâmate sau țărânoase.

Răsp. în țară: *Reg. Constanța:* Murfatlar pe coaste, Techirghiol pe colinele ce înconjoară lacul; Medgidia pe cele mai înalte dealuri; Enisala, Cogealac, Tariverde (r. Babadag).

Răsp. gen.: Europa sud-estică, Caucaz.

Genul 80. **MINUÁRTIA**²⁾ L.

Sp. pl. ed. I (1753) 89, Gen. pl. ed. V (1754) 39, nr. 100. — *Alsine* Wahlbg. Fl. Lapp. (1812) 127, non L. — Mierluță.

Plante ierboase, anuale sau vivace (mai rar semiarbuști mici), culcate, ramificate, cu frunze opuse, liniare sau subulate, lanceolate, mai rar rotunde și sesile. Flori hermafrodite de tipul 5, reunite în dichazii, rareori solitare. Sepale 5 (4), marginate, glabre sau glanduloase, acute. Petale 5 (rareori lipsesc), albe, roze sau verzui. Stamine 10, la bază cu 2 glande scurte. Stile 3, rar 4. Placentă neîngroșată între semințe. Capsulă oblong ovată sau sferică, deschizându-se prin 3 sau 4 valve. Semințe reniforme, aspre sau aculeate, cu funicul alungit și embrion inelar.

Determinarea speciilor.

- 1 a Plante anuale, cu rădăcini fusiforme. Frunze filiform subulate . . . 2
1 b Plante perene, cespitoase, cu rizom gros. Petale de lungimea caliciului, mai lungi decât acesta sau lipsesc 5

¹⁾ După numele naturalistului Leclerc Louis Georges de Buffon (1707—1788).

²⁾ După numele lui Juan Minuart (1693—1768), farmacist principal și profesor de botanică la Madrid.

- 2 a Sepale verzi, 3 -nervate, cu margini alb-membranoase, de 2—4 mm lungime. Inflorescență mai mult laxă, cu pedunculi alungiți. 3
- 2 b Sepale albe, pe dos verzi-striate, lanceolat subulate, lung acuminate, de 4—7 mm lungime, mult mai lungi decât corola. Flori sesile, scurt pedunculate; peduncul mai scurt decât caliciul. 4
- 3 a Sepale de 3—4 mm lungime, ovat lanceolate, plane, lung acuminate, mai scurte decât capsula îngust conică 11. **M. tenuifolia**
- 3 b Sepale de 2—3 mm lungime, lanceolate sau îngust liniar lanceolate, acuminate, plane, glandulos hirsute, \pm mai lungi decât capsula ovat conică 12. **M. viscosa**
- 4 a Tulpină glabră, cel mult caliciul și pedunculii răzleț păroase. Pedunculi de lungimea caliciului sau puțin mai scurți. Petale cât 1/3 parte a caliciului 2. **M. fasciculata**
- 4 b Tulpină îndesuit glanduloasă. Pedunculi cât 1/4 parte a caliciului, de 1—2 mm lungime, disparenți. Petale cât 1/2 din lungimea caliciului 13. **M. glomerata**
- 5 a Sepale albe, pe dos cu 2 strii verzi; marginea membranoasă albă, cel puțin de lățimea striilor verzi. Petale puțin mai lungi decât caliciul glabru 6
- 5 b Sepale verzi, 3 -sau multinervate 7
- 6 a Tulpini multiflore. Sepale de 2—3 mm lungime, ovate sau liniar lanceolate 3. **M. setacea**
- 6 b Tulpini pauciflore, adeseori numai cu 3—5 flori. Sepale de 4—6 cm lungime, îngust lanceolate **M. setacea** ssp. **banatica**
- 7 a Petalele lipsesc, sau dacă se găsesc, sunt cu mult mai scurte decât caliciul. Sepale de 1,5 — 2,5 mm lungime, ovat oblongi, obtuze, trinervate. Plantă de pe culmile munților, unde formează covoare cu aspectul unor mușchi 1. **M. sedoides**
- 7 b Petale cel puțin de lungimea caliciului. Sepale mai lungi. Tulpină adeseori alungită 8
- 8 a Frunze de cca 2 cm lungime, acute, uninervate. Sepale de 5—7 mm lungime, trinervate, scurt pubescente, la bază trunchiate
4. **M. laricifolia**
- 8 b Frunze adesea mucronate, la bază 3—5 -nervate. Sepale acute sau acuminate, îngust membranaceu marginate 9
- 9 a Frunze liniar lanceolate, de 2 mm lățime și 5 mm lungime. Sepale lungi de 7—10 mm, lanceolate, cu 5—7 nervuri. Flori aglomerate la vârful tulpinii 5. **M. graminifolia**
- 9 b Frunze de cca 1 mm lățime, filiforme sau liniar subulate 10
- 10 a Plantă glabră, cu tulpini cu 1—3 flori. Flori lung pedunculate. Petale încă odată atât de lungi cât caliciul. Sepale de 4—6 mm lungime, ovate **M. austriaca**

- 10 b Tulpină 1—4-floră sau multifloră, cu pedunculi \pm glanduliferi. Petale de lungimea caliciului sau puțin mai lungi 11
- 11 a Sepale și bractei trinervate, cu nervuri depărtate, bine distincte. Ramuri nelemnoase. Capsulă mai lungă decât caliciul 12
- 11 b Sepale și bractei 5—7-nervate, cu nervuri apropiate 13
- 12 a Sepale ovate, acute, alb marginate, de 3,5 — 4 mm lungime, cel puțin la bază glanduloase. Tulpini alungite, pleiochaziform ramificate, alcătuind un pâlț tufos 6. **M. verna**
- 12 b Sepale ovate eliptice, de 3,5 — 4,5 mm lungime, scurt acuminate, glabriuscule. Petale mai mari, de 5 mm lungime. Tulpini scunde, uni- sau pauciflore, formând pâlcuri tupoase, îndesuite 7. **M. Gerardii**
- 13 a Tulpini scunde, cu 1—3 flori, îndesuit tupoase. Frunze de 0,5 cm lungime, obtuze, filiforme, mai groase. Perechile de frunze la bază de 1—2 mm lățime, unite, falcate arcuite. Nervurile separelor se observă mai greu 10. **M. recurva**
- 13 b Tulpini alungite, de 10—20 cm lungime, multiflore (3—12). Frunze glabre, de 2—3 cm lungime, scurt mucronate. Inflorescență \pm glanduloasă. Sepale cu 3 nervuri proeminente și 2 nervuri externe, slab vizibile 14
- 14 a Inflorescența în timpul înfloririi capituliform glomerată, asemănătoare cu *M. glomerata*. Pedunculii florilor inferioare cel mult de lungimea florilor. Flori mari. Sepale de 7—8 mm lungime. . 9. **M. cataractarum**
- 14 b Inflorescența în timpul înfloririi relativ îndesuită. Pedunculii florilor inferioare de 2—3 ori mai lungi decât florile. Flori mai mici. Sepale de 4—5 mm lungime. 8. **M. frutescens**

1. **M. sedoides** (L.) Hiern in Journ. of Bot. (1899) 320. — *Cherleria Sedoides* L. Sp. pl. ed. I (1753) 425. — **Exs.**: FRE nr. 1222. — **Ic.**: Pl. 7, fig. 6.

2. Plantă înaltă de 4—8 cm, formând pâlcuri îndesuite, late de 5—15 cm. Axa principală multicapitată, emite numeroase tulpini răsirate sau erecte, dens foliate. Frunze îndesuite, liniar subulate, puțin trunchiate, obtuze, glabre, cu margini aspre, de 4—6 mm lungime, abia de 1 mm lățime. Flori solitare, terminale, sesile sau scurt pedunculate, cu pedunculii păroși. Sepale 5, ovate, verzi, obtuze, cu margini membranoase, păroase, 3 - nervate, de 2—2,5 mm lungime. Petalele lipsesc; dacă sunt prezente, filiforme. Stamene 10, cele exterioare la bază cu 2 glarde. Capsulă aproape de 2 ori mai lungă decât caliciul, trivalvulară. Seminte papiloase. VII—VIII.

Stațiunea. În et jul alpin pe piscurile înalte ale munților.

Răsp. în țară: *Mții Rodnei*. *Mții Bucegi*: Obârșia Ialomiței, Caraiman, Coștila, Omul. *Mții Făgărașului*: Arpașul, Breaza, Ucea Mare, Capra Budei, Iezerul Budei, Vârtopele la Iezerul din Podul Giurgului.

Variabilitatea speciei

f. **apétala** (Schur). — *Cherleria Sedoides* L. var. *apetala* Schur Enum. pl. Transs. (1866) 109. — Petalele lipsesc sau sunt rudimentare. — *Mții Bucegi*: V. Mălăești, Vf. Omul, Obârșia, Doamnele.

Răsp. gen.: Europa.

2. **M. fasciculăta** (L.) Hiern in Journ. of Bot. XXXVII (1899) 321. — *Arenaria fasciculata* L. Syst. ed. XII (1767) 733. — *Alsine fasciculata* Wahlenb. Fl. Lapp. (1812) 129. — *Arenaria fastigiata* Sm. Engl. Fl. II (1824) 309. — *Alsine Jacquinii* Koch Syn. ed. I (1835) 115. — *Minuartia fastigiata* Rehb. Ic. Fl. germ. V (1842) 28, tab. 206, fig. 4919. — **Ic.**: Pl. 7, fig. 7.

☉, ☉. Plantă înaltă până la 25 cm, cu tulpini glabre, ramificate spre vârf, erecte, în partea inferioară de obicei roșcate, mai ales spre bază dens foliate. Frunze setos subulate, erecte, spre bază lărgite și trinerve, cu margini ciliate. Flori în dichazii terminale și axilare, scurt pedunculate, (pedunculii puțin mai scurți sau de lungimea caliciului) rareori solitare. Bractei mai lungi decât pedunculii. Sepale inegal de lungi, lanceolat subulate, alb cartilaginoase, cu dungă mediană verde, de 4—7 mm lungime, mai lungi decât corola, acute. Petale albe, foarte scurte, cel mult de 1/3 din lungimea sepalelor. Capsulă alungită, mai scurtă decât caliciul. Semințe reniforme aculeat verucoase. VI—VIII.

Stațiunea. Pe pante uscate, insorite, în locuri pietroase, locuri cultivate, nisipoase, grohotișuri, pe lângă ziduri.

Răsp. în țară: *Reg. Hunedoara*: Sebeș; Zlatna pe Piatra Caprei (r. Alba Iulia) Deva, Dobra (r. Deva). *Reg. Pitești*: Băile Olănești pe V. Olăneștilor (r. Râmnic-Vâlcea).

Răsp. gen.: Europa de S și sporadică în Europa centrală, Africa de N.

3. **M. setăcea** (Thuill.) Hay. Fl. Steierm. I (1908) 271; Schischk. in Fl. U.R.S.S. VI (1936) 492, tab. XXVII, fig. 3. — *Arenaria setacea* Thuill. Fl. env. Par. ed. II (1799) 220. — *Alsine setacea* Mert. et Koch in Röhl. Deutschl. Fl. III, ed. III (1831) 286. — **Exs.**: FRE nr. 1225. — **Ic.**: Pl. 8, fig. 3.

4. Rizom cu lăstari fertili și sterili. Tulpini numeroase, ascendente, până la 15 cm, glabre, numai în partea inferioară puțin păroase. Frunze setaceu filiforme, scabre, spre bază ciliate. Inflorescențe 3—6-flore. Pedunculi floriferi glabri, de 2—4 ori mai lungi decât caliciul. Sepale ovate lanceolate, acute, lungi de 2—3 mm, alb cartilaginoase, cu o dungă mediană verde. Petale oblong ovate, albe, ceva mai lungi decât caliciul. Capsula de lungimea caliciului sau ceva mai lungă. Semințe reniforme, verucoase. VII—VIII.

Stațiunea. Pe coaste abrupte, cu deosebire pe calcar și gips.

Răsp. în țară: *Reg. Cluj*: Mții Meseșului în V. Ursului; V. Someșul Cald; V. Someșul Rece; Cheia Turzii; Râmeți (r. Aiud); Mții Trascăului (V. Runcului, V. Poșaga). *Reg. Aut. M.*: Odorhei; Mții Giurgeului (Mt. «Öcsém»). *Reg. Stalin*: Sânpetru pe Dl. «Talinenberg», Pasul Timiș, Predeal (r. Stalin), Mții Bucegi, Mt. Piatra Craiului. *Reg. Arad*: Arad și împrejurimi. *Reg. Timișoara*: în partea de E (Heuff.); Mt. Domogled. *Reg. Ploști*: Sinaia, Bușteni, Mții Bucegi. *Reg. Constanța*: Hârșova; Cernavoda, Băltăgești pe Dl. Alah-Bair (r. Medgidia). *Reg. Galați*: Filimon Sârbu pe Mt. Consul (r. Tulcea). *Reg. Bacău*: Cheile Bicazului (Piatra Glodului, Suhard, Surduc). *Reg. Suceava*: Mt. Rarău.

Variabilitatea speciei

var. *parviflora* (Velen.). — *Alsine setacea* β. *parviflora* Velen. in Abh. Böhm. Ges. Wiss. 7 ser. I (1886) 10; Fl. Bulg. (1891) 94. — Tulpini multiflore, îndesuite. Flori puține. Caliciu cu nervură mijlocie groasă, evidentă. Capsulă balonată la bază, la vârf contrasă, cu dinți ascuțiți. — *Reg. Galați*: Mții Măcinului.

var. *anatolica* (Boiss.). — *Alsine Anatolica* Boiss. Diagn. pl. or. Ser. I, VIII (1849) 97. — Frunze mici, alipite de ramuri, comprimate. Inflorescență îndesuită. Pedunculi mai scurți decât caliciul alungit cilindric, compus din sepal lanceolate. — *Reg. Galați*: Greci pe Dl. Țuțuiatu (r. Măcin).

ssp. *banatica* (Heuff.). — *Alsine setacea* β. *banatica* Heuff. Enum. pl. Banat. in Verh. ZBG Wien VIII (1858) 38, Sep. pag. 73.

Frunze capilare, ciliate. Inflorescență laxă, paucifloră, compusă din 3—5 flori. Sepale îngust lanceolate, lat membranaceu marginate, lungi de 3—5 mm. Pedunculi proporționali mai lungi și mai subțiri decât la *M. setacea*. Petale puțin mai lungi decât caliciul glabru.

Reg. Baia Mare: Mții Țibleșului în Surducul Râului Lăpuș. *Reg. Cluj*: V. Someșului Cald și V. Someșului Rece pe stâncării; Cheia Turzii; Poșaga pe Mt. Scărișoara. *Reg. Aut. M.*: Odorhei; Mții Giurgeului (Mt. «Öcsém»). *Reg. Timișoara*: Băile Herculane pe Mt. Domogled. *Reg. Craiova*: Vârciorova, Turnu Severin, Marga. *Reg. Ploști*: Mții Bucegi (Piatra Arsă, Zănoaga, Tătarul, Doamnele). *Reg. Constanța*: Hârșova pe stâncării.

Răsp. gen.: Europa centrală, Asia de V.

4. *M. laricifolia* (L.) Schinz et Thell. in Bull. Herb. Boiss. 2 sér. VII (1907) 403. — *Arenaria laricifolia* L. Sp. pl. ed. I (1753) 424. — Ic.: Pl. 8, fig. 5.

4. Rizomul emite tulpini sterile și fertile. Tulpini ascendente, numeroase, până la 30 cm înălțime, de obicei simple, alungite, adeseori roșcate, în partea superioară adeseori pruinoase. Frunze liniar subulate, rigide, acute, până la 2 cm lungime, cu margini fin dințate, uninervate. Flori în dichazii

Planșa 9. — 1. *Minuartia cataractarum* Jka. — 2. *M. frutescens* (Kit.) Tuzs. — 3. *M. recurva* (All.) Schinz et Thell., 3a. lăstari sterili cu frunze falcate. — 4. *Buffonia tenuifolia* L., 4a. fruct. — 5. *Spergularia marginata* (DC.) Kitt., 5a. sămânță mărită. — 6. *S. rubra* (L.) J. et C. Presl.



pauciflore, scurt pedunculate, relativ mari, până la 16 mm diametru. Pedunculi florali pruinoși. Sepale verzi, scurt pubescente, liniar lanceolate, obtuze, trinervate, de 5—7 mm lungime, de obicei roșcate, la bază trunchiate. Petale de 2 ori mai lungi decât caliciul, albe, obtuze, lungi până la 12 mm. Stamina 10, lungi cam pe jumătate din lungimea petalelor. Capsulă mai lungă decât caliciul; cele 3 valve bidentate la vârf. Semințe rotund reniforme, verucoase. VII—VIII.

Stațiunea. Sporadică pe coaste însoarite, pietrișuri, stânci calcaroase sau silicioase.

Răsp. în țară: Cu certitudine numai în Cheile Bicazului. Mai este indicată din: Mții Rodnei, Bârsei, Făgărașului și Retezatului. Deasemeni dela Râul Vadului și Căineni (Reg. Pitești, r. Brezoiu). Aceste stațiuni nu sunt încă confirmate.

Variabilitatea speciei

var. **multiflora** (Ser.) A. et G. Syn. V. 1 (1918) 766. — *Arenaria laricifolia* α *multiflora* Ser. in DC. Prodr. I (1824) 404. — *Alsine Kitaibelii* Nym. Consp. (1878) 116. — *Alsine laricifolia* α *typica* c. *Kitaibelii* Fiori et Paol. Fl. ital. I (1898) 343. — Tulpina culcată, solidă. Frunze scurte. Capsulă mare, de 1/2 ori mai lungă decât caliciul. — Impreună cu specia tipică în Cheile Bicazului.

Răsp. gen.: Europa centrală și occidentală.

5. **M. graminifolia** (Ard.) Jáv. in Fl. hung. exs. Cent. II (1914) nr. 142. — *Arenaria graminifolia* Ard. Animadv. spec. alt. (1764) 25, tab. 10. — *Alsine graminifolia* J. F. Gmel. Syst. II (1791) 507. — *A. Arduini* Fenzl Verbr. Als. (1833) tab. 57.

4. Plantă cespitoasă, cu rizom gros, târător și tulpini erecte. Frunze liniar lanceolate, lungi de 5 cm și late de 2 mm, plane, acuminate 3- multinervate, glabre sau lung glandulos și zbârlit păroase. Flori aglomerate la vârful tulpinii. Sepale de 7—10 mm lungime, lanceolate, cu 5—7 nervuri, acute, îngust membranaceu marginate. Petale cel puțin de lungimea caliciului.

Tipul crește în Italia, Alpii de SE și Balcanii de V; la noi numai ca:

ssp. **hungárica** Jáv. in Fl. hung. exs. Cent. II (1914) nr. 142. — **Exs.:** FRE nr. 1221 a, b; FHE nr. 142. — **Ic.:** Pl. 8, fig. 2.

Intreaga plantă dens și scurt glanduloasă. Frunze lungi de 5 cm. Caliciu lung de 7—8 mm. Capsulă mai scurtă decât caliciul. V—VII.

Stațiunea. Prin crăpături de stânci calcaroase.

Răsp. în țară: Reg. Timișoara: Mt. Arjana (1450 m) deasupra comunei Globurău (r. Mehadia).

Răsp. gen.: Endemică în R.P.R.

— ? *M. austriacă* (Jacq.) Hay. Fl. Steierm. I (1908) 274. — *Arenaria austriaca* Jacq. Fl. austr. III (1775) 39, tab. 270. — **Ic.:** Pl. 8, fig. 8.

4. Tulpini numeroase, filiforme, ascendente, până la 20 cm, simple sau ramificate, glabre sau în partea superioară glandulos păroase. Frunze îngust liniar lanceolate, lungi de 2 cm, până la 1 mm lățime, acute, în stare uscată evident trinervate. Flori câte 1—3, de 8—10 mm lățime, lung pedunculate. Pedunculi erecți, glabri sau păroși în partea superioară, cu 1—2 perechi de bractei mici. Sepale ovate, de 4—6 mm lungime, verzi, trinervate, glabre, mai scurte decât capsula. Petale albe, oblong obovate, îngustate în unguiculă, aproape de 2 ori mai lungi decât sepalele, dela mijloc patente. Stile 3, cu stigmat capitate. Capsulă lungă de 5—9 mm, cu semințe brune, reniforme, dens verucoase. VI—VIII.

Stațiunea. Planta este dubioasă la noi. Crește pe stânci și pe grohotișuri alpine.

Răsp. în țară: A fost publicată de Schur de pe Mții Bucegi și Mții Arpașului; este indicată și de pe Piatra Craiului (Vf. Baciului).

Răsp. gen.: Alpini de E, N și S.

6. *M. verna* (L.) Hiern in Journ. of Bot. XXXVII (1899) 320; Schischk in Fl. U.R.S.S. (1936) 505. — *Arenaria verna* L. Mant. I (1767) 72. — *Alsine verna* (L.) Wahlenb. Fl. Lapp. (1812) 129. — *Minuartia caespitosa* (Ehrh.) Deg. ap. Jáv. Magy. Fl. (1925) 315. — Mierluță. — Tavaszi ludhúr. — Frühlings-Miere. — Минуарция весенняя. — **Ic.:** Pl. 8, fig. 6, 6 a, 6 b.

4. Plantă înaltă de 5—15 cm, formând pălcuri dese, alcătuite din lăstari fertili și sterili. Tulpini fertile ascendente sau erecte, alungite, pleiochaziform ramificate; ramurile nelemnoase, glabre sau împreună cu pedunculii glanduloase. Frunzele liniar subulate, obtuze, pe fața superioară plane, pe cea inferioară convexe, trinervate. Inflorescența 4-multifloră. Sepale ovate lanceolate, de 3,5—4 mm lungime, trinervate, alb marginate, cel puțin la bază glanduloase. Petale albe, spre bază brusc îngustate în unguiculă, aproape cordate, egal de lungi sau ceva mai lungi decât caliciul. Antere purpurii. Capsulă de lungimea caliciului sau puțin mai lungă. Semințe rotund reniforme, verucoase. V—VIII.

Stațiunea. Pe stânci, locuri ierboase, uscate, din regiunea montană până în cea alpină.

Răsp. în țară: *Reg. Baia Mare:* V. Lăpușului între Peteritea și Răzoare (r. Lăpuș); Valea Vinului (r. Năsăud); Mții Rodnei: Ineu, Corongiș. *Reg. Cluj:* Turda, Cheia Turzii; între Aiud și Rimetea (r. Aiud); Mții Trascăului: Colții Trascăului, Vultureasa (la Poșaga). Piatra Cefii; Neagra, Scărișoara (r. Câmpeni). *Reg. Aut. M.:* Mții Călimani (Stru-

niorul, Haita); Odorhei, Lueta; Remetea (r. Gheorghieni); Mții Giurgenului (Mt. «Öcsém», Piatra Singuratică). *Reg. Stalin*: Mt. Tesla; Predeal, Râșnov, Mții Bârsei (Piatra Mare, Postăvarul, Piatra Craiului), Mții Bucegi, Mții Făgărașului (Bărcaciul). *Reg. Hunedoara*: Șard (r. Alba Iulia); Băița (r. Deva); Petreni în lungul Streiului (r. Hunedoara), Mții Retezatului (Custura). *Reg. Oradea*: Oradea. *Reg. Arad*: Măscu în vîi (r. Arad). *Reg. Timișoara*: Citat de Heuffel din Banat. *Reg. Craiova*: Mt. Oslea deasupra Tismanei. *Reg. Pitești*: Mții Făgărașului (Capra Budei, Mt. Răiosul). *Reg. Ploști*: Sinaia, Bușteni, Azuga. *Reg. Bacău*: Mt. Ceahlău. *Reg. Suceava*: Mt. Rarău.

Variabilitatea speciei

- 1 a Plantă viguroasă, cu ramificație \pm laxă. Inflorescență 4- multifloră 2
 1 b Plantă scundă, cu ramificație mai deasă. Inflorescență cu 1—3 flori, rar cu mai multe 4
 2 a Inflorescență \pm contractată, cu ramuri erecte 3
 2 b Inflorescență răsfirată, rară

var. *ramosissima* (Willd.) A. et G. Syn. V. 1 (1918) 741. — *Arenaria ramosissima* Willd. En. Hort. Berol. Suppl. (1813) 24, n. nud. ex Griseb. Spicil. Fl. rumel. I (1843) 201. pro var. *ramosiss.* *Alsine verna*. — Tulpina în partea superioară foarte ramificată, laxă. Pedunculi floralți glandulos păroși. Petale alungite, la bază retezate, cu puțin mai lungi decât sepalele. Capsulă de lungimea caliciului. — *Reg. Cluj*: Colții Trăs-căului. *Reg. Oradea*: Mții Bihorului. *Reg. Timișoara*: Băile Herculane pe Mt. Domogled.

f. *leptophylla* (Rchb.) A. et G. Syn. V. 1 (1918) 741. — *Tryphane verna* b. *leptophylla* Rchb. Ic. Fl. germ. V (1842) 29, tab. 207, fig. 4929. — *Ic.*: Pl. 8, fig. 6. — Tulpini bogat lax ramificate; pedunculi foarte lungi, glandulos păroși. Frunze înguste adeseori mai lungi de 2 cm, curbate, glabre. — *Reg. Cluj*: Cheia Turzii. *Mții Giurgenului*: Mt. Licaș, Mt. «Vithavas», Suhardul, Hăghimașul Mare, Mt. «Öcsém», Piatra Singuratică, Câmpul Alb (Fehérmező), «Vigyázókő». *Mții Cernei*: V. Ungurului în Mt. Arjana (la Mehadia). *Reg. Craiova*: Vărciorova spre Gura Slătincului.

- 3 a Tulpină de regulă ascendentă, \pm debilă

var. *montana* (Fenzl) A. et G. Syn. V. 1 (1918) 737. — *Alsine verna* ? *montana* Fenzl in Ldb. Fl. ross. I (1842) 349. n. nud. ex Griseb. Spicil. Fl. rumel. I (1843) 200. — Tulpină floriferă glabră, erectă sau ascendentă, cu frunze verzi închise, mai adeseori glabre, erecte sau subpatule. Inflorescență multifloră; pedunculi subțiri, glandulos păroși, dublu sau de mai multe ori mai lungi decât caliciul. Sepale oblong lanceolate, lungi de 3,5—4 mm, lung acuminate. Petale puțin mai lungi decât caliciul. Capsula întrece caliciul în lungime. — *Reg. Stalin*: Mt. Postăvarul.

f. *macrocarpa* (Beck) A. et G. l.c. 737. — *Alsine verna* s. *macrocarpa* Beck Fl. NÖ I (1890) 359. — Capsulă mai lungă decât caliciul. — *Reg. Ploști*: Mții Bucegi în V. Cerbului.

f. *glăbra* (Strobl) A. et G. l.c. 738. — *Alsine verna* s. *glabra* Strobl in Verh. ZBG Wien LIII (1903) 480. — Planta în întregime glabră. — *Reg. Bacău*: Mt. Ceahlău.

- 3 b Tulpină erectă, formează perne mari și dese

var. *stricta* Schinz et Kell. Fl. Schweiz. II, ed. III, Krit. Fl. (1914) 107. — Tulpină erectă, lungă, cu articule tulpinale lungi de 2—3 cm, cu 3—9 flori dispuse pe pedunculi lungi de 2 cm. Intreaga plantă puternică, alcătuită din păcuri (perne) întinse, înalte de 15 cm. — *Reg. Hunedoara*: Piatra Măceștilor deasupra comunei Paroș (900—1000) m (r. Hațeg). *Reg. Pitești*: Capra Budei și Răiosul în Mții Făgărașului.

4 a Formează perne

var. **oxypétala** (Woloszcz.). — *Alsine oxypetala* Woloszcz. in Spraw. Kom fiz. Ak. Umiej. XXII. 2 (1888) 214. — Tulpină de obicei puțin cărnoasă și ± rigidă. Frunze dispers, însă uniform glandulos ciliate.

f. **micropétala** (Zap.). — *Alsine Zarenczny* Zap. c) *oxypetala* Woloszcz. f. *micropetala* Zap. Consp. Fl. Galic. crit. III (1911) 28. — Plantă mică sau de statură mijlocie cu tulpini rigide. Sepale lungi de 3—4 mm. Petale mici, lungi de 2,5—3 mm și late de 1,5—1,8 mm, lat ovate sau subrotund ovate, acute sau scurt acuminate, nu obtuziuscule, mairarobtuze, spre bază contrase. Capsula lungă de 2,5—4 mm. Semințe late de 0,6—0,7 mm. — *Mții Rodnei*: în locuri calcaroase pe versantul de N. al Corongișului (1850—1880 m.).

var. **caespitōsa** (Ehrh.) A. et G. Syn. V. 2 (1918) 742. — *Arenaria caespitosa* Erhh. Beitr. V (1790) 117, n. nud. ex Guss. Fl. sic. Prodr. I (1842) 498. — Plantă foarte mică, gracilă, cu puține flori — Frecventă.

var. **subnivālis** (Hegetschw.) Rüb. Mon. Berninageb. (1912) 357, n. nud. ex Schinz et Kell. Fl. Schw. II, ed. III Krit. Fl. (1914) 107. — *Alsine subnivalis* Hegetschw. Fl. Schw. (1838—39) 422. — Ic.: Pl. 8, fig. 6 b. — Tulpina floriferă lungă până la 8 cm, de regulă unifloră. — *Mții Făgărașului*: Lacul Bălea, V. Doamnei, Capra Budei, Groapa Mieilor.

4 b Plantă laxă, neformând perne

var. **tenella** (Schur) A. et G. Syn. V. 1 (1918) 744. — *Sabulina tenella* Schur in Verh. SVN (1859) 73 et Enum. pl. Transs. (1866) 111. — Atârnă din crăpăturile stâncilor, având tulpini lungi de 25 cm, foarte mult ramificate, de obicei cu 3 flori Pedunculi florali foarte lungi. — Cheia Turzii.

Răsp. gen.: Europa, Africa de N, Caucaz.

7. **M. Gerardii** (Willd.) Hay. Fl. Steierm. I (1908) 272. — *Arenaria Gerardi* Willd. Sp. pl. II (1799) 729. — Exs.: FRE nr. 1220. — Ic.: Pl. 8, fig. 4.

4. Plantă cespitoasă, cu rizom gros, târător. Tulpini scunde, erecte sau ascendente, înalte de 6—12 cm, glabre, formând pâlcuri stufoase, îndesuite. Frunze filiforme sau liniar subulate, 3 - nervate, de 1 mm lățime. Tulpini 1—3 - flore, cu pedunculi și pediceli viscido-glanduloși. Sepale ovate eliptice, de 3—4,5 mm lungime, scurt acuminate, glabriuscule, 3 - nervate; nervurile distante. Petale de lungimea caliciului sau puțin mai lungi. Capsulă lat ovaticonică, mai lungă decât caliciul. VI—VIII.

Stațiunea. În locuri pietroase sau înierbate din regiunea subalpină și alpină.

Răsp. în țară: *Mții Rodnei*, *Mții Călimani*: Struniorul, Haita, Pietrosul. *Mții Giurgeului*: Hăghimașul Mare, Mt. « Öcsém », Mt. « Terkö ». *Mții Bistriței*: Ceahlău. *Mții Bârsei*: Piatra Mare, Postăvarul. *Mții Bucegi*: Jepii Mici, Babele, Caraiman, Coștila, Omul, Doamnele, Bătrâna, Obârșia, V. Mălăești. *Mții Făgărașului*: Bândeia, Gălășescu, Arpașul, Negoiu, Surul, Ghițu, Capra Budei, Râiosul, Buteanu. *Mții Parângului*: Mândra, Mirul Mare, *Mții Țarcu-Godeanu*: Mt Țarcu (Groapa Bistrei, Izvorul Hidegului).

Răsp. gen.: Europa.

8. *M. frutescens* (Kit.) Tuzson in MBL VIII (1909) 356. — *Arenaria frutescens* Kit. in Schult. Öst. Fl. I, ed. II (1814) 664. — **Exs.**: FEAH nr. 566 sub *Alsine*, FRE nr. 150 sub *Alsine*. — **Ic.**: Pl. 9, fig. 2.

4. Rizom gros de 1—7 mm, târător. Tulpini scurte, de 10—20 cm. Frunze \pm curbate, glabre, scurt mucronate, lungi de 2—3 cm, unite în perechi la bază pe o distanță de 1—2 mm. Inflorescențe multiflore, cu florile relativ indesuite în timpul înfloririi, \pm glanduloase. Pedunculii florilor inferioare de 2—3 ori mai lungi decât florile. Flori relativ mici. Sepale lungi de 4—5 mm, contrase într'o prelungire slab ascuțită (3) 5—7 - nervate. Caliciul în general ovat cilindric. V — VI.

Stațiunea. În locuri însoțite, stâncoase, dela câmpie până în etajul subalpin.

Răsp. în țară: *Reg. Cluj*: V. Someșului Rece, V. Someșului Cald. *Reg. Stalin*: Orașul Stalin; Porumbacul de Jos (r. Făgăraș); Mții Făgărașului (Mt. Surul). *Reg. Hunedoara*: Hațeg. Ciopea, Ohaba de sub Piatră (r. Hațeg); Deva pe Dl. «Szárhegy» și Dl. Cozia. *Reg. Timișoara*: Mehadia, Svinița, V. Dunărei la ruinele «Tricule» (r. Mehadia). *Reg. Craiova*: Vârciorova, Porțile de Fier,

Răsp. gen.: Europa centrală, Peninsula Balcanică.

9. *M. cataractarum* Jka. Adat. Magy. dél. fl. in MTK XII (1874) 165; Nyár. in FRE nr. 1219 cum descr. — **Exs.**: FRE nr. 1219. — **Ic.**: Pl. 9, fig. 1.

4. Plantă cespitoasă, cu rizom gros și târător. Tulpini de 10—20 cm lungime. Frunze \pm erecte, glabre, lungi de 2—3 cm, scurt mucronate; perechile de frunze concrescute la bază pe o distanță de 1—2 mm. Inflorescență capituliform glomerată, \pm glanduloasă. Pedunculi floralii inferiori cel mult de lungimea florilor. Flori mari. Sepale cu 3 nervuri proeminente și 2 externe, slab vizibile, lungi de 7—8 mm, contrase într'o prelungire fin ascuțită, din care cauză caliciul ia o formă alungit cilindro-conică. IV—V.

Stațiunea. Pe stânci de gneis.

Răsp. în țară: *Reg. Craiova*: între Gura Văii și Vârciorova, pe stâncile dela Porțile de Fier (r. Turnu Severin).

Răsp. gen.: Endemică.

10. *M. recurva* (All.) Schinz et Thell. in Bull. Herb. Boiss. 2 sér. VII (1907) 404. — *Arenaria recurva* All. Fl. pedem. II (1785) 113, tab. 89, fig. 3. — **Exs.**: FRE nr. 1223. — **Ic.**: Pl. 9, fig. 3.

4. Plantă scundă, des cespitoasă, cu tulpini numeroase, până la 10 cm înălțime și lăstari sterili, formând tufe dese. Tulpini erecte, simple, glabre,

distanțat foliate, de obicei cu 1—3 flori. Frunze de 0,5 cm lungime, filiforme, groase, falcat arcuite, la bază concrescute, în stare uscată 3-nervate. Flori de 5—12 mm diametru, cu pedunculi erecti, glanduloși, de 5—15 cm lungime. Sepale ovate lanceolate, acute, de 4,5 mm lungime, verzi, adeseori violacei, cu 5—7 nervuri neevidente. Petale albe, eliptice, obtuze, egal de lungi sau mai lungi decât caliciul. Capsulă ovată conică, puțin mai lungă decât caliciul. Seminte reniforme, brune, punctate. VII—VIII.

Stațiunea. Pe stânci, grohotișuri, locuri pietroase, în etajul alpin.

Răsp. în țară: *Mții Bucegi*: Babele, Caraiman, Coștila. *Mții Bârsei*: Postăvarul. *Mții Făgărașului*: Vf. Negoiu. *Mții Retezatului*: Vf. Căstura, Vf. Păpușa.

Răsp. gen.: Pirinei, Mții Spaniei, Alpi, Carpați, Balcani, Caucaz.

11. *M. tenuifolia* (L.) Hiern in Journ. of Bot. XXXVII (1899) 321. — *Arenaria tenuifolia* L. Sp. pl. ed. I (1753) 424. — **lc.:** Pl. 7, fig. 8.

○. Tulpini delicate, erecte, până la 15 cm, glabre, adeseori violet. Frunze liniar subulate, aproape setacee, acute, 3 - nervate. Flori dispuse în dichazii laxe. Pedunculi filiformi, cei inferiori de 4—6 ori mai lungi decât caliciul. Sepale ovate lanceolate, acute, lungi de 3—4 mm, verzi, cu margini membranoase, glabre, 3 - nervate. Petale mai scurte decât caliciul, albe. Capsulă mai lungă decât caliciul. Seminte mărunte, verucoase. V—VII.

Stațiunea. În locuri aride, pietroase, sterile.

Răsp. în țară: *Reg. Constanța*: Nicolae Bălcescu (pe Mt. Sepelgin), Căugăgia, (r. Babadag); Cheia (r. Medgidia). Mai este citată de Heuffel din Banat, fără localitate.

Variabilitatea speciei

ssp. mesogitana (Boiss.) Hand.-Mazz. in Ann. Nat. Hoffmus. Wien XXVI (1912) 148. — *Alsine Mesogitana* Boiss. Diagn. Sér. I, I (1842) 45. — *Alsine tenuifolia* β . *macropetala* Boiss. Fl. or. I (1867) 680.

Frunze alungite, slab cărnoase. Sepale ovate lanceolate, foarte ascuțite, 3 - nervate; nervurile subconvergente. Petale obovate, mari, aproape de 2 ori mai lungi decât caliciul. Capsulă de lungimea caliciului.

Reg. Constanța: Cheia (r. Medgidia).

Răsp. gen.: Europa, Africa de N, Asia de V, Siberia.

12. *M. viscosa* (Schreb.) Schinz et Thell. in Bull. Herb. Boiss. Sér. 2, VII (1907) 404; Schischk. in Fl. U.R.S.S. VI (1936) 487. — *Alsine viscosa* Schreb. Spicil. Fl. Lips. (1771) 30. — *Alsine tenuifolia* ε . *viscidula* DC. Prodr. I (1824) 406, excl. syn. — **lc.:** Pl. 7, fig. 9.

○. Plantă de 3—10 cm înălțime, cel puțin în partea superioară glanduloasă, cu tulpini ramificate, lipicios glandulos - hirsute, de obicei violacee.

Frunze liniar subulate. Sepale lanceolate sau îngust liniar lanceolate, de 2—3 mm lungime, 3 - nervate, acuminat, plane, glândulos hirsute, mai lungi decât capsula ovat conică. Petale albe, mai scurte decât caliciul. Capsula cât caliciul, sau mai scurtă. Semințe radiar sulcate, cu dungă brăzdată. V—VII.

Stațiunea. Prin locuri aride, sterile, nisipuri.

Răsp. în țară: *Reg. Constanța*: Cernavodă; Hârșova.

Răsp. gen.: Sporadică în Europa de S și centrală (spre N până în sudul Suediei), Asia Mică, Siria.

13. **M. glomerata** (M.B.) Deg. in Mitt. NV Steierm. XLVI (1910) 319; Schischk. l.c. tab. XXVII, fig. 2. — *Arenaria glomerata* M.B. Fl. taur-cauc. I (1808) 350. — *Alsine glomerata* Fenzl Verbr. Als. (1838) in tab. ad pag. 46. — **Exs.**: FRE nr. 1224 b. — **Ic.**: Pl. 8, fig. 1.

○. Rădăcini fusiforme. Tulpini îndesuit glanduloase. Frunze filiform subulate, 1—3-nervate. Flori dispuse în glomerule. Pedunculi florali lungi cât $1/4$ din caliciu. Sepale îngust lanceolate, alungit subulat acuminat, dens glandulos puberule, verzi, 3 - nervate, alb membranoase pe margine, până la 4 mm lungime. Petale lungi cât $1/2 - 1/3$ caliciului. Semințe subtil granulate. V—VI.

Stațiunea. Prin locuri ierbate, pe stânci.

Răsp. în țară: *Reg. Timișoara*: Intre Drencova și Svinița (r. Mehadia). *Reg. Craiova*: pe coastele munților între Schela Cladovei, Dudaș și Vârciorova (r. Tr. Severin). *Reg. Constanța*: Cernavodă; Murfatlar (r. Constanța); Topalu, Crucea, Stupina (r. Hârșova). *Reg. Galați*: Tulcea; între Greci și Cerna pe Dl. Pricopcea Mică (r. Măcin).

Variabilitatea speciei

ssp. **contractata** (Heldr.). — *Alsine mucronata* var. *contractata* Heldr. Herb. graec. norm. nr. 608.

Tulpină mai robustă, însă scurtă, în partea inferioară și mijlocie acoperită cu peri pubescenti mărunți și îndesuiți, în partea superioară viscidulă. Inflorescență densă, multifloră, cu flori sesile. Sepale de 6 mm lungime, puberul viscidule. Petale lungi cât jumătatea separelor. Adeseori bianuale.

Reg. Constanța: Nicolae Bălcescu (pe Mt. Sepelgin), Enisala (r. Babadag).

f. **echinosperma** (Fenzl). — *Alsine glomerata* (M.B.) Fenzl et *echinosperma* Fenzl Verbr. Alsin. (1838) in tab. ad pag. 46. — Semințe țepos aspre. — *Reg. Constanța*: Murfatlar (r. Constanța).

Răsp. gen.: Peninsula Balcanică, U.R.S.S. de S.

Genul 81. **ARENÁRIA** *) L.


Gen. pl. [ed. I (1737) 133 nr. 374], ed. V (1754) 193, nr. 505. — *Studeniță*.

Plante de obicei mici, ierbacee sau subfrutescente, cu frunze opuse, întregi, \pm concrescute la bază. Flori hermafrodite, reunite în dichazii sau solitare, de tipul 5. Sepale 5, erecte, marginate. Petale 5, albe sau rozee, întregi sau ușor emarginate, cu glande disciforme bine dezvoltate. Stamine 10. Stile 3 (rar 2 sau 5). Placenta neîngroșată sau puțin îngroșată între rândurile de semințe. Capsulă deschizându-se cu un număr dublu de dinți decât numărul carpelilor. Semințe negre, mate, verucos aspre, lentiforme, fără aril, stând pe un funicul cilindric. Embrion aproape inelar, în jurul endospermului.

Determinarea speciilor

- 1 a Sepale lat membranoase, cu membrana adeseori albă. Frunze de cca 1 mm lățime. Plante înalte de 30—50 cm 2
- 1 b Sepale cu margini îngust membranoase (partea membranoasă foarte redusă față de partea verde). Frunze mai late. Plante de statură mică 3
- 2 a Petale de 6—11 mm lungime, cu mult mai lungi decât caliciul. Frunze filiform liniare, până la 10 cm lungime. Plantă cu tulpini multiflore 3. **A. graminifolia**
- 2 b Petale mai scurte decât caliciul sau de aceeași lungime. Inflorescența o paniculă adunată, multifloră. Frunze foarte rigide, setacee sau liniare. Plantă tufoasă, înaltă de 30 cm 7. **A. rigida**
- 3 a Plante anuale, cu ramuri multiflore. Frunze \pm acuminate, ovate, scurt păroase, proeminent nervate. Caliciu mai lung decât corola. Sepale 3-nervate, acuminate 4
- 3 b Plante perene, de munte, cu ramuri uniflore sau pauciflore. Caliciu mai scurt decât corola, sau egal cu aceasta 5
- 4 a Pedunculi fructiferi de mai multe ori mai lungi decât fructul. Sepale lungi de 3—4 mm, ovate lanceolate 1. **A. serpyllifolia**
- 4 b Pedunculi fructiferi capilari, de 2—3 ori mai lungi decât fructul. Sepale de 2 mm lungime, ovate 2. **A. leptoclados**
- 5 a Petale cu mult mai lungi decât caliciul. Sepale ovate, acute, 1—3-nervate. Frunze oblong lanceolate sau oblongi 5. **A. tenella**

*) A fost întrebuințat ca nume de plantă mai întâi de Caspar Bauhin (1560—1624), botanist din Elveția.



- 5 b Petale circa de lungimea caliciului. Frunze ovat oblongi, obovate sau subrotunde, toate obtuze sau rotunjite la vârf 6
- 6 a Flori solitare, dispuse la vârful tulpinilor sau câte 2, scurt pedunculate. Sepale oblong ovate, obtuze sau acute. Petale invers ovate, cu puțin mai lungi decât caliciul. Frunze eliptice sau obovate, lucitoare, glabre, pețiolate 4. **A. biflora**
- 6 b Flori 1—2 (— 5), dispuse la vârful tulpinilor. Sepale ovat lanceolate, mai slab acute sau acuminate. Petale invers ovate, cea de lungimea caliciului. Frunze rotunjite, abrupt atenuate în pețiol scurt 6. **A. rotundifolia**

1. **A. serpyllifolia** L. Sp. pl. ed. I (1753) 423; Schischk. et Knorring in Fl. U.R.S.S. VI (1936) 539. — *Stellaria serpyllifolia* Scop. Fl. carn. I, ed. II (1772) 406. — Studeniță. — Kakuk homokhür. — Gemeines Sandkraut. — Песчанка тимьянолистная. — Exs.: FRE nr. 1473. — Ic.: Pl. 10, fig. 2, 2 a.

☉, ☉. Tulpini până la 20 cm, culcate sau erecte, ramificate, scurt pruinose păroase, rareori glabre, Frunze opuse, ovate, \pm acuminate, sesile, multinervate, scurt păroase, mult mai scurte decât internodiile. Flori 5-mere, numeroase, de obicei solitare în axilele frunzelor. Pedunculi lungi, subțiri, păroși sau glanduloși și erecti. Sepale 5, ovat lanceolate, acute, păroase, 3—5 - nervate, mai lungi decât petalele, în timpul înfloririi patente, cele interne alb marginate, la mijloc cu o dungă verde. Petale 5, albe, întregi, mai scurte decât separele. Stamine 10, cu antere albăstrui. Ovar cu 3 stigmat reflecte. Capsulă ovată, deschizându-se prin 6 dinți. Semințe numeroase, reniforme, brune închise, cu dungi brăzdate. V—IX.

Stațiunea. Prin locuri ierboase, aride, nisipoase și pietrișuri cu iarbă, prin ogoare, grădini, margini de drumuri.

Răsp. în țară: Comună în regiunea de câmpie și muntoasă, în întreaga țară. În Mtu Rodnei se urcă pe Pietrosul Mare până la 1760 m.

Variabilitatea speciei

f. **scabra** (Fenzl). — *A. serpyllifolia* a. *scabra* Fenzl in Ldb. Fl. ross. I (1842) 369. — Frunze, pedunculi florali și caliciu păroase. — Comună din câmpie până în regiunea alpină.

f. **viscida** (Lois.). — *A. viscida* Lois. in Desv. Journ. de Bot. II (1809) 324; Not. (1810) 68. — Frunze, pedunculi florali și caliciu glandulos păroase; glandele pedicelate. — Comună în regiunea de câmpie în întreg raionul Arad. În munți mai rară, de ex. la Dragomirești (r. Vișeu).

f. **pátula** (Martrin-Donos). — *A. patula* Martrin-Donos Fl. Tarn (1864) 107. — Plantă verde, scurt păroasă, cu inflorescență răsfirată. Capsulă sferică. — Reg. Cluj: Rodna. Reg. Hunedoara: Petroșani.

Răsp. gen.: Europa, Asia temperată, Indii, America de N.

2. **A. leptoclados** Guss. Fl sic. syn. II (1844) 244; Schischk. et Knorring l.c. — *A. serpyllifolia* γ. *tenuior* Mert. et Koch in Röhl. Deutschl. Fl. III, ed. III (1831) 266.

○, ⊙. Tulpini foarte ramificate, pubescent scabre. Frunze ovate, acute, slab 3—5 -nervate. Ramuri florifere alungite, cincinate. Sepale lungi de 2 mm, ovate, acute sau acuminate, 3 -nervate. Petale de 3 ori mai scurte decât caliciul. Pedunculi fructiferi capilari, de 2—3 ori mai lungi decât caliciul. Capsulă cilindro-conică, de lungimea caliciului. Semințe foveolat punctate. V—VI.

Stațiunea. Locuri pietroase, tuferișuri, la margini de păduri.

Răsp. în țară: Sporadică, în deosebi în părțile sudice. *Reg. Craiova*: Craiova. *Reg. Pitești*: Ionești, Vultureanca (r. Găești). *Reg. București*: București. *Reg. Constanța*: Fetești; Constanța, Tuzla, Mangalia; Năvodari (r. Medgidia). *Reg. Suceava*: Suceava.

Variabilitatea speciei

var. **viscidula** (Rouy et Fouc.). — *A. serpyllifolia* L. ssp. 1. *leptoclados* (Guss.) Rouy et Fouc. β. *viscidula* Rouy et Fouc. Fl. Fr. III (1896) 242. — Plantă glandulos păroasă. — Constanța.

Răsp. gen.: Europa, Asia temperată, India, America de N.

3. **A. graminifolia** Schrad. Hort. Götting. I (1809) 5 et in Neu. Journ. IV Bd., 1—2 St. (1810) 139; Schischk. et Knorring l.c. 525. — *A. Biebersteinii* Schlechter d. in Mag. Ges. Naturf. Freurde Berlin VII (1813) 202. — **Exs.**: FEAH nr. 2864, II; FRE nr. 1472. — **Ic.**: Pl. 10 fig. 6.

4. Tulpini simple, erecte, până la 50 cm, cilindrice, glabre, multiflore. Frunze îngust filiform liniare, până la 10 cm lungime, erecte, glabre, cu margini aspre, pe fața superioară brăzdate, cele inferioare circa de lungimea internodiilor, cele superioare opuse și din ce în ce mai mici, ultimele transformate în bractei scurte ale pedunculilor floral. Inflorescență laxă. Flori de 10—12 mm în diam. Sepale 5, ovate, obtuze, cele interne erecte, marginate. Petale 5, de cca 6—11 cm lungime, cu mult mai lungi decât caliciul. Stamine 10, cu glande bazale disciforme. Ovar cu 3 stile, ușor curbate în afară. Capsulă mai lungă decât caliciul și mai scurtă decât pedunculul, deschizându-se prin 6 dinți. Semințe numeroase, negre, mate, papiloase. VI—VII.

Stațiunea. Pe coline însoarite, ierboase.

Răsp. în țară: *Reg. Cluj*: Cluj pe fânețe însoarite, Cojocna, Boj (r. Cluj); Valea Florilor, Turda, Cheia Turzii. *Reg. Stalin*: Mediaș, Cenade; Ocna Sibiului, Șura Mare, Șura Mică (r. Sibiu). *Reg. Hunedoara*: Orăștie; Mții Vâlcanului în Pasul Vâlcan. *Reg. Arad*: Arad

(în şanţul Cetăţii) şi împrejurimi; Pusta «Nyék» aproape de Sf. Ana (r. Chişineu-Criş); Ineu pe Dl. Mocra (frecventă); Cristeşti (r. Gurahonţ). *Reg. Timişoara*: Băile Herculane. *Reg. Iaşi*: pe Dl. Repedeia. *Reg. Suceava*: Suceava, Bosanci.

Răsp. gen.: Europa centrală şi sud-estică, Siberia, Dahuria.

4. **A. biflora** L. Mant. I (1767) 71. — **Exs.**: FRE nr. 955, 1681 a, b. — **lc.**: Pl. 10, fig. 4.

4. Plantă repentă, formând pâlcuri. Tulpini până la 20 cm înălţime, repente, ramificate, cu 2 rânduri de peri aşezaţi opus. Frunze lat obovate, ovat-oblongi sau subrotunde, cele inferioare \pm spatulate sau cu un vârful foarte scurt, lucitoare, groase, glabre, fără nervuri distincte, cu petiol foarte scurt. Flori solitare, dispuse la vârful tulpinilor, sau câte două, stând pe pedunculii scurţi, erecti şi fin pubescenti. Pedunculul sub mijloc cu 2 bractei, dela subţioara uneia pornind a doua floare. Sepale 5, oblong ovate, de 4 mm lungime, glabre, cu nervura mediană evidentă şi nervuri laterale mai puţin evidente, îngust marginate, obtuze sau acute. Petale 5, albe, ovate, întregi, numai cu puţin mai lungi decât caliciul. **Stamine** 10. **Ovar** sferic, cu 3 stile. **Capsulă** ovată, puţin mai scurtă decât caliciul, deschizându-se cu 6 dinţi. **Seminţe** negre, uşor reniforme, verucoase. VII—IX.

Staţiunea. Prin locuri stâncoase şi umede din etajul alpin.

Răsp. în ţară: *Mţii Rodnei*: Gemenea. *Mţii Bucegi*: Jepii Mici, Cocora, Babele, Coştila, Onil, Obârşia, Doamnele, Bătrâna, Ciubotea. *Mţii Făgăraşului*: Colţii Brezii, Arpaşul Vânătoarea lui Buteanu, V. Bălea, Laiţa, Negoiu, Bărcaciu, Surul, Capra Buda, Iezerul. Budei, Iezerul, Podul Giurguiului, Vf. Râiosul, V. Argeşului la Cetatea lui Vlad Tepeş. *Mţii Sibiului*: Frumoasa, Vf. Fărcaşul, Negovanul Mare. *Mţii Parângului*: Mirul Mare, Gruicul, Mândra.

Răsp. gen.: Pirinei, Alpi, Carpaţi, Balcani.

5. **A. tenella** Kit. in Schult. Oestr. Fl. I, ed. II (1814) 662. — *A. ciliata* L. Sp. pl. ed. I (1753) 425, p.p. — *A. ciliata* Auct. — *A. multicaulis* Auct., non L. — **Exs.**: FRE nr. 1682. — **lc.**: Pl. 10, fig. 3.

4. Plantă tufoasă, cu numeroşi lăstari sterili. Tulpini până la 10 cm, uniflore, rar biflore, îndesuit cespitoase. Frunze opuse, oblong lanceolate sau oblongi, spre bază cuneat atenuate şi ciliate, cele superioare acute, cele inferioare obtuze. Flori relativ mari. Petale mult mai lungi decât caliciul. Sepale ovate, acute, 1—3 - nervate. **Capsulă** ovată, de lungimea caliciului, sau puţin mai lungă. **Seminţe** negre, mate, uşor reniforme, verucoase. VI—IX.

Staţiunea. Locuri stâncoase, prundişuri, în deosebi calcaroase, în etajul alpin.

Răsp. în țară: *Mții Rodnei*: Gemenea, Galați, Știol. *Mții Bucegi*: Jepi, Babele Caraiman, Coștila, Omul, Bucșoiu, Ciubotea. *Mții Făgărașului*: V. Doamnei, Negoitul. *Mții Parângului*: la Găuri pe Patra Tăiată. *Mții Tarcu-Godeanu*: Mt. Tarcu (dubioasă).

Răsp. gen.: Europa de N, mijlocie și de V.

6. **A. rotundifolia** M.B. Fl. taur. - cauc. I (1803) 343; Schischk. et Knorring l. c. 538. — *A. biflora* Griseb. Spicil. Fl. rumel. I (1843) 203, non L. — *A. rotundifolia* β *pauciflora* Boiss. Fl. or. I (1867) 700. — *A. transsilvanica* Simk. in Term. füz. X (1886) 180. — *A. biflora* β *transsilvanica* Grec. Consp. Fl. Rom. (1898) 123. — **Ic.**: Pl. 10, fig. 1.

4. Plantă de statură mică, cu tulpini lung târătoare, îndesuit foliate. Frunze rotunjite, abrupt atenuate într'un pețiol scurt. Flori dispuse câte una sau 2 (5) la vârful tulpinilor. Sepale ovat lanceolate, slab acute sau acuminate. Petale obovate, cca de lungimea caliciului. VI—VIII.

Stațiunea. Pe coaste pietroase, alpine.

Răsp. în țară: *Mții Ciucașului*: Ciucașul, Piroșca. *Mții Bucegi*: Furnica, Piatra Arsă, Obârșia, Omul, V. Cerbului, Ciubotea, V. Mălăești. *Mții Bârsei*: Postăvarul, Piatra Craiului la Vlădușca.

Răsp. gen.: Balcanii de E, Asia Mică.

7. **A. rigida** M.B. Fl. taur. - cauc. I (1808) 346; Schischk. et Knorring l. c. 521. — **Exs.**: FRE nr. 1314. — **Ic.**: Pl. 10, fig. 5.

4. Plantă tufoasă, înaltă de 30 cm. Frunze foarte rigide, cele ale lăstarilor sterili setacee sau liniare, cele tulpinale liniare, mai late și mai scurte decât internodiile tulpinii. Inflorescența o paniculă adânată, multifloră. Sepale lat membranoase, la mijloc cu o dungă dorsală verde și foarte îngustă, ovate sau ovat lanceolate, atenuat acuminate, acut carenate. Petale mai scurte decât caliciul sau de aceeași lungime. VI—VII.

Stațiunea. În locuri nisipoase, ierboase.

Răsp. în țară: *Reg. Galați*: Delta Dunărei. *Reg. Constanța*: Ceamurlia de Jos (r. Babadag).

Răsp. gen.: Dobrogea, Sudul U.R.S.S.

Genul 82. **MOEHRINGIA**¹⁾ L.

Gen. pl. [ed. II (1742) 167, nr. 386], ed. V (1754) 170, nr. 444. — Merinana.

¹⁾ După numele lui Paul Heinrich Gerhard Moehring (1710—1792) botanist contemporan cu Linné.

Plansa 11. — 1. *Moehringia pentula* (W. et K.) Fenzl — 2. *M. trinervia* (L.) Clairv. — 3. *M. Grisebachii* Jka. — 4. *M. Jankae* Griseb. — 5. *M. muscosa* L.



Plante adesea cespitoase, cu tulpini culcate, ascendente sau erecte, de obicei puternic ramificate. Frunze opuse, de formă diferită, spre bază \pm concrescute sau libere, subțiri sau cărnoase. Flori hermafrodite, solitare sau dispuse în dichazii rare, de tipul 4 sau 5. Sepale 4—5, erecte. Petale 4—5, albe, întregi sau slab emarginate. Stamine 8 sau 10. Stile 2—3, rar 4 sau 5. Placenta îngroșată între rândurile de semințe. Capsulă rotundă, deschizându-se prin 4 sau 6 dinți reflecti. Semințe puțin numeroase, brune sau negre, aproape netede, lucitoare, ușor reniforme, cu apendici («eliosomi») de formă diferită. Funiculul nu este cilindric. Embrion aproape inelar.

Determinarea speciilor

- 1 a Frunze late, 3—5 - nerve, scurt pețiolate, păroase. Petale mai scurte decât caliciul, uneori lipsesc. Pedunculi floralii lungi de 2—3 cm
1. **M. trinervia**
- 1 b Frunze înguste, liniare sau filiforme, (cel mult cele bazale, pot fi ovate). Petale de obicei mai lungi decât caliciul sau de lungimea acestuia 2
- 2 a Semințe opace. Plante din stepe stâncoase. Flori albe, pentamere . . 3
- 2 b Semințe lucitoare. Plante de munte. Flori 4 — 5-mere 4
- 3 a Plantă glaucă, hirsut pubescentă. Tulpini numeroase, filiforme, rigide, intricate (incâlcite), toate formând un pâl. Frunze puțin cărnoase. Semințe subrotunde, \pm granulat punctate . . 4. **M. Grisebachii**
- 3 b Plantă verde, de obicei glabră sau la întrenoduri, împreună cu baza frunzelor, puberulă. Tulpini numeroase, subțiri, formează un pâl. Frunze bazilare lung pețiolate, ovate sau ovat acutiuscule. Semințe reniforme, îndesuit ruguloase 5. **M. Jankae**
- 4 a Frunze liniar filiforme, mai înguste de 0,5 — 1 mm, uninervate (sau trinervate). Tulpini uniflore sau pauciflore. Petale 4, cu încă o jumătate mai lungi decât caliciul. Plantă glabră 3. **M. muscosa**
- 4 b Frunze liniare, plane, late de 1—4 mm, \pm 3-nervate. Tulpina pe două laturi, iar pedunculii de jur împrejur pubescenti. Tulpini cu 1—3 flori. Petale 5, de 2 ori mai lungi decât sepalele sau de lungimea acestora 2. **M. pendula**

1. **M. trinervia** (L.) Clairv. Man. d'herboris. (1811) 150. — *Arenaria trinervia* L. Sp. pl. ed. I (1753) 423; Schischk. et Knorring in Fl. U.R.S.S. VI (1936) 540, tab. XXXI, fig. 4. — Merinană. — Háromerű csitre. — Breitblättrige Nabelmiere. — Мерингия трехжилковая. — Exs.: FRE nr. 627. — Ic.: Pl. 11, fig. 2.

○, ⊙. Tulpini numeroase, până la 30 cm înălțime, culcate sau erecte, puternic ramificate, rotunde, scurt puberule, cu internodiile superioare lungi

de 3—7 cm, cele inferioare mult mai scurte. Frunze opuse, păroase, ciliate pe margini, 3—5 - nervate, cele inferioare lat ovate, aproape rotunde, cele superioare mai mari, alungit ovate până la lanceolate, scurt pețiolate. Flori 5 - mere, până la 1 cm în diam., solitare în axilele frunzelor sau în dichazii foarte rare. Pedunculi de 2—3 cm lungime, subțiri, păroși, erecți în timpul înfloririi, mai târziu luând poziții aproape orizontale. Sepale lung lanceolate, ascuțite, glabre, 1—3 - nerve, cu marginea membranoasă, ciliată, ca și nervura mediană. Petale 5, albe, cel mult cât jumătatea caliciului de lungi. Stamina 10, de lungimea petalelor sau ceva mai scurte. Ovar globulos, cu 3 stigmatate de aceeași lungime ca și ovarul. Capsulă aproape globuloasă, mai scurtă decât caliciul, deschizându-se prin 6 dinți. Semințe roșcate sau negre, puternic costate, reniform rotunde, de 1 mm în diam., cu un apendice fimbriat. V—VII.

Stațiunea. Comună prin locuri umede, umbrite, prin păduri, tufșuri, margini de pâraie, dumbrăvi, etc.

Răsp. în țară: Comună în întreaga țară.

Răsp. gen.: Europa, Asia Mică, Transcaucazia, Persia, Turchestan, Siberia.

2. **M. pëndula** (W. et K.) Fenzl Verbr. Alsin. (1833) tab. ad pag. 46. — *Arenaria pendula* W. et K. Pl. rar. Hung. I (1802) 90, tab. 87. — **Exs.:** FEAH nr. 3632, FHE nr. 947 și FRE nr. 628. — **Ic.:** Pl. 11, fig. 1.

4. Tulpini gracile, lungi de 15—90 cm, lung repente sau pendule, radicante, filiforme, difuze, pe două laturi pubescente. Frunze liniare, plane, acuminate, de 1—4 mm lățime, \pm 3 - nervate, îngustate spre extremități, glabre sau ciliate la bază. Pedunculi floriferi pubescenti de jur împrejur. Flori 5 - mere, dispuse câte 1—3 la vârful tulpinilor, în cime laxe. Sepale lanceolat subulate, subcarenate. Petale de obicei mai lungi decât caliciul, (până la de 2 ori), sau de lungimea acestuia, albe și mici. Semințe opace. VI—VIII.

Stațiunea. Pe stânci, locuri pietroase, în etajul montan și subalpin.

Răsp. în țară: *Reg. Stalin:* Tâlmaci, Sadu, Râul Sadului pe Mt. Preajbă, Fundul Râului pe Dl. Caprei, Mții Avrigului, Turnu Roșu pe Mt. Prihodiște (r. Sibiu). *Reg. Hunedoara:* Săcărâmb. (r. Orăștie); Mții Retezatului: V. Lăpușnicului, V. Râul Mare, Lacul Zănoaga, Zănoaga, Piciorul Colfului, Mt. Șerpului și Mt. Teama (deasupra Jiului Românesc); Petroșeni. *Reg. Timișoara:* Defileul Dunărei; Mții Mehedinților (V. Cernei la Gaura Fetei). *Reg. Craiova:* V. Jiului la Mrea Lainici; Mrea Bistrița (r. Horezu). *Reg. Pitești:* V. Oltului dela Călimănești în sus, Râul Vadului (r. Brezoiu).

Răsp. gen.: Balcani, Jugoslavia, Bulgaria.

3. *M. muscōsa* L. Sp. pl. ed. I (1753) 359. — Exs.: FRE nr. 626. — Ic.: Pl. 11, fig. 5.

4. Tulpini delicate, de 5—20 cm înălțime, culcate spre bază și ascendente la vârf, ramificate, glabre. Frunze îngust liniar filiforme, adeseori până la de 2 ori mai lungi decât internodiile, de 0,5 — 1 mm lățime, 1—3-nervate. Flori 4-mere, solitare, cu pedunculi glabri, de 1—4 cm lungime. Sepale 4, ovate lanceolate, uninervate, acuminate, carenate, membranoase. Petale 4, alungit ovate, de 2 ori mai lungi decât late, aproape cu încă 1/2 mai lungi decât separele. Stamine 8. Ovar rotund, cu 3 stigmatе răsfirate. Capsulă aproape rotundă, mai lungă decât caliciul, deschizându-se prin 6 valve, până la bază. Semințe roșcat negre, lucitoare, glabre, cu apendice alb membranos, cu margini aproape întregi. V—IX.

Stațiunea. Prin locuri umbroase, umede, stâncoase, pe lângă pâraie, în regiunea montană și subalpină.

Răsp. în țară: *Reg. Baia Mare*: Repedea pe Mt. Pietricea, Bistra pe Topolău, Vișeu de Jos pe Mocira Mare, Borșa la Birți (r. Vișeu); *Mții Rodnei* (Puzdrea). *Reg. Cluj*: Cluj; Cheia Turzii; *Mții Trascăului* (Colții Trascăului, Piatra Ceții); Abrud pe Mt. Vulcan; *Mții Bihorului* între Arieșul Mare și Arieșul Mic. *Reg. Aut. M.*: *Mții Gurghiului* (V. Gurghiului) V. Mureșului între Toplița și Deda; Borsec, Ditrău (r. Gheorghieni); *Mții Giurgeului*; Mt. «Öcsém»; Tușnad la Lacul Sf. Ana și pe Mt. «Büdös». *Reg. Stalin*: Racoșul de Jos pe Mt. «Töpe» și Mt. «Urmöstöpe» (r. Rupea); Orașul Stalin pe Tâmpa, Mt. Piatra Mare, V. Timișului, Predeal, *Mții Bucegi*, Zărnești; Cârțișoara la Glăjărie (r. Făgăraș); *Mții Făgărașului* (Negoiul, Surul). *Reg. Hunedoara*: Alba Iulia, Galda de Sus, *Mții Trascăului* (Piatra Caprei), Zlatna (r. Alba Iulia); Băița (r. Deva); Ponorici (r. Hațeg); Câmpul lui Neag pe V. Jiului Românesc, *Mții Parângului* (r. Petroșani). *Reg. Arad*: Moneasa (în *Mții Codrului Dealul Mare*, Merișoara). Hălmașiu în *Mții Bihorului* spre Mt. Găina (r. Gurahont). *Reg. Timișoara*: Maidan pe Fața Mare (r. Oravița); Băile Herculane. *Reg. Craiova*: Baia de Aramă, Tismana. *Reg. Pitești*: Mrea Bistrița (r. Horezu); Mt. Cozia (Mrea Stănișoara); *Mții Făgărașului* (Surul, Prislopul); *Mții Iezer-Păpușa* (V. Dâmbovicioarei). *Reg. Ploesti*: Sinaia (V. Peleșului, Mt. Piatra Arsă), Bușteni (V. Urlătorilor, V. Jepilor, V. Cerbului), *Mții Bucegi* (V. Ialomiței, V. Brăteului). *Reg. Bacău*: Mt. Ceahlău; *Mții Giurgeului*; Cheile Bicazului, Mt. Suhardul, Mt. Ciuha, Piatra Glodului; Ghimeș (r. Moinești), *Mții Tarcăului* (Tărbăușul).

Variabilitatea speciei

f. typica (Beck). — *M. muscosa* α. *typica* Beck Fl. NÖ I (1890) 361. — Frunze liniare, late de 1 mm, de lățimea tulpinii sau cu puțin mai late. — *Mții Bihorului*.

f. filifolia (Beck). — *M. muscosa* β. *filifolia* Beck l.c. — Frunze subțiri ca firele de ață, ± de aceeași lățime ca și tulpina. — *Mții Bihorului*.

f. stricta (Hausm.) A. et G. Syn. V. 1 (1915) 464. — *M. muscosa* var. *stricta* Hausm. in ÖBZ V (1855) 131. — Tulpină mai groasă, mai solidă, ascendentă sau erectă, uneori violetă în partea inferioară. Flori de tipul 4, sau mai rar de tipul 5. — *Mții Bihorului*.

Răsp. gen.: Europa sudică și sud-vestică.

4. **M. Grisebachii** Jka. in ÖBZ XXIII (1873) 194. — Exs.: FRE nr. 954. — Ic.: Pl. 11, fig. 3.

4. Plantă glaucă cu numeroase tulpini filiforme, rigide, intricate, formând un pâlc, pe tulpini cu peri scurți, deși și reversi. Frunze \pm cărnoase, cele inferioare adeseori liniar lanceolate sau liniar oblongi, \pm atenuate spre bază; cele tulpinale liniare sau filiforme, pubescent scabre sau glabre, spre vârf dilatate, acuminate. Flori albe, pentamere, dispuse în cime laxe. Petale aproape de lungimea caliciului. Semințe nelucioase, subrotunde, \pm granulat-punctate. V—VIII.

Stațiunea. Prin crăpături de stânci și locuri umbroase, stâncoase, în regiunea muntoasă a Dobrogei.

Răsp. în țară: Reg. Constanța: Cheia (r. Babadag). Reg. Galați: Hagilar pe Dl. Denis Tepe, Filimon Sârbu pe Dl. Consul (r. Tulcea); Cerna, Greci pe Dl. Țuțuiatu, Măcin pe Dl. Pricopanului și V. Sulucului (r. Măcin).

Răsp. gen.: Dobrogea, Bulgaria.

5. **M. Jankae** Griseb. ap. Janka in ÖBZ XXIII (1873) 195. — Ic.: Pl. 11, fig. 4.

4. Plantă verde, de obicei glabră sau la internodii, împreună cu baza frunzelor, puberulă, formând pâlcuri. Tulpini numeroase, subțiri, moi. Frunze bazale lung pețiolate, ovate sau ovat-oblongi, acutiuscule, cele tulpinale spatulat liniare, submembranoase, acutiuscule. Flori 5-mere, dispuse în cime laxe. Semințe nelucioase, reniforme, îndesuit rugoase. VI—VII.

Stațiunea. Pe stânci calcaroase.

Răsp. în țară: Reg. Galați: Filimon Sârbu pe Dl. Cosul (r. Tulcea), munții dintre Greci și Măcin. Reg. Constanța: Hârșova, pe malul Dunării.

Răsp. gen.: Dobrogea, Bulgaria.


Genul 83. SPÉRGULA¹⁾ L.

Gen. pl. [ed. I (1737) 133, nr. 375] ed. V (1754) 199, nr. 519. — H r a n a v a c i i.

Plante anuale sau bianuale, de obicei ramificate, cu tulpini glandulos păroase sau glabre. Frunze liniare sau subulate, opuse, grase, pe fața inferi-

¹⁾ Nume la Lobelius (Matthias de L'Obel, 1538-1616), format după un nume german, cu semnificație neprecizată.

Plânșă 12. — 1. *Spergula vernalis* Willd., 1 a. sămânță, 1 b. petală (mărită). — 2. *S. arvensis* L., 2 a. sămânță (mărită). — 3. *Spergularia salina* J. et C. Presl. 3a, 3b. semințe mărite, cu aripă și fără aripă. — 4. *Herniaria glabra* L., 4 a. fruct mărit. — 5. *H. incana* Lam. 5 a. caliciu mărit. — 6. *H. hirsuta* L., caliciu mărit. — 7. *Spergula pentandra* L., petală mărită, 7 a. sămânță mărită.



oară uneori cu o brazdă longitudinală, cu stipele mici, pergamentoase, caduce. Flori dispuse în inflorescențe terminale, laxe, 5-mere, hermafrodite. Pedunculi după înflorire îndreptați în jos, mai târziu se ridică din nou în sus. Sepale 5, cu margine pergamentoasă, îngustă. Petale 5, albe, nedivizate. Stamine 5 sau 10. Ovar cu placentă centrală, cu 5 stile scurte. Capsulă ovată, deschizându-se prin 5 valve adânci, opuse separelor. Semințe lenticiforme, negre, mate, \pm aripate, uneori papiloase. Papile în formă de măciucă. Embrion cochleariform răsucit.

Determinarea speciilor

- 1 a Frunze liniare, pe fața superioară convexe, pe fața inferioară cu o brazdă adâncă, longitudinală. Semințe lenticulare, negre, late de cca 1 mm, foarte îngust marginate, cu sau fără papile. . . 1. **S. arvensis**
- 1 b Frunze cilindrice, pe dos fără brazdă. Semințe lat membranose aripate 2
- 2 a Stamine 5. Petale lanceolate, nu se acoperă cu marginile. Membrana semințelor lată și albă 3. **S. pentandra**
- 2 b Stamine (6) 10. Petale ovate, se acoperă cu marginile. Membrana semințelor brunie 2. **S. vernalis**

1. ○ **S. arvensis** L. Sp. pl. ed. I (1753) 440. — Hrana vacii. — Mezei csibehúr. — Acker-Spark. — Торица обыкновенная. — Exs.: FRE nr. 1212. — Ic.: Pl. 12, fig. 2, 2 a.

○. Tulpini erecte sau ascendente, de 10—30 (100) cm, rotunde, glabre sau dispers păroase, glanduloase în partea superioară, simple sau ramificate, cu internodii lungi de 2—10 cm. Frunze opuse, dispuse în verticile, liniare sau subulate, de 1—3 cm lungime, pe fața inferioară cu o brazdă longitudinală, pe fața superioară convexe, glandulos păroase. Flori 5-mere, așezate în inflorescențe terminale laxe, pe pedunculi lungi de 1—2 cm, \pm glandulos păroși, aplecați în jos după înflorire, mai târziu iarăși erecti. Sepale 5, ovate, erecte, obtuze, fără nervuri evidente, adeseori glandulos păroase, cu o margine pieleasă îngustă. Petale 5, albe, obovate, puțin mai lungi decât caliciul. Stamine 10. Stile 5. Capsulă globulos ovată, de 2 ori mai lungă decât caliciul, deschizându-se prin 5 dinți largi. Semințe negre, mate, lenticiforme, până la 1 mm în diam., foarte îngust marginate, glabre sau papiloase. VI—X.

Stațiunea. Prin locuri nisipoase, semănături, uneori cultivată ca plantă de nutreț.

Răsp. în țară: Foarte comună.

Variabilitatea speciei

var. **vulgaris** (Boenningh.) Mert. et Koch in Röhl. Deutsch. Fl. III, ed. III (1831) 360. — *S. vulgaris* Boenningh. Prodr. Fl. Monast. (1824) 135. — Semințe de cca 1 mm lungime,

acoperite cu papile, la început alburii, mai târziu brunii. — *Reg. Baia Mare*: Grebla (r. Tg. Lăpuşului). *Reg. Arad*: Şimand (r. Chişineu-Criş); Ineu; Dezna, Gurahonţ, Hăl-magiu (r. Gurahonţ).

var. *máxima* (Weihe) Mert. et Koch l.c. — *S. maxima* Weihe in Arch. Deutsch. Apoth. Ver. VIII (1824) 51. — Plantă înaltă de 1 m. Seminte mari, de 1,5 mm în diam., acoperite cu papile. — *Reg. Cluj*: Năsăud. *Reg. Aut. M.*: Tg. Săcuesc.

var. *laricina* (Wulf.) Koch Syn. ed. II (1843) 120. — *S. laricina* Wulf. in Jacq. Coll. II (1788) 207, non L. — Tulpină şi frunze dens glanduloase. — *Reg. Baia Mare*: Grebla (r. Tg. Lăpuşului). *Reg. Aut. M.*: Sovata; Corund (r. Odorhei); Vâlcele, Reci, (r. Sf. Gheorghe). *Reg. Hunedoara*: Petrila (r. Petroşani).

var. *sativa* (Boenningh.) Mert. et Koch l.c. (1931) 360. — *S. arvensis* β . *leiosperma* Čelak. in Sitzb. Böhm. Ges. Wiss. (1881) 30. — Plantă gracilă, neramificată sau slab ramificată. Seminte negre, mate, cu margine neagră, lipsite de papile sau numai punctate. — *Reg. Stalin*: Oraşul Stalin.

var. *refrăcta* (Dethard.) Rechb. Fl. Germ. exc. III (1832) 567. — *S. refracta* Dethard. ex Rechb. l.c. pro var. β — Plantă glanduloasă, cu ramuri scurte şi reflecte. — *Reg. Cluj*: Aiton (r. Turda).

Întrebuinţări. Uneori se cultivă ca plantă de nutreţ.

Răsp. gen.: Aproape cosmopolită, uneori sălbătică.

2. *S. vernális* Willd. Fl. Berol. Prodr. (1787) 158; Schischk. in Fl. U.R.S.S. VI (1936) 555, tab. XXXIII, fig. 1. — *S. Morisonii* Boreau in Duchartre Rev. Bot. II (1847) 424. — *Ic.*: Pl. 12, fig. 1, 1 a, 1 b.

☉. Plantă de 5–35 cm, uni- sau multicaulă. Tulpină dreaptă sau ascendentă, aproape glabră, brumată, simplă sau ramificată. Frunze \pm suriu-verzi, cilindrice, pe dos fără brazdă longitudinală. Flori aşezate în dichazii, cu pedunculi glabri. Sepale 5, ovate, cu margini îngust membranos marginate, negru nuanţate. Petale 5, albe, ovate sau lat ovate, obtuze, se acopăr cu marginile. Stamine de obicei 10, rar mai puţine. Ovar ovat, cu 5 stile. Capsulă cu mult mai lungă decât caliciul. Seminte negre, mate, de 0,3 – 0,4 mm lăţime, cu o membrană brunie, albă, lată cât jumătatea lăţimii seminţei. IV–VI.

Staţiunea. Prin câmpuri nisipoase.

Răsp. în ţară: *Reg. Iaşi*: Mânzăteşti, Coada Stăncii (r. Iaşi).]

Răsp. gen.: Europa, Algeria.

3. *S. pentándra* L. Sp. pl. ed. I (1753) 440; Schischk. l.c. 555. — *Ic.*: Pl. 12, fig. 7, 7 a.

☉. Plantă înaltă de 5–20 cm, cu tulpini simple sau ramificate, glabre sau glandulos păroase în partea superioară, albăstrui ca şi frunzele. Frunze lanceolate sau subulate, verticilate, glabre, fără brazdă longitudinală. Flori dispuse în dichazii terminale, rare. Pedunculi glabri sau slab glandulos

păroși, de câteva ori mai lungi decât caliciul, cu bractei mici, pergamentoase, aplecați după înflorire, apoi din nou erecți. Sepale 5, ovate, cu marginea membranoasă, îngustă. Petale 5, albe, lanceolate, neacoperindu-se cu marginile lor, de obicei mai lungi decât caliciul. Stamine 5. Ovar globulos, cu 5 stile. Capsulă ovată, deschizându-se prin 5 valve largi. Semințe negre, mate, lentiforme, de 2,5 mm în diam., lat alb marginate. IV—V.

Stațiunea. Prin locuri și ogoare nisipoase.

Răsp. în țară: Reg. Baia Mare: Carei. Reg. Cluj: Canciu (r. Dej).

Răsp. gen.: Europa.

Genul 84. SPERGULARIA¹⁾ (Pers.) J. et C. Presl

Fl. čech. (1819) 94. — *Arenaria* Sect. *Spergularia* Pers. Syn. I (1805) 504.

○ — 4. Tulpini adeseori cespitoase, procumbente sau ascendente, glabre sau glandulos păroase. Frunze opuse, liniare sau subulate, obtuze sau ascuțite, cu margini întregi. Stipele pielioase, argintii, bractei forme, întregi sau laciniate, la bază adeseori concrescute. Flori de tipul 5, unisexuate sau bisexuate, dispuse în inflorescențe pauciflore. Pedunculi florali după înflorire aplecați, mai târziu din nou erecți. Sepale 5, adeseori membranos marginate. Petale 5, albe sau roze, uneori lipsă, întregi sau ușor emarginate. Stamine 5—10, cele exterioare cu 2 glande mici. Stile 3, rar 5. Ovule cu funicul scurt, amfitrop. Capsulă unibracteată, deschizându-se prin 3 valve largi. Semințe piriforme, rotunde sau lentiforme, cu o dungă marginală mai largă sau mai îngustă, și embrion aproape încârligat.

Determinarea speciilor

- | | | |
|-----|---|------------------------|
| 1 a | Capsulă cu mult mai lungă decât caliciul. Toate semințele lat aripate, împreună cu aripa, late de cca 1,5 mm. Stamine 10. Plantă perenă | 3. <i>S. marginata</i> |
| 1 b | Capsulă numai cu puțin mai lungă decât caliciul sau egală cu acesta. Semințe nearipate sau numai foarte puțin aripate | 2 |
| 2 a | Stamine 10. Toate frunzele liniare, plane, la vârf mucronate. Semințe nearipate | 1. <i>S. rubra</i> |
| 2 b | Stamine 5. Frunze cărnoase, semicilindrice, cel puțin la început mucronate. Semințe scurt papilate, cele dela bază aripate | 2. <i>S. salina</i> |

1. ○ *S. rubra* (L.) J. et. C. Presl Fl. čech. (1819) 94. — *Arenaria rubra* α. *campestris* L. Sp. pl. ed. I (1753) 423. — Exs.: FRE nr. 1213 a, b, c. — Ic.: Pl. 9, fig. 6.

¹⁾ Nume derivat după acela al genului *Spergula*.

☉, ☉ (rar 4). Plantă cespitoasă, formând tufe sau pajiști încheiate. Tulpini de 4—25 cm, culcate sau ascendente, păroase, în partea superioară glanduloase, rar glabre. Frunze opuse, îngust liniare, puțin cărnoase, glabre, plane, până la 2,5 cm lungime și 0,5 mm lățime, la vârf mucronate, aproximativ de lungimea internodiilor. Stipele alb membranoase, argintii, ovate lanceolate, adeseori laciniate, la bază adeseori concrescute. Flori în dichazii rare. Pedunculi floralii de lungimea caliciului, după înflorire aplecați, mai târziu erecți. Sepale 5, ovate lanceolate, lungi de 4 mm, acute, larg marginate, împreună cu pedunculii glandulos păroase. Petale 5, roze sau liliachii, ovate, obtuze, mai scurte decât caliciul. Stamine 10. Ovar ovat, cu 3 stigmathe scurte. Capsulă de lungimea caliciului, se deschide prin 3 valve largi. Semințe brun deschise, triunghiular ovale, fin verucoase, nearipate. V—IX.

Stațiunea. Prin locuri uscate, nisipoase, sărace în calcar, pe margini de drumuri, căi ferate.

Răsp. în țară: Din regiunea de câmpie, prin sărături, se urcă în munți până la 1300 m, de ex. în Mții Harghita, apoi în Mții Bihorului (pe Vlădeasa) până la 1400 m.

Răsp. gen.: Europa, Africa de N, Asia temperată, India, America de N, adventivă în Australia.

2. *S. salina* J. et C. Presl Fl. čech. (1819) 95; Gorschkova in Fl. U.R.S.S. VI (1936) 561, tab. XXXIII, fig. 4. — *Arenaria rubra* β. *marina* L. Sp. pl. ed. I (1753) 423, p.p. — *S. marina* (Pall.) Griseb. Spicil. Fl. rumäl. I (1843) 213. — **Exs.:** FRE nr. 2523. — **le.:** Pl. 12, fig. 3, 3 a, 3 b.

☉, ☉, 4. Tulpini până la 20 cm, culcate sau ascendente, ramificate, glabre sau glandulos păroase în partea superioară. Frunze opuse, semiro-tunde, cărnoase, liniar lanceolate, cel puțin la început mucronate. Stipele ovate, alb membranoase, adeseori concrescute. Flori dispuse în inflorescențe rare, cu pedunculi glanduloși, după înflorire aplecați. Sepale 5, ovate, glandulos păroase, larg membranos marginate. Petale 5, rozee, mai scurte decât caliciul. Stamine de obicei 5, rareori mai puține. Stile 3, scurte, reflecte. Capsulă puțin mai lungă decât caliciul, deschizându-se prin 3 valve. Semințe brune, mate, cu papile mici, cele dela bază aripate. V—IX.

Stațiunea. Prin locuri nisipoase, umede și sărate, pe lângă lacuri, șanțuri, margini de drumuri, etc.

Răsp. în țară: *Reg. Cluj:* Rodna, Năsăud; Ocna Dejului; Cluj, Someșeni, Desmir, Apahida, Cojocna, Boj (r. Cluj); Valea Florilor, Turda. *Reg. Aut. M.:* Gurghiu, Jabenita (r. Reghin); Sovata, Praid (r. Sângeorgiul de Pădure); Păuleni, Petreni (r. Odorhei). *Reg. Stalin:* Rupea; Veștem, Sibiu, Ocna Sibiului, Cunța, Drașov (r. Sebeș). *Reg. Arad:* Pecica (r. Arad); Adea, Șimand, Șintea, Pîlu (r. Chișineu-Criș); Săvârșin (r. Lipova). *Reg. București:* Turnu Măgurele, Islaz în lunca Oltului. *Reg. Ploști:* Câmpina pe prundișul

Doftanei, copios; Cotorca (r. Urziceni). *Reg. Constanța*: Tuzla (r. Constanța); Jurilovca (r. Babadag). *Reg. Galați*: Delta Dunării; Barboși în lunca Siretului (r. Galați).

Variabilitatea speciei

f. *halophila* (Bge.). — *Arenaria halophila* Bge. in Ldb. Fl. alt. II (1850) 162. — *S. media* β *halophila* Simk. in MNL III (1879) 22. — Plantă dens glandulos pubescentă. — *Reg. Cluj*: Fânețele Clujului în V. Primă și V. Caldă, Someșeni, Apahida, Cojocna (r. Cluj).

f. *genuina* (Briq.) — *S. salina* α . *genuina* Briq. Prodr. Fl. Corse I (1910) 492. — Intreaga plantă glabră.

Răsp. gen.: Europa, Africa de N, Asia, Noua Zeelandă, America de N și S.

3. *S. marginata* (DC.) Kitt. Taschenb. Fl. Deutschl. ed. II (1844) 1003. — *Arenaria marginata* DC. in Lam. et DC. Fl. fr. IV. 2, ed. III (1805) 793; Gorsch. l.c. 557, tab. XXXIII, fig. 3. — *Exs.*: FRE nr. 1214, a, b. — *l.c.*: Pl. 9, fig. 5, 5 a.

4. Plantă până la 40 cm înălțime, mai robustă decât *S. salina*, cu tulpini culcate sau ascendente, ramificate, în partea superioară puternic glandulos păroase, uneori glabre. Frunze lungi de 3—4 cm și late de 1 mm, cărnoase, îngust liniare, neacuminate. Pedunculi glanduloși, după înflorire aplecați, apoi din nou erecți. Flori mai mari decât la *S. salina*. Sepale 5, ovate, glanduloase, acute, cu o margine pergamentoasă îngustă. Petale 5, roze, mai scurte decât caliciul. Stamine 10. Stile 3. Capsulă de 2 ori mai lungă decât caliciul, deschizându-se prin 3 valve. Semințe brune, netede, mate, larg alb marginate, împreună cu aripa până la 1,5 mm lățime. VII—IX.

Stațiunea. În locuri umede, sărate, din stepă și din regiunea litorală maritimă.

Răsp. în țară: *Reg. Cluj*: Someșeni, Cojocna (r. Cluj); Turda. *Reg. Stalin*: Tiur (r. Târnăveni); Șeica Mare (r. Medias). *Reg. Arad*: Intre Grăniceri și Pilul la Lacul Mare Sărat (r. Chișineu-Criș). *Reg. Timișoara*: Indicat de Heuffel din Câmpia Banatului. *Reg. Craiova*: Zăvalu (r. Bechet.) *Reg. Ploști*: Buzău. *Reg. Constanța*: Medgidia; Constanța, Mamaia, Anadolchioi; Istria (r. Babadag). *Reg. Galați*: Delta Dunărei, Sf. Gheorghe, Sulina; Greci, Măcin pe V. Slatina; Barboși în lunca Siretului (r. Galați); Lacul Sărat (r. Brăila); Balta Albă (r. Filimon Sârbu).

Răsp. gen.: Europa, Africa de N, Colonia Capului, Asia Mică, Persia, Siberia, America de N și S.

× *Spergularia salontana* I. Pop n. novum et emend. = *rubra* × *salina*. — *S. salina* × *campestris* A. et G. Syn. V, 1 (1919) 851.

Plantă înaltă de 10—19 cm, cu tulpini erecte, la bază foarte puțin culcate. Frunze semicilindrice, cărnoase, la vârf nemucronate, late de 0,5—1 mm și lungi până la 34 mm. Stipele membranacee, lat triunghiular ovate, până la 3 mm lungime, la bază unite. Pedicel floral glandulos păros, în timpul

înfloririi mai scurtă sau egal cu floarea, mai târziu de 1,5—3 ori mai lung decât fructul. Sepale glandulos păroase, de 3,5—4 mm lungime. Petale de jumătatea sepalelor, uneori puțin mai lungi, de culoare roz-purpurie. Stamine 8 (rar 6). Capsula egală, sau cu puțin mai lungă decât caliciul. Seminte obovate, unele netede, cele mai multe puțin rugos scabre, nearipate, brune-mate, de 0,4—0,6 mm lungime. VI—VII.

După înfățișare seamănă cu *S. salina*, de care se deosebeste prin frunze înguste, pedicel floral până la de 3 ori mai lung decât fructul, seminte mai mici, nearipate (caractere de *S. rubra*). De ambii părinți se deosebeste prin cele 8, rar 6 stamine. (*S. salina* are 5 stamine, iar *S. rubra* 10 stamine).

Stațiunea. Pe terenuri de sărătură slabă.

Răsp. în țară: *Reg. Oradea*: Salonta, pe marginea inundată și umedă a canalului «Kölesér», pe o suprafață de cca 25 m.p.

Genul 85. **PARONYCHIA**¹⁾ Adans.

Fam. II (1763) 272, em. Juss. in Mém. Mus. Paris II (1815) 389.

Flori dispuse în capitule la vârful tulpinii și așezate între bractei albe, relativ mari, lat ovate, membranoase, lucitoare. Petale lipsă sau neînsemnate, subulate. Stigmate 2. Ovar unilocular, cu un ovul. Fructul o nucuoară cu înveliș membranos, care se lacerează începând dela bază. Stipele numai cu puțin mai scurte decât frunzele.

P. cephalotes (M.B.) Bess. Enum. hort. Cremenec. (1830) 4. — *Illecebrum cephalotes* M.B. Fl. taur.-cauc. III (1819) 169; Schischk. in Fl. U.R.S.S. VI (1936) 565, tab. XXXIV, fig. 6. — *P. Kapela* A. Kern. in ÖBZ XIX (1869) 376, non XXVI (1876) 294. — Exs.: FRE nr. 762. — Ic.: Pl. 13, fig. 3, 3 a.

4. Tulpini lignificate, indesuit cespitoase. Frunze lungi de 2—5 mm, oblong sau îngust lanceolate, cu mult mai lungi decât late, cu margini scurt ciliate. Flori în capitule. Bractei lat-ovate, albe, membranoase, acuminate și ușor despicate la vârf. Caliciu cu lacinii drepte, de 2 ori mai lung decât capsula. VI—VII.

¹⁾ Paronychia = ulcer dureros al unghiei; împotriva acestei boli grecii întrebuințau plante din acest gen.

Planșa 13. — 1. *Heliosperma quadrifidum* (L.) Rchb., 1a. floare mărită, 1b. sămânță mărită. — 2. *Viscaria vulgaris* Röhl., 2.a. fruct cu ginofor (caliciu în secțiune longitudinală). — 3. *Paronychia cephalotes* (M.B.) Bess., 3a. o pereche de frunze, la b. se văd stipelele membranoase.



Stațiunea. Pe stânci, coaste pietroase și însorite din regiunea muntoasă.

Răsp. în țară: *Reg. Cluj*: Cheia Turzii, Cheia Turului, Buru, Rimetea, Runc, Lunca, Poșaga de Sus pe Mt. Scărița (r. Turda). *Reg. Aut. M.*: Tg. Săcuesc. *Reg. Stalin*: Orașul Stalin, Râșnov. *Reg. Timișoara*: Mehadia, Defileul Dunărei între Drencova și Svinița. *Reg. Craiova*: Vârciorova, Gura Văii, Schela Cladovei, Dudașu, Turnu Severin. *Reg. Constanța*: Bălăgești pe Dl. Alah-Bair (r. Hârșova); Nicolae Bălcescu pe Dl. Sepelgin, Enisala (r. Baba-dag). *Reg. Galați*: Hagilar pe Dl. Denis-Tepe, Filimon Sârbu pe Dl. Consul (r. Tulcea); Cerna Greci, Măcin pe Dl. Pricopanului.

Răsp gen.: Balcanii de E, U.R.S.S. de S, Asia Mică.

Genul 86. **HERNIARIA**¹⁾ L.

Gen. pl. [ed. I (1737) 34, nr. 93], ed. V (1754) 103, nr. 272, Pax in Engl. et Prantl Nat. Pflzfam. III. 1 b (1889) 91. — *Feciorică, Săpunaș.*

Plante anuale sau perene, culcate la suprafața solului, unde cresc în formă de roți dese, glabre, aculeat păroase. Frunze opuse, cele superioare, din cauza atrofierii uneia, aparent alterne, glabre sau păroase, cu stipele alb membranoase, adesea concrescute, cu margini fimbriate. Flori hermafrodite sau unisexuate, de tipul 5, dispuse în glomerule sesile la subțioara frunzelor și sprijinite de bractei alb membranoase. Caliciu concrescut în treimea inferioară, cu 5 lacinii libere, ovate, concave, glabre sau \pm păroase, verzi, ierbacee, mucronate sau nemucronate. Petale 5, subulate, mai scurte decât caliciul. Stamine 5, cu antere globuloase și filamente scurte, stând în fața petalelor. Ovar \pm cufundat în receptacul, cu un stil bifid aproape până la bază și cu 2 stigmatе globuloase. Ovule pe funicul lung, campilotrope, adeseori încârligiate, anatropе. Fruct mai lung sau mai scurt decât caliciul, erect, nedehiscent, căzând împreună cu caliciul. Semințe negre lucitoare, globuloase, cu margine evidentă și cu embrion încovoiat. Cotiledoanele perpendiculare pe mediana seminței.

Determinarea speciilor

- 1 a Plantă glabră sau glabrescentă. Capsulă mai lungă decât caliciul 2. **H. glabra**
- 1 b Plante \pm aspru păroase. Capsulă închisă în caliciu 2
- 2 a Sepale setos acute la vârf. Flori în glomerule cu cca 10 flori 3. **H. hirsuta**
- 2 b Sepale fără sete terminale. Glomerule cu câte 3—6 flori. Frunze până la 1 cm lungime, oblong lanceolate sau oblong liniare. Caliciu acoperit cu peri lungi, setiformi și pătenți. Vârfurile sepalilor acute 1. **H. incana**

¹⁾ Hernia = ruptură, *Herniaria glabra* era întrebuințată în evul mediu împotriva durerilor cauzate de fracturi.

1. *H. incana* Lam. Encycl. III (1789) 124; Muravjeva in Fl. U.R.S.S. VI (1936) 568, tab. XXXIV, fig. 3. — Săpunaș. — Szürke porcika. — Graues Bruchkraut. — Грыжник седоватый. — Exs.: FRE nr. 953, sub. var. *Besseri*. — Ic.: Pl. 12, fig. 5.

24. Plantă des păroasă, aproape cenușie, cu tulpini puternic ramificate, până la 20 cm lungime. Frunze opuse, de cca 1 cm lungime, oblong lanceolate sau oblong liniare, pe ambele fețe aspru păroase, cele superioare alterne, din cauza atrofierii unei frunze. Stipele ovate triunghiulare, laciniate. Flori dispuse în glomerule apropiate, spiciforme, compuse din 3—6 flori. Flori de tipul 5, scurt pedunculate, sprijinite de bractei membranoase, laciniate. Sepale 5, ovate, acute, concrescute la bază și setos păroase dar fără setă terminală. Petale 5, subulate. Stamine 5. Ovar cu 2 stile scurte. Fruct mai scurt decât caliciul, complet îmbrăcat de acesta. Semințe negre, lucitoare, rotunde, cu o margine pronunțată. VII—X.

Stațiunea. Prin pietrișuri bătorite, prundișuri, locuri uscate, însoțite, nisipoase.

Răsp. în țară: *Reg. Cluj*: Cojocna (r. Cluj); Cheia Turului, Turda; Ocna Mureșului (r. Aiud). *Reg. Hunedoara*: Alba Iulia, Bărbant, Vințul de Jos la Cetatea Zevernic; Sebeș pe Dl. Roșu. *Reg. Timișoara*: Orșova pe Mt. Alion. *Reg. Craiova*: Vârciorova, Turnu Severin; Craiova, Leamna de Jos; Segarcea, Studina (r. Caracal). *Reg. Pitești*: Ionești, Căcova (r. Găești). *Reg. București*: București (Băneasa, Herăstrău, Chitila); Comana (r. Vidra); Pasărea (r. Brănești); Lehliu; Slobozia, Bora (r. Slobozia). *Reg. Ploști*: Ploști; Sinaia. *Reg. Constanța*: Fetești, Hagieni, Țândărei. *Reg. Bârlad*: Tecuci. *Reg. Bacău*: Tg. Neamț.

Variabilitatea speciei

f. *latifolia* (Fenzl). — *H. incana* β. *latifolia* Fenzl in Ldb. Fl. ross. II (1844) 161. — *H. macrocarpa* Sibth. et Sm. Fl. graec. Prodr. I (1806—1809) 167. — Dens sur păroasă. Frunze obovate, obtuze, cele inferioare scurt pețiolate. Flori lungi de 2—3 mm. — *Reg. Hunedoara*: Simeria pe Dl. Uroiului. — *Reg. Pitești*: Slătioara (r. Slatina). *Reg. București*: Comoara (r. Alexandria); Comana (r. Vidra).

var. *Besseri* (Fisch.) Gürke in Richt. - Gürke. Pl. eur. II (1897) 186. — *H. Besseri* Fisch. in Hornem. Hort. Hafn. Suppl. (1819) 167. — Exs.: FRE nr. 953. — Plantă ± hispidă păroasă. Tulpină și ramuri alungite. Frunze liniare sau liniar lanceolate, acute, cele inferioare oblongi, deabia pețiolate. Inflorescență compusă din mai multe flori, evident pedunculate, lungi de 1,5—2 mm. Bifurcația ramurilor lipsită de flori sau paucifloră. — *Reg. București*: în stepile Ialomiței. *Reg. Galați*: Măcin pe Dl. Pricopan. *Reg. Constanța*: Constanța spre Tuzla.

var. *viridis* Nyár. et Prod. var. nova in Add. p. 663. — Exemplarele de toamnă mai verzi decât cele de primăvară. — *Reg. București*: Urziceni. — *Reg. Galați*: între Măcin și Greci. *Reg. Constanța*: Valul lui Traian (r. Constanța).

Răsp. gen.: Europa de S, Asia Mică, Siria, Persia, Afganistan.

2. *H. glabra* L. Sp. pl. ed. I (1753) 218; Muravjeva l.c. 567, tab. XXXIV, fig. 5. — Feciorică. — Копасз porcika. — Kahles Bruchkraut. — Грыжник гладкий. — Exs.: FRE nr. 952. — Ic.: Pl. 12, fig. 4, 4 a.

☉, ☉ (rar 4). Plantă multicaulă, culcată la pământ, formând tufe dese, circulare, aproape glabră. Tulpini până la 30 cm lungime, glabre sau foarte scurt păroase, ramificate. Frunze eliptice sau ovate, opuse, concrescute, cu margini laciniate. Flori mărunte, verzi, de tipul 5, în glomerule formate din 10 flori, sprijinite de bractei alb membranoase. Sepale 5, ovate, îngust marginate, obtuze. Petale 5, albe, subulate, mai scurte decât caliciul. Stamine 5. Ovar cu 2 stile scurte. Fruct ovat, aspru, monosperm, mai lung decât caliciul. Semințe negre, netede, lucitoare, lentiforme. VII—IX.

Stațiunea. Prin locuri uscate, prundișuri, surpături, locuri nipoase, etc.

Răsp. în țară: *Reg. Baia Mare*: Repedea pe V. Repedea la gura Văii Tomnatec (r. Vișeu). *Reg. Cluj*: Rodna, Năsăud; Bistrița; Cluj; Bologa (r. Huedin); Turda. *Reg. Aut. M.*: Porcești (r. Reghin); între Morăreni și Rușii Munți pe V. Mureșului (r. Toplița); Sâncrăieni (r. Miercurea Ciuc). *Reg. Stalin*: Sâmbăta de Jos, Cârțișoara și V. Arpașului (r. Făgăraș); Bradu (r. Sibiu). *Reg. Hunedoara*: Orăștie; Petrila (r. Petroșani), *Reg. Oradea*: Ciucea (r. Aleșd). *Reg. Pitești*: Călimănești (r. Brezoiu); Câmpulung pe V. Râul Târgului și V. Bughea; Cacova, Ionești (r. Găești). *Reg. București*: București (Herăstrău); Comana (r. Vidța). *Reg. Constanța*: Babadag, Enisala. *Reg. Galați*: Filimon Sârbu, Niculițel (r. Tulcea); Cerna, Greci, Măcin; Galați. *Reg. Bacău*: Tg. Neamț; V. Bicăzului spre gura Pâr. Neagra.

Variabilitatea speciei

f. *glaberrima* (Fenzl). — *H. glabra* β *glaberrima* Fenzl in Ldb. Fl. ross. II (1844) 159. — Frunzele și tulpinile complet glabre. — Cu totul sporadică. — *Reg. Constanța*: Tariverde (r. Babadag).

var. *moldavica* Prod. var. nova in Add. pag. 664. — Tulpină cu cili albi. Frunze late, sesile sau aproape sesile, cu stipele lacerate și pe margini ciliate. Frunze tulpinale aproape la fel cu cele florale. — *Reg. Bacău*: pe marginea râului Bistrița aproape de Piatra Neamț.

var. *dobrogensis* Prod. var. nova in Add. pag. 664. — Tulpină foarte slab dispers-păroasă și cu glande sesile, numeroase. Frunze alungit invers-lanceolate, la bază contrase într'un pețiol lung. Glomerulele inflorescenței fiind mai distanțate și cu frunze înguste, inflorescența apare mai subțire. — *Reg. Galați*: Măcin pe Dl. Pricopan, între Măcin și Greci.

f. *scabrëscens* (B. de Roem.). — *H. glabra* var. *scabrescens* B. de Roem. in Willk. Pl. exs. (1845) Sched. nr. 1153; Willk. et Lange Prodr. Fl. hisp. III (1874) 152. — Tulpini și frunze cu peri scurți, setacei. — *Reg. Cluj*: Cluj. *Reg. București*: Pădurea Ghimpați (r. Mihăilești).

Întrebuintări. Drogul acestei plante este cunoscut sub denumirea de « Herba Herniariae ». Planta fără rădăcini, folosită sub formă de ceai sau praf, se recomanda odinioară la combaterea bolilor de rinichi, a bătăcii udului, dropiceii și la curățirea sângelui.

Răsp. gen.: Europa, Africa de N, Asia Mică, Altai, Siberia.

3. *H. hirsuta* L. Sp. pl. ed. I (1753) 218; Muravjeva l.c. 571, tab. XXXIV, fig. 2. — Ic.: Pl. 12, fig. 6.

☉, ☉, (4). Plantă culcată, ramificată, sur-verzui păroasă, cu tulpini lungi de cca 30 cm, aspru păroase. Frunze opuse, oblong eliptice, păroase, cele superioare alterne. Stipele ovate, adeseori concrescute, cu margini laciniate. Flori câte 7—10, dispuse în glomerule spiciforme, sprijinite de bractei alb membranoase, ciliate. Sepale 5, ovate, până la 1,5 mm lungime, concrescute la bază, aspru păroase, la vârf cu un spinișor lung de 1 mm. Petale 5, subulate. Stamine 5, foarte scurte. Ovar cu o singură sămânță, cu 2 stile scurte. Fruct mai scurt decât caliciul, înconjurat complet de acesta. Semințe negre, lucitoare, rotunde. VII—IX.

Stațiunea. Prin locuri nisipoase.

Răsp. în țară: Reg. Constanța: în nisipurile litorale dela Portița (r. Babadag).

Răsp. gen.: Europa de S și mijlocie, Africa de N, Caplanda, Asia Mică, Siberia, Indiile estice.

Genul 87. *SCLERANTHUS*¹⁾ L.

Gen. pl. [ed. I (1737) 130, nr. 366], ed. V (1754) 190, nr. 497. — Buruiana surpăturii, Sincerică, Studeniță.

Plante anuale sau perene, mici, rigide, cu frunze opuse, concrescute la bază, înguste, subulat lanceolate, acute. Stipele absente. Flori mici, verzui, glomerulate. Flori și stamine dispuse pe o adâncitură în formă de cupă care mai târziu se întărește, înconjoară fructul și cade împreună cu acesta. Caliciul 5 (4)-laciniat, tubulos campanulat, 10-nervat. Petale lipsă. Stamine 5 sau 10, uneori mai puține. Ovar monolocular, închis în tubul caliciului. Stile 2, cu stigmat capitate. Ovule amfitrope, pe funiculi lungi. Fructul nucușoară pielosă, cu 1—2 semințe, indehiscentă, înconjurată de caliciul cartilaginos și căzând împreună cu acesta. Semințe lentiforme, netede, cu coaje subțire. Embrion în formă de potcoavă. Cotiledoane perpendiculare pe mediana seminței.

Determinarea speciilor

- 1 a Laciniile caliciului verzi, cu margini foarte înguste, alb membranoase; partea membranoasă foarte redusă față de partea verde . . 2

¹⁾ Dela sklerôs = uscat și anthos = floare, dat fiind aspectul uscat al plantei.

Plansa 14. — 1. *Scleranthus polycarpus* Torn., 1 a. floare mărită. — 2. *S. annuus* L., 2 a. floare mărită. — 3. *S. perennis* L., 3. a. floare mărită. — 4. *S. uncinatus* Schur, 4 a. floare mărită. — 5. *S. neglectus* Roch., 5 a. floare mărită.



- 1 b Laciniile caliciului cu margini late, alb membranoase, membrana spre vârf mai lată; partea verde foarte redusă față de partea membranoasă 4
- 2 a Laciniile caliciului la vârf încârligate (uncinate), îngust lanceolate. Inflorescență densă. Frunze bazale dilatate, subulate, mai lungi decât internodiile tulpinii. Tulpină prostrată, foarte ramificată, mărunț globulos pubescentă 4. *S. uncinatus*
- 2 b Laciniile caliciului drepte 3
- 3 a Laciniile caliciului mai scurte decât fructul. Flori lungi de 2—3 mm, dispuse în spice scurte, întrerupte. Tulpină foarte gracilă, gălbui-verde, foarte scurtă, erectă, paucifloră 3. *S. polycarpus*
- 3 b Laciniile caliciului mai lungi decât fructul. Flori lungi de 3,5 — 5 mm, dispuse în dichazii sau pleiochazii. Tulpina de 8 — 20 cm lungime 2. *S. annuus*
- 4 a Tulpini ascendente sau erecte, de obicei abundant dichotomic ramificate. Frunze subțiri, lungi 1. *S. perennis*
- 4 b Tulpini procumbente, scurte, cu puține flori. Frunze ± cărnoase, scurte 5. *S. neglectus*

1. *S. perennis* L. Sp. pl. ed. I (1753) 406; Schischk. in Fl. U.R.S.S. VI (1936) 547, tab. XXXI, fig. 6. — Sincerică. — Évelő szikárka. — Ausdauernder Knäuel. — Дивала многолетняя. — Exs.: FRE nr. 2754. — Ic.: Pl., 14, fig. 3.

4. Plantă până la 15 cm înălțime, sur-verzuie, în genere mai robustă și mai rigidă decât *S. annuus*, cu tulpini numeroase și puternic dichotomic ramificate, spre bază lignificate, purtând resturile frunzelor moarte, în porțiunea inferioară adeseori roșcate. Frunze opuse, liniar subulate, acute, suriu-verzui, cu bază vaginantă, până la 10 mm lungime. Flori sesile, albe-verzui, reunite în dichazii terminale. Laciniile caliciului eliptice, obtuze, lat alb membranos marginate, puțin mai lungi decât staminele; marginile spre vârf mai late, partea verde mai redusă decât cea membranoasă. Lacinii fructifere puțin închise sau patule. Fruct glabru sau puțin păros, lung de 4—5 mm. Stamine 10. V—IX.

Stațiunea. Prin locuri stâncoase, pietroase, nisipoase, prundișuri.

Răsp. în țară: *Reg. Cluj*: Valea Vinului (r. Năsăud), pe V. Someșului Mare; Huedin, între Călată și Baci (r. Huedin); Cluj, Feleac, Someșeni; Turda, Cheia Turzii, Copăceni, Tureni, Micești, Vidolm (r. Turda); Vidra (r. Câmpeni). *Reg. Aut. M.*: Zetea, Vlahița, Beclean (r. Odorhei). *Reg. Stalin*: Mediaș, Vorumlac, Copșa Mică, Șeica Mică, Micăsasa, Valea Lungă, Mănărade (r. Mediaș); Reci (r. Sf. Gheorghe); Predeal, Bran-Poarta; Sibiu, Gușterița, Noul, Ocna Sibiului, Cislădioara, Rășinari, Gura Râului (r. Sibiu). *Reg. Hunedoara*: Sebeș, Drașov, V. Secășului (r. Sebeș); Cetea pe Piatra Ceții (r. Alba Iulia); Orăștie, Săcărâmb; pe dealurile dintre Deva și Cozia, Hărău (r. Deva); între Hunedoara și Teliuc; pe V. Streiului între

Simeria și Pui; Grădiștea de Munte, Bretea Română, Ciopea (r. Hațeg), Mții Retezatului pe V. Lăpușnicului; Petroșeni. *Reg. Oradea*: Oradea; Bratca (r. Aleșd). *Reg. Arad*: Șiria, Măsca (r. Arad); Păuliș, Miniș, Lipova, Slatina de Mureș (r. Lipova); Măderat, Agriș, Arăneag, Cermeiu (r. Ineu); Dezna, Hălmăgel spre Mt. Găina (r. Gurahonț). *Reg. Timișoara*: Mehadia, Crușovăț, Globurău, V. Dunărei la ruinele Tricule (r. Mehadia). *Reg. Craiova*: Vârciorova, Gura Văii (r. Tr. Severin); Costești, Baia de Aramă; Craiova, *Reg. Pitești*: Râul Vadului, Mrea Cozia, Călimănești (r. Brezoiu); Râmnicul Vâlcea; Mt. Ghițu (r. Curtea de Argeș); Câmpulung pe V. Râul Târgului și V. Bughea; Sturzeni (r. Târgoviște); Ionești, Căcova (r. Găești); *Reg. Ploiești*: Sinaia. *Reg. București*: Comana (r. Vidra); Băneasa (r. Giurgiu). *Reg. Constanța*: Constanța. *Reg. Galați*: Filimon Sârbu (pe Dl. Consul), Mrea Cocos, Nifon (la Stâna Oancei), Tulcea; Greci, Măcin pe Dl. Pricopanului; Galați. *Reg. Suceava*: Stroiești, Bălăceana (r. Suceava); Calafindești (r. Rădăuți).

Variabilitatea speciei

- 1 a Tulpină flexuos erectă sau pendulă pe stâncării, cu frunze subulat alungite, de 13—17 mm lungime. Laciniile fructifere ale caliciului închise
 var. *dichotomus* (Schur). — *S. dichotomus* Schur in Verh. SVN (1851) 10—12; Enum. pl. Transs. (1866) 225. — In crăpăturile stâncilor de gneis, în văile montane și subalpine. — *Reg. Cluj*: Valea Vinului (r. Năsăud). *Reg. Stalin*: Mții Făgărașului (Arpașul, în regiunea jneapănului); Cisnădioara în dosul Cetății, Gura Râului pe malul Cibinului (r. Sibiu). — După Schur ar fi o formă de trecere între *S. perennis* și *S. neglectus*.
 - 1 b Tulpini erecte, ± rigide, numeroase, cu frunze până la 10—12 mm lungime. Laciniile caliciului fructifer deschise sau ± închise 2
 - 2 a Flori dispuse la vârful tulpinii formând glomerule ± dense, cu aspectul unor inflorescențe capituliforme 3
 - 2 b Flori dispuse mai uniform, puțin mai distanțate, formând inflorescențe mai laxe, cu pedunculi floralii mai puțin adunați, fără aspect capituliform 4
 - 3 a Frunze relativ late
 f. *glomeratus* Döll Fl. Bad. III (1862) 1048. — *Reg. Cluj*: Cluj; Huedin.
 - 3 b Frunze mai înguste
 f. *fastigiatus* (Lasch). — *S. perennis* L. β. *fastigiatus* Lasch in Linn. IV (1829) 413. — *Reg. Cluj*: Cluj pe malul Someșului.
 - 4 a Plantă înaltă, tufoasă •
 f. *laricifolius* (Rehb.) Borza Consp. Fl. Rom. I (1947) 93. — *S. perennis* L. var. β *laricifolia* Rehb. Fl. germ. exc. III (1832) 565. — *Reg. Oradea*: Ciucea (r. Aleșd)
 - 4 b Plante de statură mijlocie și cu flori dispuse mai uniform 5
 - 5 a Frunze falcate în amestec cu frunze drepte
 f. *typicus* (Beck) Borza l.c. — *S. perennis* L. α. *typicus* Beck Fl. NÖ I (1890) 348. — *Reg. Cluj*: Călata la Chicera (r. Huedin); Mții Trascăului (Colții Trascăului). *Reg. Aut. M.*: Zetea la Üknyédláza » (r. Odorhei).
 - 5 b Toate frunzele falcate într-o direcție
 f. *dicranifolius* (Rehb.) Borza l.c. — *S. dicranifolius* Rehb. in ÖBZ XXII (1872) 115. n. nud. ex Form. in Verh. NV Brünn XXXIII (1894) 199. — *Reg. Cluj*: Cheia Turzii.
- Răsp. gen.: Europa, Asia Mică, Caucaz, Armenia, Siberia.

2. *S. annuus* L. Sp. pl. ed. I. (1753) 406; Schischk. in Fl. U.R.S.S. VI (1936) 547. — Buruiana surpăturii. — Egyéves szikárka. — Einjähriger Knäuel. — Дивала однолетняя. — **Exs.:** FRE nr. 1217, nr. 1218 sub var. *comoso*. — **Ic.:** Pl. 14, fig. 2, 2 a.

○. Tulpini culcate sau ascendente, până la 20 cm înălțime, verzi sau brune, scurt păroase sau glabre. Frunze liniar subulate, acute, concrescute la bază, glabre sau scurt păroase. Flori verzui, mărunte, de 3,5 — 5 mm lungime, reunite în glomerule, dichazii sau pleiochazii axilare sau terminale. Bractei mai lungi decât florile. Sepalele cu vârful ascuțit, cu margini îngust membranoase, glabre sau dispers păroase, la maturitate erecte sau cu vârfurile patente, mai lungi decât fructul. Stamine de 3—4 ori mai scurte decât sepelele, de obicei în număr de 10, unele fiind atrofiate. Fruct glabru, rareori răzleț păros. V—IX.

Stațiunea. Pe coline sterpe, locuri însoțite, nisipoase, uscate, prin locuri cultivate, pietrișuri, pe prundișurile râurilor.

Răsp. în țară: Răspândită în întreaga țară, atât în locurile necultivate, cât și în cele cultivate.

Variabilitatea speciei

var. *caespitosus* Neilr. Fl. NÖ (1859) 783, ampl. Oborny Fl. Mähr. (1883—86) 1108. — Plantă tufoasă. Tulpini și partea inferioară a ramurilor atât de mult ramificate, încât tulpina principală se ridică numai puțin cu vârful din tufă. — **Reg. Arad:** Mții Codrului.

var. *campéstris* Schur Herb. Transs. et Enum. pl. Transs. (1866) 223. — *S. collinus* Schur in Verh. SVN II (1851) 13, non Horn. — Plantă de un verde gălbui, scundă, de 2—5 cm înălțime. Tulpini și frunze păroase la bază. Flori cu pedunculi scurți. Sepale obtuziuscule, la bază alb membranoase. — **Reg. Arad:** Glogovăț (r. Arad); Șoimoș (r. Lipova); Musca, Agriș Miderat, Arăneag, Pâncota, Mocrea, Bocsig (r. Ineu); Sebiș, Dezna, Iosășel, Hălmagiu (r. Gurahonț).

var. *divaricatus* Beck Fl. NÖ I (1890) 348. — Bractei de obicei mai scurte decât florile superioare. Sepale ovate și relativ mai lat membranoase pe margini, de lungimea ovarului (de cca 3,5—4 mm). Tulpină de obicei erectă. — **Reg. Galați:** Tulcea.

var. *hibernus* Rchb. Fl. germ. exc. III (1832) 565. — Plantă anuală care ierneză. Tulpini culcate sau ascendente, ramificate numai la bază, unde are frunze uscate pe timpul înfloririi. Flori aproape sesile. — Frecvent.

var. *tenellus* Rchb. ap. Hoehme in ÖBZ XXIV (1874) 148 n. seminud. ampl. A. et G. Syn. V. 1 (1919) 925. — Tulpini, frunze și sepele foarte subțiri. Tulpinile dela bază foarte ramificate, de 10 cm înălțime. Bractei de lungimea florilor superioare sau cu puțin mai scurte. — **Reg. Arad:** Mții Codrului; Poiana Brătcoia, Rășchirata, Ponoare până la Sohodol (r. Beiuș) și Hălmăgel (r. Gurahonț).

var. *comosus* (Dumort.) Beck Fl. NÖ I (1890) 348. — *S. comosus* Dumort. Fl. Belg. (1827) 23. — **Exs.:** FRE nr. 1218. — Bractei mai lungi decât florile superioare. Sepale alungit lanceolate, aproape subulate, la vârf acuminate ca și fructul, de 4—5 mm lungime. —

Reg. Cluj: Rodna; *Cluj. Reg. Stalin:* Blaj; Feldioara (r. Stalin) Reci (r. Sf. Gheorghe); Sibiu.

Răsp. gen.: Europa, Africa de N, Asia temperată. Adventivă în America de N.

3. *S. polycarpus* Torn. Cent. II pl. (1756) 16, in L. Amoen. acad. IV (1759) 313; Schischk. in Fl. U.R.S.S. VI (1936) 548. — *S. annuus* L. ssp. *polycarpus* (Torn.) Thell. in Schinz et Kell. Fl. Schw. ed. III, II, krit. Fl. (1914) 109; A. et G. Syn. V. 1 (1919). — *S. collinus* Hornung in Opiz Naturalientausch X (1825) 232. — *Ic.*: Pl. 14, fig. 1.

○. Plantă delicată, de 3–10 cm înălțime, cu tulpină foarte gracilă, verde-gălbuie, erectă, paucifloră. Frunze uscate în partea inferioară, mai lungi decât internodiile, de obicei arcuit îndoite. Inflorescențe glomerate; glomerule subverticilate și pauciflore, sau chiar flori solitare, formează spice întrerupte. Flori de 2–3 mm lungime, scurt pedunculate. Laciniile caliciului erecte, mai scurte decât fructul, îngust alb marginate. Fruct de 2–3 mm lungime, la bază rotunjit. V–VI.

Stațiunea. Prin locuri ierboase, uscate, mai ales în locurile cu iarbă mărunță și rară din sărături.

Variabilitatea speciei

var. *Delortii* (Gren.) Rouy in Rouy et Fouc. Fl. Fr. XII (1910) 16. — *S. Delortii* Gren. in F. W. Schultz Arch. Fl. Fr. All. I (1852) 206. — Tulpină mai robustă, mai tare, alungită, dreaptă, ascendentă sau culcată, mai adeseori furcat ramificată. Frunze mai scurte decât articulele tulpinii. — *Reg. Galați:* Cerna (r. Măcin).

Răsp. gen.: Europa, Asia de V.

4. *S. uncinatus* Schur in Verh. SVN I (1850) 107, 108 n. nud, ibid. II (1851) 10, descr.; Schischk. in Fl. U.R.S.S. VI (1936) 548. — Studeniță. — *Kampós szikárka*. — Hackiger Knäuel. — Дивала крючковатая. — *Exs.*: FRE nr. 2753. — *Ic.*: Pl. 14, fig. 4, 4a; Pax Grundz. II (1908) 48, fig. 3.

○. Tulpini prostrate, până la 20 cm, foarte ramificate, mărunț globulos pubescente. Frunze liniare, dilatate la bază, subulate, mai lungi decât internodiile tulpinii. Inflorescențe glomerate, terminale sau axilare, dense. Laciniile caliciului verzi, îngust lanceolate, cu margini îngust alb membranoase, cu vârful ascuțit, curbat înspre interior. Fruct glabru, rareori răzlet păros. VI–VII.

Stațiunea. Pietrișuri, pe coaste rupte și pe lângă drumuri, locuri cultivate, înierbate, în regiunea montană și subalpină.

Răsp. în țară: *Reg. Baia Mare:* Repedea pe Mt. Petriceaua și Mt. Farcău, Borșa pe V. Cizla și Mt. Cearcanul (r. Vișeu). *Reg. Cluj:* Mții Rodnei (Corongiș); Feiurdeni pe Coama

Mărgău (r. Cluj). *Reg. Aut. M.*: Toplița; Mții Gurghiului (Mt. Saca, Dl. Crucii); Mții Harghita; Mții Giurgeului: Hăghimașul Mare, Piatra Singuratică, Mt. «Öcsém» «Vigyázokő», «Terkő» *Reg. Stalin*: Mt. Ciucașul, Mt. Tesla, Predeal, Mții Bucegi; Mții Sibiului: Dl. Negru (Vf. Stărpului), Negovanul, Frumoasa, Șerbota, Gropata, Beșineul. *Reg. Hunedoara*: Mții Retezatului: V. Butii deasupra Com. Câmpul lui Neag. (r. Petroșani). *Reg. Timișoara*: Mții Semicului. *Reg. Craiova*: Aninoasa (r. Tg. Cărbunești). *Reg. Pitești*: Voineasa pe V. Lotrului (r. Brezoiu); Mt. Ghițu, V. Argeșului la Cetatea lui Vlad Țepeș. *Reg. Ploești*: Sinaia, Bușteni; Mt. Penteleu. *Reg. Bacău*: Mt. Ceahlău pe stâncile de la Șea.

Răsp. gen.: Europa, Caucaz, Asia Mică, Siria, Africa boreală.

5. *S. negléetus* Roch. in Baumg. Enum. stirp. Transs. III (1816) 345.—*S. marginatus* Guss. Fl. sic. Prodr. I (1827) 486. — **Exs.**: FRE nr. 1216. — **Ic.**: Pl. 14, fig. 5, 5a; Roch. Pl. rar. Ban. (1828) t. III, fig. 10.

4. Tulpini numeroase, dens cespitoase, procumbente, foarte scurte, inde-suit foliate. Frunze suriu-verzi, scurte, distant glandulos ciliate, la bază dilatate, liniare, destul de groase, cărnoase, acute și \pm curbate. Laciniile caliciului la fructificație patule, rotund obtuze, cu margini late, alb membranoase, cu o dungă verde foarte subțire între ele. Inflorescență condensată. VI—IX.

Stațiunea. Prin pășuni alpine superioare, pe stânci cristaline sau conglomerate.

Răsp. în țară: *Mții Bucegi*: Caraiman, Coștila, Vf. Omul, Doamnele. *Mții Făgărașului*: Mții Arpașului, Mții Cârțișoarei, Negoii. *Mții Parângului*: Slăveiu. *Mții Retezatului*. *Mții Țarcu-Godeanu*: Godeanu, Murariu. *Mții Bihorului*: Dl. Pleșa deasupra Com. Ciucea (r. Aleșd).

Răsp. gen.: Carpații sudici, Italia de S, Balcani, Asia Mică.

Subfam. Silenoideae A. Br.

in Aschers. Fl. Prov. Brand. I (1864) 60

Sepale concrescute, \pm tubuloase. Stigmate despărțite.

Genul 88. **AGROSTÉMA**¹⁾ L.

Gen. pl. [ed. I (1737) 135, nr. 379], ed. V (1754) 198, nr. 516. — **Neghină**.

La noi, plantă anuală segetală (prin semănături), cu flori lungipedunculate, așezate în monochaziu lax. Caliciu cu lacinii foliacee. Petale emarginate, întregi, lipsite de coronulă, cu unguiculă lungă, la mijloc dealungul ei cu o

¹⁾ Dela grec. agros = câmp, ogor și stemma = coroană, cunună, deoarece mai de mult se făceau cununi din *A. Githago*.

dungă proeminentă. Stigmate 5, păroase. Capsulă uniloculară, 10-dințată. Semințe puțin turtit reniforme.

A. Githágo L. Sp. pl. ed. I (1753) 435; Muravjeva in Fl. U.R.S.S. (1936) 575. — Neghină. — Vetési konkoly. — Kornrade. — Куколь посевной. — Ic.: Pl. 15, fig. 3.

☉, ☉. Plantă înaltă de 30—100 cm, erectă, furcat ramificată, alipit sericeu păroasă, cu rădăcină verticală, pivotantă. Frunze liniare sau liniar lanceolate, de 1 cm lățime, sericeu păroase, cu nervură mediană puternică. Flori mari, hermafrodite, așezate în monochazii pauciflore. Caliciu campanulat tubulos, subțiat în porțiunea superioară, 10-brăzdat, membranaceu, aspru păros, lung de 3—5 cm, cu lacinii lungi, liniare, acute. Petale purpurii, rar albe, mai scurte decât laciniiile caliciului, fără coronulă. Lamina petalelor triunghiular obovată, la vârf ondulat crenată. Stamine 10. Stile 5. Stigmate fin păroase. Capsula 1-loculară, tare, lunguiată, mai lungă decât tubul caliciului, deschizându-se la vârf prin 5, (rar 4) valve longitudinale. Semințe reniforme, spre hil îngustate, negre, cu asperități așezate în rânduri regulate. VI—IX.

Stațiunea. Frecventă prin semănături, cereale, lucerniere.

Răsp. în țară: Răspândită în întreaga țară, în regiunea de câmpie și dealuri.

Variabilitatea speciei

f. **nicaeensis** (Link.). — *Githago nicaeensis* Link. Diss. bot. (1795) 62. — *A. Gith.* β. *anomala* Porc. En. pl. Naszód. (1878) 10. — Sepale lanceolate, de 2—3 ori mai lungi decât petalele. — Reg. **Baia Mare:** Borșa pe V. Cizla. Reg. **București:** Ghimpați (r. Mihăilești).

f. **microcalyx** (Döll.). — *A. Gith.* β. *microcalyx* Döll. Fl. Bad. (1862) 1232. — *A. Gith.* β. *brachycalyx* Opiz ap. Celak. Prodr. Fl. Böhm. (1875) 514. — Sepale mai scurte decât petalele. — Reg. **Galați:** Niculițel (r. Tulcea).

Întrebuințări. Singurul folos al neghinei este că planta tânără plivită dă un nutreț bun pentru vacile cu lapte. Dacă la treerat semințele ajung în cantitate mai mare în grâu, depreciază calitatea grâului. Semințele conținând o saponină (agrostemina), sunt veninoase și dau făinii o culoare mai negricioasă și pâinei un gust neplăcut de usturoi și o culoare albăstruie. Se susține că prin copt, făina cu neghină își pierde în mare măsură puterea toxică. Totuși, consumarea pâinii amestecată cu neghină, produce la oameni diferite turburări nervoase. Unele animale pot consuma fără nicio urmărire semințele de neghină, altele însă nu. Se mai susține că păsările pier în urma consumării lor. După unele experiențe.

Răsp. gen.: Eurasia. În celelalte părți adventivă.

Planșa. 15. — 1. *Lychnis Coronaria* (L.) Desr. — 2. *L. Flos-cuculi* L. — 3. *Agrostemma Githago* L.



vitele cornute consumă semințele cu multă plăcere și se îngrășă, la fel și porcii le pot consuma fără nicio vătămare. Caii însă nu se pot hrăni cu furaje conținând neghină. În general, s'a constatat că pentru animalele de făt sunt foarte periculoase. Boilor însă li se poate da cca 1—2 kg. pe zi din acest furaj.

Genul 89. **VISCĂRIA**¹⁾ Röhl.

Deutschl. Fl. II, ed. II (1812) 37. — Lipicioasă.

Ierburi perene, cu tulpini dese, glabre sau lipicioase sub noduri. Flori roșii (rar albe), așezate în raceme paniculate, terminale. Caliciu 10-brăzdat. Corola cu coronulă (paracorolă). Stamine 10. Stile 5 (rar 4 sau 3). Fruct capsular cu 5 dinți, care mai târziu se pot divide în câte 2 dinți mici.

Determinarea speciilor

- 1 a Carpofoar aproape cât jumătatea capsulei de lung. Paracorolă lungă de 3 mm. Flori de culoare roșie deschisă 1. **V. vulgaris**
- 1 b Carpofoar foarte scurt, de 2 mm. Paracorolă numai de 2 mm lungime. Flori atropurpurii 2. **V. atropurpurea**

1. **V. vulgaris** Röhl. Deutschl. Fl. II, ed. II (1812) 275. — *V. viscosa* (Scop.) Aschers. Fl. Prov. Brand. I (1864) 85; Gorschk. in Fl. U.R.S.S. VI (1936) 576, tab. XLV. fig. 1. — Lipicioasă. — Rovarfogó enyvesszegfű. — Gemeine Pechnelke. — Смолка клейкая. — Exs.: FRE nr. 2519. — Ic.: Pl. 13, fig. 2, 2a.

4. Tulpini numeroase, de 30—100 cm înălțime, erecte, glabre sau ușor păroase, lipicioase sub noduri, slab ramificate spre vârf. Frunze inferioare invers lanceolate, late până la 1 cm, îngustate spre pețiol, cele superioare liniar lanceolate, toate păroase la bază, în rest glabre. Flori așezate în panicule terminale laxe, aparent verticilate. Caliciu glabru sau puțin păros, 10-brăzdat, lung de 10—15 mm, roșcat, cu dinți triunghiulari, ascuțiți, mai târziu îndoiți în afară și de regulă despicați. Corola de 18—20 mm în diametru. Petale roșii-purpurii, la vârf puțin emarginate, cu coronulă bifidă, înaltă de 3 mm. Carpofoar lung. Stamine 10, dintre care 5 puțin mai lungi, cu antere ovale. Stile 5, puțin mai lungi decât staminele. Ovar 5-ocular la bază. Capsula ovată, de 2 ori mai lungă decât carpofoarul, rupând la maturitate caliciul. Semințe reniform turtite, mamelonate, pe spinare puțin brăzdate, de 0,5 mm în diametru. V—VI.

¹⁾ Viscaria, derivat din cuvântul «viscum», clei făcut din bacele lui *Viscum album*, referitor la materia lipicioasă de pe tulpinile speciei *Viscaria vulgaris*.

Stațiunea. Prin livezi, coaste ierboase și pietroase, terasamente de cale ferată, margini de păduri, dela câmpie până în etajul subalpin.

Răsp. în țară: Răspândită în întreaga țară.

Variabilitatea speciei

f. graminifolia (Beck.) — *V. viscosa* 2. *graminifolia* Beck in Glasnik XIX (1907) 15. — Frunze liniare, late de 3—5 mm, acute sau acuminate, contrase lent în pețiol, la bază cu margini lanate. — **Reg. Aut. M.:** Sândominic (r. Miercurea Ciuc); Mții Giurgeului (Mt. « Öcsém »). **Reg. Timișoara:** Citat de Heuffel din Banat. — **Reg. Pitești:** Rădești (r. Pitești).

f. albiflora (Sweet). — *V. albiflora* Sweet Hort. Brit. ed. II (1830) 54. — *V. vulgaris* subvar. *albiflora* Rouy et Fouc. Fl. Fr. III (1896) 100. — Flori albe. — Cluj la Fânațe.

f. latifolia (Beck). — *V. viscosa* 1. *latifolia* Beck, l.c. — Frunze bazale lat lanceolate, contrase în pețiol, cele tulpinale late de 6—14 mm. — **Reg. Cluj:** Suceag (r. Cluj).

f. adenocalyx Borb. in MBL III (1904) 288. — Caliciu glandulos. — **Reg. Galați:** Greci pe Dl. Țuțuiatu (r. Măcin).

Răsp. gen.: Europa, Caucaz, Siberia de V.

2. V. atropurpurea Griseb. Spicil. Fl. rumel. I (1843) 166.

4. Tulpină erectă, lipicioasă la noduri. Frunze bazale ciliate, glabre, oblong lanceolate. Flori atropurpurii. Caliciu de 10—14 mm lungime, dispers glandulos. Lamina petalelor lungă de 4—5 mm, purpurie, întreagă sau emarginată. Paracorola numai de 2 mm lungime. Carpofor (2 mm) mai scurt decât jumătatea lungimii capsulei. V—VI.

Stațiunea. Pe coaste pietroase.

Răsp. în țară: **Reg. Aut. M.:** pe coaste calcaroase la Sândominic (r. Miercurea Ciuc). **Reg. Timișoara:** Mehadia.

Răsp. gen.: Balcani.

Genul 90. **LYCHNIS**¹⁾ L.

Gen. pl. [ed. I (1737) 135, nr. 381, p.p.], ed. V (1754) 198, nr. 517, p.p.; A. Br. in Flora XXVI (1843) 369. — **Opaiță.**

[Ierburi perene, aspru sau moi păroase, cu flori mari, bisexuate, așezate în dichazii rare sau adunate. Caliciu tubulos campanulat, 10-brăzdat. Petale întregi, emarginate sau 2—4-fidate, roșii sau albe, cu coronulă evidentă. Stamine 10. Ovar unilocular, pedicelat. Stile 5, rar 3 sau 6. Fruct capsular cu 5 dinți. Semințe reniforme, aspre.]

Determinarea speciilor

- | | | |
|-----|---|------------------------|
| 1 a | Inflorescența deasă, capituliform adunată | L. chalcidonica |
| 1 b | Inflorescența în dichazii rare, răsfirată | 2 |

¹⁾ Nume de plantă la Theophrastos (372—287 î.e.n.), dela «lychnos», lampă.

- 2 a Plantă peste tot dens sericeu păroasă, tomentoasă. Petale purpurii, întregi sau emarginate 1. **L. Coronaria**
 2 b Tulpină scurt păroasă. Frunze aspre, verzi. Petale adânc 4-fidate, cu lacinii liniare 2. **L. Flos-cuculi**

1. **L. Coronaria** (L.) Desr. in Lam. Encycl. III (1789) 643. — *Agrostemma Coronaria* L. Sp. pl. ed. I (1753) 436. — *Coronaria coriacea* (Mnch.) Schischk. in sched. ap. Gorschk. in Fl. U.R.S.S. VI (1936) 699. — Curcubeu. — Bársonyos szűnyogvirág. — Bekrönte Lichtnelke. — Горлицет кожистый. — Exs.: FRE nr. 2206, a, b. — Ic.: Pl. 15, fig. 1.

4. Plantă înaltă de 30—100 cm, dens tomentoasă și alb sericeu păroasă. Tulpini erecte, în partea superioară dichotomic ramificate, dens foliate la bază, mai rar foliate spre vârf. Frunze sesile, ovate sau lanceolat ovate, acute Flori solitare, lung pedunculate. Caliciu lung de 1—2 cm, păros, cu 5 dungi inegale, verzi; dinții caliciului răsuciți spre dreapta. Petale lat ovate, întregi, cel mult emarginate, purpurii, excepțional albe. Coronulă bipartită, acută. Fructe capsulare, deschizându-se prin 5 dinți. Semințe negre, reniforme, colțuroase, sbârcite. VI—IX.

Stațiunea. Prin poieni, marginea pădurilor, rar pe coaste în-sorite.

Răsp. în țară: *Reg. Cluj*: Indicat de Baumgarten din Câmpia Transilvaniei. *Reg. Stalin*: Turnu Roșu pe Mt. Prihodiște (r. Sibiu). *Reg. Hunedoara*: Căzănești, Vulcan pe V. Aninoasa (r. Brad); Dobra, Roșcani (r. Deva); între Hunedoara și Govâșdia; Hațeg. *Reg. Oradea*: Oradea, Băile Episcopopești. *Reg. Arad*: Cuvin, Miniș, Păuliș, V. Cladovei (r. Lipova). *Reg. Timișoara*: Rusca Montană (r. Caransebeș); Mehadia; Viile Giarmata (r. Timișoara). *Reg. Craiova*: Vârciorova, Turnu Severin, Hinova, Mții Mehedinților la Piatra Cloșanilor; Craiova. *Reg. Pitești*: Stolnici (r. Costești); Leordeni (r. Topoloveni); Vultureanca (r. Găești). *Reg. București*: Ciocănești (r. Răcari); București; Comana (r. Vidra). *Reg. Ploești*: Ploești; Buzău. *Reg. Constanța*: Constanța; Babadag, Jurilovca, Slava Rusă, Ciucurova (r. Babadag). *Reg. Galați*: Filimon Sârbu, Isaccea, Mrea Cocos, Niculițel, Tulcea. *Reg. Bârlad*: Focșani.

Întrebuințări. Adeseori se cultivă în grădini. Uneori sălbătică pe lângă mână-stiri, cimitire, etc.

Răsp. gen.: Europa sudică, Asia Mică, Caucaz, Turchestan, Himalaia.

2. **L. Flos-cuculi** L. Sp. pl. ed. I (1753) 436. — *L. laciniata* Lam. Fl. fr. III, ed. I (1778) 51. — *Melandrium Flos-cuculi* Röhl. Deutschl. Fl. ed. II (1812—13) 275. — *Coronaria Flos-cuculi* A. Br. in Flora XXVI (1843) 386; Gorschk. in Fl. U.R.S.S. VI (1936) 700. — Floarea cucului. — Kakuk szűnyogvirág. — Kuckucks - Lichtnelke. — Горлицет кукушкин. — Exs.: FRE nr. 2207 a,b. și 2520 sub v. *latifolio*. — Ic.: Pl. 15, fig. 2.

4. Tulpină înaltă de 30—90 cm, cu lăstari floriferi și sterili. Axe florifere erecte, unghiulare, dispers scurt păroase, lipicioase sub noduri, adeseori roșcate. Frunze inferioare alungit spatulate, acute, cele superioare liniar lanceolate, verzi, \pm aspre. Flori în dichazii rare, scurt pedunculate. Caliciu tubulos-campanulat, glabru, lung de 1 cm, verde sau roziiu, cu 10 nervuri, late, închise. Dinții caliciului ceva mai scurți decât $1/2$ lungimii tubului. Petale roze, rare albe, 4-fidate, cu lacinii liniare, palmat divergente, simple sau învoalte. Coronulă adânc bidentată sau cu dințișori pe fața externă. Fruct capsular, deschizându-se la maturitate prin 5 dinți scurți, acuti, privind spre exterior. Semințe numeroase, brune, verucos aculeate, late până la 0,7 mm. V—VIII.

Stațiunea. Prin livezi și fânețe umede, băltoase.

Răsp. în țară: Comună în întreaga țară, prin locuri înierbate, umede, la marginea bălților, dela câmpie până la munte.

Variabilitatea speciei

f. *albiflora* (Tinant). — *L. Flos-cuculi albiflora* Tinant Fl. Luxemb. (1836). — Flori albe. — Cluj și împrejurimi.

var. *latifolia* C. Bolle in Verh. BV Brandenb. VII (1865) 19. — Exs.: FRE nr. 2520. — Frunze late de 1 cm. Plantă verde, nenuanțată cu roșu. Flori protandrice. — Reg. Cluj: Poșaga (r. Turda). Reg. Timișoara: Deta (r. Deta). Reg. București: Bulbucata la Păd. Babele de Luncă (r. Mihăilești).

var. *parviflora* Peterm. Fl. Lips. (1838) 332. — Flori mici. — Reg. Arad: Mții Codrului.

f. *eglutinosa* Hegi Fl. Mitt.-Eur. III (1912) 299. — Tulpină nevâscoasă sub noduri. — Reg. București: Bulbucata la Păd. Babele de Luncă (r. Mihăilești).

f. *pleniflora* (Schur). — *L. Flos-cuculi a. pleniflora* Schur Sert. (1853) 13, n. nud. — *Coronaria Flos-cuculi* L. m. *pleniflora* A. et G. Syn. V. 2. (1920) 13. — Flori învoalte. — Reg. Cluj: Sâmpetrul de Câmpie (r. Sărmășel). Reg. Stalin: livezi lângă Sibiu.

Răsp. gen.: Europa, Siberia, Caucaz. Adventiv în America.

* *L. chalcédonica* L. Sp. pl. ed. I (1753) 436; Gorsch. in Fl. U.R.S.S. VI (1936) 696, tab. XLV, fig. 4. — Arșinic, Cruciuliță. — Egő szerelem. — Brennende Liebe. — Лихнис татарскоемыло.

4. Tulpină dreaptă, solidă, înaltă de 30—45 (60) cm, sbârlit păroasă. Frunze ovate, cordate la bază, acute, pe nervuri și pe margini sbârlit păroase. Flori numeroase, adunate în cime capituliforme. Caliciu alungit cuneat, păros. Petale de culoare roșie, cu lamina bifidată și unguiculă ciliată.

Stațiunea. Cultivată în grădini la orașe și la țară.

Intrebuințări. Plantă ornamentală foarte răspândită.

Răsp. gen.: Originară din U.R.S.S. sudică.

Genul 91. **BÉHEN** *) Mnch. ¹⁾

Meth. (1794) 709; Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon Nouv. Sér. (1868) 343. — *Silene* Sect. *Behenantha* Otth in DC. Prodr. I (1824) 367. — *Silene* Subgen. *Behen* Rohrb. Monogr. *Silene* (1868) 66. — *Behenantha* Schur in Verh. NV. Brünn XV, 2 (1877) 130. — Guşa porumbelului.

Plante perene sau anuale, cu tulpini uneori \pm lignificate, de obicei glabre. Frunze opuse, întregi şi de regulă cu margini coriacee. Inflorescenţa bine distinctă de partea vegetativă şi având un dichaziu terminal, cu primele ramuri colaterale egale sau numai puţin diferite ca lungime, cele următoare (superioare) colaterale foarte inegale; una dintre ele rămâne foarte scurtă, formând cu floarea mijlocie un dichaziu lateral, iar cealaltă se aşează în direcţia internodiului ramurii de sub nodul ei, formând cu ea o axă dreaptă, îngroşată. Numărul internodiilor 3—4. Flori trioice. Caliciu umflat, ovoid, membranos, cu 5 nervuri mediane şi 5 intersepale (comisurale). Între aceste 10 nervuri se desvoltă câte o nervură de obicei mai scurtă, toate împreunate prin o reţea anastomozată. Petale unguiculate; lamina bi- ∞ -partită cu prefloaraune cochleară. Cele 10 stamine aproape de 2 ori mai lungi decât caliciul. Gineceu trimer şi trilocular. Capsulă ovată, deschizându-se prin 6 dinţi.

Determinarea speciilor

- 1 a Caliciu trecând lent în pedicel; capsula matură umple complet caliciul 1. **B. Csereii**
- 1 b Caliciu rotunjit la bază, la maturitate umbilicat şi mai larg decât capsula pe care o înconjoară 2
- 2 a Plante \pm ierboase, mai rar lignificate la bază, lax tufoase, necesitoase, cu frunze mari şi inflorescenţe mai mult decât triflore 2. **B. vulgaris**
- 2 b Tulpină scurtă, \pm lignificată, emiţând dela bază un număr mare de ramuri subţiri, lungi de 10—30 cm, decumbente, apoi ascendente. Frunze mici, lungi de 10—30 mm, late de 3—10 mm, îngust eliptice, până la ovat-lanceolate. Inflorescenţă 1—3-floră. Petale cu ligulă (coronulă) redusă 3. **B. alpinus**

1. **B. Csereii** (Baumg.) Guşul. comb nova. — *Silene Csereii* Baumg. Enum. stirp. Transs. III (1816) 345, nr. 2250, in Omiss.; Schischk. in Fl. U.R.S.S. VI (1936) 598, tab. XXXV, fig. 3. — *S. Schottiana* Schur Enum. pl. Transs. (1866) 103. — *Behenantha Csereii* Schur in Verh. NV Brünn XV, 2 (1876) 132. — *Silene Fabaria* β *Csereii* Rohrb. in ÖBZ XIX (1869) 268. — *S. saponariaefolia* Rehb. Ic. Fl. germ. VI (1844) 54, tab. 301, fig. 5121, non Schott, nec Auct. plur. — Guşa porumbului. — Cserei Habszégfüje. — Cserei's Tau-

*) După un nume indian sau arab al seminţelor plantei Moringa.

¹⁾ Prelucrat de M. Guşuleac.

benkropf. — Смолевка цвѣта — **Exs.:** FRE nr. 238 sub *Silene*, FEAH nr. 525 sub *Silene*, HN nr. 5428. — **Ic.:** Pl. 16, fig. 1.

4. Tulpină înaltă de 50—100 cm, cu noduri îngroșate, glaucescentă, glabră. Frunze cărnoase, cele inferioare obovate, îngrămădite, cele mijlocii eliptice, până la cordat lanceolate, scurt mucronate, lungi de 4—7 cm, late de 2—5 cm. Inflorescența un dichaziu alungit, cu cele 2 prime ramuri laterale egal dezvoltate și foarte alungite; bifurcațiile următoare inegale, florile terminale și ramurile reduse lateral. Flori cu caliciu la bază lent atenuat în pedicel. Caliciu fructifer de cca 10 mm lungime, lat de 7 mm, cu 10 nervuri lungi și 10 mai scurte, cu anastomoze foarte slabe. Petale lungi de 18 mm, bipartite, cu lobi oblong liniari și 2 dinți laterali, fără ligulă (coronulă); unguicule de culoare alburie sau rozee. Fructul o capsulă ovoid-globoasă, de 3—4 ori mai lungă decât carpoforul, matură umple complet caliciul. Semințe dorsal plan convexe, cu laturi slab concave, seriat turberculate, de culoare brună închisă. VII—VIII.

Stațiunea. Pe coaste marno-argilo-humoase, pe lângă vii, având la Șoimuș lângă Deva, limita apuseană.

Răsp. în țară: *Reg. Hunedoara:* pe lângă vii între Șoimuș și Chișcădagă lângă Deva (locul clasic). *Reg. Timișoara:* Băile Herculane la Prolaz. *Reg. Pitești:* Dealul Mare prin vii (r. Drăgășani). *Reg. Galați:* între Măcin și Greci pe Mt. Suluc, între Greci și Cerna, între Cerna (r. Măcin) și Nifon (r. Tulcea).

Variabilitatea speciei

f. **elätior** Gușul. f. nova in Add. pag. 664. — Inflorescență alungită, cu frunze mari, ovate lanceolate, până la 9 cm lungime și late de 4 cm. — *Reg. Hunedoara:* Șoimuș (r. Deva). *Reg. Constanța:* Gura Dobrogei, Tirgușor (r. Medgidia).

f. **tenella** Gușul. f. nova in Add. pag. 664. — Frunze eliptice, mici, lungi de 3 cm, late de 1 cm. — *Reg. Hunedoara:* Șoimuș (r. Deva). — **Exs.:** FEAH nr. 525.

f. **pusillus** (Säv. et Rayss). — *Silene Cserei* Baumg. var. *pusilla* Säv. et Rayss, Mat. Fl. Bas. II in Supl. Bul. Agric. III (1926) 162. — Tulpină înaltă de 10—20 cm, cu frunze mici, lungi de 10—15 mm, late de 3—5 mm, toate îngrămădite la bază, cu margini cartilaginoase. Caliciu lung de 8—10 mm, alb-roziu. Petale lungi de 12 mm. — *Reg. Galați:* Greci (r. Măcin).

Răsp. gen.: Bulgaria, Ucraina, Crimeea, Caucaz, Anatolia.

2. **B. vulgăris** Mnch. Meth. (1794) 709. — *Cucubalus Behen* L. pl. ed. I. (1753) 414, non *Silene Behen* L. — *Silene Cucubalus* Wib. Prim. fl. Werth. (1799) 241. — *S. venosa* (Gilib.) Aschers. Fl. Prov. Brand. I (1864) 86. — *Behen*

Planșa 16. — 1. *Behen Cserei* (Baumg.) Gușul. — 2. *Silene gallica* L. — 3. *S. dichotoma* Ehrh.



vesicarius Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon Nouv. Sér. XVI (1868) 343. — *Sil. vulgaris* Garcke Fl. Deutschl. ed. IX (1869) 64. — *Behenantha inflata* Schur Verh. NV Brünn XV. II (1877) 131. — *Sil. latifolia* (Mill.) Rendle et Britt. List Brit. Seeds- Pl. (1907) 5; Schischk. in Fl. U.R.S.S. VI (1936) 596, tab. XXXV, fig. 4. — Gușa porumbelului. — Hólyagos hatszegfü. — Gemeiner Taubenkropf. — Смолевка широколистная. — Ic.: Pl. 17, fig. 1, 3, 4.

4. Plantă ierboasă, mai rar lignificată la bază, lax tufoasă. Tulpini înalte de 30—100 cm, de obicei glabre. Frunze eliptic lanceolate sau ovate, la vârf acute. Bractei membranoase. Inflorescența un dichaziu bine distinct de partea vegetativă, de obicei cu 2—3 bifurcații simetrice, lungi până la 15 cm, mai rar cu 5 bifurcații, cu ramurile numai ale primei bifurcații egal dezvoltate, celelalte inegale și dispuse lateral, formând o inflorescență lungă până la 50 cm. Flori polioic-dioice, cu caliciu ovat umflat, membranos, glabru, la bază umbilicat, cu lobi triunghiulari ascuțiți, cu 20 nervuri anastomozate, mai larg decât capsula pe care o înconjoară. Petale unguiculate, cu ligulă foarte redusă sau lipsă, albe sau roze. Stile 3. Capsulă globuloasă, ovată, cu carpor for mai scurt decât caliciul în care rămâne închisă. Semințe rotund reniforme, dorsal plan convexe, lateral plan concave, seriat tuberculate. VII—VIII.

Stațiunea. Foarte răspândită și frecventă în livezi, crânguri, mărăcinișuri, coaste însoțite, prin parcuri, fânețe uscate sau îngrășate, pârloare, ogoare, dela câmpie până în regiunea alpină.

Răsp. în țară: În toate regiunile țării ± comună.

Obs. Mai rar există o specie ale cărei forme variate să aibă o apreciere atât de diferită și controversată ca *Behen vulgaris*. A. et G. Syn. împart specia în 2 grupe după părozitate, iar pe cele glabre în alte 2 grupuri după lungimea caliciului fructifer, de 6—12 mm lățime, și 15—20 mm lungime, care sunt de obicei simple modifi cațiuni, dependente de influența directă a mediului. Așa, apar în fânețe după cosire exemplare cu ramuri mai subțiri și cu flori mai mici, care în aceste împrejurări artificiale se pot compara cu plantele nealterate de pe stâncile de calcar. Frunzele de obicei au o membrană îngustă, care la margine pe alocuri este transformată în cili foarte fini. La exemplarele din țara noastră perii sunt foarte scurți și se găsesc numai în regiunea vegetativă a plantei, pe tulpină și pe frunză. Dar nici celelalte caractere, ca ligulele petalelor, rugozitatea semințelor, nu sunt suficient de constante, pentru a putea fi întrebuințate la delimitarea formelor. Luând în considerare pe lângă caracterele întrebuințate, formele deosebite ale inflorescenței, putem stabili 2 subspecii.

Variabilitatea speciei

ssp. *vesicarius* (Schrad.). — *Silene inflata* A. *glabra* α. *vesicaria* Schrad. ap. Rehb. Fl. germ. exc. III (1832) 823; Rehb. Ic. Fl. germ. VI (1844) 54, tab. 299, fig. 5120. — Ic.: Pl. 17, fig. 1.

Plantă de înălțime mijlocie. Frunze lanceolate sau obovat lanceolate, acuminate. Inflorescența un dichaziu normal, bifurcat simetric de 1—3 ori, cu ramurile colaterale de toate gradele, egale. Lungimea inflorescenței 3—15 cm.

Reg. Cluj: Mții Rodnei în etajul montan (Corongiș, Mihăiasa); Turda. *Reg. Aut. M.:* Mții Călimani. *Reg. Stalin:* Mții Bucegi (Ciubotea); Mții Făgărașului (Arpașul Mare, V. Bălii). *Reg. Hunedoara:* Mții Retezatului (Lacul Zănoaga). *Reg. Oradea:* Aleșd. *Reg. Timișoara:* Băile Herculane., Defileul Dunării la Cazane. *Reg. Craiova:* Argintești pe V. Motrului. (r. Filiași). *Reg. Ploești:* Mții Bucegi (Jepii Mici, Caraiman, V. Cerbului, V. Horoabei). *Reg. Bârlad:* Blăjarii de Sus (r. Tecuci). *Reg. Suceava:* Suceava.

Forme

- 1 a Frunze glabre 1
- 1 b Frunze și tulpini pubescente
 - f. **pubescens** (DC.). — *Silene inflata* Sm. δ *pubescens* DC. Fl. fr. IV. 2 (1805) 747. — *Cucubalus Antelopum* (Vest) Grec. Consp. Fl. Rom. (1898) 106. — *Behen puberulus* Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon XVI (1868) 313. — *Mții Rodnei:* Vf. Negreasa. *Mții Bucegi:* Caraiman. *Mții Făgărașului:* Surul. *Mții Retezatului.*
- 2 a Frunze ovate oblongi sau ovate lanceolate, de lungime mijlocie, 5—6 cm lungi și 2,5—3 cm late
 - f. **genuinus** (Rouy et Fouc.). — *Silene vesicaria* α. *genuina* Rouy et Fouc. Fl. Fr. III (1896) 104. — Răspândirea vezi mai sus.
- 2 b Frunze mai late sau mai înguste decât la f. *genuinus* 3
- 3 a Frunze late, deseori foarte mari (9 cm lungime și 3—5 cm lățime), ovate sau ovate oblongi. Inflorescența evident paucifloră
 - f. **latifolius** (Rchb.). — *Silene inflata* Sm. var. B. *ciliata* Rchb. α. *latifolia* Rchb. Ic. Fl. germ. VI (1844) 54, tab. 301, fig. 5120. — *Mții Bucegi* în V. Mălăești.
- 3 b Frunze mai înguste decât la f. *genuinus* 4
- 4 a Plante înalte sau mijlocii. Frunze înguste, oblongi sau lanceolate, atenuate spre bază.
 - f. **oleraceus** (Bor.). — *Silene oleracea* Bor. Fl. centr. Fr. II, ed. III (1857) 95. — *S. inflata* var. *oleracea* Fic. Fl. Dred. I, ed. II (1822) 313, p.p. — *S. inflata* Sm. var. A. *glabra* γ *oleracea* (Fic.) Rchb. Ic. Fl. germ. VI (1844), 54, tab. 300, fig. 5120 sin. — *S. venosa* γ. *oleracea* Grec. Consp. Fl. Rom. (1898) 106. — *Reg. Baia Mare:* Vișeu de sus. *Reg. Cluj:* Dej; Turda. *Reg. Oradea:* Aleșd. *Reg. Timișoara:* Timișoara. *Reg. Craiova:* Cârcea (r. Craiova) *Reg. Pitești:* Masivul Leaota (Mt. Roșu). *Reg. București:* București (Băneasa). *Reg. Ploești:* Mții Bucegi (V. Horoabei). *Reg. Constanța:* Ostrov (r. Băneasa); Murfatlar. *Reg. Bacău:* Mrea Neamțului. *Reg. Iași:* Iași (Bucium).
- 4 b Frunze înguste însă neatenuate spre bază
 - f. **brachiatus** (Jord.). — *Silene brachiata* Jord. ex Boreau Fl. centr. Fr. I, ed. III (1857) 94. — *Behen brachiatus* Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon Nouv. Sér.

Planta 17. — *Behen vulgaris* Mnch. ssp. *vesicarius* (Schrad.) Gușul. — 2. *B. alpinus* (Thomas) Gușul. f. *microphylla* (Boiss.) Gușul. — 3. *B. vulgaris* Mnch. f. *oleraceus* (Bor.) Gușul. — 4. *B. vulgaris* Mnch. ssp. *paniculatus* (Grec.) Gușul. — 5. *B. alpinus* (Thomas) Gușul. f. *typicus* Gușul.



XVI (1868) 343. — *Reg. Cluj*: Dej. *Reg. Oradea*: Peștiș în V. Bărbănească (r. Aleșd), *Reg. Timișoara*: în partea de S. — *Reg. Craiova*: Vârciorova.

ssp. *paniculatus* (Grec.). — *Silene venosa* Gilib. = *paniculata* Grec. Consp. Fl. Rom. (1898) 107. — *S. saponariaefolia* Schott et Auct. plur., non Rehb.; cf. Rohrb. in ÖBZ XIX (1869) 71, 261. — *S. Csereii* Schur exs. in Herb. Inst. Bot. București. — **lc.**: Pl. 17, fig. 4.

Inflorescența un dichaziu robust, lung de 16—40 cm, de 4—5 ori bifurcat la tulpinile principale și normale dezvoltate. Numai ramurile primei bifurcațiuni sunt egale; la cele următoare, o ramură rămâne cu mult mai slabă decât cea colaterală, care este redusă la puține flori și împinsă împreună cu floarea mijlocie la o parte. de către ramura viguroasă, care se îndreaptă în sus și formează cu ramura viguroasă a bifurcației precedente și cu cea a ramurei bifurcației următoare, o pseudoaxă.

Obs. Această subspecie este foarte caracteristică și are o asemănare atât de mare în ce privește inflorescența cu *Behen Csereii* încât a fost confundată cu această plantă chiar de botaniști încercați ca Schur, Janka și alții (cf. ÖBZ 1869). De *B. Csereii* se deosebește la prima vedere prin caliciul său umbilicat. S'a preferat denumirea lui Grecescu, fiind primul care a descris corect planta noastră. Denumirea de *Silene saponariifolia* a rămas în mare parte nelămurită și după explicarea monografistului Rohrbach în ÖBZ (1869).

Forme

- 1 a Lungimea totală a dichaziilor suprapuse ajunge, la exemplarele normal crescute, la 16—20 cm 2
- 1 b Lungimea totală a dichaziilor suprapuse de 14—15 cm lungime
f. *intermedius* Gușul f. nova in Add. pag. 664. — *Reg. Stalin*: Satulung (r. Stalin). *Reg. Hunedoara*: Mții Retezatului (Zănoaga). *Reg. București*: Brănești, Cernica.
- 2 a Frunze ovate oblongi sau ovate lanceolate, glabre, de lungime mijlocie (6 cm lungi și 2,5—3 cm late)
f. *fallacinus* Gușul. f. nova. in Add. pag. 664. — *Reg. Cluj*: Mții Rodnei (la poalele Mt. Ineu); Cluj (la Făget și Techintău). *Reg. Stalin*: Mercurea (r. Sebeș). *Reg. Timișoara*: V. Dunărei la Cazane. *Reg. Craiova*: Simnic (r. Craiova). *Reg. Ploști*: Gara Văcărești la Păd. Colanu (r. Târgoviște); Gara Prahova (r. Ploști). *Reg. Galați*: Hanu Conachi (r. Măicănești). *Reg. Bacău*: Bistricioara (r. Ceahlău). *Reg. Iași*: Iași (Galata)
- 2 b Frunze mai mari, lat ovate până la lat oblongi sau lanceolate, mai înguste decât la f. *fallacinus* 3
- 3 a Frunze foarte mari (—10) cm lungime
f. *grandifolius* Gușul f. nova in Add. pag. 664. — *Reg. Cluj*: Cluj (la Făget), Someșul Rece; Turda, Iara. *Reg. Stalin*: Mții Bucegi în V. Mălăești. *Reg. Craiova*: Bucovăț (r. Craiova). *Reg. București*: Brănești. *Reg. Constanța*: Murfatlar (V. Serpla Kula). *Reg. Iași*: Iași (Galata, Copou).
- 3 b Frunze îngust lanceolate, acuminate
f. *microphyllus* (Boiss.). — *Silene inflata* γ *microphylla* Boiss. Fl. or. I (1867) 629. — *S. angustifolia* Briq. ssp. δ. *vulgaris* δ. *microphylla* Briq. Prodr. Fl. Corse I (1910) 546. — *Reg. Stalin*: Rășinari (r. Sibiu). *Reg. Hunedoara*: Petroșani la Cetatea

Bolii. *Reg. Timișoara*: Băile Herculane (Peștera Bori). *Reg. Ploești*: Bușteni la Cascada Urlătoarea (r. Sinaia). *Reg. Bacău*: Hangu (r. Ceahlău).

Întrebuințări. Planta merită să fie cultivată ca plantă furajeră pentru oi. Frunzele tinere se întrebuințează în unele regiuni în loc de varză. Rădăcina se întrebuințează de mult ca «*Radix Behen albi*» în medicină. Floarea este vizitată de albine pentru nectarul foarte abundent.

Răsp. gen.: Eurasia, Africa bor., America merid.

3. **B. alpinus** (Lam.). — *Cucubalus alpinus* Lam. Encycl. III (1786) 220. — *Silene inflata* ssp. *prostrata* Gaud. Fl. Helv. III (1828) 164. — *S. alpina* Thomas Catal. (1837) 45. — *S. inflata* γ *oleracea* Fic. var. *alpina* (Lam.) Rehb. Ic. Fl. germ. VI (1844) 54, tab. 300, fig. 5120 med. inf. — *S. cucubalus* γ *alpina* Rohrb. Monogr. Sil. (1868) 87, excl. syn. nonnullis. — *S. brachyantha* Schur in Linn. XXXVI (1870) 259. — *Behenantha inflata* var. c. *subalpina* et var. d. *subtriflora* Schur in Verh. NV Brünn XV, 2 (1876) 131. — **Exs.**: FRE nr. 236. — **Ic.**: Pl. 17, fig. 2, 5.

4. Tulpină ± lignificată, de 10–13 cm, decumbent ascendentă, emițând dela bază numeroase ramuri subțiri. Frunze crasiuscule, îngust eliptice până la ovat lanceolate, acuminate, până la 3 cm lungime și 1 cm lățime. Bractei cu margini membranaceu scarioase. Inflorescență redusă la 1–3 flori. Petale de obicei neligulate sau cu ligulă redusă. Capsulă subglobuloasă, pe carpofoar scurt. Seminte fin tuberculate, nețepoase. VII–VIII.

Stațiunea. Pe stânci și locuri uscate din zona subalpină, deseori împreună cu *B. vulgaris* ssp. *vesicarius*. Coboară pe grohotișuri până la câmpie.

Răsp. în țară: *Reg. Cluj*: Dej; Turda, Runc. *Reg. Stalin*: Mții Bucegi (V. Mălăești); Rășinari (r. Sibiu). *Reg. Timișoara*: Moldova Nouă; Băile Herculane pe Mt. Domogled. *Reg. Craiova*: Vârciorova. *Reg. Pitești*: Masivul Leaota (Mt. Roșu). *Reg. Ploești*: Mții Bucegi (V. Mălinului, Obârșie).

Variabilitatea speciei

Behen alpinus este foarte variabil și tratat de mulți autori ca o subspecie sau o varietate a speciei *Behen vulgaris*. Formele tipice sunt rare. Majoritatea constă din forme atipice și asemănătoare și cu *B. alpinus* și cu *B. vulgaris* ssp. *vesicarius*. O formă mai deosebită este:

var. **glareosus** (Jord.) — *Silene glareosa* Jord. Pugill. (1852). 31. — *Behen glareosus* Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon Nouv. Sér. (1868) 343. — *Silene vulgaris* Garcke ssp. *alpina* A. et G. var. *angustissima* (Nocca et Balb.) A. et G. Syn. V. 2 (1920) 80. — Tulpină foarte ramificată dela bază, înaltă de 10–30 cm. Frunze mai scurte, ascuțite și mai îngust lanceolate decât la tip. — *Reg. Cluj*: Poșaga de Sus pe stânci calcaroase (r. Turda). *Reg. Timișoara*: Băile Herculane pe Mt. Domogled, Pecenișca pe grohotișuri calcare (r. Mehadia).

Întrebuințări. Ca și la *B. vulgaris*.

Răsp. gen.: Europa de S și SV.

Genul 92. **POLYSCHÉMONE***) Schott, Nym. et Kotschy¹⁾

Analecta bot. (1854) 55. — *Lychnis* Kit. in Schult. Oesterr. Fl. I (1814) 698. — *Agrostemma* G. Don Syst. I (1831) 416. — *Viscaria* Gris. et Schenk Iter hung. in Wieg. XVIII. I (1852) 299. — *Silene* Rohrb. Monogr. Sil. (1868) 70, 142; *Silene* Sect. I *Pleiogyne* Subsect. III *Polyschemone* Pax et Hoffm. in Engl. et Prantl. Nat. Pflzfam. III. 2 (1934) 346. — *Melandryum* Sect. a. *Polyschemone* Nym. Consp. (1879) 86.

Plantă alpină, 1—3-floră, cu frunzele bazale așezate în rozetă. Flori terminale mai lung pedunculate decât cele laterale. Caliciul umflat, cu 5—9 (rar 10) dinți ovat rotunjiți și ciliați. Petale ligulate, cu același număr de piese ca și caliciul, de culoare roză sau albă. Stamina 10—18, rar 20. Gineceu 5—7-mer cu 5—7 loje la bază. Capsulă pe un carpor scurt stipitat, se deschide cu valve bidentate, câteodată fără despărțituri. O singură specie, endemică, în Mții Rodnei.

O b s. Din numărul mare de sinonime rezultă că și astăzi sunt nedumeriri asupra poziției plantei în sistemul Silenoideelor.

Schott o consideră ca intermediară între *Viscaria* și *Melandryum* din cauza capsulei 5-loculare și totodată deseori 10-dințată. Rohrbach și Pax sunt de părere că planta trebuie să fie așezată la *Silene* din cauza valvelor bidentate ale capsulei. După cercetările noastre, *Viscaria vulgaris* își despică valvele după maturitate. Prin aceasta cade ultima piedică pentru a atribui planta genului *Viscaria*. Totuși, din cauza polimorfismului ca și a polimeriei părților florale, este pe deplin justificată tratarea ei ca gen aparte.

Polyschemone este un tip vechi, izolat, interpretat ca relict glaciatic.

P. nivalis Schott, Nym. et Kotschy Anal. bot. (1854) 55. — *Lychnis nivalis* Kit. in Schult. Oesterr. Fl. I, ed. II (1814) 698. — *Silene Siegeri* Baumg. Enum. stirp. Transs. I (1816) 400. — *Agrostemma nivalis* G. Don Syst. I (1831) 416. — *Lychnis Siegeriana* Schur in Verh. SVN I (185) 103. — *Viscaria Siegeri* Gris. et Schenk Iter hung. in Wieg. Arch. XVIII. I (1852) 299. — *Melandryum nivale* Nym. Syll. (1854) 230. — *Silene nivalis* (Kit.) Rohrb. Monogr. Sil. (1868) 142. — *Viscaria nivalis* Simk. Enum. Fl. Transs. (1886) 131. — **Exs.:** FEAH nr. 521, 2510 sub *Lychnide*; HN nr. 3025; FHE nr. 837 I, II sub *Silene*; FRE nr. 2751 sub *Silene*. — **Ic.:** Pl. 25, fig. 4.; Pax Grundzüge I (1898) 168, fig. 7 sub *Silene*; Hay. Pflanzend. I (1916) 418 sub *Silene*.

4. Plantă înaltă de 5—10 cm, glabră, neramificată, tulpina ieșind lateral din rozeta frunzelor. Frunze oblong lanceolate. Flori mari, poligame. Caliciul membranos, umflat, neted. Petale în același număr ca și piesele caliciului. Stamina 10—18, rar 20. Gineceu polimer. VII—VIII.

*) Dela polys = mult, numeros și schema = formație, referitor la numărul foarte variabil al părților florale.

¹⁾ Prelucrat de M. Gușuleac.

Stațiunea. În zona jneapănului și deasupra acesteia, pe locuri pietroase, înierbate, umede, între 1820—2200 m.

Răsp. în țară: Mții Rodnei: Pietrosul Mare (Iezerul Pietrosului, în căldarea V. Repedea sub Curmătură, între Vf. Pietrosul și Vf. Rebrii). Vf. Obârșia Rebrii, la SE de Vf. Puzdrelor, Vf. Galați, Vf. Gărgălău, Vf. Omului, Cișa, Inău.

Variabilitatea speciei

f. quadrifolia Zap. Consp. Fl. Galic. crit. III (1911) 177. — Cu statură mai mare, de 10—23 cm înălțime, la vârf dichazială. Petale mai mari, palid purpurii. — *Mții Rodnei*: Pietrosul Mare la E de Iezer.

f. diminuta Zap. l.c. 178. — Plantă mică, înaltă de 7 cm, unicaulă, unifloră. Caliciul de 11 mm lungime. Petale lungi de 12 mm; lamina lungă de 7 mm; coronula foarte mică, laciunile de 0,5 mm lungime. — Pietrosul Mare sub vârf.

m. pléna (Zap.) A. et G. Syn. V. 2 (1920) 140. — *S. nivalis* (Kt.) Rohrb. f. *plena* Zap. l.c. 177. — Plantă bicaulă cu tulpina unifloră și florile pline. — Pietrosul Mare sub vârf.

f. versicolor (Schur). — *P. nivalis* Schott var. *floribus albis, roseis, lilaceis, purpureis* Schur Enum. pl. Transs. (1866) 107. — Plantă cu flori albe, sau liliachii. — *Mții Rodnei*: Inău.

f. laciniata (Schur). — *P. nivalis* Schott var. *laciniata* Schur l.c. — Plantă cu petale laciniate. — *Mții Rodnei*: Inău.

f. multiplicata (Schur). — *P. nivalis* Schott var. *multiplicata* Schur l.c. — Plantă cu un număr mai mare de petale. — *Mții Rodnei*: Inău.

Întrebuințări. Plantă potrivită pentru culturi în «alpinete».

Răsp. gen.: Endemică pentru Mții Rodnei.

Genul 93. *SILÉNE* *) L. 1)

Gen. pl. [ed. I (1737) 132, nr. 372], ed. V (1754) 193, nr. 503, Rohrb. Monogr. *Silene* (1868) 65, excl. subgen. *Behen* et spec. pentagyn., Pax et Hoffm. in Engl. et Prantl. Nat. Pflzfam. ed. II, XVIc (1934) 343, excl. Sugben *Behen*, *Silene* Sect. *Pleioogyne*. — *Milițea*.

Plante perene, cu tulpină glabră sau scurt păroasă, inelat vâscoasă, peste tot foliată sau frunzele normale așezate la bază în rozetă. Flori în dichazii terminale sau și laterale, progresive sau reduse la 3—1 flori, sau în monochazii (cincine). Caliciu campanulat, tubulos, conic sau obconic, strâns atașat gineceului neumflat, cu baza de obicei umbilicată, cu 10—30 nervuri libere sau nearticulat împreunate. Petale cu preflorație contortă, cu lamină emarginată sau bifidă, mai rar întreagă, cu sau fără ligulă la baza ei. Stamina 10. Gineceu

*) Nume de plantă la Lobelius (Matthias de l'Obel, 1538—1616).

1) Prelucrat de M. Gușulea c.

Planșa 18. — 1. *Silene conica* L., 1a. caliciu mărit. — 2. *S. conica* L. ssp. *subconica* (Friv.) Gușul., un caliciu mărit. — 3. *S. Otites* (L.) Wib. cu flori și fructe. — 4. *S. Otites* (L.) Wib. var. *pseudotites* (Borb.) Gușul., o parte din inflorescență.




tricarpetar, la bază trilocular, în partea superioară unilocular. Capsula se deschise cu 6 dinți. Semințe reniforme, turtite lateral, cu suprafață granulată sau striată. Embriion aproape liniar, înconjurat de endosperm.

Determinarea speciilor

- 1 a Flori dispuse în *dichaziu terminal*, compus din 3 flori, sau repetat cimos ramificat și multiflor, cu dichaziul transformat în monochaziu («cincine»), cu aspect de «spice» sau «raceme» de flori fără bractei, sau toată inflorescența redusă la 1—2 flori 2
- 1 b În afară de dichaziul terminal cu ritm cimos, în ambele subțiori (except. *S. supina* și *S. pontica*) ale uneia sau ale mai multor perechi de frunze tulpinale opuse, se dezvoltă regulat *dichazii laterale*, constituindu-se astfel o inflorescență combinată de ritm cimos și simultan de ritm racemos, egal cu un racem de dichazii; ramurile dichaziale laterale, la rândul lor pot constitui progresiv raceme noi, secundare sau în mod regresiv se pot reduce la câte o floare cu 2 bractei. (Sect. *Botrysosilene*) 15
- 2 a Caliciu cu 30 nervuri. Inflorescența în *dichazii* asimetrice, cu puține flori, deseori reduse la o singură floare (Sect. *Conosilene*) . . . 3
- 2 b Caliciu cu 10 nervuri 4
- 3 a Gineceu (și fruct) fără carpor 1. *S. conica* ssp. *euconica*
- 3 b Gineceu (și fruct) cu un carpor scurt . . . 1. *S. conica* ssp. *subconica*
- 4 a Flori pedicelate sau sesile, dispuse în cincine rărite, câteodată la bază simplă până la dublu dichaziale, însă terminându-se cu ramuri cincine. Caliciu contractat la vârf. (Sect. *Cincinnosilene*) 5
- 4 b Flori de regulă pedicelate, dispuse în *dichazii* cu ramuri multiflore simetrice, rar asimetrice sau inflorescențe reduse la 3—2—1 (Sect. *Dichasiosilene*) 8
- 5 a Flori ginodioice, aproape sesile, dispuse în cincine geminate
10. *S. dichotoma*
- 5 b Flori în cincine simple 6
- 6 a Sămânță concav excavată pe ambele laturi 12. *S. gallica*
- 6 b Sămânță plană pe ambele laturi 7
- 7 a Caliciu pe nervuri cu peri la bază noduloși, în stadiul de fructificare contractat la vârf. Frunze trinerve în tot lungul lor. Carpor ± egal de lung cu fructul 11. *S. trinervia*
- 7 b Perii caliciului la bază nu sunt noduloși. Caliciu contractat la vârf
— *S. pendula*
- 8 a Inflorescențe *dichazii* tipice, compuse, multiflore. Plante perene sau anuale 9
- 8 b Inflorescențe reduse la 3—2 sau la o singură floare 12
- 9 a Inflorescențe răsfirate. Plante perene 10
- 9 b Inflorescențe ± dens contractate. Plante anuale 11

- 10 a Pe lângă dichaziul terminal, multiplu, cel mult încă 1—2 dichazii în subțioara frunzelor. Plante de stânci, cu frunze mici, eliptic lanceolate, cu portul de *Heliosperma* 2. *S. rupestris*
- 10 b În afară de dichaziul terminal repetat, mai multe dichazii laterale sunt așezate în subțioara frunzelor. Frunze mici, ovate sau eliptice. (Există și forme pauciflore, Pl. 19, fig. 4). 5. *S. Lerchenfeldiana*
- 11 a Flori foarte scurt pedicelate. Caliciu membranos, glabru, cu dinți rotunjit ovați, sau ovat obtuși. Petale de regulă emarginate 8. *S. Armeria*
- 11 b Flori dispuse în dichazii contractate, aproape în inflorescență capituliformă, la bază învelite de frunze supreme. Petale întregi 9. *S. compacta*
- 12 a Plante cu tulpini scurte, lignificate, emițând tulpini filicaule, foarte ramificate, înalte de 10—40 cm 13
- 12 b Plante scunde, până la 10 cm înălțime, cu frunze și tulpini dese, formând pernițe 14
- 13 a Plante cu 2 feluri de frunze; cele dela bază formând o rozetă care emite mai multe tulpini filiforme, cu mai multe perechi de bractee, dintre care numai cea terminală poartă un dichaziu redus la 2—1 flori, cu petale gălbui 4. *S. flavescens*
- 13 b Plante cu tulpini subțiri, alungite, ramificate, de 10—30 cm înălțime. Toate frunzele îngust liniare. Inflorescență terminală cu 3—2—1 flori și dichazii laterale uniflore. Petale alburii, pe partea de jos verzi 3. *S. Saxifraga*
- 14 a Pernițele de frunze rărite; tulpini florifere ridicate peste pernițe cu 2—4 perechi de frunze și cu 2—4 flori. Caliciu de 12—15 mm lungime 6. *S. dinarica*
- 14 b Tulpini florifere scunde, numai puțin ridicate din pernițele dense, uniflore, peste pernițe având cel mult o pereche de frunze. Caliciu de 4—10 mm lungime 7. *S. acanlis*
- 15 a Flori mari, ♀, cu petale bifide și caliciu peste 8 mm lungime . . . 16
- 15 b Flori mici, dioice, cu petale întregi, sau slab emarginate și caliciu până la 6 mm lungime, complet glabru 25

Planșa. 18 a. — Tipuri de inflorescență la *Silene*. — 1, 2. Dichaziu normal simetric: 1. dich. mic. — 2. dich. mare, dezvoltat. — 3, 4. Dichaziu redus. — 5, 6. Dichazii asimetrice. — 7. Dichaziu transformat în monochaziu (cincin). — 8-11. Dichazii combinate cu racemul (« cimobotriu »): 8. Dichazii laterale sesile. — 9. Dichazii laterale pedunculate. — 10. Dichaziul terminal și cele laterale reduse la câte o floare cu bractee. — 11. Racem de dichazii de diferite forme: a. dichaziu terminal, b. dichaziu lateral mic, c. dichaziu lateral mare, d. și e. dichazii dispuse în raceme de gradul II și III. — Cifrele romane indică gradele (ordinea) de ramificație. II+, III+ . . . ramuri dichaziale sporite. II—, III— . . . ramuri dichaziale reduse. — (Orig. Gușul.)



- 16 a Caliciu pubescent sau glabrescent, de consistență membranoasă, cu peri și cu sau fără glande 17
- 16 b Caliciu \pm pielos (coriaceu), complet glabru 24
- 17 a Plante de locuri nisipoase sau stâncoase, multicaule, la bază foarte ramificate, întortochiate, \pm cespitoase. Dichaziile laterale de obicei numai în subțioara uneia din cele 2 frunze opuse ale tulpinii, sau dacă nu sunt opuse, atunci sunt neegale. Caliciul cu peri scurți, rigizi .. 18
- 17 b Plante cu dichazii laterale dezvoltate egal în subțioara ambelor frunze tulpinale opuse 19
- 18 a Plante de locuri uscate, stâncoase, Frunze mici, toate liniare, de culoare cenușie și pubescente. Inflorescență bogat ramificată
17. *S. supina*
- 18 b Plante de nisipuri litorale. Frunze mici, cele tinere obovate, cele vechi liniare și rigid păroase. Inflorescență slab ramificată
16. *S. pontica*
- 19 a Toate dichaziile (laterale) sesile sau foarte scurt pedunculate (mai ales cel mai de jos). Pedicelii cu bractei la bază. Flori mari. Carpofor de lungimea capsulei sau mai lung 15. *S. multiflora*
- 19 b Toate dichaziile \pm lung pedunculate; bracteele fixate mai sus, aproape de floare 20
- 20 a Carpofor de lungimea capsulei 21
- 20 b Carpofor mai scurt (1/3) decât capsula 22
- 21 a Frunze inferioare de obicei lat ovat spatulate. Inflorescență bogată în dichazii. Caliciu dispers păros sau glabru, fără glande sau cu glande foarte rare 18. *S. italica* var. *nemoralis*
- 21 b Frunze bazale de obicei lanceolat spatulate. Ramurile purtătoare de dichazii laterale mai sărace în flori. Caliciu cu peri numeroși, glanduloși; glande sesile sau scurt stipitate, la maturitate rărite
18. *S. italica*
- 22 a Dichazii rărite. Caliciu lent îngustat la bază, de regulă foarte lung pedunculat. Flori de regulă câte 3, uneori 1—2. . . 19. *S. viridiflora*
- 22 b Caliciul umbilicat (excavat la locul de inserțiune pe pedicel) . . . 23
- 23 a Tulpina mai ales la bază cu peri mici \pm patenți, crispuți . . 20. *S. nutans*
- 23 b Tulpina la bază și mai sus, foarte fin adpres și recurbat pubescentă
21. *S. dubia*
- 24 a Caliciu de 8—10 mm 14. *S. chlorantha*
- 24 b Caliciu foarte lung, de 20—25 (—30) mm 13. *S. longiflora*

- 25 a Indumentul din partea de jos a plantei compus din peri foarte scurți (1/10 mm), pubescenti; partea de sus cu același fel de peri foarte scurți sau glabră 26
- 25 b Perii din partea de jos a plantei patent, de 1/2 — 1 mm lungime
22. *S. Otites* ssp. *densiflora*
- 26 a Partea de sus a axei complect glabră . . . 22. *S. Otites* ssp. *euotites*
- 26 b Partea de sus a axei inflorescenței cu pedunculii dichaziilor, pedice-
lii florilor și caliciul cu peri mici, aspri . . 22. *S. Otites* ssp. *parviflora*

Secția I. CONOSILENE Rohrb. Monogr. Sil. (1868) 67, 89.

Caliciu fructifer conic, cu baza lătită, spre vârf îngustată, strâns lipit de fruct, la speciile noastre cu 30 nervuri paralele. Florile în dichaziu simplu, asimetric, mai rar solitare.

1. *S. conica* L. Sp. pl. ed. I (1753) 418, ampl. Gușul.; Schischk. in Fl. U.R.S.S. VI (1936) 690, tab. XXXV, fig. 1. — **Exs.:** FRE Nr. 1687, a, b. — **Ic.:** Pl. 18, fig. 1, 1 a.; Prod. Conspect. Fl. Dobr. (1935) Sep. pag. 82, Pl. XVI, fig. V, 1, 2.

○. Tulpină erectă, simplă, scurt pubescentă. Caliciu lung de 15—18 mm, membranat, umbilicat, cu 30 nervuri, cu dinți lungi, ascuțiți. Petale deschise purpurii, emarginat bilobate, cu ligule crenate (coronulă) la baza laminei. Stamine păroase. Capsulă sesilă. Sămânță mică, pruinooasă, pe partea dorsală brăzdată. VI—VIII.

Stațiunea. Pe marginea drumurilor, pe maluri și ogoare nisipoase sau calcaroase.

Răsp. în țară: În regiunile de Sud ale țării.

Variabilitatea speciei

ssp. *eucónica* Gușul. ssp. nova in Add. pag. 664. — *S. conica* L. l.c. 418. — *S. conoidea* Huds. Fl. angl. ed. II (1778) 183, non L.

Caliciul acoperit cu peri scurți, recurbați, câteodată amestecați cu peri glanduloși, mai ales pe nervuri. Capsulă sesilă.

Reg. Cluj: Sărățel (r. Bistrița); Rimetea (r. Turda). *Reg. Aut. M.:* Reghin. *Reg. Stalin:* Rupea; Merghindeal (r. Agnita). *Reg. Hunedoara:* Deva, Șoimuș, Mintia, Dobra, Zam (r. Deva). *Reg. Timișoara:* citat de Heuffel din Banat. *Reg. Craiova:* Schela Cladovei (r. Tr. Severin); Bistrețu la Grindul Babei Oprea (r. Băilești); Segarcea; Popoveni, Obedinu (r. Craiova). *Reg. Pitești:* Mt. Cozia (la Trepte). *Reg. Constanța:* Murfatlar (V. Serpla Cula), Agigea (r. Constanța). *Reg. Galați:* Letea, Caraorman (r. Tulcea).

ssp. *subcónica* (Friv.). — *S. subconica* Friv. in Flora XVIII, I (1835). 334. — *S. cylindriflora* Gris. Spicil. Fl. rumel. I (1843) 171, non Otth. —

Ic.: Pl. 18, fig. 2; Prod. Consp. Fl. Dobr. (1935) Sep. pag. 79, Pl. XVI, fig. VI, 1,2.

Caliciu lung de 14—24 mm, glandulos pubescent, cu dinți lanceolați, acuminați, cu margine lată, hialină și lung ciliată, ocupând aproape jumătate din suprafața dintelui. Petale mari, palid purpurii, \pm emarginate, mai lungi decât caliciul. Capsulă \pm stipitată, cu semințe \pm netede.

Reg. Galați: Măcin (Dl. Pricopanului), Greci. *Reg. Constanța:* Cobadin, Murfatlar (V. Serpla Cula).

O b s. După examinarea exemplarelor din Balcani și Asia Mică s'a constatat că toate caracterele, ca: prezența carpoforului, a glandelor caliciului și mărimea corolei, sunt variabile.

Răsp. gen.: Europa, Transcauzia, Asia Mică, Siberia, Africa boreală.

Secția II. DICHASIOSILENE Rohrb. Monogr. Sil. (1868). 69, 124.

Caliciu cu 10 nervuri, cu sau fără anastomoze. Inflorescența un dichaziu tipic, repetat și progresat multiflor, cu ramuri simetrice sau inegal dezvoltate, a doua ramură fiind deseori redusă la o singură floare. Când internodiile sunt scurte, dichaziul formează un capitul. La multe specii perene dichaziul este redus la 3—1 flori.

2. S. rupēstris L. Sp. pl. ed. I (1753) 421; Schischk. in Fl. U.R.S.S. VI (1936) 630. — **Exs.:** FRE nr. 2752. — **Ic.:** Pl. 20, fig. 6.

4. Tulpină ramificată dela bază, glabră. Frunze lanceolate, ascuțite, cele inferioare atenuate spre bază. Flori lung pedicelate. Caliciu obconic, umbilicat, glabru, fără anastomoze între nervuri, cu dinți obtuși. Petale albe sau rozee, obovate, profund emarginate, ligulate. Capsulă ovoid-oblongă cu carpofor scurt (1/5 din capsulă). Semințe dorsal plane, lateral puțin concave. VIII—IX.

Stațiunea. Pe stânci, grohotișuri, locuri uscate, în zona subalpină.

Răsp. în țară: *Reg. Baia Mare:* Băile Borșa pe Pâr. Cîsla pe stânci de andezit, la «Stâna lui Vartic» (1680—1880 m).

Variabilitatea speciei

f. măjor (Gaud.). — *S. rupestris* β . *major* Gaud. Fl. Helv. III (1828) 167. — Până la 25 cm. înălțime.

f. pumila (Gaud.). — *S. rupestris* γ . *pumila* Gaud. l. c. — Tulpină mică, unifloră.

f. micrāntha Rehb. Ic. Fl. germ. VI (1844) 52, tab. 288, fig. 5091 sin. — Caliciu numai de 3 mm lungime.

Intrebuintări. Ca plantă decorativă pe stâncării, (alpinete).

Răsp. gen.: Europa de N și V, Siberia. În Carpați, numai în Mții Rodnei.

3. S. Saxifraga L. Sp. pl. ed. I (1753) 421. — *Petrosilene saxifragum* Four. in Ann. Soc. Linn. Lyon XVI (1868) 344. — **Exs.:** FRE nr. 42 sub

S. petraea, FHE nr. 158 sub *S. petraea*. — **Ic.:** W. et K. Pl. rar. Hung. II (1805) tab. 163.

4. Tulpini subțiri, alungite, de 10—30 cm înălțime, ramificate, subfrutescent cespitoase, glabre, în partea de sus subviscide. Frunze liniar lanceolate sau liniare, \pm serulat ciliate. Flori terminale, solitare sau câte 2, lung pedicelate. Caliciu alb membranos, lung de 5—10 mm, umbilicat, cu dinți ovați, lat alb marginati, ciliați. Petale alburii, pe partea de jos verzi, bifide sau bipartite, cu ligule obtuze. Capsulă ovoid oblongă, total închisă în caliciu sau pe jumătate ieșită afară. Carpofoar \pm de lungimea capsulei. VI—VII.

Stațiunea. Pe stânci abrupte, locuri pietroase, pe grohotișuri, de obicei în regiunea montană și subalpină.

Răsp. în țară: *Reg. Hunedoara:* Mții Parângului (Baumg.); Mții Retezatului (Schur). *Reg. Timișoara:* Mehadia, Plugova, Băile Herculane pe Mt. Domogled, Pecenișca (la Prolaz). *Reg. Pitești:* Mrea Bistrița (r. Horezu); Mrea Cozia pe stâncile dela Bivolari și la Masa lui Traian, Mrea Turnu (r. Brezoiu).

Obs. *S. Saxifraga* s.l. constituie un ciclu de forme, remarcabil prin variabilitatea lui mai ales în țările balcanice, de unde unele își întind aria lor până în Carpații meridionali. În special dimensiunile caliciului, ale capsulei, ale carpofoarului, precum și raportul lor reciproc, variază atât de mult, încât numai cu greu se pot distinge forme mai stabile. Cu toate cercetările lui Beck, Hayek, Janchen și Handel-Mazzetti nu s'a ajuns, la rezultate definitive. Toate caracterele menționate variază și numai pentru o orientare sumară s'ar putea așeza « speciile » descrise de monografistul Rohrbach într'o serie aproximativă, după lungimea caliciului: *S. Regis Ferdinandi* 30 mm, *S. clavata* Hampe (*S. Waldsteinii* Gris.) 20—25 mm, *S. multicaulis* Guss. (*S. dalmatica* Schöele, *S. Kitaibelii* Vis.) 14—18 mm, resp. 11—14 mm, *S. fruticulosa* Wib. 8—11 mm și *S. petraea* W. et K. 7—8 mm. Din aceste serii se desfac forme cu capsule ieșite din caliciu: *S. parnassica* Boiss. et Sprun. și *S. Hayekiana* Hand. - Mazz. et Janch. care nu cresc la noi.

Variabilitatea speciei

ssp. *eusaxifraga* Hay. Prodr. Fl. balc. I (1927) 229, p.p.

Frunze liniar lanceolate, late de 1—2 mm. Caliciu de 8—10 mm lungime. Capsulă de cca 6 mm lungime, rămânând închisă în caliciu. — Nu s'a găsit în forma tipică ci numai în forme apropiate, pe Mt. Cozia.

ssp. *petraea* (W. et K.) — *S. petraea* W. et K. Pl. rar. Hung. II (1805) 178, tab. 164, non Adans. — **Ic.:** Pl. 19, fig. 5; W et K. Pl. rar. Hung. II (1805) tab. 164.

Planșa 19. — 1. *Silene longiflora* Ehrh. — 2. *S. Armeria* L. — 3.] *S. Lerchenfeldiana* Baumg. — 4. *S. Lerchenf.* var. *lotriensis* Grec. — 5. *S. Saxifraga* L. ssp. *petraea* (W. et K.) Gussul.



Frunze liniare, până la 30 mm lungime și 0,5—0,8 mm lățime. Caliciu lung de 5—7 mm. Capsula rămâne \pm închisă în caliciu. — Foarte caracteristică prin portul său, cu tulpini și frunze foarte subțiri.

Reg. Timișoara: Mt. Domogled. *Reg. Pitești*: Mt. Cozia.

f. intricata Guşul. f. nova in Add. pag. 665. — Plantă cu peste 100 tulpini erecte, foarte subțiri, ramificate dela bază, foarte des întrețesute. — *Reg. Timișoara*: Băile Herculane. — Se mai cunoaște dela Mostar (Herțegovina) și dela Băile Bormio (Italia).

f. macrocarpa Guşul. f. nova in Add. pag. 665 — Capsula iese din caliciu la maturitate. — *Reg. Timișoara*: Plugova (r. Mehadia).

Întrebuințări. Recomandabilă ca plantă decorativă. Formează tapete îndesuite pe stâncării și pe pământ uscat, înmulțindu-se în fiecare an din ce în ce mai mult.

Răsp. gen.: Carpații meridionali, Peninsula Balcanică, Italia, Sicilia, Creta, Anatolia.

4. *S. flavescens* W. et K. Pl. rar. Hung. II (1805) 131, tab. 175. — Ic.: Pl. 20 fig. 5; W. et K. Pl. rar. Hung. II (1805) tab. 175.

4. Tulpină de 15—20 (—45) cm, la bază \pm lignificată, foarte dens ramificată, fin pubescentă. Frunze inferioare lanceolat spatulate, lung atenuate în pețiol, formează rozete, cele superioare liniare. Flori în dichaziu asimetric, terminal, redus deseori la 1—2 flori. În afară de dichaziul sau floarea terminală se află și dichazii laterale foarte reduse, în formă de ramuri de îmbogățire, reduse și ele la rândul lor la o singură floare. Caliciu oblong, pubescent, la bază umbilicat, alb striat, cu dinți lanceolați, ascuțiți, alb marginati, ciliați. Petale gălbui, bifide, cu lobi liniari, cu 2 ligule mici, obtuze. Carpofor scurt. Seminte dorsal canaliculate, striate pe fața plană. VI—VII.

Stațiunea. Pe stânci, în pajiști stâncoase, prin grohotișuri, în regiunea montană și subalpină.

Răsp. în țară: *Reg. Hunedoara*: Zam (r. Deva) *Reg. Timișoara*: Băile Herculane (Mt. Domogled, Peștera Hoților). *Reg. Pitești*: Mrea Polovragi pe V. Oltețului, Mrea Bistriței pe V. Bistriței (r. Horezu); Govora; V. Oltului la Mrea Cozia și Masa lui Traian (r. Brezoiu).

Variabilitatea speciei

Planta variază după stațiune, ajungând dela forme scunde la tulpini foarte ramificate și erecte, 4—uniflore. Deasemenea variază frunzele dela bază, care la formele de pe locuri uscate, expuse soarelui, sunt liniar spatulate iar la exemplare mai adăpostite, obovat lanceolate.

Întrebuințări. Ca plantă de ornament pe stâncării.

Răsp. gen.: R. P. Română, Balcani și Insulele învecinate.

5. *S. Lerchenfeldiana* Baumg. Enum. stirp. Transs. I (1816) 398. — *S. macedonica* Formanek in Verh. NV Brünn XXXII (1893) 183. — Exs.:

FRE nr. 2205. — **Ic.**: Pl. 19, fig. 3; Pax Grundzüge II (1898) 243, fig. 25 B; Hayek Pflanzendecke I (1916) 443.

4. Tulpini florifere ieșind lateral din rozeta terminală, glabre, debile, înalte de 10—20 cm. Frunze glaucescente, lanceolate, acute, atenuate spre bază, cele inferioare dispuse în rozetă. Inflorescența un dichaziu repetat. Caliciu glabru, cu nervuri anastomozate, la vârf cu dinți ovat obtuși. Petale rozee, biligulate. Capsulă ovat globoasă. Semințe dorsal obtuz canaliculate, lateral concave. VII—VIII.

Stațiunea. Pe stânci silicioase și grohotișuri, în regiunea alpină.

Răsp. în țară: *Mții Făgărașului*: Colții Brezii, Viștea Mare, Arpașul, Berevoescu, Bârcaciul. *Mt. Cozia*. *Mții Lotrului*: la Voineasa. *Mții Parângului*. *Mții Vâlcanului*: V. Jiu-lui la Lainici către Vama Păiușu pe Ciocane. *Mții Retezatului*: Lacul Zănoaga, Piciorul Colțului. *Mții Mehedinților*: Mt. Bulzu pe Culmea Scăriții și pe stâncile de pegmatită numite «Biserici». *Mții Țarcu-Godeanu*: Mt. Țarcu, Mt. Baicu.

Variabilitatea speciei

var. *lotriensis* (Grec.) Borza Consp. Fl. Rom. I (1947) 80. — *S. lotriensis* Grec. Supl. Consp. Fl. Rom. (1909) 197, tab. 1. — **Ic.**: Pl. 19, fig. 4 et Grec. l.c. — Frunze glauce, mai late, spatulat obovate, eliptice și ovate. Dichazii laterale conforme cu cel terminal. Lamină rozee. — *Reg. Pitești*: Voineasa pe Pâr. *Jidoaia* din V. Lotrului (r. Brezoiu).

Răsp. gen.: R. P. Română, Balcani.

6. *S. dinárica* Spreng. Syst. II (1825) 405. — *S. depressa* Baumg. Enum. stirp. Transs. III (1816) 826, non M.B. — *S. Baumgarteni* Schott et Kotschy Pl. Transs. Herb. (1850) nr. 459. — *Saponaria Baumgarteni* Jka. in Linn. XXX (1851) 559. — **Exs.**: FRE nr. 1685. — **Ic.**: Pl. 20, fig. 4; Pax Grundzüge II (1908) 243, fig. 25A; Hay. Pflzdecke. (1916) 438.

4. Plantă cespitoasă, formând pernetari. Tulpini înalte, de obicei de 5—8 cm, subțiri, erecte, de regulă cu 2—4 perechi de frunze liniare. Flori de obicei solitare sau formând o inflorescență laxă, 2—4-floră. Caliciu oblong campanulat, de 12—15 mm lungime, umbilicat, cu nervuri reticulat anastomozate, cu dinți ovat obtuși. Petale rozee, ligulate, bilobate. Capsulă ovată, de 2 ori mai lungă decât carpoforul vilos. Semințe mari, pe spate slab convexe, pe laturi plane, granulate. VII—VIII.

Stațiunea. Pe brâne și stânci, pe grohotișuri calcaroase sau cristaline, numai în regiunea alpină a Carpaților de S.

Plansa 20. — 1. *Silene compacta* Fisch. — 2. *S. acaulis* L. var. *longiscapa* Kern. — 3. *S. acaulis* L. var. *norica* Vierh. — 4. *S. dinarica* Spreng. — 5. *S. flavesens* W. et. K. — 6. *S. rupestris* L.



Răsp. în țară: *Mții Făgărașului*: Colții Brezii, Arpașul Mic, Vânătoarea lui Buteanu, V. Bălii, Negoiu; Capra Budei (Piciorul Caprei, Fața Iezerului, Groapa Mieilor), sub Vf. Buteanu deasupra V. Capra, Mt. Paltina. *Mții Țarcu-Godeanu*: Mt. Scărișoara sub Godeanu și V. Pârâul Șes. Orașul Stalin (Baumg. sec. Rohrb. neconfirmat).

Variabilitatea speciei

f. *genúina* Gușul. f. nova in Add. pag. 665. — Tulpină mai scurtă, cu flori solitare. — Mt. Negoiu.

f. *elátior* Gușul. f. nova in Add. pag. 665. — Tulpini mai înalte, până la 10 cm, purtând 2—4 flori. — Mt. Arpașul

Intrebuințări. Ca plantă decorativă în grupe alpine.

Răsp. gen.: Endemică pentru Carpații sudici. Stațiunea din Mții Dinarici, menționată de Sprengel, nu s'a verificat.

7. *S. acaulis* L. Sp. pl. ed. II (1762) 603; Schischk. in Fl. U.R.S.S. VI (1936) 628. — *Cucubalus acaulis* L. Sp. pl. ed. I (1753) 415. — Iarbă roșioară. — Törpe habszegfü. — Stengelloses Leimkraut. — Смолевка бесстебельная. — Exs.: FRE nr. 235, a.b. — Ic.: Pl. 20, fig. 2. 3.

4. Tulpini numeroase, scurte, îndesuit foliate, formează pernțe scunde, compacte. Frunze aciculare, liniare, glabre, acuminate, uninerve. Flori sesile sau scurt pedicelate, solitare, terminale, trioice. Caliciul scurt măciucat, lung de 4—10 mm. Sepale deseori roșietice, cu dinți până la jumătatea caliciului. Lamina petalelor obovată, fără ligulă. Capsulă închisă în caliciu sau ieșind puțin afară din el. Sămânță reniformă, cu brazdă dorsală, cu laturi concave, granulate. VII—IX.

Stațiunea. Pe stânci, în pajiști pietroase din regiunea alpină (2000 — 2500 m), frecventă.

Răsp. în țară: Numai în regiunea alpină a Mților Rodnei și a Carpaților sudici, între 1900—2500 m. — *Mții Țibleșului*. *Mții Rodnei*: Gărgălău, Inău, *Mții Ciucașului*: Mt. Piroșca. *Mții Bârsei*: Piatra Mare, Piatra Craiului. *Mții Bucegi*: Piatra Arsă, Jepii Mari, Jepii Mici, Caraiman, Coștila, Babele, Vf. Omul, Doamnele, Bătrâna, Grohotișul, Guțanul. V. Gaurei, Mt. Gaura, Ciubotea, Clinea. V. Mălăești, Bușoiu, V. Cerbului. *Mții Iezer-Păpușa*: Mt. Păpușa. *Mții Făgărașului*: Arpașul Mare, V. Bălii, Negoiu, Bârcaciul. Surul. *Mții Pârângului*. *Mții Retezatului*: Vf. Custurii. *Mții Țarcu-Godeanu*: Mt. Godeanu.

Variabilitatea speciei

var. *nórica* Vierh. in Verh. ZBG Wien LI (1901) 560. — Ic.: Pl. 20, fig. 3. — Flori sesile sau scurt pedicelate. Caliciu rotunjit la bază, lung de 4—5 mm. Capsulă eliptică, de 4—7 mm lungime, numai puțin mai lungă decât caliciul. — Mții Rodnei: Vf. Inău pe gneis.

var. *longiscápa* A. Kern. ap. H.-Mazz. in ÖBZ LIII (1903) 361. — Ic.: Pl. 20, fig. 2. — Flori de obicei mai lung pedicelate. Caliciu rotunjit la bază, lung de 5—8 mm. Capsulă eliptică, lungă de 6—8 mm, mai lungă decât caliciul. — Mții Bucegi: V. Jepilor

var. *dianthifolia* Rehb. Fl. germ. exc. III (1832) 817, p.p., non Otth. — *S. pannonica* Vierh. in Verh. ZBG Wien LI (1901) 562. — Pernițe mai puțin dense; frunze ceva mai lungi. — Impreună cu var. precedentă.

Întrebuințări. Plantă decorativă pentru grupuri pe stâncării alpine.

Răsp. gen.: Arctic circumpolară. În Mții Europei, Siberiei și Americii de Nord.

8. *S. Armeria* L. Sp. pl. ed. I (1753) 420; Schischk. in Fl. U.R.S.S. VI (1936) 615. — Milițea roșie. — Szeplős hatszegfü. — Grosses Tausendguldenkraut. — Смолевка армериевидная. — Exs.: FRE nr. 237; HN nr. 4004. — Ic.: Pl. 19, fig. 2.

☉, ☼. Tulpină înaltă de 10–90 cm, glaucă, vâscoasă sub ultimul nod. Frunze inferioare spatulate, cele tulpinale ovate sau ovat lanceolate, sesile ± cordate sau semiamplexicaule. Inflorescență tipică ramificată în dichazii laxe sau îngrămadite. Florile foarte scurt pedicelate. Caliciu îngust claviform, lung de 12–15 mm, membranos, glabru, cu nervuri anastomozate, la bază umbilicat, cu dinți ovat-rotunziți sau ovat-obtuzi. Petale deschis purpurii sau rozee, cu lamină lungă de 4–6 mm, emarginată sau întreagă, cu ligule lanceolate. Capsulă oblongă, aproape până în vârf triloculară, de lungimea carpoforului sau puțin mai scurtă. Sămânță de 0,5 mm în diam., dorsal slab brăzdată, cu laturile plane granulate. VI–VIII.

Stațiunea. Prin locuri pustii, stâncoase, grohotișuri.

Răsp. în țară: *Reg. Cluj*: Rodna; Mții Călimani (Pâr. Voevodessii). *Reg. Aut. M.*: între Deda și Răstolița, între Toplița și Gara Galaș, Borsec (r. Toplița); Gara Lăzarea, Ditrău (r. Gheorghieni); Sovata; Odorhei, Merești pe V. Vârghișului la Peștera Mereștilor. (r. Odorhei); Băile Tușnad pe Dl. Ciomad (r. Miercurea Ciuc); Malnaș, Reci (r. Sf. Gheorghe). *Reg. Stalin*: Racoșul de Jos pe Dl. «Töpehegy» (r. Rupea); Orașul Stalin (pe Tâmpa și Stejăriș); Sibiu, Gușterița, Daia, Cașolț, Brad, Veștem, Tâlmăciu, Turnu Roșu, Sadu, Cisnădioara, Rășinari pe Dl. Dejani, Săcel (r. Sibiu); Sebeș, V. Secașului (r. Sebeș); Sighișoara; Mediaș. *Reg. Hunedoara*: Deva; Gântaga pe V. Streiului, Ohaba de sub Piatră (r. Hațeg). *Reg. Oradea*: Ciucea (r. Aleșd); Mții Bihorului (V. Drăganului sub Vlădeasa). *Reg. Timișoara*: Orșova, Băile Herculane pe Mt. Domogled, Svinița la Trescovăț, Globurău în V. Malinin (r. Mehadia); Baziaș (r. Moldova Nouă); Oravița, Ciclova. *Reg. Craiova*: Vârciorova; Craiova. *Reg. Pitești*: Călimănești, Mt. Cozia pe vers. V, Căineni, Brezoiu; Pitești. *Reg. Galați*: Măcin pe Dl. Suluc, Greci. *Reg. Bacău*: Piatra Neamț (pe Mt. Cozla și Mt. Pietricica); între Corbu și Tulgheș (r. Ceahlău). *Reg. Suceava*: Suceava; Botoșani.

Variabilitatea speciei

var. *lithuanica* (Zap.) A. et G. Syn. V. 2 (1921) 154. — *S. lituanica* Zap. Consp. Fl. Galic. crit. III (1911) 181. — Inflorescență ± fasciculată. Frunzele caulinare, la bază rotunjite sau amplexicaule. Petale întregi la vârf sau puțin emarginate. — *Reg. Timișoara*: Svinița pe Dl. Trescovăț, Toplet; Baziaș.

var. *sparsiflora* Schur Enum. pl. Transs. (1866) 105. — Inflorescență rărită, cu flori solitare sau mai multe la un loc, pedunculată. — *Reg. Bacău*: Piatra Neamț; Cheile Bicazului.

Intrebuintări. Se cultivă mult prin grădini, de unde se răspândește de multe ori în împrejurimi.

Răsp. gen.: Spontană în Europa de SV, U.R.S.S. centr. și de S. În Europa de N, subspontan.

9. *S. compacta* Fisch. Cat. Hort. Gorenki ed. II (1812) 60 n. nud. et in Hornem. Hort. Hafn. I (1815) 417; Schischk. in Fl. U.R.S.S. VI (1936) 615. — *S. Armeria* M. B. Fl. taur.-cauc. I (1808) 325, non L. — **Ic.:** Pl. 20, fig. 1.

☉, ☉. Tulpină erectă, înaltă de 20—40 cm. Frunze inferioare lanceolat spatulate, cele caulinare oblongi până la oblong lanceolate, obtuze. Inflorescență foarte îndesuit fasciculată, aproape în formă de capitul. Flori sesile, la bază învelite de frunzele supreme. Caliciul cilindric, claviform, umbilicat, cu dinți ovați, obtuziusculi, alb membranați. Petale rozee, cu margini întregi, la gât ligulate. Capsulă oblongă, de lungimea carpoforului sau puțin mai scurtă. Semințe foarte mici, pe partea dorsală brăzdate, lateral plane. VI—VIII.

Stațiunea. Prin tuferișurile munților stâncoși din Dobrogea.

Răsp. în țară: *Reg. Galați:* Măcin pe Dl. Suluc și Dl. Pricopanului; Mtele Consul lângă Com. Filimon Sârbu (r. Tulcea).

Variabilitatea speciei

f. elătior Gușul. f. nova in Add. pag. 665. — Tulpină înaltă de 30 — 50 cm. Frunze mari, cele tulpinale inferioare oblong spatulate, până la 11 cm lungime și 3,5 cm lățime. — *Reg. Galați:* Măcin pe Dl. Suluc (360 m).

f. humilis (Boiss.). — *S. compacta* β. *humilis* Boiss. Fl. or. I (1867) 582. — Tulpină scundă, înaltă de 5 — 10 cm. Frunze mici, îngust lanceolate. — *Reg. Galați:* Dl. Consul lângă Com. Filimon Sârbu (r. Tulcea).

Intrebuintări. Se cultivă prin grădini pentru florile sale frumoase.

Răsp. gen.: Penins. Balcanică de N, U.R.S.S. de S, Transcaucazia, Asia Mică, Siria.

Secția III. CINCINNOSILÉNE Rohrb. Monogr. Sil. (1868) 93.

Flori dispuse în monochazii (cincine) simple sau geminate, de obicei scurt pedicelate. Caliciu cu 10 nervuri.

10. ○ *S. dichótoma* Ehrh. Beitr. VII (1792) 144; Schishk. l.c. 610, tab. XXXVII, fig. 5. — *S. racemosa* Otth in DC. Prodr. I (1824) 384. — **Ic.:** Pl. 16, fig. 3; W. et. K. Pl. rar. Hung. Ic. I (1802) tab. 29.

○. Tulpină erectă, dichotomic ramificată, rar simplă, scurt crispul păroasă, înaltă de 20—80 (100) cm. Frunze păroase, cele inferioare spatulate, cele superioare lanceolate, ascuțite. Flori ginodioice, aproape sesile, în cincine

geminat. Caliciu contractat la vârf. Nervurile caliciului lung viloase, ciliate. Petale albe, cu ligulă bifidă și aperiici mici, obtuși. Semințe dorsal convexe, lateral plane și seriat tuberculate. V—VI.

Stațiunea. Prin fânețe, livezi, pe marginea drumurilor de țară, pe ogoare, la marginea pădurilor.

Răsp. în țară: E răspândită mai ales în partea de S și E a țării. *Reg. Cluj:* Aiud. *Reg. Stalin:* Mediaș. *Reg. Craiova:* Craiova; Malaica (r. Segarcea). *Reg. Pitești:* Govora; Stolnici (r. Costești). *Reg. București:* Alexandria; Giurgiu; Comana (r. Vidra); București (Băneasa, Chitila); Ciorogârla (r. Crevedia); Mrea Căldărușani (r. Căciulați); Cernica, Pasărea (r. Brănești). *Reg. Ploști:* Ploști; Buzău; Cotorca (r. Urziceni). *Reg. Constanța:* Cobadin, Coroana (r. Constanța); Independența (r. Băneasa). *Reg. Galați:* Somova (r. Tulcea). *Reg. Iași:* Miroslava, Aroneanu, Mârzești (r. Iași). *Reg. Suceava:* Bosancea (r. Suceava).

Variabilitatea speciei

var. eudichótoma Hay. Prodr. Fl. balc. I (1927) 261. — Ramurile cincinelor simple, multiflore. Caliciu glabrescent la maturitate, de lungimea capsulei. Cea mai răspândită varietate și cu forme asemănătoare cu var. următoare.

var. racemósa (Otth) Hay. l. c. 261. — *S. racemosa* Otth in DC. Prodr. I (1824) 384. — Cincine repetat dichotomice. Caliciu la maturitate cu peri lungi. — Capsulă mai scurtă decât caliciul. — *Reg. Constanța:* între Cobadin și Independența; Cernavoda pe malul Dunării.

Răsp. gen.: Italia, Peninsula Balcanică, U.R.S.S. centrală și de S, Asia Mică, uneori adventivă în Europa de N.

11. ***S. trinervia*** Seb. et Mauri Fl. roman. Prodr. (1818) 152. — *S. Gallinyi* Heuff. Enum. fl. Banat. in Verh. ZBG Wien VIII (1858) 70. — **Ic.:** Pl. 24, fig. 2.

○. Tulpină erectă, înaltă de 20—30 cm, pubescentă. Frunze inferioare lanceolate, cele superioare oblong liniare, acute, toate pubescente, la bază ciliate, cu una sau trei nervuri. Bractei liniare. Flori în monochazii (cincine simple). Caliciu îngust tubulos, umbilicat, pe nervuri cu peri roduloși la bază, la fructificație contractat la vârf. Petale rozee, bifide, cu lobi rotunzi, cu câte 2 aperiici (ligule) emargirați. Carpofoar ± de lungimea capsulei. Semințe reniforme, pe laturi și pe șate plane sau puțin excavate, foarte fin tuberculate. VI—VII.

Stațiunea. La marginea drumurilor, pe lângă garduri, pe sol nisipos.

Răsp. în țară: *Reg. Timișoara:* Ogradena (r. Mehadia). *Reg. Craiova:* Gura Văii spre T. Severin; Cârcea (r. Craiova); Balș.

Răsp. gen.: Italia, Peninsula Balcanică.

Planșa 21. — 1. *Silene viridiflora* L., 1a. floarea în mărime naturală (se observă unguiculele ieșite din caliciu). — 2. *S. supina* M. B. — 3. *S. pontica* Brandza.



12. ○ *S. gállica* L. Sp. pl. ed. I (1753) 417. — *S. anglica* L. l.c. 416, non Rechb. Ic. Fl. germ. — *S. quinquevulnera* L. l.c. 416. — *S. lusitanica* L. l.c. 416. — Exs.: FRE nr. 41 a, b. — Ic.: Pl. 16, fig. 2.

○. Tulpină erectă, înaltă de 15—50 cm, simplă sau ramificată dela bază, ± aspru păroasă sau pubescentă. Frunze scabru pubescente, la bază ± ciliate, oblong spatulate sau lanceolate, cele superioare mai înguste, aproape liniare, obtuziuscule și deseori apiculate. Bracteele lanceolat liniare, dens pubescente. Flori în cincine simple. Caliciu scurt pedicelat, tubulos, la fructificație ovoid, contractat la vârf, acoperit cu peri lungi, patenți sau alipiți. Petale variabile atât ca mărime, cât și ca culoare, obovate, întregi sau emarginat bifide, cu ligule bipartite. Capsulă conic ovoidă, cu carporor foarte scurt. Seminte reniforme, negre, pe partea dorsală plane, seriat tuberculate, lateral concave. VI—VII.

Stațiunea. Pe ogoare, între cereale, pe pietrișuri.

Răsp. în țară: Sporadică aproape în toată țara.

Variabilitatea speciei

var. *silvestris* (Schott) Aschers. Fl. Prov. Brand. I (1864) 88. — *Cucubalus sylvestris* α. Lam. Fl. fr. III, ed. I (1778) 28. — *Silene silvestris* Schott in Rechb. Fl. germ. exc. III (1832) 812, excl. var. β. — *S. gallica* Rechb. l. c. fig. 5054. — *S. anglica* Rechb. l. c. tab. 273, fig. 5056. — *S. Gallica* L. em. Godr. f. *genuina* Rohrb. Monogr. Sil. (1868) 97. — Tulpină simplă sau erect ramificată. Caliciu de obicei cu peri alipiți. Petale palid roșii. — Reg. Cluj: Mții Rodnei sub Mt. Ineu; Cluj; Aiton, Poșaga de Sus (r. Turda); Sălciua, între Neagra și Vidra, Bucium pe Mt. Detunata Goală (r. Câmpeni); Mții Bihorului. Reg. Stalin: Orașul Stalin; Vâlcele (r. Sf. Gheorghe); Rășinari, Tâlmaci, Boița (r. Sibiu). Reg. Hunedoara: Cetea pe Piatra Ceții, Galda de Jos (r. Alba Iulia); Lăpușnic (r. Deva); Sarmisegetuza, Hobita (r. Hațeg). Reg. Oradea: Ciucea (r. Aleșd); Mții Bihorului sub Vlădeasa. Reg. Timișoara: Gladna (r. Făget). Reg. Ploști: Sinaia. Reg. Bacău: Făgetel (r. Buhuși); Țibucani (r. Piatra Neamț); Petricani (r. Tg. Neamț). Reg. Suceava: Țolești, Mălini (r. Fălticeni); Bosanci (r. Suceava); Calafindești (r. Rădăuți).

var. *quinquevulnera* (L.) Mert. et Koch in Röhl. Deutschl. Fl. III, ed. III (1831) 230. — *S. quinquevulnera* L. Sp. pl. ed. I (1753) 416, s.s. — Tulpină simplă sau ramificată. Caliciu cu strii purpurii. Petale albe sau spălăcit rozee, la mijloc cu o pată mare, roșie sau purpurie. — Reg. Baia Mare: Maramureș (Văgner in Herb. Inst. Bot. Buc.).

Răsp. gen.: Europa, Asia, Africa, introdusă în America.

* *S. pëndula* L. Sp. pl. ed. I (1753) 418; Schischk. in Fl. U.R.S.S. VI (1936) 614.

○. Tulpină simplă, lungă de 30—50 cm, ± pubescentă, în partea inferioară procumbentă, apoi ascerdentă. Frunze oblong spatulate, pubescente, cele superioare ca și bracteele, lanceolat acute. Inflorescența de obicei cu un cincin, rar cu două. Flori pedicelate, erect patente, la maturitate reverse,

rar erecte. Caliciu lung, claviform, ovat, la maturitate contractat la vârf, glardulos. Petale rozee, rar albe, cu limb bilobat și biligulat. Carpofoor mai scurt decât jumătatea lungimii capsulei. Semințe reniforme, puțin turtite, pe ambele laturi plane, pe partea dorsală slab canaliculate, fin tuberculate. VI—VIII.

Stațiunea. Cultivat adeseori în grădini și cimitire, de urde evadează.

Răsp. în țară: *Reg. Stalin:* Sibiu pe ogoare și locuri ruderaie lângă oraș (Schur, Herb. Inst. Bot. București).

Intrebuintări. Planta a fost mult cultivată prin grădini pe la finele sec. XIX.

Răsp. gen.: Europa de S, Asia Mică.

Secția IV. BOTRYOSILÉNE Rohrb. Monogr. Sil. (1886) 73, 175 em. Gușul. in Add. pag.

Plante 2, rar ☉. In afară de dichaziul terminal \pm dezvoltat, se mai află dichazii laterale așezate în raceme simple sau compuse. Uneori, din cele 2 dichazii opuse, se dezvoltă numai unul. Când internodiile inflorescenței sunt scurtate, florile apar în capitule. Dichazii reduse câteodată la o singură floare.

13. *S. longiflora* Ehrh. Beitr. VII (1792) 144; Schischk. l.c. 636. — *S. longifolia* Schur Enum. Pl. Transs. (1866) 102. — **Exs.:** FRE nr. 540. — **l.c.:** Pl. 19, fig. 1; W. et K. Pl. rar. Hurg. I (1802) tab. 8.

4. Tulpină erectă, înaltă de 40—90 cm, glabră, în partea superioară foarte vâscoasă. Frunze inferioare oblong lanceolate, acute, îngustate în petiol lung, late de 5—8 mm, cele superioare linear lanceolate; bracteele la bază ovate, lung acuminate. Dichaziile laterale biflore sau uniflore (în cazul din urmă, dichaziul uniflor se deosebește de o floare terminală prin prezența a două bracteele). Flori hermafrodite, mari. Caliciu de 20—30 mm lungime, cilindric, coriaceu, glabru, umbilicat, cu nervuri arctomozate, de obicei roșcate. Petale albe, bifide, cu lobi obovat oblongi, cu 2 ligule alungite, acute. Carpofoor de lungimea capsulei. Sămânță mare, pe partea dorsală canaliculată, pe laturi plană, este tot fin tuberculată. VI—VIII.

Stațiunea. Prin locuri aride, coaste pietroase și înșorite.

Răsp. în țară: *Reg. Cluj:* Cluj (V. Morii), Florești, Apahida, între Căpușul Mic și Macău pe Dl. « Medvehegy »; Turda, Cheia Turzii, Buru, Moldovenești în lungul Arieșului, Vidolm, Rimetea, Luncani (r. Turda); Aiud, Izvoarele în Cheile Vălișoarei (r. Aiud); Zăul de Câmpie (r. Luduș). *Reg. Aut. M.:* Reghin. *Reg. Stalin:* Orașul Stalin, Cristian; Sibiu, Gușterița, Daia, Noul, Hamba, Slimnic, Tălmăciu, Boița (r. Sibiu); Săscior, Căcova, Cuntă, Mercurea (r. Sebeș); Sighișoara, Criș, Beșa (r. Sighișoara). *Reg. Hunedoara:* Orăștie; între Deva și Cozia; între Ciopea și Ohaba de sub Piatră în lungul Streiului, Subcetate (r. Hațeg). *Reg. Craiova:* Schela Cladovei, Dudașu (r. Tr. Severin). *Reg. București:* Gara Sărulești, Dâlga (r. Lehliu). *Reg. Ploiești:* Cotorca, Bărcănești-Speteni (r. Urziceni). *Reg. Constanța:* Fetești,

Hagieni; Constanța, Mangalia, Murfatlar pe V. Serpla Cula. *Reg. Galați*: Pechea, Cișmele (r. Galați). *Reg. Bârlad*: Cosmești (r. Tecuci); Bârlad pe Dl. Mare. *Reg. Iași*: Oltenești (r. Huși); Roșiești (r. Vaslui); la N de Com. Tîgănești (r. Iași).

Variabilitatea speciei

var. *junceea* (Roth) Otth in DC. Prodr. I (1824) 382. — *S. juncea* Roth Catalecta I (1797) 54. — *S. longifolia* a. *pallida* Schur Enum. pl. Transs. (1866) 102. — *S. longiflora* var. *linearifolia* Heuff. Enum. pl. Banat. in Verh. ZBG Wien VIII (1858) 36. — Frunze caulinare inferioare mult mai înguste decât la f. tipică. Inflorescență mai mică, cu ramuri scurte. — Impreună cu f. tipică la Turda și Cluj pe fânețe.

În t r e b u i n ț ă r i. Poate servi ca plantă decorativă pe stâncării.

R ă s p. g e n.: Europa de S. Asia Mică, Palestina și Persia.

14. *S. chlorántha* (Willd.) Ehrh. Beitr. VII (1792) 144. — *Cucubalus chloranthus* Willd. Prodr. Fl. Berol. (1787) 155; Schischk. l.c. 616. — *S. polyphylla* Baumg. Enum. stirj. Transs. I (1816) 397, non L. nec alior. — *S. subspathulata* Schur Enum. pl. Transs. (1866) 102. — Exs.: FEAH nr. 2492. — l.c.: Pl. 24, fig. 3.

24. Tulpină erectă, glabră, înaltă de 30–60 cm, rar până la 100 cm. Frunze inferioare fasciculate, spatulat lanceolate, îngustate în petiol lung, la bază ciliat, cele superioare liniare. Dichaziile laterale ale racemului principal scurte, opuse, rareori alterne prin reducere, toate uniforme sau cele inferioare cu 5–7–15 flori, la început \pm nutante. Pedunculii dichaziilor (și celor uniflore) înspre vârful plantei din ce în ce mai scurți, astfel încât bracteele lor primare își schimbă locul. Flori mari, hermaphrodite. Caliciu membranos, coriaceu, de 8–10 mm lungime, de color. roșcat sau albăstrui pruios, glabru, cu nervuri arastomozate, la bază umbilicat; dinții ovat rotunjiți. Petale verzi, profunde bipartite, cu l gule minime. Capsulă lunguiată, cu un car. ofor de 4 ori mai scurt. Semințe reniforme, pe spate canaliculate, pe fețe plane, pe te tot fin tuberculate. VI–VIII.

S t a ț i u n e a. Pe colme ierboase, însoțite, din regiunea de câmpie.

R ă s p. î n ț a r ă: *Reg. Cluj*: Cluj; Turda, Vișoara. *Reg. Stalin*: Gușterița, Șura Mare, Tâlmăciu, Boița, Oana Sibiului, Slimnic (r. Sibiu); Cenade, Valea Lungă, Proștea Mare, Proștea Mică, Mediaș; Sighișoara, Dumbrăveni; Sebeș. *Reg. Bârlad*: Odobești, Vârteșcoiu. *Reg. Bacău*: între Mrea Bistrița și Mrea Bisericiani (r. Piatra Neamț). *Reg. Iași*: Roșiești (r. Vaslui). *Reg. Suceava*: Bosanci (r. Suceava); Mt. Rarău. Mai este citată din Dobrogea, fără localitate.

Variabilitatea speciei

f. *lătior* Zap. Cons. Fl. Galic. crit. (1911) 184. — Frunzele de sub jumătatea tulpinii evident mai late, oblanceolate, asemănătoare celor bazale. — *Reg. Stalin*: Valea Lungă (r. Mediaș) împreună cu f. tipică.

f. **pauciflora** Zap. l. c. — Toate dichaziile uniflore. Frunze foarte mici, cele inferioare îngust lanceolate, spre vârf puțin dilatate. — *Reg. Cluj*: Cluj; Turda.

Răsp. gen.: Europa de SE, Siberia, Songaria.

15. **S. multiflora** (Ehrh.) Pers. Syn. I (1805) 497. — *Cucubalus multiflorus* Ehrh. Beitr. VII (1792) 141; Schischk. l.c. 617. — **Ic.**: Pl. 22, fig. 3; W. et K. Pl. rar. Hung. I (1802) tab. 56 sub *Cucubalo*.

4. Tulpină erectă, simplă, de (50) 60—90 cm, cu peri foarte scurți, scabri. Frunze inferioare fasciculate, lanceolat spatulate, obtuziuscule, îngustate într'un pețiol lung, cele caulinare oblong liniare, cele superioare bractei-forme. Bractei ovate, acute, alb marginate, dens ciliate. Dichaziile scurt pedicelate, 3—7-flore. Flori mari; pedicelii cu bractei la bază. Caliciu alungit clavate, umbilicat, membranos, puberul sau glabrescent, cu sau fără glande fără anastomoze ale nervurilor. Petale albe, bifide, cu lobi obovat oblongi, fără ligule. Capsulă oblongă, de lungimea carpofozului sau puțin mai scurtă. Semințe dorsal și pe fețe plane, fin granulate. VI—VII.

Stațiunea. Pe fânețe nisipoase, umede, pe ogoare. Rară.

Răsp. în țară: *Reg. Hunedoara*: Mintia (r. Deva). *Reg. Timișoara*: Timișoara. *Reg. Galați*: Caraorman pe Insula Sft. Gheorghe (r. Tulcea).

Răsp. gen.: Austria, Ungaria, U.R.S.S. meridională, Asia temperată.

Obs: Se deosebește de *S. clorantha*, cu care e asemănătoare, prin caliciul păros și carpofoz mai lung decât capsula.

16. **S. pontica** Brandza Veget. Dobr. in Anal. Acad. Rom. Ser. II, tom. IV, Sect. II. Mem. Not. (1884) 430, Sep. pag. 26, n. nud. et Fl. Dobr. (1898) 61; Panțu in Sched. ad FRE nr. 239 in Bul. Inf. Grăd. Bot. Cluj III (1923) 21 et in Publ. Soc. Nat. Rom. XXVI, 7 (1925) 4 cum icone. — *S. thymifolia* Sibth. et Sm. Fl. graec. Prodr. (1806) 292. — *S. thymifolia* Sibth. et Sm. ssp. *pontica* Prod. Consp. Fl. Dobr. in Bul. Acad. Stud. Agron. Cluj V, 1 (1935) 252, Sep. pag. 80, pl. XVI, fig. III, 1—7. — **Exs.**: FRE nr. 239 a, b. — **Ic.**: Pl. 21, fig. 3; — Acad. Rom. Bul. Sect. Sc. IX (1924) tab.; Consp. Fl. Dobr. I (1935) 82, Pl. XVI sub *S. thymif.* var *pontica*.

4. Tulpina îngroșată, semilemnosă, lungă de 15—20 cm, culcată, întortochat ramificată, la vârf ascendentă, în subțioara frunzelor inferioare ale ramurilor cu smocuri de frunze fasciculate. Frunze mici, de 8—20 mm lun-

Plansa 22. — 1. *Silene nutans* L. — 2. *S. dubia* Herb. — 3. *S. multiflora* (Ehrh.) Pers.



gime, ovat oblongi, rar eliptice, îngustate în prepețiol, pubescente, la bază fin ciliate. Dichaziile inferioare alterne, cele superioare opuse, toate pauciflore (1—3-flore). Caliciu hirsut, cu dinți obtuși, liniari. Petale bifide, la gât ligulate, albe. Carpofor lung de 7 mm, aproape egal de lung cât capsula (8—9 mm). Sămânță reniformă, de 1,5 mm lungime și 1,2 mm lățime, pe partea dorsală canaliculată, pe fețe plană, peste tot fin tuberculată. VII—VIII.

Stațiunea. Pe dunele de pe litoralul Mării Negre, foarte răspândită.

Răsp. în țară: *Reg. Constanța*: Mamaia, Agigea, Eforia, Vasile Roaită, Techirghiol, Tuzla, Mangalia (r. Constanța).

Răsp. gen.: Litoralul Mării Negre, România, Bulgaria.

Obs. Nu este nicio îndoială, că planta noastră aparține la grupa «*Spergulfoliae*» Rohrb. și este aceeași ca și planta de pe litoralul Crimeei («*supina* M. B.»), cât și de pe litoralul apusean la Varna («*supina* Vel.»). Dar plantele din Constantinopol («*thymifolia* Aznav.» exs.), aparțin la *S. pontica*, nefiind deloc cert dacă ele sunt identice cu *S. thymifolia* S. et S., precum o crede Aznavour (HN nr. 4005). — *S. thymifolia* a fost descrisă de Sibth. și Smith Fl. graec. Prodr. l. c. și iconografiată în Ic. Fl. Gr. fig. 411. Atât descrierea, cât și figura sunt atât de incomplete și neclare, încât Rohrbach, monografistul genului, nu știe unde să le așeze (l. c. 230); crede însă că din cauza «racemului» ar trebui să stea la Sect. *Botryosilene*. Boissier în Fl. or. I (1867) 648 o așează cu rezervă lângă *S. succulenta* din Sect. *Dichasiosilene*, unde o găsim și la A. et G. l. c. 196. Alți autori o așează împreună cu Otth la *Stachyomorpha* Otth, grupă identică cu Sect. *Cincinnosilene*.

Deci nu *S. pontica* Brandza este dubioasă, precum o presupun A. et G., ci *S. thymifolia* S. et S., care este așezată în trei secțiuni mari ale genului *Silene* s. str. — Până nu se va stabili cu precizie identitatea plantei *S. thymifolia* S. et S., planta de noi trebuie să rămână sub denumirea de *S. pontica* Brandza.

17. *S. supina* M.B. Fl. taur.-cauc. I (1808) 336; Schischk. in Fl. U.R.S.S. VI (1936) 656. — *S. spergulfolia* Rehb. Fl. germ. exc. III (1832) 820; Ic. Fl. germ. VI (1844) 53, tab. 292, fig. 5101. — Exs.: FRE nr. 1933. — Ic. Pl. 21, fig. 2.

4. Tulpină ascendentă, ramificată dela bază, la bază lemnoasă, în subțioara frunzelor inferioare cu smocuri de frunze fasciculate. Frunze înguste liniare, sau cel mult oblong liniare, de 2 — 2,5 cm lungime, mai lungi decât la *S. pontica*, rigid păroase, cele tinere obovate. Dichaziile inferioare alterne, cele superioare opuse, toate pauciflore (1—3-flore). Caliciu cu peri scurți, rigizi, amestecați cu alții lungi. Petale bifide, la gât ligulate. Carpofor ceva mai lung sau subeg. cu capsula. Sămânță pe partea dorsală canaliculată, pe fețe plană, peste tot fin tuberculată. V—VII.

Stațiunea. În locuri stâncoase, prin tufișuri, la poalele munților, numai în sudul țării.

Răsp. în țară: *Reg. Craiova*: Vârciorova către Gura Văii. *Reg. Galați*: Mții Măcinului spre Greci, între Cerna și Greci pe calcar, Turcoaia pe Dl. lui Iacob.

Intrebuintări. Plantă decorativă pentru stâncării, cu plante alpine sau saxicole.

Răsp. gen.: Europa de SE, Caucaz, Songaria, Siberia altaică.

Obs. Foarte asemănătoare cu *S. pontica*, de care se deosebește la prima vedere prin frunzele sale îngust liniar lanceolate și puțin mai lungi.

18. *S. italică* (L.) Pers. Syn. I (1805) 498. — *Cucubalus italicus* L. Syst. ed. X (1759) 1030; Schischk. l.c. 675. — **Ic.:** Pl. 23, fig. 2 et 24, fig. 1.

24. Tulpină de 20—80 cm, erectă, pubescent-scabă; internodiile superioare cu inele vâscoase. Frunze scurt păroase, cele inferioare lanceolat sau lat ovat spatulate, cele superioare lanceolate până la liniar lanceolate. Inflorescență bogată în dichazii. Dichaziile lung pedunculate, simple, 3—5-flore, cele inferioare repetat bifurcate, sau dispuse în raceme laterale. Flori lung sau scurt pedicelate. Caliciu de 15—25 mm lungime, dispers păros sau glabru, glandulos, cu glande sesile sau puțin ridicate, sau fără glande. Lamina petalelor bifidă, albă, cu unguicula în jumătatea superioară \pm ciliată. Carpofor de lungimea capsulei, sau cel puțin cât $2/3$ din lungimea ei. Sămânță dorsal reniformă, dorsal slab canaliculată, pe laturi plană, fin tuberculată. V—VIII.

Stațiunea. În locuri stâncoase, ierboase, prin rărituri de pădure.

Răsp. în țară: În toate provinciile, dela câmpie până în zona subalpină.

Variabilitatea speciei

var. *typica* Fiori et Paoletti Fl. anal. ital. I (1898) 368, App. 76, emend. Guşul. — *S. italica* Pers. l. c. s. str. — *S. italica* var. *umbrosa* Heuff. Enum. pl. Banat. in Verh. ZBG Wien VIII (1858) 72. — *S. Ital.* a. *genuina* A. et G. Syn. V. II (1921) 217. — Frunze inferioare de obicei lanceolat spatulate. Inflorescența cu un număr mai redus de flori. Caliciu cu numeroși peri glanduloși; glande sesile sau scurt stipitate, la maturitate rărite. — Recoltată de Rochel din Banat, fără localitate.

var. *nemoralis* (W. et K.) Heuff. l. c. 72. — *S. nemoralis* W. et K. Pl. rar. Hung. III. (1812) 274, tab. 249 (Ic. mala). — *S. italica* (L.) Pers. β . *floccosa* Rohrb. l. c. 220. — *S. Jundzillii* Zapal. Consp. Fl. Galic. crit. III (1911) 197. — **Exs.:** FEAH nr. 523 sub *Lychnide*; FRE nr. 1934. — **Ic.:** Pl. 24, fig. 1; W. et K. l. c. III (1812) tab. 249. — Frunze inferioare de obicei lat obovat spatulate. Inflorescență bogată în dichazii și flori. Caliciu dispers păros, subglabru, fără glande sau cu glande foarte rare. — **Reg. Baia Mare:** Vișeu de Sus. **Reg. Cluj:** Rodna, Mții Rodnei (Mt. Inău 2280 m); Tihuța, Bistrița; Cluj (la Făget și la Fânațe); Cheia Turzii, Turda, Rimetea, Runc, Poșaga de Jos, Poșaga de Sus pe Mt. Belioara. **Reg. Aut. M.:** Mții Călimani (V. Voivodeasa); Borsec; Ditrău, Voșlab (r. Gheorghieni); Tușnad; Odorhei, Băile Homorod. **Reg. Stalin:** Orașul Stalin pe Tâmpa, Săcele, Mt. Piatra Mare, Predeal pe Susai și Clăbucetul Taurului, Mții Bucegi; Racoșul de Jos (r. Rupea); Valea Lungă (r. Mediaș); Mții Făgărașului; Tâlmăciu (r. Sibiu); V. Secașului (r. Sebeș). **Reg. Timișoara:** Băile Herculane pe Mt. Domogled, Mehadia; Moldova Nouă. **Reg. Craiova:** Vârciorova, Ilovița pe V. Bahnei, Hinova pe Dl. Stârmina, Cerneți (r. Tr. Severin). **Reg. Pitești:** Râmnul Vâlcea la Păd. Gurănoaia, Govora pe Măgura Mătușa Floarea; Otești de Sus (r. Dră-

gășani); Curtea de Argeș pe Dl. Hodiei; Câmpulung; Leordeni (r. Topoloveni). *Reg. Pitești*: Viforâta (r. Târgoviște) Călinești în zăvoiul Proviței (r. Câmpina); Bușteni, Azuga (r. Sinaia), Dl. Istrița (r. Buzău).³ *Reg. București*: Comana (r. Viștea). *Reg. Constanța*: Gura Dobrogei (r. Medgidia); Murfatlar pe V. Serpla Cula (r. Constanța); Ostrov la Japcea (r. Băneasa). *Reg. Galați*: Greci pe Dl. Tuțuiatul (r. Măcin); Mrea Cocos, Niculițel, Nifon, Balabancea, Filimon Sârbu pe Mt. Consul (r. Tulcea). *Reg. Bacău*: între Dărmănești și Poiana Uzului (r. Tg. Ocna); Mt. Ceahlău (Poiana Durău), Buha Inița, Borca (r. Ceahlău). *Reg. Suceava*: Bosanci, Pătrăuți (r. Suceava); Mt. Rarău (Schitul Rarău), Mt. Giumalău; Ciocănești, Mt. Suhardul (r. Vatra Dornei).

var. *pilosa* (Willd.) Heuff. Enum. pl. Banat. in Verh. ZBG Wien, VIII (1858) 36. — *Cucubalus pilosus* Willd. Enum. Hort. Berol. (1809) 471. — *S. pilosa* Spreng. Syst. II (1825) 411. — *S. nemoralis* W. et K. *β. pilosa* Grec. Consp. Fl. Rom. (1898) 108. — Frunze mari, cu indument dens, pubescent, albicios, moale. Caliciu dens păros. — *Reg. Galați*: Greci (r. Măcin).

var. *Porciusii* Gușul. var. nov. in Add. pag. 666. — *S. italica* (L.) Pers. var. *glabra* Porcius in Sched. n. nud. (Herb. Inst. Bot. București). — Plantă în întregime glabră, exceptând pedunculii foarte puțin păroși. — *Reg. Cluj*: Rodna. *Reg. Stalin*: Valea Lungă (r. Mediaș).

Răsp. gen.: Pentru *S. italica* tipică: Europa de SE, Caucaz, Asia Mică, Persia, Africa de N. — Pentru *S. nemoralis*: Europa de mijloc și de S.

Obs. *S. italica* este o specie foarte variabilă, mai ales în ce privește forma inflorescenței. Petalele variază ca mărime și culoare, iar unguiculele sunt \pm ciliate și de obicei ligulate. Pedunculii dichaziilor, ca și pedicelii florilor, variază ca lungime și sunt dela început erecți. Importantă este părozitatea caliciului, căreia i s'a dat prea puțină importanță, sau o interpretare necorespunzătoare.

La întregul ciclu de forme de *S. italica*, care este răspândit în regiunea mediteraneeană, s'a observat pe caliciu: 1) peri scurți, 2) peri mai lungi, patenți și 3) peri glanduloși. Perii scurți și dispersi, care dispar în mare parte la maturitate, caracterizează formele din mijlocul Europei (var. *nemoralis*); cele glanduloase (var. *italica* f. *typica*) sunt răspândite în regiunea mediteraneeană, iar cele cu peri mai lungi (var. *pilosa*) le aflăm deseori alături de *S. italica typica*.

Avem astfel varietăți cu arii \pm distincte, cel puțin între *S. italica* tipică și var. *nemoralis*.

19. *S. viridiflora* L. Sp. pl. ed. II (1762) 597; Schischk. in Fl. U.R.S.S. VI (1936) 674. — *S. livida* Grec. Consp. Fl. Rom. (1898) 108, p.p. — Exs.: FEAH nr. 2491. — Ic.: Pl. 21, fig. 1; W. et K. Pl. rar. Hung. III (1812) tab. 248 sub *Cucubalo molliss*.

4. Tulpină erectă, înaltă de 40—80 (100) cm, glandulos pubescentă, în partea de sus foarte vâscoasă. Frunze inferioare oblong spatulate, acute, lung petiolate, cele superioare lanceolat acuminate, toate pubescente. Dichazii pauciflore, așezate pe ramurile principale sau pe ramuri laterale. Flori nutante la anteză, de regulă câte 3, uneori câte 1—2. Caliciu ovat ventricos, acoperit cu glande lungi, la bază lent îngustat într'un peduncul de regulă foarte lung. Petale albe verzui, cu unguicula ieșită în afară, bifide, cu lobi liniari, cu două ligule oblongi. Capsulă ovoidă, subsesilă. Carpoforul mai scurt (1/3) decât

capsula. Sămînțe lateral 1 lane, pe spate ușor canaliculate, peste tot fin tuberculată. VI—VII.

Stațiunea. Prin poieni și rărituri ale pădurilor, pe sol uscat.

Răsp. în țară: *Reg. Cluj*: Rodna; Sântioana (r. Gherla); Mții Meseșului; Someșul Rece (r. Cluj); Turda spre Cheia Turzii, Mții Trascăului (Colții Trascăului). *Reg. Aut. M.*: Sovata; Târgul Mureș. *Reg. Stalin*: Orașul Stalin, Codlea; Mții Făgărașului (Colții Brezii, Arpașul, Scara); Hamba (r. Sibiu); Sighișoara; Mădiaș, Valea Lungă. *Reg. Hunedoara*: Galda de Sus pe V. Gălzii, Mții Trascăului pe Piatra Caprei, Bucerdea Vinosă, Bărbant (r. Alba Iulia); Romoș, Spini (r. Orăștie); Deva, Zam, Hunedoara. *Reg. Oradea*: Ciucea (r. Aleșd); Mții Bihorului (V. Drăganului spre Mt. Vlădeasa). *Reg. Timișoara*: Armeniș (r. Caransebeș); Oravița; Băile Herculane pe Mt. Domogled, între Svinița și Tisovița (r. Mehadia); Moldova Nouă. *Reg. Craiova*: Cerneți (r. Tr. Severin); Baia de Aramă, Tisman, Mții Mehedinților (Piatra Cloșanilor); Podari, Bucovăț, Leamna (r. Craiova). *Reg. Pitești*: Călimănești, M'ea Cozia, M'ea Turnu, M'ea Stănișoara (r. Brezoiu); Vlădeni (r. Câmpulung). *Reg. București*: București (Chitila); Păsărea la Păd. Cernica, Brănești; Comana, Crucea de Piatră, Uzun (r. Vidra). *Reg. Constanța*: Babadag. *Reg. Galați*: Mrea Cocoș (r. Tulcea).

Variabilitatea speciei

var. *latifolia* (Hornem.) Schur Enum. pl. Transs. (1866) 102. — *S. latifolia* Hornem. Suppl. Hort. Hdn. (1819) 49, non Poir. — Frunze mai late și mai scurt pețiolate. — *Reg. Stalin*: V. Lungă (r. Mădi ș). *Reg. Hunedoara*: Orăștie. *Reg. Craiova*: Bucovăț (r. Craiova). var. *banatica* Gușul. var. nova. in Add. pag. 665. — Tulpină înaltă de 40 — 50 cm. Frunzele fasciculelor bazale lanceolate, lung pețiolate, cu peri scurți, canescenți. Frunzele din mijlocul tulpinii sesile, scurte, ovate, cele superioare bracteiforme. Internodii lungi de 2 — 5 cm. Inflorescența cu număr redus de flori (5 — 1). — *Reg. Timișoara*: între Svinița și Tisovița (Herb. Inst. Bot. București).

Intrebuintări. Ca plantă ornamentală de stâncării.

Răsp. gen.: Europa de S, Crimeea, Himalaia.

20. *S. nutans* L. S. pl. ed. I (1753) 417; Schischk. in Fl. U.R.S.S. VI (1936) 674. — Exs.: FRE nr. 1688. — Ic.: Pl. 22, fig. 1.

4. Tulpină de 30—60 cm, erectă, în partea inferioară cu peri scurți, crispuli, moi, ± patentți. Frunze inferioare lanceolat sau eliptic spatulate, celelalte lanceolate. Dichazii 1- multiflore, patente; florile înainte de fecundare nutante, după fecundare erecte. Caliciu de cca 10 mm lungime, la bază umbilicat, acoperit cu peri simpli și peri glanduloși foarte numeroși. Petale cu lamina albă, profund bifidă. Urguicula glabră. Capsulă pe un carpofoz de 3—4 ori mai scurt decât lungimea ei. Sămânță reniformă, pe laturi 1 lană, pe spate canaliculată, peste tot tuberculată. V—VIII.

Plansa 23. — 1. *Silene Otites* Wib. ssp. *densiflora* A. et G. — 2. *S. italica* Pers. — 3. *S. Otites* Wib. ssp. *parviflora* (Ehrh.) Gușul.



Stațiunea. Pe coaste înșorite, prin poieni uscate, fânețe, pe stânci și ziduri, dela câmpie până în regiunea montană.

Răsp. în țară: *Reg. Baia Mare:* Vișeu de Jos, Vișeu de Sus. *Reg. Cluj:* Rodna, Valea Vinului pe V. Izvorul Mare (r. ășăud); Bistrița; Chiochiș (r. Beclean); Canciu, Olpret, Babdiu pe Dl. Ciuha (r. Dej); Sântioana (r. Gherla); Mții Meseșului pe Măgura; Cluj, Feleac, Sălicea; Balta (r. Sărmășel); Turda la Băile Sărute; Aiud; Roșia Montană (r. Câmpeni). *Reg. Ar. M.:* Remetea (r. Gheorghieni); Mții Gurghiului (Dl. Crucii); Mții Giurgeului (Mt. «Öcsém»); Băile Tușnad; Reci, Zagon pe Dl. «Metehagy» (r. Sf. Gheorghe). *Reg. Stalin:* Orașul Stalin, Săcele, Predeal; Rupea; Sighișoara, Boiu; Mediaș, Proștea Mare, Copșa Mică, Vorumlac, Șeica Mică, Țapu, Valea Lungă (r. Mediaș); Gușterița, Noul, Șura Mare, Cisnădioara pe Mt. «Götzenberg» (r. Sibiu). *Reg. Hunedoara:* Orăștie; Alba Iulia; între Covragi și Băești pe V. Streiului, Ohaba de sub Piatră (r. Hațeg); Mții Retezatului (Fața Fetei 1200 m); Petroșani la Cetatea Bolii. *Reg. Pitești:* Voineasa pe V. Voinești din V. Lotrului (r. Brezoiu). *Reg. București:* (Chitila); Mrea Păsărea, Mrea Cernica (r. Brănești); Adunații-Copăceni spre Varlam (r. Vidra). *Reg. Ploiești:* Vulcana (r. Pucioasa); Sinaia pe V. Zgarburei, Bușteni; Valea Călugărească (r. Ploiești). *Reg. Bacău:* Slănic (r. Tg. Ocna); Piatra Neamț (pe Mt. Cozla și Mt. Pietricica), Mrea Biserici, Bicaz; Petricani, Mrea Neamț, Mt. Dumeșnic (r. Tg. Neamț). *Reg. Iași:* Iași (Copou, Galata), Bucium, Ciurea, Bârnova, Șorogari, Aro-neanu; Hârlău. *Reg. Suceava:* Bosanci (r. Suceava); Vama, Câmpulung; Iacobeni (r. Vatra Dornei).

Variabilitatea speciei

var. typica Beck Fl. NÖ I (1890) 382. — Dichazii scurt pedunculate; pedunculii nu ajung până la jumătatea internodiului. Anbele ramuri dichaziale ale aceiași perechi de frunze de obicei unilateral nutante. — Cea mai răspândită variatăte.

f. válida Zap. Consp. Fl. Galic. crit. III (1911) 191. — Mai robustă, înaltă până la 1 m, cu ramurile dichaziale ale fiecărei perechi, de obicei congruent așezate. — Formă răspândită pe soluri mai îngrășate.

f. oligantha Zap. l. c. — Tulpină de 10 — 30 cm lungime. Dichazii cu 1—3 flori. — Impreună cu f. *typica*.

var. livida (Willd.) Otth in DC. Prodr. I (1824) 378. — *S. livida* Willd. Enum. Hort. Berol. (1809) 474, p.p. — Dichaziile inferioare pe pedunculi alungiți, ce întrec jumătatea internodiului. Petalele pe fața de jos de obicei de culoare plumburie. — *Reg. Cluj:* Năsăud; Aiud. *Reg. Stalin:* Sighișoara.

O b s. Această varietate se confundă de către mulți autori cu hibridul $\times S. Grecescui$ Gușul. = *nutans* \times *viridiflora*.

var. infracta (W. et K.) Wahlenbg. Fl. Carpat. (1814) 128; Schur Enum. pl. Transs. (1866) 101. — *S. infracta* W. et K. Pl. rar. Hung. III (1812) 237. — *S. nutans* β . *glabra* DC. in Lam. et DC. Fl. fr. V (1815) 605. — *S. nutans* β . *amblevana* Dumort. Fl. Belg. (1827) 107. — **Ic.:** W. et K. l. c. II (1812) tab. 213. — Plantă glabră, adeseori cu peri răzleți la baza frunzelor și câteva glande pe pedicel și pe caliciu. — *Reg. Stalin:* Mt. «Götzenberg» lângă Cisnădioara (r. Sibiu).

Răsp. gen.: Europa, Africa de N, Caucaz, Siberia, Japonia.

× *S. pseudonutans* (Panč.) = *nutans* × *italica*. — *S. pseudonutans* Panč. Addit. Fl. Serb. (1884) 116. — *S. nutans* L. var. *incana* Otth in DC. Prodr. I (1824) 377. — **Ic.:** Rechb. Ic. Fl. germ. VI (1844) 53, tab. 296, fig. 5108 b, p.p.

Florile deseori pe același individ cu carpofoar de diferite lungimi, dela 1/4 până la întreaga lungime a capsulei. Inflorescență compusă din dichazii în parte erecte, în parte nutante înainte de fecundare.

Banat, între părinți (Roch. exs. in Herb. Inst. Bot. Cluj).

× *S. Grecescui* Gușul. sp. hybr. nova in Add. pag. 665 = *nutans* × *viridiflora*. — *S. livida* Willd. Enum. Hort. Berol. (1809) 494, p.p.; Grec. Consp. Fl. Rom. (1898) 108, p.p.

Caliciu ± decurent în pedicel, neumbilicat sau mai puțin trunchiat. Dichaziile racemului de obicei lung pedunculate, pauciflore. Petale verzui. Capsulă umflată la mijloc, îngustată înspre ambele capete.

Reg. Cluj: Turda; Aiud.

21. *S. dubia* Herb. Fl. Bucov. (1859) 388. — *S. transsilvanica* Schur in ÖBZ VIII (1858) 22, 287, n. nud. — *S. saxatilis* Schur Enum. pl. Transs. (1866) 101, non Sims. — *S. nutans* var. *dubia* Zap. Rosl. Pok. Marmar. in Sprav. Komis. fiz. Ak. Umiej. Krak. XXIV (1889) 111. — *S. nutans* β. *transsilvanica* Grec. Consp. Fl. Rom. (1898) 109. — Milițea. — Kárpáti habszegfü. — Karpaten-Leimkraut. — **Exs.:** FRE nr. 234, a, c., nr. 1686; FEAH nr. 2490. — **Ic.:** Pl. 22, fig. 2; Römer Pflzwelt. (1898) tab. 13.

4. Tulpină de obicei înaltă de 20—40 cm, în partea inferioară acoperită cu peri foarte mici, alipiți sau recurbați, de 1/10 — 1/4 mm lungime. Frunze ± glabrescente, slab ciliate. Inflorescență compusă din dichazii scurt pedunculate, dispuse de obicei în grupe unilaterale, 1—3—7 - flore, nutante, după fecundare erecte. Flori puțin mai mici decât la *S. nutans*. Caliciu de 10—11 cm lungime, umbilicat, acoperit cu peri mici setiformi, amestecați de obicei și cu puține glande. Petale de culoare galbenă, verde sau alburie, lungi de 14—17 mm, cu unguicule auriculate. Carpofoar mult mai scurt decât capsula, de 1/4 — 1/5 din lungimea ei. VI—VII.

Stațiunea. În locuri stâncoase din regiunea montană până în cea alpină, între cca 800 m și 2500 m altitudine.

Răsp. în țară: *Reg. Baia Mare:* Baia [Sprie; Mții Gutinului; Mții Tibleșului; Borșa (r. Vișeu), Mții Rodnei (Pietrosul Mare). *Reg. Cluj:* Rodna, Valea Vinului pe V. Izvorul Mare (r. Năsăud), Mții Rodnei: Rotunda, Corongiș, Mihăiaș, Ciflie; Canciu (r. Dej); Surduc (r. Jibou); Panic (r. Zalău); Mții Bihorului (Vlădeasa); Cluj (Făget), Gilău, Someșul Rece, Răcățiu (r. Cluj); Săliște, Cheia Turzii, Muntele Băișoarei, Rimetea, Runc, Lunca, Poșaga pe V. Poșaga, Mt. Scărița, Piatra Vultureasa (r. Turda); Mții Trascăului: Colții Trascăului, V. Aiudului, Cheile Râmețului, Piatra Cetii, Piatra Caprei; Vidra, Câmpeni, Bucium pe Detunata Goală, Abrud pe Mt. Vulcan, Roșia Montană (r. Câmpeni). *Reg. Stalin:*

Orașul Stalin (Tâmpa, Poiana Stalin), Mții Ciucașului (Tesla), Mt. Piatra Mare, V. Timișului, Predeal, Mții Bucegi, Zărnești, Mt. Piatra Craiului; Mții Făgărașului în tot cuprinsul, Mții Sibiului în tot cuprinsul; Sibiu, Râul Sadului, Rășinari, Păltiniș, Turnu Roșu (r. Sibiu). *Reg. Hunedoara*: Galda de Sus (r. Alba Iulia); Săcărâmb (r. Orăștie); Vărmaga (r. Deva); Ponorici (r. Hațeg), Mții Retezatului (Păpușa, Slăveiu, Borăscu); Petroșani la Cetatea Bolii, V. Jiului, Pasul Surduc, Mții Parângului. *Reg. Oradea*: Mții Bihorului. *Reg. Timișoara*: Mt. Tarcu, Mții Semeniciului, V. Dunării între Svinița și Drencova la Trescovăț. *Reg. Craiova*: V. Jiului la Lănci, Mții Parângului. *Reg. Pitești*: Brezoiu, V. Lotrului, V. Oltului, Mt. Cozia; Curtea de Argeș pe Dl. Hodiei, Corbeni pe Mt. Ghițu, Cheile Argeșului, V. Argeșului la Cumpăna, Mții Făgărașului: V. Caprei, V. Budei, Paltina, Lespezi, Negoiu, Câmpulung, Dâmbovicioara, Mții Iezer-Păpușa. *Reg. Ploiești*: Sinaia, Poiana Țapului, Bușteni, Azugă. Mții Bucegi: Zănoaga, Vânturii, V. Peșelui, Furnica, Piatra Arsă, Jepi, Caraiman, Poiana Coștilei, V. Ialomiței la Schitul Peștera; Mții Ciucașului (Zăganul). *Reg. Bacău*: Slănic pe Mt. Șandru; Mt. Ceahlău (Poiana Durău, Duruitoarea, Stănilile, Panaghia), Cheile Bicazului. Bistricioara, Broșteni pe V. Neagra. *Reg. Suceava*: Mții Bistriței (Mt. Barnaru); Mt. Rarău, Pojorâta, Fundul Moldovei, Dl. Negru (r. Câmpulung); Cărlibaba, Iacobenii (r. Vatra Dornei).

Variabilitatea speciei

var. **glabriuscula** (Zap.). — *S. nutans* c. *glabriuscula* Zap. Consp. Fl. Galic. crit. III (1911) 192. — Tulpină puberulă sau ± glabră. Caliciu răzleț păros, cu peri glanduloși. — *Reg. Cluj*: V. Izvorul Mare din Mții Rodnei; Turda. *Reg. Stalin*: Orașul Stalin. *Reg. Ploiești*: Poiana Țapului (r. Sinaia).

var. **Hormuzakii** Gușul. nom. novus. — *S. transsilvanica* var. *angustifolia* Hormuz. in ÖBZ LXI (1911) 147. — Părozitatea compusă din peri simpli pe pedicel și pe caliciu, amestecați cu puține glande. Carpoforul cât $1\frac{1}{4}$ din lungimea capsulei, ca la forma tipică. — *Reg. Suceava*: Mt. Rarău la Pietrele Doamnei.

f. **robustior** (Schur) A. et G. Syn. V. 2 (1921) 212. — *S. saxatilis* a. *racemosa* Schur et *robustior* Schur Enum. pl. Transs. (1866) 101, 102. — *S. nutans* ssp. *dubia* Herb. 2. f. *luxuriosa* Zap. l. c. (1911) 195. — Tulpina peste 70 cm înălțime, de obicei ramificată dela jumătate. Dichazii repetat bifurcate. — *Reg. Suceava*: V. Colbului de sub Giurmalău (r. Vatra Dornei).

f. **apricorum** (Zap.) Graebn. in A. et G. Syn. l. c. — *S. nutans* ssp. *dubia* f. *apricorum* Zap. l. c. — Tulpini scunde, puțin ramificate. Dichazii scurte, de obicei uniflore, rar triflore. Flori mici, cu caliciul până la 10 mm lungime; petale cu lamină de 4 — 5 mm lungime. — *Reg. Suceava*: Cărlibaba (r. Vatra Dornei).

f. **Herbichii** (Zap.) Graebn. l. c. — *S. nutans* ssp. *dubia* b. *Herbichii* Zap. l. c. — Tulpini de obicei mici și puțin ramificate. Flori mari, cu caliciu de 10 — 12 mm lungime și lamine de 18 — 21 mm. — *Reg. Baia Mare*: Mții Maramureșului: Mt. Popadia (1500 m). Mt. Cearcanul pe culme; Băile Borșa la Stâna lui Vartic pe andezit. — *Reg. Suceava*: Ciocănești (r. Vatra Dornei).

f. **kelemenensis** (Zap.) Graebn. l. c. — *S. nutans* ssp. *dubia* a. *kelemenensis* Zap. l. c. — Înălț. de 30 — 50 cm. Plantă bogată în antocian, cu bracteele și caliciul pe nervuri. eventual și tulpina, purpuriu violacee; petalele albe. — *Reg. Aut. M.*: Mții Călimani.

f. **lilacina** (Zap.). — *S. nutans* ssp. *dubia* a. *kelemenensis* f. *lilacina* Zap. l. c. — Plantă colorată în întregime, inclusiv petalele. — Impreună cu precedentă.

m. **acaulis** Gușul. monstr. nova in Add. pag. 665. — Frunze în rozetă, din care ies direct dichaziile. — *Reg. Stalin*: lângă Orașul Stalin.

O b s. Celelalte forme pe care le găsim la Schur și Zapal. l. c. ca: f. *acutifolia*, f. *oblongifolia*, f. *latifolia*, f. *stenophylla*, f. *spargulifolia*, apoi f. *pauciflora* Borza, etc. ne arată prin însăși denumirea lor caracterele pe care se bazează, precum și m. rea variabilitate a speciei. — *S. dubia* este un exemplu de specie sau rasă geografică înrudită cu *S. nutans* și stând față de aceasta întocmai ca și *S. saxatilis* Sims. din Caucaz față de *S. viridella* Otth din Franța.

R ă s p. g e n.: Endemică pentru Carpații din R.P.R.

22. *S. Otites* (L.) Wib. Fl. Werthem. (1799) 241. — *Cucubalus Otites* L. Sp. 1. ed. I (1753) 415. — Ic.: Pl. 18, fig. 3, 4; Pl. 23, fig. 1, 3.

⊙ — 4. Tulpină dreaptă, înaltă de 20—60 cm, la bază foarte scurt adpres pubescentă, până la subglabră, în partea superioară complet glabră, rar pubescentă, viscidă, sau în partea de jos cu peri mai lungi, patenți, la fel ca și frunzele. Frunze la f. tipică scurt pubescente, cele inferioare obovat oblongi, cele superioare lanceolat liniare, sau și cele dela bază lanceolate, respectiv lanceolat spatulate. Dichaziile dispuse pe o axă principală sau și pe axe laterale, de obicei repetat bifurcate, însă cu un număr redus de flori dezvoltate. Dichazii sesile, mai rar cele inferioare pedunculate. Flori dioice, mai rar poligame, mici. Caliciu de (3) 4—6 mm lungime, de obicei împreună cu pedunculii glabru. Petale mici, întregi, la bază răzleț ciliate. Gineceu pe un carpor mai scurt decât capsula. Capsulă aproape subrotundă, de 4—6 mm în diam. Seminte reniforme cu muchii ascuțite sau obtuziuscule. V—VII.

S t a ț i u n e a. In locuri deschise, însorite, pe ogoare nisipoase, pe iezături, pe coline calcaroase și fânețe uscate.

Variabilitatea speciei

- 1 a Indumentul în partea de jos a plantei compus din peri foarte scurți (1/10 mm), pubescenti. Partea de sus cu același fel de peri foarte scurți sau glabră..... 2
- 1 b Perii în partea de jos a plantei, patenți, de 1/2 — 1 mm lungime...ssp. **densiflora**
- 2 a Partea de sus a axei complet glabră ssp. **euotites**
- 2 b Partea de sus a axei, inflorescența cu pedunculii și caliciul acoperiți cu peri foarte mici, aspri.....ssp. **parviflora**

ssp. **euotites** A. et G. Syn. V. 2 (1921) 192. — *S. Otites* (L.) Wib. s. str. et Auct. plur.

Tulpină numai în partea de jos foarte fin pubescentă; în partea de sus, împreună cu inflorescența, complet glabră. Capsulă de 4—6 mm lungime.

var. **genúina** Rohrb. Monogr. Sil. (1868) 200. — Dichazii sesile, în racem simplu; mai rar racemul principal cu 1 — 2 ramuri laterale purtătoare de dichazii. — Reg. Cluj:

Planșa 24. — 1. *Silene italica* (L.) Pers. var. *nemoralis* (W. et K.) Heuff. — 2. *S. trinervia* Seb. et Mauri. — 3. *S. chlorantha* (Willd.) Ehrh.



Năsăud; Chiochiș (r. Beclean); Cluj, Someșeni, Boju; Valea Florilor, Turda la Băile Sărate. *Reg. Aut. M.*: Mărești (r. Odorhei); Lăzărești (r. Miercurea Ciuc). *Reg. Stalin*: Orașul Stalin pe Tâmpa; Racoșul de Jos pe Dl. «Töpehegy» (r. Rupea); Făgăraș; Sighișoara; Șeica Mică, Frâua, Valea Lungă, Mănărade (r. Mediaș); Gușterița, Daia, Șura Mare, Ocna Sibiului (r. Sibiul); Miercurea (r. Sebeș). *Reg. Hunedoara*: Orăștie; Deva; V. Streiului dela Simeria până la Pui; Hunedoara; Bretea Română (r. Hațeg). *Reg. Timișoara*: Periam (r. Sănnicolaul Mare); Orșova. *Reg. Craiova*: între Vârciorova și Gura Văii; Segarcea. *Reg. Pitești*: Mt. Cozia. *Reg. Constanța*: Murfatlar. *Reg. Iași*: Iași. *Reg. Suceava*: Bulai lângă Suceava; Stânca-Ștefănești (r. Trușești).

var. *pseudotites* (Bess.) Borb. Budap. es Környék. Növ. (1879) 148. — *S. Pseudotites* Bess. in Rechb. Fl. germ. exc. III (1832) 819, Schischk. in Fl. U.R.S.S. (1936) 686. — *S. densiflora* Proc.-Procop. Fl. Sucz. in Verh. ZBG Wien XLII (1892) 65. — *Ik.*: Pl. 18, fig. 4. — Racem principal cu multe ramuri lungi laterale, toate purtătoare de dichazii sesile, aglomerate în «verticilastre»; numai dichaziile dela baza ramurilor scurt pedicelate. Capsulă mică, de 4 — 6 mm lungime. — *Reg. Cluj*: Domnești (r. Bistrița); Chiochiș (r. Beclean); între Mihăești și Berind, Someșeni, Boju (r. Cluj); Valea Florilor, Ceanul Mare (r. Turda). *Reg. Aut. M.*: Căcoși (r. Tg. Mureș); Gheorghieni; Mărești (r. Odorhei); Reci, Zagon (r. Sf. Gheorghe). *Reg. Stalin*: Orașul Stalin pe Tâmpa; Ocna Sibiului; Valea Lungă (r. Mediaș). *Reg. Hunedoara*: Zeicani la «Porțile de Fer» (r. Hațeg). *Reg. Pitești*: Căineni, Râul Vadului Mt. Cozia (r. Brezoiu). *Reg. București*: Tămădău (r. Brănești). *Reg. Ploiești*: între Tohani și Jugureni (r. Mizil), Dl. Istria. *Reg. Constanța*: Murfatlar; Independența (r. Băneasa). *Reg. Galați*: Hanu Conachi (r. Măicănești). *Reg. Iași*: Iași (Copou, Galata), Păușești în Păd. Războiu, Sculeni (r. Iași). *Reg. Suceava*: Bosanci (r. Suceava); Stânca-Ștefănești (r. Trușești).

var. *effusa* (Othth). — *S. effusa* Othth în DC. Prodr. I (1824) 370. — *S. Wolgensis* Othth l. c. 370, nr. 25 p.p. quoad ramific. infloresc. — *S. otites* ssp. *S. Wolgensis* b. *effusa* A. et G. Syn. V. 2 (1921) 196. p.p. — Axa principală a inflorescenței foarte ramificată, cu ramuri laterale simple sau din nou ramificate, toate purtând dichazii pedunculate (la varietățile *pseudotites* și *euotites*, sesile). Astfel «panicula» la var. *effusa* devine foarte laxă. Caliciul de 4 mm lungime. — *Reg. Hunedoara*: Teiuș (r. Alba Iulia). *Reg. Craiova*: Cârcea, Craiova. *Reg. București*: Lehliu.

var. *duriuscula* Velen. in Sitzber. Böhm. Ges. Wiss. XXXVII (1893) 13. — Plante de statură mijlocie, cu tulpină rigidă, slab ramificată, cu indument caracteristic ca la ssp. *euotites*, însă cu capsulă mai mare, de 6 — 8 mm lungime. — *Reg. Craiova*: Vârciorova la Porțile de Fier.

ssp. *parviflora* (Ehrh.) Hay. Prodr. Fl. balc. I (1927) 278, emend. Gușul. — *Cucubalus parviflorus* Ehrh. Beitr. VII (1792) 143, non Lam. — *Silene parviflora* Pers. Syn. I (1805) 497, Schischk. in Fl. U.R.S.S. VI (1936) 689. — *S. Otites* β. *parviflora* Rohrb. Monogr. Sil. (1868) 200. — *Ik.*: Pl. 23, fig. 3; Roch. Pl. Ban. rar. (1828) tab. II, fig. 7.

Tulpina, frunzele, pedunculii, pedicelii și caliciul foarte fin pubescente. Semințe reniforme, cu margini ascuțite și proeminente.

Reg. Craiova: Dunele de nisip de la Obedinu (r. Craiova). *Reg. Constanța*: Constanța, Mamaia, Agigea. *Reg. Galați*: Delta Dunării (Păd. Letea, Hașmacul Mare).

O b s. Această plantă crește împreună cu ssp. *euotites*, dând forme hibride.

ssp. **densiflora** A. et G. Syn. V. 2 (1921) 197. — *S. densiflora* d'Urv. in Mém. Soc. Linn. Paris (1822) 303, Schischk. in Fl. U.R.S.S. VI (1936) 686. — *S. Otites* ϑ . *densiflora* Otth in DC. Prodr. I (1824) 369. — **Exs.**: FRE nr. 539. — **Ic.**: Pl. 23, fig. 1.

Tulpina în partea inferioară cu peri moi sau \pm setiformi, patentă. Inflorescență și flori glabre. Semințe reniforme, cu muchii obtuziuscule.

var. **macroclada** Boiss. Fl. or. I (1867) 608. — *S. densiflora* f. *chersonensis* Zap. Consp. Fl. Galic. crit. II (1911) 189. — Tulpină în partea inferioară cu frunze lat oblong spatulate, cu peri deși \pm moi. — **Reg. Craiova**: Craiova la V. Fetii. **Reg. Constanța**: Agieea, Techirghiol, între Techirghiol și Mungalia, Murfatlar pe V. Serpla Cula, Osmancea (r. Constanța); Ostrov pe Dl. Japcea (r. Băneasa); Babadag, Jurilovca.

var. **volgénsis** (Otth) — *S. Wolgensis* Otth in DC. Prodr. I (1824) 370. — Tulpină în partea inferioară cu frunze lanceolate sau îngust oblong spatulate, cu indument de obicei mai scurt decât la var. *macroclada*. — **Reg. Ploști**: Bărcănești-Speteni (r. Urziceni). **Reg. Galați**: Delta Dunării. **Reg. Iași**: Iași (Copou pe V. Bădărău), Valea Ursului, Vânători pe Dl. Budăi Impuțit, Cârlig, Aroneanu, Rușeni, Focuri pe V. Prisaca (r. Iași); Spinoasa (r. Tg. Frumos).

f. **subdensiflora** Răv. Fl. distr. Iași in Ann. Sc. Univ. Iassy, II Sect. XXVII, 1 (1941) 189. — Indumentul dela baza tulpinii mai rarit, compus din peri mai scurți și rigizi. — **Reg. Iași**: Mârzești, Repedea. **Reg. Bârlad**: Păd. Drăgănești (r. Tecuci).

Răsp. gen. a speciei: Europa, Asia centr. și orientală.

Genul 94. **HELIOSPERMA** *) (Rehb.) Pax ¹⁾

in Ergl. et Prantl Nat. Pflzfam. III. 16 (1889) 73. — *Silene* Sect. a. *Heliosperma* Rehb. Fl. germ. exc. III (1832) 817. — *Heliospermum* Wohlfarth in Hall. - Wohlf. Kochs Syn. I (1891) 387.

Plante perene. Inflorescență în dichazii laxe, rar solitare. Caliciu campanulat, 10 - nervat. Petale cu ligule scurte. Stamine 10. Gineceu 3 - rar 5 - carpelar, neseștat, deschizându-se cu 6—10 dinți. Stile 3. Carpor de lungimea capsulei. Semințe reniforme, fin tuberculate; tuberculii pe fața dorsală radiar alungiți în formă de fapile (de aici și asemănarea cu soarele, «helios»).

H. quadrifidum (L.) Rehb. Repert. Herb. (1841) 206. — *Cucubalus quadrifidus* L. Sp. pl. ed. I (1753) 415. — *Silene quadrifida* L. Syst. ed. X (1759) 1032. — *Lychnis quadridentata* Murr. Syst. Veget. ed. XIII (1774) 362. — *Silene quadridentata* Pers. Syn. I (1805) 500. — **Ic.**: Pl. 13, fig. 1, 1 a, 1 b.

4. Tulpină lax cespitoasă, până la 40 cm înălțime cu glande pluricelulare, în partea de sus uncelulare și nestipitate, sau în întregime glabră. Frunze liniare, oblong sau eliptic lanceolate. Flori lung pedicelate, în dichazii

*) Nume provenit dela helios = soare și sperma = sămânță, din cauza prelungirilor în formă de raze ale papilelor dela coaja seminței (vezi Pl. 13).

¹⁾ Prelucrat de M. Gușuleac.

laxe, pauciflore. Caliciu campanulat, de 4—10 mm lungime, acoperit cu glande rare, pluricelulare sau complect glabru. Petale cu lamină 2—6-dințată, cu 2—4 ligule scurte la gâtul petalelor. Carpor for mai scurt decât capsula. Semințe reniforme, aproape rotunde, cu 2 serii de papile, de lungimea jumătății diametrului seminței. VII—IX.

Stațiunea. În locuri pietroase, umede, pe grohotișuri umede, mai ales pe roci calcaroase, în regiunea subalpină și alpină, rar coboară mai jos.

Răsp. în țară: *Mții Maramureșului:* Pop Ivan, V. Vaser, V. Cizla din V. Vișeuului, Toroiața, Cearcanul, Prislopul, Piatra Tîbăului. *Mții Rodnei:* V. Izvorul Roșu, Corongiș, Repedea, Mihăiasa, Crăciunel, Pietrosul Mare, Drăgușul, Vf. Rebri, Piatra Rea. *Mții Suhardului.* *Obcina Mestecănișului:* V. Botoș și V. Oița din V. Bistrița Aurie; Cărlibaba la poalele Mt. Fluturica (r. Vatra Dornei). *Mții Bistriței:* Mt. Ceahlău. *Mții Ciucașului.* *Mții Bucegi:* V. Izvorul Dorului, V. Peleşului, V. Urlătorilor, V. Jepilor, Caraiman, V. Albă, Coștila, V. Cerbului, Vf. Omul, V. Mălăești, V. Gaura, V. Tisa deasupra Com. Șimon, V. Ialomitei în Cheile Zănoagei și Cheile Urșilor, V. Horoabei, Mt. Doamnele; Sinaia, Bușteni, Predeal. *Mții Iezer-Păpușa:* V. Dâmbovicioarei. *Mții Făgărașului:* Vânătoarea lui Buteanu, Lacul Bălea, Negoitul, V. Argeșului la Cetatea lui Vlad Tepeș, Râiosul, Piscul Caprei. *Mții Parângului:* V. Jieșului, Mirul Mare; Petroșani. *Mții Retezatului:* V. Lăpușnicului, Custura, Mt. Tomeasa lângă Gura Apei, Mt. Paltina. *Mții Țarcu-Godeanu:* Țarcu, Izvorul Hidegu, Scărișoara. *Mții Mehedinților:* Mt. Oslea.

Variabilitatea speciei

var. **vulgare** DuRoi. Fl. Ober-Öst. IV (1885) 78. — *H. quadrifidum* α. *typicum* Maly în Glasnik XV (1903) 561. — Plantă glabră sau subglabră. Caliciu mic, de 5 — 6 cm lungime. Corolă de obicei 4-dentată, albă, mai rar rozee. Această varietate se găsește mai ales ca:

f. **pubundum** (Hffsgg.) A. et G. Syn. V. 2 (1920) 22. — *Silene pubunda* Hffsgg. în Rchb. Fl. germ. exc. III (1832) 817. — *Heliosperma pubundum* Griseb. Spicil. Fl. rumel. I (1843) 182. — Petale la început albe, mai târziu se colorează în roșu. — *Mții Rodnei:* în apropierea orașului Rodna. *Mții Bucegi:* V. Mălăești. *Mții Retezatului:* Custura.

var. **pusillum** (W. et K.) Schur. Sert. (1853) 12. — *Silene pusilla* W. et K. Pl. rar. Hung. III (1812) 235. — Frunze inferioare de obicei spatulate, cele mijlocii liniar lanceolate, până la 4 mm lățime, ± crispu păroase. Capsulă ceva mai lungă decât caliciul — *Mții Rodnei:* Corongiș. *Mții Bistriței:* Ceahlău. *Mții Bârsei:* Mt. Postăvarul la Poiana Stălin. *Mții Făgărașului:* Lacul Bălea. *Mții Retezatului.* *Mții Țarcu-Godeanu:* Mt. Țarcu.

var. **emarginatum** (Panțu et Proc. - Procop.). — *Silene emarginata* Panțu et Proc. în Bul. Erb. Inst. Bot. Buc. I (1901) 94. — *H. quadrifidum* Grec. Pl. vasc. Ceahlău în Anal. Acad. Rom. Ser. II, tom. XXVIII (1906) 429. — *H. quadrifidum* ssp. *carpaticum* Zap. Consp. Fl. Galic. crit. III (1911) 201. — Caliciu glandulos, de 7 mm lungime. Petale emarginate, obcordat cuneate, rar tridentate sau 4-dentate, cu ligule de 0,1 — 1 mm lungime. — *Mții Bistriței:* Mt. Ceahlău. *Mții Bucegi:* V. Mălăești. *Mții Țarcu-Godeanu:* Mt. Țarcu la Izvorul Hidegu.

O b s. Această varietate nu este nicidecum constantă, deoarece pe lângă formele emarginate sau bifide, se mai găsesc și exemplare cu petale quadrifide (Mt. Paltina în Retezat), sau scurt 4-dentate (pe Mt. Cârțișoarei), sau în afară de lamina 4-dentată și cu unguicula auriculată.

f. *auriculatum* (G. Grinț.). — *H. auriculata* G. Grinț. Hel. - Sil. - auric. Mt. Ceahlău (1908) 7, cum icon. — Petale cu unguicula biauriculată și cu lamina bi-tri- sau quadridentată, până la bilobată, cu margine întreagă sau neegal și multidentată, neemarginată. — Mt. Ceahlău la Pâr. Fântânilor și la Fântâna Măcărescu.

Alte forme descrise de Zapal. sunt de mai mică importanță:

f. *latifordatum* Zap. l. c. pag. 202. — Lamina obcordată, de cca 3 mm lungime și 3 mm lățime. — Cărlibaba (r. Vatra Dornei).

f. *grandiflorum* (Zap.). — *H. quadrifidum* (L.) Rchb. ssp. *carpaticum* a. *grandiflorum* Zap. l. c. — Cu flori mai mari; petale obcordate, de 8 — 9 mm lungime. — Mții Rodnei: Inău.

f. *ineuense* Zap. l. c. Plante mici, cu tulpini biflore. — Mții Rodnei: Inău.

f. *rodnense* (Zap.). — *H. quadrifidum* (L.) Rchb. ssp. *carpaticum* b. *rodnense* Zap. b. c. pag. 202. — Plante de 10 cm lungime sau mai puțin. Flori cu petale mici, de 6 mm lungime și 1,5 mm lățime. — Mții Rodnei: Mt. Pietrosul, Piatra Rea, Mt. Cailor.

Răsp. gen.: Mții Pirinei, Mții Alpi, Mții Caucaz, Mții Balcani.

O b s. Din Mții Maramureșului a fost indicată și *Heliosperma alpestre* (Jacq.) Rchb. — Prezența plantei la noi n'a fost însă confirmată până în prezent.

Genul 95. MELÁNDRIUM *) Röhl.

Deutschl. Fl. II, ed. II (1813) 274. — O p a i ț ă.

Plante ierboase, anuale sau perene, cu flori hermafrodite sau dioice. Caliciu umflat, 10—20-nervat. Petale bifidate, cu coronulă 2—4-laciniată. Stamine 10, stând adeseori la înălțimi diferite. Ovar unilocular. Stile 3—5. Fructe capsulare, deschizându-se prin 6—10 dinți. Semințe reniforme, tuberculate.

Determinarea speciilor

- | | | |
|-----|--|-----------------|
| 1 a | Flori hermafrodite. Stile 3. Inflorescență terminală | 2 |
| 1 b | Flori dioice. Stile 5 (uneori mai multe) | 4 |
| 2 a | Plantă perenă, cu tulpina, caliciul și marginea frunzelor dens pubescente. Frunze îngroșate, cele tulpinale rărite, lanceolate sau liniare. Petale albe, întregi, coronate | 7. M. Zawadzkii |
| 2 b | Plante anuale sau bianuale, bogate în frunze tulpinale | 3 |
| 3 a | Planta întreagă pronunțat vâscos glandulos păroasă. Frunze cu marginea ondulată, inegal crenate sau dințate. Petale albe, fără coronulă. În afară de dichaziul terminal, multe dichazii laterale | 6. M. viscosum |

*) Nume dedicat lui Girolamo Melandri, coautor cu Giuseppe Moretti al unei lucrări de analiză chimică a rădăcinii unei cariofilacee.

Planșa 25. — 1. *Vaccaria pyramidata* Medik. ssp. *grandiflora* (Fisch.), 1 a. secțiunea transversală a caliciului fructifer. — 2. *V. pyramidata* Medik. — 3. *Saponaria bellidifolia* Sm., 3 a. o singură floare. — 4. *Polyschemone nivalis* Schott, Nym. et Ky.



- 3 b Plante de obicei numai cu inflorescența glandulos păroasă. Dichaziu terminal. Frunze cu marginea întreagă. Petale roșii deschise sau albe, cu câte 2 ligule 5. **M. noctiflorum**
- 4 a Dinți capsulei conivenți (răsuciți îndărăt) 5
- 4 b Dinții capsulei porecți (îndoți înainte sau plecați înainte) 6
- 5 a Flori roșii închise, rar roze sau albe, deschise peste zi. Caliciu roșietic. Plantă \pm sbârlit păroasă 1. **M. rubrum**
- 5 b Flori albe, rar puțin roze. Caliciu verde, nervat. Tulpină ramificată dela bază, sbârlit păroasă 4. **M. nemorale**
- 6 a Caliciu cu peri denși, scurți, în amestec cu peri lungi, dispersi, neglanduloși. Capsulă lungă de 2 cm 2. **M. album**
- 6 b Caliciu dens lung vilos, în amestec cu peri lungi, glarduliferi, dispersi. Capsulă de 15—18 mm lungime 3. **M. eriocalycinum**

1. **M. rubrum** (Weig.) Garcke Fl. N. u. M. Deutschl. ed. IV (1858) 55. — *Lychnis dioica* β . *rubra* Weig. Fl. Pom. Rug. (1769) 85. — *L. dioica* L. Sp. pl. ed. I (1753) 437, p.p. — *Lychnis diurna* Sibth. Fl. Oxon. (1794) 145. — *Melandr. silvestre* Röhl. Deutschl. Fl. I, ed. II (1812) 274; Schischk. in Fl. U.R.S.S. VI (1936) 724. — *M. diurnum* (Sibth.) Fr. in Bot. Not. (1842) 170. — Opaită roșie. — Piros mécsvirág. — Rothe Nachtnelke. — Дрема лесная. — Ic.: Pl: 26, fig. 3.

4. Plantă înaltă de 60 — 100 cm, \pm moale și sbârlit păroasă, uneori glandulos păroasă. Tulpini erecte, simple sau ramificate în partea superioară. Frunze inferioare obovate, îngustate în petiol scurt, cele superioare alungite, sesile, toate acute. Flori dispuse în dichazii pauciflore, dioice, scurt pedunculat, fără miros, deschise peste zi. Caliciu roșietic, umflat, uneori glandulos păros, lung de 10—15 mm, cu 5 dinți triunghiulari, acuti; la florile femele dinții ovați și 20-nervați, la cele masculine cilindrici și 10-nervați. Corolă de un roșu închis, cu petale bifide, lat cordate, având coronulă roză sau albă. Stamine 10, concrescute în partea inferioară într'un tub, 5 dintre ele mai scurte. Flori femele cu 5 stile albe, filiforme. Capsulă ovată, închisă în caliciu, cu 10 dinți recurbați înapoi. Seminte numeroase, negre, dens sgrăbunțoase pe partea dorsală. IV—IX.

Stațiunea. Prin fânețe grase, marginea pădurilor, locuri pășunate, dela dealuri până la munte.

Răsp. în țară: Reg. *Baia Mare*: Mt. Țibleș; Vișeu de Sus, Mt. Pietrosul Rodnei. Reg. *Cluj*: Mții Țibleșului (Pasul Strâmbul); Bistrița; Dej; Cluj; Mții Meseșului pe Dl. Ursului; Cheia Turzii, Rimetea (r. Turda); Abrud pe Mt. Vulcan, Bucium pe Detunata Goală (r. Câmpeni). Reg. *Aut. M.*: Sălard, Lunca Bradului, Toplița, Borsec; Mții Călimani; Gheorghieni, Mureș-Izvor, Bălan; Mții Giurgeului (Hăghimașul Mare, Mt. «Öcsém»); Mții Gur-

ghiului (Buneasa, Dl. Crucii, « Délhegy », Saca); Sovata; Odorhei, Lueta, Firtuş, Corund, Băile Homorod (r. Odorhei); Băile Harghita, Sândominic, Tomeşti, Racul, Băile Tuşnad, Mţii Ciucului (r. Miercurea Ciuc). *Reg. Stalin*: Predeal, Mt. Piatra Craiului; Mţii Făgăraşului (Breaza, Buteanu); Cislădie (r. Sibiu). Mţii Sibiului (Iezerul Căminului). *Reg. Hunedoara*: Alba Iulia pe Dl. Bilac şi Dl. Mamut; Petroşani. *Reg. Oradea*: Săldăbagiu (r. Oradea); Ciucea (r. Aleşd), V. Drăganului sub Mt. Vlădeasa. *Reg. Piteşti*: Mt. Cozia (Mrea Stănişoara); Câmpulung, Nămăeşti, Dâmbovicioara, Mt. Păpuşa. *Reg. Ploieşti*: Sinaia, Buşteni; Mt. Penteleu. *Reg. Bacău*: Slănic pe Mt. Şandru; Pasul Ghimeş; V. Tarcăului, Mt. Ceahlău (Durău), Cheile Bicazului, Mt. Suhardul, Lacul Tulgheş la Pietrele Roşii, Broştene, pe Barnarul Mic şi Cheile Barnarului (r. Ceahlău); Mrea Neamţ (r. Tg. Neamţ).

Răsp. gen.: Europa, Asia temperată, Africa de N.

2. ○ **M. album** (Mill.) Garcke Fl. N. u.M. Deutschl. ed. IV (1858) 55; Schischk. in Fl. U.R.S.S. VI (1936) 725. — *Lychnis alba* Mill. Gard. Dict. ed. VIII (1768) nr. 4. — *Lychnis vespertina* Sibth. Fl. Oxon. (1794) 146. — Opaiţă. — Fehér mécsvirág. — Weisse Nachtnelke. — Дрема беловатая. — Ic.: Pl. 26, fig. 2.

⊙, 4. Tulpini înalte de 45—120 cm, erecte, ramificate, dens şi scurt ondulat păroase. Frunze inferioare obovate, îngustate în peţiol, cele superioare lanceolate, acute, sesile. Flori dioice, aşezate în dichazii pauciflore, rare, puţin mirositoare, deschizându-se după amiază. Caliciu glandulos păros, cu peri deşi şi scurţi amestecaţi cu peri lungi, dispersi, cu dinţi lungi, obtuşi. Dinţii florilor masculine ovat tubuloşi şi 10-nervaţi, cei ai florilor femele ovaţi, 20-nervaţi. Corolă albă, adânc bifidă, cu coronulă puţin lobată. Stile 5, filiiforme. Capsulă lat ovată, lungă de 2 cm, înconjurată de caliciu. Dinţii capsulei porecţi. Seminte sgrăbunţoase. VI—IX.

Staţiunea. Prin locuri fertile, părăsite, pe coaste însoarite, pe margini de drumuri, prin tufişuri, pe lângă garduri, ziduri, etc.

Răsp. în ţară: Comună în întreaga ţară.

Variabilitatea speciei

var. **thessalum** Hausskn. in Mitt. Thür. BVNFV (1893) 47. — Tulpină în partea superioară acoperită cu peri mai lungi şi dens glanduloşi. Frunze de obicei ovate, pe margini glandulos păroase. Caliciu dens vâscos glandulos. Capsulă lungă de 18 mm. — *Reg. Timişoara*: Defileul Dunării pe Mt. Glavcina deasupra comunei Sviniţa (r. Mehadia).

Răsp. gen.: Europa, Africa de N, Asia Mică până în America, Siberia până la Lacul Baical.

Planşa 26. — 1. *Melandrium viscosum* (L.) Cel. — 2. *M. album* (Mill.) Garcke. — 3. *M. rubrum* (Weig.) Garcke.



3. *M. ericalcynum* Boiss. Diagn. Sér. II nr. 1 (1853) 78.

☉, ☉. Plantă de un verde întunecat, păroasă, cu perii alburii, la maturitatea fructelor mai puțin păroasă, divaricat difuz ramificată. Tulpină îngroșată la noduri, cu articulele tulpinii lungi de 16—17 mm. Pedunculul florii centrale lung de 3 cm, mai păros decât celelalte organe. Frunze ovate lanceolate, acute sau acuminate, dispers păroase pe ambele laturi, cele mijlocii lungi de 5 cm și late de 15—18 mm. Caliciu aproape până la mijloc 5-fidat, balonat, dens și lung păros, în amestec cu peri glanduliferi dispersi, lung de 20 mm și lat de 10 mm; pedicelul sub floare mai lung păros. Petale ± oblice trunchiate. Capsulă subgloboasă, lungă de 15—18 mm, lată de 13 mm. Dinții capsulei porecți. Semințe mici, cca de 1 mm, negre, sgrăbunțoase. VI—IX.

Stațiunea. Fânețe, pășuni, tufișuri.

Răsp. în țară: Reg. București: Păd. Ghimpați (r. Mihăilești). Reg. Pitești: Valea Brazilor (r. Curtea de Argeș). Reg. Constanța: între Cernavodă și Hârșova.

Răsp. gen.: Bulgaria, Tracia, Macedonia.

4. *M. nemorale* (Heuff.) A. Br. in Flora XXVI (1843) 371. — *Lychnis nemoralis* Heuff. in Rechb. Fl. germ. exc. III (1832) 424. — Opați. — Ligeti mécsvirág. — Wald-Nachtnelke. — Exs.: FEAH nr. 523 sub *Lychnide*. — Ic: Pl. 27, fig. 3.

☉, ☉. Tulpină înaltă de 30—40 cm, ramificată dela bază, dispers și lung sbârlit păroasă, cu frunze oblong lanceolate sau ovate, hirsute. Inflorescență acoperită cu peri articulați, lungi, vișoși și vâscoși. Caliciu ovat, verde nervat, lung de 10—15 mm, la fructificație campanulat și vilos. Flori dioice, albe, rar puțin roze. Petale bilobate, coronate. Capsulă globoasă, lungă de 10—15 mm, matură cu dinți conivenți (răsuciți îndărăt). V—VI.

Stațiunea. În locuri păduroase, în regiunea montană și subalpină, îndeosebi în vestul și sudul țării.

Răsp. în țară: Reg. Cluj: Mții Meseșului; Someșul Rece (r. Cluj); Cheia Turzii; Mții Trascăului (V. Aiudului dela Aiud până la Rimetea); Vidra, Secătura, Neagra, Albac, Scărișoara (V. Ordencușei la Scăunoase), Câmpeni, Roșia Montană, Bucium-Cerbu, Abrud pe Mt. Vulcan (r. Câmpeni). Reg. Aut. M.: Bilbor (r. Toplița); Gurghiu (r. Reghin); Bălan pe Mt. Hăghimașul Mare (r. Gheorghieni). Reg. Stalin: Predeal; Mt. Piatra Mare (V. Gârcinului), Mt. Postăvarul (Poiana Stalin); Mții Făgărașului (Mții Cârțișoarei și Mții Avrighului), Cristian (r. Sibiu). Reg. Hunedoara: Deva (pe dealurile din jur), Zam; Hunedoara pe V. Zlăști; Mții Retezatului (V. Râul Mare, Gura Apei, Lunca Berhini); Mții Parângului (r. Jieșului). Reg. Oradea: Ciucea, Stâna de Vale (r. Aleșd), V. Drăganului sub Mt. Vlădeasa; Băița (r. Beiuș); Oradea pe Pâr. Lucuța și Pâr. Bistrița. Reg. Arad: Agriș, Șiria, Arăneag (r. Ineu); Miniș, Cladova, (r. Lipova); Dezna (r. Gurahonț). Reg. Timișoara: Mții Țarcu-Godeanu (Mt. Măgura). Reg. Craiova: Cerneți pe Dl. Iorgutovei și Dl. Dumbrăviței (r. Tr. Severin); Mții

Parângului la poalele Mt. Mirul Marc. *Reg. Pitești*: Mții Făgărașului (V. Caprei, V. Budei, Paltina). *Reg. Ploiești*: Sinaia (V. Peleşului), Bușteni (V. Albă). *Reg. Bacău*: Cheile Bicazului pe Mt. Suhard.

Răsp. gen.: Peninsula Balcanică.

5. *M. noctiflorum* (L.) Fries in Bot. Notis. (1842) 178; Schischk. in Fl. U.R.S.S. VI (1936) 712. — *Silene noctiflora* L. Sp. pl. ed. I (1753) 419. — *lc.*: Pl. 27, fig. 1.

○. Tulpini erecte, de 15—45 cm înălțime, spre vârf puțin ramificate, în partea inferioară scabre, în cea superioară glandulos vâcos păroase. Frunze inferioare obovate sau ovate lanceolate, cele superioare lanceolate sau liniar lanceolate, toate dispers păroase, cu margini întregi. Inflorescență paucifloră (dichaziu terminal). Flori hermafrodite, deschizându-se seara, noaptea mirositoare. Caliciul umflat tubulos, dens și scurt glandulos păros, 10-nervat. Dinții caliciului liniar subulați. Corolă roză sau albă, bifidă, cu coronule crenate. Stamine 10. Stile 3. Capsule lat ovate, cu dinți recurbați. Semințe sgrăbunțoase, pe partea dorsală puțin brăzdate. VII—IX.

Stațiunea. Prin locuri umbroase, cultivate, ogoare, grădini, vii.

Răsp. în țară: Comună în întreaga țară, prin locuri virane, grădini, câmpuri.

Răsp. gen.: Europa de S și centr., Orient, Siberia.

6. *M. viscôsum* (L.) Čelak. in Lotos XVIII (1868) 118; Schischk. *lc.* 710. — *Cucubalus viscosus* L. Sp. pl. ed. I (1753) 414. — *Silene viscosa* Pers. Syn. I (1805) 497. — *Exs.*: FRE nr. 1461, — *lc.*: Pl. 26, fig. 1.

○. Planta întreagă glandulos vâcos păroasă, cu tulpini erecte, simple, de 30—70 cm înălțime. Frunze ovate lanceolate, sesile, cu margini ondulate, inegal crenate sau dințate, nervate, cu nervuri mediane puternice, cele superioare ascuțite spre vârf. Inflorescență racemiformă, bogată în flori, compusă din verticile false. În afară de dichaziul terminal, multe dichazii laterale. Pedunculi floralii lipicioși. Caliciu cilindric, cu 5 dinți scurți, obtuși. Petale mari, albe, fără coronulă. Stamine păroase. Stile 3, proeminente. Capsulă lunguiață, pedunculată, închisă în caliciu, se deschide prin 6 dinți răsfrânți. Semințe aculeat sgrăbunțoase, scobite puțin pe margine. V—VI.

Stațiunea. Prin ogoare, pe lângă căi ferate, drumuri, garduri, fânețe, locuri fertile, mai ales în locuri semialcaline.

Planșa 27. — 1. *Melandrium noctiflorum* (L.) Fries. — 2. *M. Zawadzki* (Herb.) A. Br. — 3. *M. nemorale* (Heuff.) A. Br.



Răsp. în țară: *Reg. Baia Mare*: Satu Mare. *Reg. Cluj*: Cluj la lacul dela Someșeni, Apahida; Valea Florilor, Turda la Băile Sărate. *Reg. Aut. M.*: Reghin. *Reg. Stalin*: Sighișoara; Mediaș, Proștea Mică, Valea Lungă, Mănărade (r. Mediaș); Cârțișoara (r. Făgăraș); Porumbacu (r. Sibiu); Mercurea (r. Sebeș). *Reg. Oradea*: Salonta. *Reg. Craiova*: Turnu Severin, Simian, Hinova; Craiova. *Reg. Constanța*: Hagieni, Țândărei (r. Fetești). *Reg. Galați*: Delta Dunărei pe colinele dela Caraorman, Isaccea, Niculițel (r. Tulcea). *Reg. Iași*: Târgul Frumos.

Răsp. gen.: U.R.S.S. sud-estică, Siberia, Asia Centrală.

7. **M. Zawadzkii** (Herb.) A. Br. in Flora XXVI (1843) 387. — *Silene Zawadzkii* Herb. in Zaw. En. pl. Gal. Bucov. (1835) 181 et Herb. Fl.d. Bucov. (1859) 390. — Exs.: FRE nr. 149, a, c. — Ic.: Pl. 27, fig. 2; Pax Grundz. II (1908) 201, fig. 20; Hay. Pflanzendecke (1916) 425.

4. Tulpină înaltă de 15—30 cm, ascendentă, pubescentă, simplă, unifloră sau cimoasă, paucifloră. Inflorescența compusă din 1—7 flori. Frunze pie-loase, îngroșate, pe ambele fețe punctat scabre, glabre, foarte mărunț ciliate pe margini, cele radiale oblongi sau oblong ovate, late de 1—4 cm, acuminate, subseile, îndesuite, cele tulpinale mult mai mici, lanceolate sau liniare. Caliciu lung de 1,5 cm, puțin umflat, multistriat, reticulat, pubescent, cu dinții ovați, obtuși. Petale întregi, coronate. VI—VII.

Stațiunea. Pe munți calcaroși, în regiunea subalpină și alpină.

Răsp. în țară: *Mții Maramureșului*: Pâr. Salhoi din V. Țibăului. *Mții Rodnei*: Obârșia Rebri, Mihăiasa, Galați, Aria Zimbrului, Gărgălău, Corongiș, Inău, *Mții Rarăului*: Mt. Rarău pe Piatra Zimbrului și Pietrele Doamnei. *Mții Bistriței*: Mt. Ceahlău, Cheile Bica-zului. *Mții Giurgeului*: Surduc, Suhardul Mic, Lacul Ghilcoș, Hăghimașul Mare, Mt. «Öcsém», Piatra Singuratecă, Mt. «Terkő», Curmătura. *Mții Făgărașului*: Arpașul, Vf. Trăsnița deasupra V. Brezioara.

Răsp. gen.: Endemism în Carpații din R.P.R.

Hibridi

× **M. dubium** Hampe in Garcke Fl. N. u M. Deutschl. ed. VI (1863) 66. = *album* × *rubrum*.

Caracterele hibridului sunt asemănătoare cu ale celor doi părinți deoarece tulpina în partea superioară și pedunculul florilor nu e lanat păros, ci pre-văzut numai cu peri patenți, dispersi, scurți, între care, din loc în loc, apare și câte un păr glandulos. Capsulă mai lungă decât la *M. album*, însă mai scurtă decât la *M. rubrum*.

Dela *M. album* are mărimea florilor, culoarea sur-brunie, mărimea se-mințelor și inelul mai puternic al acestora. Dela *M. rubrum* are culoarea de un verde întunecat a frunzelor, lățimea lor și culoarea florilor, de un roșu viu sau palid.

Reg. Aut. M.: Mții Gurghiului (Dl. Crucii); Băile Tușnad. *Reg. Cluj*: Mții Bihorului (Mt. Vlădeasa).

× *M. subnemorale* Simk. in Term. füz. X (1886) 180; Enum. Fl. Transs. (1886) 130 = *album* × *nemorale*.

Se deosebește de precedentul prin părozitatea mai redusă a tulpinilor și frunzelor și prin florile albe, iar de *M. album* prin capsula mai scurtă, părozitatea mai lungă și mai dispersă și forma frunzelor inferioare, ovate. De *M. rubrum* și *M. nemorale* diferă numai prin portul său.

Reg. Stalin: Cisnădioara pe Mt. «Götzenberg» (r. Sibiu). *Reg. Hunedoara:* Săcărâmb (r. Orăștie); Mții Retezatului (V. Lăpușnicului).

Genul 96. CUCÚBALUS *) L.

Gen. pl. [ed. I (1737) 132, nr. 371], ed. V (1754) 192, nr. 502, p. min. p., Scop. Introd. (1777) 331. — Pleșca i ț ă , Gu ș a p o r u m b u l u i .

Fructul o bacă globuloasă, la început albastră, apoi neagră. Caliciu larg campanulat, umflat, la maturitate mai lat decât lung, Stile de obicei 3.

C. báccifer L. Sp. pl. ed. I (1753) 414; Gorschk. in Fl. U.R.S.S. VI (1936) 729 tab. XLV fig. 5. — Pleșca i ț ă . — Ligeti szegfűbogyó. — Gemeiner Taubenkropf. — Волдырник ягодный — Exs.: FRE nr. 1684 a, b. — Ic.: Pl. 28, fig. 3.

4. Plantă de 60—150 cm scurt păroasă sau glabrescentă. Rizom rotund, ramificat. Tulpini subțiri, moi, puțin ramificate. Frunze alungit ovate, acute, scurt păroase, cu margini întregi. Inflorescențe pauciflore. Caliciu răsfrânt în lături, inegal 5-dințat, cu 20 dungi puțin proeminente. Petale ligulate, bifidate, albe-verzui, cu coronulă scurtă. Stamine 10, cu antere galbene. Ovar globulos, cu 3 stile filiforme. Fructul capsulă baciformă, sesilă, globuloasă, atingând mărimea unui bob de mazăre, cu un strat intern verde, pergamentos. Semințe numeroase, la început albe, mai târziu galbene, apoi negre lucioase. VII—IX.

S t a ț i u n e a. Prin locuri joase, umede, dealungul râurilor, prin tufișuri umede, pe lângă păduri, etc.

R ă s p. i n ț a r ă : Răspândită în întreaga țară.

R ă s p. g e n . : Eurasia.

*) Numele unei plante la Plinius (sec. I.e.n.) luat ca nume de gen de botanistul francez Joseph Pitton de Tournefort (1656 — 1708).



Genul 97. **GYPSOPHILA** *) L.

[Nova pl. gen. Diss. Chenon in Amoen. acad. III, 1751 (1756) 23], Gen. pl. ed. V (1754) 191, nr. 498, A. Br. in Flora XXVI (1843) 382. — I p c ă r i g e.

Plante anuale sau perene, cu structură adeseori xerofitică. Flori hermafrodite, așezate adeseori în inflorescențe bogate. Caliciu scurt, larg campanulat, 5-fid, cu dinți separați prin dungi uscat pielose. Petale îngustate încet spre bază. Stamine 10. Stile 2, rar 3. Capsulă scurt pedunculată, deschizându-se prin 4, rareori 6 dinți. Semințe reniforme, cu partea dorsală rotunjită și embrion răsucit.

Determinarea speciilor

- 1 a Plantă anuală, mică, de 4—18 cm înălțime, adeseori dela bază repetat dichotomic divaricat ramificată. Frunze liniare, de 0,5—2 mm lățime. Flori rozee 1. **G. muralis**
- 1 b Plante perene cu rizom repent sau ramificat, adeseori foarte îngroșat . . 2
- 2 a Flori dispuse în dichazii ingrămădite în capitule globuloase, terminale 3
- 2 b Flori dispuse în dichazii paniculate, depărtate, laxe (mai rar strânse), multiflore 4
- 3 a Stamine 10, dintre care 5 anterifere și 5 sterile. Plantă mică, tufoasă, de 4—10 cm lungime. Flori alburii-trandafirii, așezate la vârful tulpinilor în capitule de 1—2 cm în diametru 8. **G. petraea**
- 3 b Stamine toate anterifere. Plantă înaltă de 100 cm, de culoare glaucă, cu ramuri glandulos vâscoase. Flori albe 6. **G. glomerata**
- 4 a Plantă de munte, tufoasă, mică, înaltă de 8—25 cm, cu tulpină, frunze și inflorescență glabre. Corolă albă sau violet deschis-roșietică 2. **G. repens**
- 4 b Plantă de stepe și litorale maritime, de statură robustă, înaltă de 20—100 cm 5
- 5 a Frunze late de 2—3,5 cm, 5-nervate. Caliciu de 2,5 mm lungime, cu lacinii aproape obtuze. Petale pe partea externă saturat purpurii, de 1,5—2 ori mai lungi decât caliciul 4. **G. scorzonrifolia**
- 5 b Frunze înguste, cel mult de 1 cm late, 1—3-nervate. Flori albe, mai rar palid rozee sau roșietice. 6
- 6 a Frunze 3-nervate, lanceolate sau liniar lanceolate, dela bază spre vârf treptat îngustate 7
- 6 b Frunze uninervate, liniare, late de 1—4 mm. Corolă albă, stamine și pistile mai lungi decât petalele, ies din corolă. Inflorescență cu pedunculi glanduloși 3. **G. fastigiata** ssp. **arenaria**

*) Dela « gypsos » — gips și « philos » — iubitor, deoarece planta crește cu predilecție pe sol gipsos sau calcaros.

- 7 a Laciniile caliciului rotund ovate, obtuze, cu nervura verde lată, invers ovată sau lanceolată. Caliciu de 1,5—3 mm lungime. Petale lungi de 3—4 mm. Plantă complet glabră, multicaulă, foarte ramificată dela bază
5. *G. paniculata*
- 7 b Laciniile caliciului oblongi, obtuze sau acuminate, cu nervura mediană verde îngustă, liniară. Caliciu de 2—4 mm lungime. Pedunculii inflorescenței pubescenti sau glanduloși 8
- 8 a Laciniile caliciului oblongi, acuminate, \pm recurbate. Caliciu de 3—4 mm lungime. Petale emarginate, lungi de 6—8 mm. Frunze inferioare late de 1 cm — *G. acutifolia*
- 8 b Laciniile caliciului oblongi, obtuze. Petale lungi de 5—6 mm. Frunze foarte cărnoase, cele inferioare mai late de 1 cm . . . 7. *G. altissima*

1. ○ *G. muralis* L. Sp. pl. ed. I (1753) 408; Schischk. in Fl. U.R.S.S. VI (1936) 774. — Exs.: FRE nr. 1697. — Ic.: Pl. 29, fig. 3.

○. Plantă de 4—18 (—40) cm înălțime, de culoare albastră-verzuie. Rădăcină pivotantă, fusiformă. Tulpini erecte, dela bază puternic dichotomic divaricat ramificate, rotunde, spre bază scurt păroase, în rest glabre. Frunze liniare, atenuate spre ambele extremități, întregi, late de 0,5—2 mm, cele mijlocii lungi până la 2 cm. Flori numeroase, așezate în dichazii răsfirate. Caliciu lung de 3—4 mm, verde, cu dungi de legătură albe, membranoase și dinții scurți, obtuși. Petale roze, cu nervuri mai închise, emarginate, de 2 ori mai lungi decât caliciul. Ovar ovat, cu 2 stile filamentoase. Capsulă erectă, de lungimea caliciului și închisă în acesta, deschizându-se la vârf prin 6 (rar 4) dinți recurbați. Semințe numeroase, brun închise sau negre, ușor sgrăbunțoase. VI—X.

Stațiunea. Prin locuri cultivate, ogoare, șanțuri, margini de drumuri, ziduri, prundișuri umede, etc.

Răsp. în țară: În întreaga țară, comună și prin locuri alcaline.

Variabilitatea speciei

f. *ramosissima* (Schur). — *G. muralis* L. a. *ramosissima* Schur Sert. (1853) 11, n. nud. ex Herbieh Fl. Bucov. (1859) 383, pro var. — Plantă mai mare, cu tulpină foarte mult ramificată, înaltă de 20 cm; ramurile subțiri. — Reg. Cluj: Cluj și împrejurimi. Reg. Aut. M.: Tg. Mureș.

f. *montis-ăpium* O. Ktze. Taschenfl. Leipz. (1879) 229. — Tulpină erectă, înaltă de 2 — 3,5 cm. — Reg. Cluj: Cluj și împrejurimi. Reg. București: indicat din «Vlașca».

var. *serótina* (Hayne) Höfft Cat. Kursk (1826) 30. — *G. serótina* Hayne in Dreves et Hayne Bot. Bild. (1794 — 1801) tab. 152. — Tulpină înaltă. Frunze tulpinale late de 2 — 2,5 mm, mai lungi decât articulele tulpinii. Laciniile perigonului emarginate. — Comună toamna

prin locuri umede. — *Reg. Cluj*: Cluj și împrejurimi. *Reg. Aut. M.*: Vâlcele (r. Sf. Gheorghe. *Reg. Oradea*: Pârâul Lucuța lângă Oradea.

f. *capillaris* Fiek et Schubert in 71. Jahresb. schles. Ges. vaterl. Kult. Bresl. Bot. Sect. (1893) 46. — Pedunculi floriali foarte alungiți, capilari. Articulele tulpinale (internodii) alungite. Frunze patente. Caliciu alungit, cu dinți ascuțiți. Corolă foarte îngustă. — Comună în locuri semicalcine, umede, în raionul Arad.

Răsp. gen.: Europa, Caucaz, Asia Mică, Siberia.

2. *G. répens* L. Sp. pl. ed. I (1753) 407. — *Ic.*: Pl. 28, fig. 1.

4. Plantă înaltă de 8–25 cm, glabră, albastrii-glaucă. Rizom lignificat, ramificat, cu lăstari fertili și sterili. Tulpini erecte, simple sau puțin ramificate în partea superioară, glabre, rărit foliate. Frunze sesile, liniare, uneori ușor curbate în formă de seceră, cu margini întregi, glabre, albastrii. Flori așezate în dichazii terminale, laxe, bogate. Caliciu de 4–5 mm lungime, verde sau roșcat, cu 5 dinți alungiți, obtuși, glabri. Petale albe sau violet deschis-roșietice, de 2 ori mai lungi decât caliciul, până la 1 cm în diam. Petale mai lungi decât staminele și stilele. Capsulă rotundă, cu puțin mai lungă decât caliciul. Semințe reniform rotunde, negre, lungi de 1,5 mm, late de 1 mm, acoperite cu 8–12 rânduri de proeminente concentrice, conice. V–VIII.

Stațiunea. Grohotișuri alpine și subalpine, coborând adeseori prin văi sau pe platouri înalte, pe soluri calcaroase.

Răsp. în țară: *Reg. Cluj*: indicată de Baumgarten din Mții Rodnei: la Padna, Rotunda. De atunci n'a mai fost confirmată.

Răsp. gen.: Mții Pirinei, Alpi, Carpați, Apenini.

3. *G. fastigiata* L. Sp. pl. ed. I (1753) 407; Schischk. in Fl. U.R.S.S. VI (1936) 747, Pl. XLIVII, fig. 2. — *Ic.*: Pl. 29, fig. 1.

4. Plantă înaltă de 20–40 (100) cm. Rizomi puternici, lignificați, târători, emit lăstari lungi, fertili și scurți, sterili. Lăstarii floriferi erecti, adeseori roșcați, în partea superioară împreună cu ramificațiile florale glandulos păroși. Frunze liniare, ușor cărnoase, late de 1–4 mm, acute, atenuate spre extremități, glabre, spre margini puțin aspre, albastrii. Flori în dichazii paniculate, multiflore, strânse. Caliciu campanulat, 5-partit, cu dinți rotunjiți, erecti. Pedunculi glanduloși. Petale albe sau roșiatice, obovate, obtuze. Stamine și pistile mai lungi decât petalele, ies din corolă. Capsulă până la de 2 ori mai lungă decât caliciul. Semințe așezate în rânduri neregulate. VI–VIII.

Stațiunea. Prin locuri nisipoase, prin văile râurilor, pe coline.

Variabilitatea speciei

ssp. **arenária** (W. et K.) Richt.-Gürke Pl. eur. II (1897) 335. — *G. arenaria* W. et K. Pl. rar. Hung. I (1802) 40, tab. 41. — **Ic.:** W. et K. l. c.

Plantă înaltă de 50—100 cm. Frunze late de 1—4 mm, cele inferioare la subțioară cu fascicule sterile. Tulpini bogate în flori, glabre. Inflorescență mai mare, cu pediceli glanduloși, de obicei mai scurți decât florile. Bractei ovate, acute, ciliate. Caliciu de 2—3 mm lungime. Corolă albă.

Reg. Timișoara: Indicată de Heuffel din Banat. *Reg. Bârlad:* Fălciu.

var. **leioeládos** Borb. in Term. fúz. XIII (1890) 84-85. — Flori așezate în dichazii paniculiforme, cu pedunculi glabri. Sepale lungi de 3 mm. Bractei mai lungi și mai alungit acuminate. — *Reg. Cluj:* între Căpușul Mic și Macău (r. Cluj); Dl. Țiganilor între Cojocna și Turda. Crește în masă în jurul stâncăriilor de gips, începând dela Aghireș până la Leghia (r. Cluj), precum și începând dela Gilău spre V. Dl. Ursului. — *Reg. Sibiu:* Mediaș (locul clasic).

Răsp. gen.: Europa centrală și de SE.

4. **G. scorzonerifolia** Ser. in DC. Prodr. I (1824) 352; Schischk. l. c. 760. — **Ic.:** Pl. 30, fig. 2.

4. Tulpină puternică, înaltă de 50—60 cm, cilindrică, suriu-verde, în partea inferioară patent păroasă sau glabră, paniculat ramificată. Frunze lat oblongi, de 2—3 cm lățime, 5-nervate, la bază scurt concrescute, adesea semiamplexicaule. Inflorescență foarte ramificată. Caliciu numai de 2—2,5 mm lungime, cu coaste verzi și lacinii aproape obtuze. Petale pe partea externă saturat purpurii, de 1,5—2 ori mai lungi decât caliciul. Capsulă cu 1/2 mai lungă decât caliciul, cu cca 10 semințe. Semințe numai de 1 mm lungime, fin scabre. VI—VII.

Stațiunea. Dune maritime, sărate, nisipoase.

Răsp. în țară: *Reg. Constanța:* Portița (r. Babadag), Mamaia, Tuzla (r. Constanța). *Reg. Galați:* Tulcea; Sf. Gheorghe.

Răsp. gen.: Europa pontică.

5. **G. paniculata** L. Sp. pl. ed. I (1753) 407; Schischk. in Fl. U.R.S.S. VI (1936) 749, tab. XLVII, fig. 3. — Ipcărige. — Buglyos dercefü (szappanyökér). — Rispiges Gypskraut. — Качим метельчатый — **Ic.:** Pl. 29 fig. 2; Hay. Pflzdecke. (1916) 491.

Planșa 29. — 1. *Gypsophila fastigiata* L. — 2. *G. paniculata* L., 2 a. o floare mărită, 2 b. o porțiune din tulpina inferioară noduroasă. — 3. *G. muralis* L.



4. Plantă de 60—90 cm înălțime, păroasă, cu tulpini numeroase, erecte, rotunde, foarte ramificate dela bază, glabre, numai în partea inferioară scurt și fin păroase. Frunze lanceolate, acute, trinervate, dela bază spre vârf treptat îngustate. Bracteele inflorescenței alb membranoase. Inflorescențe extinse, laxe, puternic ramificate, glabre, foarte bogate în flori. Flori mărunte, de 4—5 mm în diametru. Caliciu de 2 mm lungime, adânc 5-laciniat. Laciniile caliciului rotund ovate, obtuze cu nervura verde, lată, invers ovată sau lanceolată și marginea laciniilor albă, membranoasă. Petale albe sau roșcate, de 3—4 mm lungime, aproximativ de 2 ori mai lungi decât caliciul. Stamine și pistil mai lungi decât petalele. Capsulă mai lungă decât caliciul. Semințe turtite, sgrăbunțoase, lungi de 1,5—1,7 mm. VI—IX.

Stațiunea. Prin locuri nisipoase, coaste stâncoase, pe lângă căi ferate.

Răsp. în țară: *Reg. Hunedoara:* Deva, Dobra, Zam. *Reg. Timișoara:* indicată de Năilreich din Banatul de Est. *Reg. Craiova:* Bistrița la Grindul Baba Oprița (r. Băilești). *Reg. Constanța:* Hugieni, Tândărei (r. Fetești); între Hârșova și Ciobanul. *Reg. Galați:* Hanul Conachi (r. Măicănești). *Reg. Bârlad:* Tecuci, Țigănești; Bârlad.

Variabilitatea speciei

var. **hungárica** Borb. in Baenitz Herb. Eur. nr. 6560; Prosp. (1892) XXV, n. nud. ex Borb. et Wohlfart. in Kochs Syn. I, ed. III (1892) 328. — Ramuri, frunze și întreaga inflorescență dens acoperite cu peri glanduliferi, gălbui. — In Deliblat (Iugoslavia) aproape de frontieră.

Întrebuințări. Drogul acestei plante este cunoscut sub denumirea de «Radix Gypsophilae paniculatae», cu calități depurative, emeto-catartice, aperitive, sudorifice, expectorante, tonice, stimulante, antireumatice. Combate anemia, astma, guta, reumatismele cronice, bolile de ficat, splină, stomac, piele, limfatismul, etc. sub formă de praf, fiertură, etc. — Mai este întrebuințat și la fabricarea unor săpunuri fine.

Răsp. gen.: Europa de SE, Caucaz, Siberia de V.

6. **G. glomerăta** Pall. in M.B. Fl. taur.-cauc. I (1808) 324; Schischk. in Fl. U.R.S.S. VI (1936) 746. — **Exs.:** FEAH nr. 2862; FRE nr. 763. — **Ic.:** Pl. 30, fig. 2.

4. Plantă până la 100 cm înălțime, sur-verde (glaucă), cu tulpină erectă, cilindrică, ramificată, cu ramuri subțiri, puțin cleioase și puberule. Frunze liniar lanceolate, de cca 2—8 cm lungime, glabre. Flori aproape sesile, așezate în capitule lung pedunculate, terminale, sprijinite de bractee ovate, lat scarioase pe margini. Caliciu globulos campanulat, fidat până la mijloc, alburii membranos, cu coaste violacee și dinți ascuțiți. Petale albe, îngust alungit liniare. Ovar cu 6—8 ovule. Capsulă globuloasă. VI—VIII.

Stațiunea. Pe coline, stânci abrupte.

Răsp. în țară: *Reg. Craiova:* Schela Cladovei pe primele stânci abrupte de conglomerat dinspre Gura Văii (r. Tr. Severin). *Reg. Constanța:* Cernavoda; Mangalia pe stâncile

dela izvorul de apă sulfuroasă (r. Constanța); Jurilovca (r. Babadag). *Reg. Galați*; între Măcin și Tulcea; între Mahmudia și Dunavăț (r. Tulcea).

Răsp. gen.: Europa estică, pontică.

* **G. acutifolia** Fisch. Hort. Gorenki (1812) 59; Fl. U.R.S.S. VI (1936) 757.

4. Rădăcina groasă. Tulpină înaltă de 30—100 cm, glabră. Frunze lat lanceolate, până la liniar lanceolate, cărnoase, foarte acute, 3-nervate, cele inferioare de 1 cm lățime. Inflorescență răsfirată, lată, cu ramurile superioare și pediceli florilor lipicioase, cu flori numeroase, uneori în cultură învoalte. Laciniile caliciului oblongi, acuminate, recurbate. Petale emarginate, de 6—8 mm lungime. VII—VIII.

Stațiunea. Cultivată și sălbătică.

Răsp. în țară: In Reg. Suceava, cultivată și sălbătică.

Răsp. gen.: U.R.S.S. centrală și sudică.

7. **G. altissima** L. Sp. pl. ed. I (1753); 407; Schischk. in Fl. U.R.S.S. VI (1936) 750. — Ic.: Pl. 30, fig. 1.

4. Tulpini numeroase, erecte, groase, lungi de 30—80 cm, cu ramuri patente. Frunze foarte cărnoase, pieloase, alungit lanceolate, invers lanceolate până la liniare, de obicei lungi de 5—8 cm și late de 0,5—1 cm, cele inferioare mai late de 1 cm, acute sau obtuze, 3-nervate, adeseori ondulate pe margini. Inflorescență puțin laxă, compusă din flori mai puține, cu pedunculi pubescenti și glanduloși. Caliciu lung de 2 mm, rar mai lung, fidat până la mijloc, cu lacinii oblongi, obtuze. Petale lungi de 5—6 mm și late numai de 1 mm. Capsulă lungă de cca 3 mm. Semințe reniforme, late de 1 mm. VII—VIII.

Stațiunea. Pe stânci de gips sau pe soluri amestecate cu gips și uneori în cultură.

Răsp. în țară: La noi în țară nu s'a găsit spontană, dar crește în Bucovina sovietică, aproape de frontieră. Probabil că se va găsi și la noi.

Răsp. gen.: Europa sud-estică, Turchestan, Siberia, Asia centrală.

8. **G. petraea** (Baumg.) Rechb. Fl. germ. exc. III (1832) 801. — *Banffya petraea* Baumg. Enum. stirp. Transs. I (1816) 385. — *Gypsophila transsylvanica* Spreng. Syst. IV. Cur. post. (1827) 179. — Exs.: FRE nr. 629. — Ic.:

Plansa 30. — 1. *Gypsophila altissima* L. — 2. *G. glomerata* Pall., 2 a. două perechi de frunze tulpinale. — 3. *G. scorzonifolia* Ser., 3 a. o pereche de frunze.



Pl. 28, fig. 2; Pax Grundz. I (1898) 164, fig. 6a-c sub *G. transs*; Hay. Pflzdecke. (1916) 432; Römer Burzenländ. (1898) tab. 22.

4. Plantă suriu-verde, mică, tufoasă, de 4—10 cm înălțime, formând pernițe compacte. Rădăcina lemnoasă, multicapitată. Tulpinimici, erecte, rotunde, simple, viloase. Frunze liniare, \pm îngroșate, obtuziuscule, cele radicale cespitiforme, cele tulpinale opuse, sesile, amplexicaule, toate la bază violet nuanțate. Flori albe-trandafirii, în dichazii îngrămădite, fasciculat capitate; capitule de 1—2 cm diametru. Caliciu 5-partit. Petale 5. Stamine 10, dintre care 5 anterifere și 5 sterile. Stile 2, filiforme. Capsulă oblong-ovată, uniloculară, la vârf 4-valvulară, cu 1—4 semințe reniform globuloase, negre. VI—VIII.

Stațiunea. În etajul subalpin și alpin din Carpați, în locuri stâncoase.

Răsp. în țară: Mții Bistriței: Mt. Ceahlău, V. Bicazului. Mții Giurgeului: Surduc, Mt Ghilcoș, Piatra Glodului, Suhardul Mic, Munticelul, Hăghimașul Mare, Mt. «Öcsém». Mții Ciucașului: Ciucașul, Tesla. Mții Bârsei: Piatra Mare, Piatra Craiului. Mții Bucegi: Piatra Arsă, Jepi, Caraiman, Coștila, V. Cerbului, V. Mălăești, Bătrâna. Mții Făgărașului: Lespezi, Negoiu.

Răsp. gen.: Endemică în Carpații din R.P.R., mai ales pe stânci calcaroase.

Genul 98. TŪNICA *) Scop.

Fl. carn. I, ed. II (1772) 298, p.p., Mert. et Koch in Röhl. Deutschl. Fl. III, ed. III (1831) 182, ampl. A. Br. in Flora XXVI (1843) 384.

Plante ierboase, anuale sau perene, de statură diferită, cu flori dispuse în capitule, solitare, sau în inflorescențe paniculate, învelite cu scvame involucreale sau fără involucreu. Caliciu tubulos sau campanulat. Sepale 1—3-nervate, separate prin dungi membranose uscate. Petale cuneate, fără coronulă. Stamine 10. Stile 2. Ovar scurt pedicelat. Capsulă alungită, deschizându-se prin 4 dinți. Semințe în formă de scut.

Determinarea speciilor

- 1 a Plantă anuală. Caliciu alungit cilindric (tubulos). Unguicula petalelor foarte lungă. Floarea terminală, împreună cu cele laterale, învelite de 3 perechi de scvame involucreale, (cea internă acoperind complet caliciul) formează un capitul 1. **T. prolifera**
- 1 b Plante perene. Floarea solitară, învelită numai la bază de 2 perechi de scvame involucreale scurte sau fără scvame 2
- 2 a Caliciul ușor ciliat pe lacinii. Petale rozee, emarginate. Scvamele involucreale există 2. **T. saxifraga**
- 2 b Caliciul păros pe coaste. Petale albe, la bază roșu maculate. Scvamele involucreale lipsesc 3. **T. illyrica** ssp. **Haynaldiana**

*) Tunica, un fel de cămașă la Romani. Mai târziu se numeau astfel și glumele cerealelor. S'a dat acest nume pentru că sub flori se găsesc scvame membranoase.

1. **T. prolifera** (L.) Scop. Fl. carn. I ed. II (1772) 299. — *Dianthus prolifer* L. Sp. pl. ed. I (1753) 410. — *Kohlrauschia prolifera* Kunth Fl. Berol. I, ed. II (1838) 109; Gorschik. in Fl. U.R.S.S. VI (1936) 779, tab. LV, fig. 7. — **Exs.:** FRE nr. 401 a, b. — **Ic.:** Pl. 31, fig. 1.

○. Rădăcini subțiri, albe, purtând una, sau mai multe tulpini drepte, înalte de 30—50 cm, simple sau ușor ramificate în partea superioară, 4-unghiulare, glabre. Frunze liniare, late de 1—2 mm, acute, îngustate spre extremități, pe margini aspre, mai scurte decât internodiile tulpinale, concrescute la bază, cele superioare scvamiforme. Flori dispuse în capitule terminale, multiflore (rareori solitare) înconjurate de 3 perechi de scvame involucrale brune, uscate, membranoase, eliptice, ascuțite sau obtuze, cele interne acoperind complet caliciul. Caliciu tubulos, lung de 10—13 mm, roșcat, 5-nervat, la vârf membranos și neregulat 5-laciniat. Laciniile caliciului separate prin 5 dungi îngust membranoase. Petale mici, liliachii-roșiatice, emarginate, cu unguicula foarte lungă. Ovar alungit, cu 2 stile filiforme. Capsulă mai scurtă decât caliciul, umflându-se la maturitate și spărgând caliciul. Semințe turțite, late de 1,5 mm, fin brăzdate, îngust aripate. VI—IX.


Stațiune a. Pe coaste înșorite, uscate, pietroase, pe coline nisipoase sau calcaroase, prin locuri nisipoase.

Răsp. în țară: **Reg. Cluj:** Cozla (r. Jibou); Someșul Cald (r. Cluj); Cheia Turzii. Moldovenesti pe V. Arieșului (r. Turda); Zăul de Câmpie (r. Luduș). **Reg. Aut. M.:** Chinari (r. Tg. Mureș); Ideciu, Gurghiu (r. Reghin). **Reg. Stalin:** Orașul Stalin; Rupea; Saschiz. Sighișoara; Dârlos, Mediaș, Proștea Mică, Frâua (r. Mediaș); Nochrich (r. Agnita); Sibiu, Gușterița, Slimnic, Tâlmăciu; Sebeș pe Dl. Roșu. **Reg. Hunedoara:** Tăuț, Alba Iulia; Deva, Hărău, V. Streiului și afluenți dela Simeria (r. Deva) până la Pui (r. Hațeg); Hunedoara pe Dl. Căprița. **Reg. Oradea:** Oradea. **Reg. Arad:** Arad, Șiria, Măsca; Șoimoș, Troiaș pe V. Troiașului (r. Lipova) Pâncota, Mocrea (r. Ineu); Sebiș, Nădălbști, Baltele, Iosășel (r. Gurahonț). **Reg. Timișoara:** Băile Herculane. **Reg. Craiova:** Turnu Severin, Simian, Hinova. V. Topolniței; Strehăia; Craiova. **Reg. Pitești:** Călimănești, Jiblea (r. Brezoiu); Stolnici (r. Costești). **Reg. București:** București (Chitila); Comana (r. Vidra); Băneasa, Giurgiu. **Reg. Constanța:** Fetești; Medgidia; Babadag, Caugagia; Constanța; Independența (r. Ostrov). **Reg. Galați:** Măcin; Nifon, Niculițel, Tulcea, Beștepe.

Răsp. gen.: Europa de S și centrală, Africa de N, Caucaz.

2. **T. saxifraga** (L.) Scop. Fl. carn. I, ed. II (1772) 300. — *Dianthus Saxifragus* L. Sp. pl. ed. I (1753) 413; Gorschik. in Fl. U.R.S.S. VI (1936) 777, tab. LV, fig. 6. — **Ic.:** Pl. 31, fig. 2, 2a.

Planșa 31. — 1. *Tunica prolifera* (L.) Scop. — 2. *T. saxifraga* (L.) Scop., 2 a. o floare mărită. — 3. *T. illyrica* (Ard.) Fisch. et Mey., 3 a. o floare mărită.



24. Plantă de 10—35 cm, puțin glaucă. Tulpini culcate sau ascendente, de obicei ramificate dela bază, glabre sau puțin pubescente. Frunze foarte înguste, liniare, în partea de jos alipite de tulpină, în cea de sus încovoiate în afară. Flori solitare, evident pedunculate. Caliciu tubulos campanulat, lung de 4—5 mm, la bază purtând 2—5 bractee alb membranoase, ascuțite. Laciniile caliciului verzi sau albe-roșcate, separate prin dungi albe. Dinții caliciului obtuși, ușor ciliați. Petale liliachii deschise sau rozii, cu 4 nervuri, fără coronulă. Lamina petalelor lungă de 3—4 mm, emarginată. Stile 2, filiforme. Capsulă cuneat ovată, abia de lungimea caliciului, deschizându-se prin 5 valve. Semințe de forma scutului, umflate pe o parte, scobite pe cealaltă, brăzdate, lungi de 1 mm. VI—VII.

Stațiunea. Pe coaste pietroase, prin pajiști uscate și prundișuri, stânci, în regiunea montană și de coline.

Răsp în țară: *Reg. Cluj*: Bistrița. *Reg. Stalin*: Orașul Stalin. *Reg. Timișoara*: Băile Herculane, Svinița (r. Mehadia), Baziaș (r. Moldova Nouă). *Reg. Craiova*: Gura Văii, Vârciorova până la Schela Cladovei; Baia de Aramă pe V. Găinei.

Variabilitatea speciei

var. **scăbra** Schur in *ÖBZ XIX* (1869) 16. — Intreaga plantă scabră. — *Reg. Timișoara*: Pe Mt. Olimp deasupra Orșovei, Cazane între Plavișevița și Ogradena (r. Mehadia).

Răsp. gen.: Europa de S, Asia Mică, Caucaz, Armenia, Persia.

3. **T. illyrica** (Ard.) Fisch et Mey. in *Index sem. Hort. Petrop.* IV (1837) 49. — *Saponaria illyrica* Ard. *Animadv.* II (1764) XXIV, tab. 9. — **Exs.**: FEAH nr. 2863 sub *Haynald.* — **Ic.**: Pl. 31, fig. 3, 3a.

24. Tulpini numeroase, rigide, de 10—30 cm înălțime, glandulos vâscoase, dichotomic ramificate; ramificația mai adunată, ramurile mai viguroase, nepatente. Frunze liniar subulate, de 1 mm lățime și 1,5—2,5 cm lungime. Flori solitare, lipsite de scvame la bază. Caliciu liber, fără scvame, glandulos, de 4—5 mm lungime, cu dinți triunghiulari, acuti, mucronați. Lamina petalelor albă, la bază maculată cu roșu. Semințe alungite, aproape netede. VI—VII.

Stațiunea. Pe rupturi de coaste, drumuri pietroase.

La noi se întâlnește în următoarea subspecie:

ssp. **Haynaldiana** (Jka.). — *Gypsophila Haynaldiana* Jka. in *ÖBZ XX* (1870) 316. — *Tunica Haynaldiana* Borb. in *Just's Bot. Jahresb.* IV (1878) 1067.

Partea inferioară a tulpinii glabră. Caliciu glabru, pe coaste păros. Flori mai lung pedunculate, de obicei solitare.

Reg. Craiova: Porțile de Fier între Gura Văii și Vârciorova, frecventă (r. Tr. Severin).

Răsp. gen.: Italia, Balcani.

Genul 99. **VACCARIA** *) (DC.) Medik.

Phil. bot. I (1789) 96, Pax in Engl. et Prantl. Nat. Pflzfam. III, 1b (1889) 76. — *Saponaria* Sect. I *Vaccaria* DC. Prodr. I (1824) 365. — Floarea Călugărului.

Plante anuale cu frunze late. Caliciu cu 5 dungi aripate. Unguicula petalelor la mijloc cu o dungă îngustă.

V. pyramidata Medik. Phil. bot. I (1789) 96. — *Saponaria Vaccaria* L. Sp. pl. ed. I (1753) 409. — *Vaccaria segetalis* (Neck.) Garcke in Aschers. Fl. Prov. Brand. I (1864) 84; Gorschk. in Fl. U.R.S.S. VI (1936) 802 et Ic.: Pl. IV, f. 8. — **Exs.**: FRE nr. 2208. — **Ic.**: Pl. 25, fig. 2.

○. Rădăcină fusiformă. Tulpini erecte, glabre, de 30—65 cm, în partea superioară dichotomic ramificate. Frunze lanceolate, acute, concrescute la bază, cele superioare aproape cordate, glabre, albăstrui-glauce. Flori lung pedunculate, dispuse în dichazii laxe, ramificate. Caliciu umflat, lung de 12—17 mm, cu 5 dungi mai închise, glabru. Petale obovate, cuneate, emarginate, rozee, fără coronulă. Stamine 10. Stile 2. Capsulă globoasă, mult mai scurtă decât caliciul, deschizându-se prin 4 dinți. Stratul extern pergamentos al capsulei se desprinde la maturitate de cel intern, subțire. Semințe globoase, negre, sgrăbunțoase, late de 2 mm. VI.

Stațiunea. Prin semănături, ogoare, vii, pe lângă mori, gări, margini de drumuri.

Răsp. în țară: Sporadică aproape în întreaga țară, îndeosebi în partea de Nord. — *Reg. Cluj*: Beclean, Chiochiș; Gherla; Cluj, Cojocna, Apahida; între Turda și Săndulești, Cheia Turzii. *Reg. Stalin*: Racoșul de Jos (r. Rupea), *Reg. Oradea*: Oradea. *Reg. Timișoara*: citată de Heuffel din Banat fără localitate. *Reg. Craiova*: Craiova; Caracal. *Reg. București*: Titu, Ciocănești (r. Răcari); București; Comana (r. Vidra); Băneasa (r. Giurgiu), *Reg. Ploști*: Ploști, *Reg. Constanța*: Cernavoda, Medgidia. *Reg. Galați*: Măcin, Greci; Niculițel, Malcoci (r. Tulcea); *Reg. Bârlad*: Tecuci; Crângu (r. Bârlad). *Reg. Bacău*: Tg. Neamț.

*) Nume la Dodonaeus (Rembert Dodoens, 1517—1585), dela vacca (vacă), unele specii constituind un bun nutreț pentru vaci.

Variabilitatea speciei

ssp. **grandiflora** (Fisch.). — *Saponaria Vaccaria* β *grandiflora* Fisch. in DC. Prodr. I (1824) 365, pro var. — *V. pyr.* var *grandiflora* Čelak Sitzb. Böhm. Ges. Wiss. (1889) 490. — **Ic.**: Pl. 25, fig. 1.

Corolă lungă de 20—23 mm și lată de 5—6 mm. Lamina petalelor lungă de 6—8 mm, invers ovată, cca de lungimea caliciului; unguicula iese din caliciu. — Adeseori o găsim împreună cu specia tipică, însă este indicată din mai puține locuri.

Reg. Cluj: Cluj. *Reg. Aut. M.*: Tg. Mureș; Vâlcele (r. Sf. Gheorghe); Tg. Săcuiesc. *Reg. Arad*: Arad, Aradul Nou, Micălacă, Semlac; Șimand (r. Chișineu-Criș); Bocsig (r. Ineu). *Reg. Constanța*: Medgidia. *Reg. Galați*: Măcin, Greci.

Răsp. gen.: Eurasia, Australia, Noua Zeelanda. Adventivă în America de N.

Genul 100. **DIÁNTHUS** *) L.

Gen. pl. [ed. I (1737) 130, nr. 364], ed. V (1754) 191 nr. 500. — **G a r o a f ă**, **G a r o f i ț ă**.

Plante anuale, perene, rar semiarbuști, cu frunze înguste, adesea albastrii, unite la bază. Flori bisexuate, solitare, în capitule sau în dichazii laxe. Caliciu tubulos, 5-dințat, cu caliciu exterior format din 2—3 perechi de sevame involucale aristate. Petale roșietice sau rozee, rar albe, brusc îngustate într-o unguiculă lungă, aripată, fără coronulă. Lamina florilor răsfirată, cu marginea întreagă, dentată sau laciniată. Stamine 10. Stigmate 2. Capsulă deschizându-se în 4 clape. Semințe turtite, ovale sau lunguiețe, cu embrion drept, împărțind endospermul în două.

Determinarea speciilor

- | | | |
|-----|---|----------------------------|
| 1 a | Marginea petalelor dințată sau ușor crenată | 2 |
| 1 b | Marginea petalelor de obicei până la 1/3 parte, sau chiar și mai adânc fimbriată (excepție făcând <i>D. Simonkaianus</i> , care are flori albe, cu lamina pe margini crestată.) Flori solitare, dispuse la vârful tulpinii sau la vârful ramurilor laterale, \pm pedunculate. Caliciul de cca. 2 cm | 38 |
| 2 a | Petale palide (albe gălbui), sau palid gălbui, ușor crenate, până la întregi. Caliciu de 20—25 mm | 3 |
| 2 b | Petale roșii, de obicei sanguinee sau de culoare carmin-liliachie . . . | 4 |
| 3 a | Lamina petalelor cuneiformă, de 3—7 mm lățime și de 12—15 mm lungime, îngust oblong-liniară, la vârf retuză, cu dințișori foarte mici, pe față albă-gălbuie, pe dos plumburie. Plantă mai slab ramificată | 39. D. leptopetalus |

*) Derivat din cuvintele Dios-Zeus și anthos-floare, floarea lui Zeus, din cauza frumuseții sale.

- 3 b Lamina petalelor lată, cuneat obovată, la vârf emarginată, cu dințișori mici, obtuși, pe față albă, pe dos spălăcit verzuie. 38. **D. pallens**
- 4 a Flori ± sesile, adunate în capitule multiflore, sau uneori pauciflore, rar solitare. Caliciu înconjurat de 3 sau 2 perechi de scvame involu-
crale, în total 6, mai rar 4 5
- 4 b Flori ± pedunculat, așezate la vârful tulpinii sau la vârful ramurilor
laterale dichotomice. Caliciu înconjurat de 2—4 scvame involu-
crale și numai excepțional cu 4—6, când frunzele sunt filiforme, setacee,
mai înguste de 0,5 mm. 30
- 5 a Scvamele involu-
crale ale caliciului, împreună cu aristele, brunii des-
chise sau închise, uneori nearistate. Vagine de 2—6 ori mai lungi decât
lățimea frunzelor. Lamină liniară, cel mult de 5—7 mm lățime. Flori
glomerate (excepțional compuse din 2—4 glomerule) 6
- 5 b Scvamele caliciului de obicei verzi, rar roșii, terminate într'un vârf
alungit, aristat. Vagine rareori mai lungi decât lățimea frunzelor . . 21
- 6 a Plante de terenuri nisipoase. Dinții caliciului obtuși sau subacuți . . 7
- 6 b Plante de alte terenuri. Dinții caliciului acuți sau acumi-
nați, alungiți (*D. dobrogensis* are dinții caliciului scurți și obtuși) . . . 8
- 7 a Dinții caliciului foarte obtuși, aproape rotunjiți. Caliciu palid verzui
sau purpurescent, de 12—15 mm lungime. Capitule cu 1—3 flori
liliachii-roșietice 11. **D. diutinus**
- 7 b Dinții caliciului lanceolați, subacuți, la vârf mucronați. Caliciu palid
verde, verde-albăstrui sau verde-roșietic, lung de cca 8 mm. Capitule
cu 3—10 flori 24. **D. kladovanus**
- 8 a Frunze radicale și tulpinale de 0,5—1 (2) mm lățime 9
- 8 b Cel puțin frunzele radicale mai late; când și acestea sunt înguste,
atunci caliciul este de 4—5 mm lățime 10
- 9 a Caliciu de 12—15 mm lungime și de 3 mm lățime, verde la cele mai
multe exemplare, sau rar roșietic. Vagine de 2 ori mai lungi decât
lățimea frunzelor 18. **D. Henteri**
- 9 b Caliciu de 16—18 mm lungime. Vagine de 5—8 ori mai lungi decât
lățimea frunzelor 17. **D. pinifolius**
- 10 a Scvamele involu-
crale interne ale caliciului ovate sau cuneat obcor-
date, ± rotunjite, abrupt aristate; arista de 1—8 mm lungime. Scva-
mele externe de obicei mai înguste decât cele interne și brunii . . 11
- 10 b Scvamele interne ale caliciului de formă diferită, cele externe mai
mari și mai late decât cele interne 15
- 11 a Scvamele involu-
crale ale caliciului foarte late, negre-brunii și luci-
toare, la vârf emarginate sau subcordate, subulat aristate, adeseori
ajungând împreună cu aristele lungimea caliciului. Frunze de 0,5—1
mm lățime. Lamina petalelor de lungimea caliciului, de 8—12 mm
lungime 20. **D. tenuifolius**

- 11 b Scvamele caliciului nu așa de late. Frunze de 1—4 mm lățime . .12
- 12 a Scvamele involucrale ale caliciului pe margini evident hialin marginate, membranoase, uneori aproape în întregime hialine . . .13
- 12 b Scvamele caliciului brun întunecate, pe margini mai puțin membranoase. Lamina petalelor de obicei numai pe jumătate sau cât 1/3 parte a lungimii caliciului, de 5—10 mm lungime. Frunze late de 2—5 mm 14
- 13 a Scvamele involucrale ale caliciului lat ovate, până aproape subrotund ovate, cele externe lungi de 3,5—4,5 mm, late de 2—3,6 mm cu membrană foarte lată sau uneori aproape în întregime membranoase, obtuze sau scurt mucronate. Caliciu verde, de 9—10 (11) mm 22. **D. dobrogensis**
- 13 b Scvame lat ovate sau eliptice, acuminate și alungite într'o aristă îngustă, lungă de 1—2,5 mm; membrana lată de 1—1,5 mm. Caliciu lung de 16—18 mm, la vârf purpuriu 21 **D. Rehmanii**
- 14 a Tulpinile, nodurile, frunzele și scvamele caliciului ± glabre. Lamina petalelor purpurie sau roșie închisă, de lungimea caliciului (lung de 15—20 mm) sau 3/4 din lungimea lui 19. **D. carthusianorum**
- 14 b Tulpinile, nodurile și frunzele asperul puberule. Lamina petalelor de 5—10 mm, cu 2/3 mai scurtă decât unguicula 10. **D. puberulus**
- 15 a Scvame involucrale interne albe-verzui, albăstrui pruinoase, obovate, foarte obtuze, subulat aristate, coriacee, aproape cât jumătatea caliciului de lungi. Scvame involucrale externe foarte late, subconiforme, palide. Caliciu de 9—18 mm lungime. Lamina petalelor de 5 mm lungime, purpurie. Frunze supreme lanceolat dilatate la bază, cu vagina ventricooasă 23. **D. capitatus**
- 15 b Scvame involucrale interne de obicei brumate, netede, ± oblongi sau lat oblongi, la mijloc verzi, cele externe uneori nearistate . .16
- 16 a Scvamele involucrale ale caliciului laxe, cele interne abrupt terminate într'o aristă scurtă; toate scvamele ondulate pe margini. Lamina petalelor cca de 6—8 mm lungime 15. **D. banaticus**
- 16 b Scvame alipite de caliciu. Lamină lungă de 3—6 mm 17
- 17 a Scvame involucrale brunii deschise, de obicei ovate lanceolate, glabre, scurt aristate sau cele interne obtuze, cu margini membranoase. Caliciu cca de 1 cm lungime. Lamina petalelor purpurie sau liliachie, de 3—4 (—6) mm lungime și lată de 2—3 mm, numai cu puțin mai lungă decât unguicula. Glomerule cu mai mult de 10 flori 18
- 17 b Scvame, îndeosebi cele externe, alburii sau palide, scurt aristate, cele interne ± nearistate. Lamina petalelor de obicei cât 1/2 din lungimea caliciului sau și mai scurtă 19
- 18 a Plantă glabră, cel mult slab scabrescentă, sveltă. Frunze rigide, mai înguste, puțin glauce. Capitule cu mai mult de 10 flori liliachii 12. **D. Pontederac**

- 18 b Plantă păroasă, indeosebi în partea inferioară lung păroasă atât pe frunze cât și pe tulpină 13. **D. urziceiensis**
- 19 a Frunze inferioare foarte înguste, de 0,5 mm lățime, cele superioare late de 1 mm, toate convolute pe margini, foarte acute. Scvamele involucale ale caliciului de culoare alburie. Capitule multiflore, globoase 25. **D. Vandasii**
- 19 b Frunze inferioare și superioare mai late, de obicei plane (sau puțin convolute) 20
- 20 a Capitule cu 3—20 flori. Caliciu de 13—15 mm lungime, cu scvame interne aproape nearistate, scurt acuminate, la vârf brunii. Frunze bazale setacee, cele tulpinale late de 3—5 mm, puțin convolute 14. **D. giganteiformis**
- 20 b Capitule multiflore. Caliciu mai lung de 1,8 cm, roșietic, cu scvame interne nearistate, acute, la vârf roșietice. Plantă robustă, mai înaltă de 50 cm, cu frunze tulpinale de 3 (5—7) mm lățime. 16. **D. giganteus**
- 21 a Specii anuale sau bianuale, lipsite de frunze sterile. Scvamele involucale ale caliciului uneori mai lungi decât caliciul. Tulpină adeseori ramificată și \pm pubescentă. Frunze îngust liniar-subulate, liniare sau liniar lanceolate, de cca 3—5 mm lățime, mai adeseori obtuziuscule 22
- 21 b Specii perene. Scvamele caliciului glabre, cel mult împreună cu tulpina mărunț pubescent scabre sau ciliate. Frunze lung acuminate. Vaginele frunzelor scurte, lungi cel mult cât lățimea frunzelor 24
- 22 a Petale mici, de 3 mm lungime și 2 mm lățime, obovate, rozee. Flori indesuit fasciculate. Caliciu glabru, de 15—17 mm lungime și 3 mm lățime 3. **D. pseudarmeria**
- 22 b Petale mai mari. Flori mai lax fasciculate și nu indesuit fasciculate. Caliciul și întreaga plantă \pm păroasă, de statură înaltă 23
- 23 a Scvamele involucale ale caliciului ierbacee, verzi, lanceolat subulate, împreună cu bracteele, hirsute. Scvame de lungimea caliciului. Caliciu de 13—25 mm lungime, dens pubescent. Flori roșii deschise, punctate 1. **D. Armeria**
- 23 b Scvamele caliciului mai adeseori roșietice, ovate, terminate într-o aristă mai lungă decât caliciul. Caliciul lung de 16—20 mm, pubescent. Flori întunecat purpurii 2. **D. armeriastrum**
- 24 a Flori adunate în 3 fascicule terminale, scurt pedicelate. Frunze cu 5 sau mai multe nervuri 25
- 24 b Flori adunate în 2 fascicule terminale. Frunze de obicei 3—5-nervate 28
- 25 a Frunzele nu sunt reticulat-nervate; nervurile sunt numai longitudinale 26
- 25 b Frunze reticulat nervate, late de 0,5—2 cm 27

- 26 a Frunze glabre, netede și numai pe margini scabre, liniar lanceolate, 5—7-paralel nervate, cele inferioare de 5—10 (foarte rar de 20) mm lățime, mai late deasupra bazei. Scvamele involucrale ale caliciului ierbacee, se continuă într'o aristă mai lungă decât partea lată a scvamei. Scvame setacee, de lungimea caliciului, plane, sub aristă multinerve, netede și numai pe margini scabre. Caliciu lung. Tulpini florifere fără frunze sterile. Petale mari, roșii . . . 6. **D. trifasciculatus**
- 26 b Frunze și tulpini scabre sau scabru puberule, liniar lanceolate, 9-nervate, late de 4—10 mm. Scvamele involucrale ale caliciului tari, cu aristă tare, groasă, \pm convolute. Caliciu scurt, de 10—11 mm lungime. Petale mici, liliachii, lungi de 4 mm și late de 5 mm
7. **D. deserti**
- 27 a Lamina petalelor purpuriu deschisă sau închisă. Caliciul și scvamele involucrale verzi. Frunze sesile . . . 4. **D. barbatus**
- 27 b Lamina petalelor de un purpuriu mai închis. Caliciul împreună cu scvamele sale involucrale purpuriu-brun sau albăstriu închis. Frunze atenuate în petiol . . . 5. **D. compactus**
- 28 a Tulpini și frunze scabriuscul pubescente. Frunze îndesuite, liniar lanceolate, îndeosebi pe margini și pe nervura mijlocie mai evident pubescente; cele inferioare de 5—8 mm lățime, cele mijlocii și superioare late de 3—5 mm. Lamina petalelor de 7—12 mm lungime, la bază barbulată și maculată. Caliciu de 14—18 mm lungime, verde palid sau la vârf slab purpuriu, cu scvamele involucrale membranoase la bază și terminate într'un vârf ierbaceu . . . 31. **D. collinus**
- 28 b Tulpini și frunze glabre și netede, numai pe margini scabriuscul ciliate. Frunze îngust sau lat lanceolate și drepte (erecte). Inflorescență furcată, redusă sau mare, cu câte 2—3 flori într'un capitul. Scvame acute, cu mult mai scurte decât caliciul . . . 29
- 29 a Inflorescență furcată, redusă, cu flori mai puține. Frunze îngust lanceolate. Caliciul împreună cu scvamele involucrale de obicei roșietice; atât dinții caliciului, cât și scvamele mai înguste. Plantă de un verde viu . . . 8. **D. glabriusculus**
- 29 b Inflorescență furcată sau corimboasă, extinsă, compusă din flori numeroase. Frunze \pm lat lanceolate. Caliciul, împreună cu scvamele, sunt mai late. . . 9. **D. Piatra-Neamtzui**
- 30 a Frunze de 0,5—1 mm lățime, setacee, rigide. Scvamele involucrale ale caliciului 4—6, palide brunii. Petale deschis purpurii. Plantă tufoasă, mică (—10 cm), cenușiu-sur-glaucă . . . 37. **D. nardiformis**
- 30 b Frunze mai late, mai moi, nu sunt setacee . . . 31
- 31 a Tulpină înaltă de 30—50 cm, în partea superioară totdeauna ramificată, adeseori dichotomic ramificată, cu ramuri uniflore, excepțional între ele și ramuri cu 2—3 flori. Caliciu de obicei verde, mai rar roșietic. Plante glabre, scabre sau fin pubescent scabre . . . 32
- 31 b Tulpină de 10—20 cm înălțime, neramificată, rar cu 2—3 flori, cu caliciu purpuriu închis. Lamina petalelor barbată . . . 36

- 32 a Plante \pm scabre, pubescente. Scvame involucrale cât jumătatea caliciului sau mai scurte. Frunze late de 1,5 — 3 mm 33
- 32 b Plante glabre, cel mult frunzele pe margini scabriusculă, mai rar scabre pe nervuri. Scvame de lungimea caliciului sau numai cu puțin mai scurte. Flori rozee. Frunze late de 3—4 mm 35
- 33 a Scvamele involucrale ale caliciului 2, eliptice, aristate, de obicei mai scurte decât jumătatea caliciului, mai rar de lungimea acestuia 32. **D. deltoides**
- 33 b Scvamele involucrale ale caliciului 4—6, cât jumătatea caliciului de lungi 34
- 34 a Plantă debilă, mică, de 15—20 (—35) cm înălțime. Frunze și tulpini \pm rigide, disparent pubescent scabre. Vaginele frunzelor scurte. Toate frunzele 3-nervate 35 **D. campestris**
- 34 b Plantă relativ mai robustă, de 30—46 cm înălțime, numai mărunț scabriusculă. Vaginele frunzelor mai lungi de 5—10 mm. Toate frunzele 5-nervate 36. **D. Șerbanii**
- 35 a Scvamele involucrale ale caliciului contrase într'o aristă verde aproape cât caliciul de lungă sau mai lungă 34. **D. guttatus**
- 35 b Scvamele involucrale ale caliciului contrase într'o aristă mai scurtă decât caliciul 33. **D. Racovitzae**
- 36 a Frunze liniar lanceolate, acute, spre bază mai late. Lamina petalelor roșie carmin, cu o zonă barbulată, cu macule deschise și închise 42. **D. callizonus**
- 36 b Frunzele inferioare, de regulă liniar-spatulate, spre vârf mai late 37
- 37 a Vagina frunzelor de lungimea lățimii frunzei sau mai lungă. Lamina petalelor lungă de 5—10 mm și lată de 4—7 mm, invers ovată, \pm rotunjită 40. **D. glacialis**
- 37 b Vagina frunzelor foarte scurtă. Lamina petalelor lungă de 10—12 mm și tot atât de lată, triunghiular obovată, în partea anterioară aproape trunchiată, mai adânc dințată 41. **D. gelidus**
- 38 a Lamina petalelor aproape până la bază fimbriat divizată, albă sau roză, de 15—20 mm lungime, la bază barbată, cu peri liliachii. Frunze de 3—10 mm lățime 26. **D. superbus**
- 38 b Lamina petalelor cel mult pe jumătate fimbriată. Frunze mai înguste, de 0,5—3 mm lățime, paralel nervate, plane 39
- 39 a Lamina petalelor numai până la 1/3 parte fimbriată, numai excepțional \pm întreagă, la gât barbulată 40
- 39 b Lamina petalelor crenat dințată sau \pm întreagă, numai excepțional fidată până la 1/3 parte; în cazul acesta, frunzele proporțional dilatate spre bază. Lamina petalelor albă, la bază glabră. Plante de culoare verde vie 41

- 40 a Caliciu lung de 25 mm și lat de 3—4 mm, de obicei palid galben. Lamina petalelor de 1—1,5 cm lungime, abia până la 1/3 parte digitat multifidată, albă. Flori solitare 27. *D. serotinus*
- 40 b Caliciu mai adeseori de 4 (rar 5) mm lățime. Lamina petalelor albă sau rozee, de 1—2 cm lungime, până la 1/3 —1/2 parte laciniată; laciniiile bi- sau trifide, cu areola medie de sub lacinii ovată, la bază barbulată 28. *D. spiculifolius*
- 41 a Lamina petalelor de 4—8 mm lungime, pe margine crenată, se ridică mult din caliciu. Frunze de 2 cm lungime, rigide, la vârf înțepătoare 29. *D. Simonkaianus*
- 41 b Lamina petalelor mai lungă, lat romboidală (laminele petalelor formează un cerc închis), de 1 cm lungime, până la 1/3 parte digitat multifidată 30. *D. Kitaibelii*

Secția I. *ARMERIUM* F.N. Williams in Journ. of Bot. XXII (1885) 340.

Plante anuale cu tulpina cilindrică. Bracteele de sub flori, ca și cele 2 scvame calicine externe, ierboase. Caliciu cu dinți prevăzuți cu 9—11 nervuri. Petale fin barbulate.

1. *D. Arméria* L. Sp. pl. ed. I (1753) 410; Schischk. in Fl. U.R.S.S. VI (1936) 812. tab. 44, fig. 2. — *Ic.*: Pl. 32, fig. 1.

○. Rădăcină fusiformă. Tulpini erecte, rigide, de 30—45 (80) cm înălțime, cilindrice, simple sau puțin ramificate în partea superioară, aspru păroase. Frunze liniar lanceolate, late de 1—3 mm, 3—5-nervate, obtuze, scurt păroase, pe margini scabre, sesile, cu teacă (vagină) scurtă. Flori sesile sau scurt pedunculate, reunite câte 2—10 într'un fascicul dens de forma evantaiului. Bractei lanceolat subulate, aspre, brăzdate, ierbacee. Scvamele involucrale ale caliciului de lungimea tubului acestuia, ierbacee, verzi, lanceolat subulate, hirsute. Caliciu de 13—20 mm lungime, cilindric, îngustându-se spre vârf, dens pubescent, verde sau roșcat, cu dungi lunguiețe. Corolă roșie deschisă cu petale alungit obovate, cu puncte mai închise, în partea anterioară paucidentate. Unguiculă albă. Capsulă de lungimea caliciului. Semințe late de 1,5 mm. VI—VII.

Stațiunea. La marginea pădurilor, prin livezi, prin păduri mai rare, prin vii, etc.

Răsp. în țară: Sporadică în întreaga țară, dela câmpie până în regiunea sub-alpină.

Variabilitatea speciei

f. *glaber* Scholtz Fl. Bresl. (1843) 142. — *D. Armeria* L. β. *laevis* Heuff. in Verh. ZBG Wien XIII (1858) 68. — Tulpină glabră, cu excepția părții superioare slab pubescentă. — *Reg. Cluj*: Feleac, Cluj. *Reg. Aut. M.*: Băile «Szejke» lângă Odorhei. *Reg. Oradea*: Beiuș. *Reg. Timișoara*: Berzasca pe V. Berzasca (r. Mehadia). *Reg. Pitești*: Valea Brazilor (r. Curtea de Argeș).

f. *grandilimbis* Zap. Consp. Fl. Galic. crit. III (1911) 107. — Petale mari. — *Reg. Stalin*: Predeal.

Răsp. gen.: Europa centrală și sudică, Transcaucasia.

2. *D. armériastrum* Wolfn. in ÖBZ VIII (1858) 318. — **Exs.**: FEAH nr. 2499, FRE nr. 1693 pro *D. Armeria* var. — **Ic.**: Pl. 32, fig. 2.

☉. Plantă asemănătoare cu precedentă, însă cu statură mai viguroasă, mai divaricat ramificată. Scvamele interne ale caliciului lat marginate la bază, cele următoare mai adeseori roșietice, ovate, terminate într'o aristă mai lungă decât caliciul. Flori întunecat purpurii. Caliciu lung de 16—20 mm, pubescent. Dinții caliciului mai subțiri, abrupt aristat acumițați. Lamina petalelor obovată, cuneată, de 6—8 mm lungime și 4—5 mm lățime, în partea anterioară evident dințată, pe dos adeseori gălbuie, pe față întunecat purpurie. VI—VII.

Stațiunea. Livezi, margini de pădure, la câmpie și dealuri.

Răsp. în țară: *Reg. Cluj*: Aiud. *Reg. Hunedoara*: Cetatea Bolii la Petroșani. *Reg. Arad*: Lipova. *Reg. Timișoara*: Oravița (la Marila). *Reg. Pitești*: Govora (r. Râm. Vâlcea).

Variabilitatea speciei

f. *glăber* (Vand.) — *D. corymbosus* Sibth β. *glaber* Vand. in ÖBZ XXXVIII (1888) 333. — Caliciu glabru. Scvame calicine și frunze pubescente. — *Reg. Constanța*: Jurilovca (r. Babadag).

f. *glaberrimus* (Urum.). — *D. Armeriastrum* γ *glaberrimus* Urum. in ÖBZ L (1900) 15. — Intreagă plantă glabră. — Indicată de Urumov din Dobrogea, fără localitate.

f. *glandulosus* Hay. Prodr. Fl. Balc. I (1927) 225. — Plantă ± glanduloasă. — *Reg. Galați*: Tulcea.

Răsp. gen.: Europa de S.

3. *D. pseudarméria* M.B. Fl. taur.-cauc. I (1868) 323; Schishk. in Fl. U.R.S.S. VI (1936) 812, tab. LI, fig. 3. — **Exs.**: FRE nr. 1694 sub ssp. *dobr.* — **Ic.**: Pl. 32, fig. 3; Prod. Consp. I (1935) Pl. XXVII.

☉, ☉. Plantă lipsită de frunze sterile, cu tulpină mai adesea ramificată, de 20—40 cm înălțime, scurt pubescentă, erectă, rigidă. Frunze liniar subulate, late de 3 mm, pubescent scabre. Flori îndesuit fasciculate. Scvamele involucrale ale caliciului ovat subulate, pubescent scabre. Caliciu glabru, de 15—17 mm lungime și 3 mm lățime, cu dinții aristați, pe margini glabri,

Plansa 32. — 1. *Dianthus Armeria* L., 1a. caliciu și o petală. — 2. *D. armeriastrum* Wolfn., 2a. caliciu și o petală. — 3. *D. pseudarmeria* M.B.



L.

lat coriaceu marginati. Scvamele involucrale ale caliciului ovate, terminate in arista acuta, aproape de lungimea caliciului. Petale mici, de 3 mm lungime si 2 mm latime, obovate, rozee sau spalacit rozee. VI—VII.

Stațiunea. Locuri uscate, pietroase si nisipoase.

Răsp. în țară: *Reg. Constanța*: Cernavoda, Medgidia; Murfatlar (r. Constanța); Hârșova, Ciobanul; între Babadag și Caugagia, Jurilovca la Capul Dolojman. *Reg. Galați*: Greci, Cerna.

Variabilitatea speciei

ssp. *dobrogensis* Borza et Nyár. in Bul. Grăd. Bot. Cluj XVIII (1938) 40. — Exs.: FRE. nr. 1694.

Caliciul aproape glabru, dispers și scurt scabru pubescent.

Reg. Galați: Măcin pe Dl. Pricopan, între Greci și Cerna.

f. *microcalyx* Prod. f. nova in Add. pag. 666. — Caliciu lung de 10—11 mm și 2 mm latime. — *Reg. Galați*: Măcin.

Răsp. gen.: Pen. Balcanică, U.R.S.S. de S, Transcaucasia.

Secția II. CARTHUSIANI Boiss. Fl. or. I (1867) 481, 509. — Sect. *Carthusianum* F.N. Williams in Journ. of Bot. XXIII (1885) 341.

Plante perene. Scvamele involucrale calicine, ca și bracteele de sub inflorescență, membranoase până la pielose, foarte rar ierbacee. Inflorescență capitată. Flori sesile. Caliciu striat. Lamina petalelor rozee până la purpurie.

4. *D. barbatus* L. Sp. pl. ed. I (1753) 409; Schischk. in Fl. U.R.S.S. VI (1936) 821. — Garofițe de grădină. — Szakállas szegfű. — Bart-Nelke. — Гвоздика бородатая. — Ic.: Pl. 33, fig. 1.

4. Plantă de 30—70 cm înălțime, cu colet puternic din care iau naștere una sau mai multe tulpini erecte, rotunde, distanțat foliate, simple sau ramificate în partea superioară. Frunzele lat ovate lanceolate, late de 5—18 mm, subțindu-se spre extremități, multinervate, sesile, reticulat nervate, pe margini ± aspre. Flori scurt pedicelate, câte 3—30 dens fasciculate, învelite de bractee îngust liniare, ascuțite, reflecte, pe margini ± aspre. Scvame involucrale calicine de obicei 4, cu vârf setaceu, de lungimea tubului caliciului, erecte sau puțin reflexe. Caliciu cilindric, lung de 15—18 mm, ușor nervat, verde, la vârf de obicei violet, glabru. Dinții caliciului îngust liniari, setaceu ascuțiți la vârf. Petale purpurii închise sau deschise, pătate sau barbete. Lamină obovată, triunghiulară, în partea anterioară dințată. Capsulă în partea de jos puțin dilatăată. VI—VIII.

Stațiunea. La margini de păduri, prin tufișuri, poieni. Cultivată și spontană.

Răsp. în țară: *Reg. Cluj*: subspontană în Mt. Țibleș; Cluj (sălbătică pe malul Someșului și la Făget), Someșul Cald.

Răsp. gen.: Europa de S, U.R.S.S. centrală și sudică.

Intrebuințări. Mult cultivată prin grădinile noastre ca plantă ornamentală.

5. **D. compactus** Kit. in Schult. Österr. Fl. I, ed. II (1814) 654. — *D. barbatus* Baumg. Enum. stirp. Transs. I (1816) 387 et Auct. Transs. non L. — Garoafe. — Tömöttvirágú szegfű. — Kopfige-Nelke. — **Exs.**: FRE nr. 148; FEAH nr. 2501; HN nr. 5434. — **Ic.**: Pl. 33, fig. 2; Pax Grundz. I (1898) 152 fig. 4A; Hay. Pflzdecke (1916) 30.

24. Plantă înaltă până la 45 cm, glabră sau în parteă superioară scurt păroasă. Frunzele inovațiunilor oblong lanceolate, atenuate în pețiol, cele tulpinale lanceolate, reticulat nervate, pe margini serulat scabre. Vagine de două ori mai scurte decât lățimea frunzelor. Toate frunzele 5—7-nervate. Inflorescență fasciculat agregată. Bractei ovate, foliacei, accentuat patente, flexuoase. Flori mari, palid purpurii. Scvame involucale calicine ierbacee, purpurii-brune sau albăstriei închise, ovate, subit îngustate și lung aristate; aristele de lungimea caliciului sau și puțin mai lungi. Caliciu lung de 1,4—1,7 cm, purpuriu-brun sau albăstriei închis, cu dinți îngust lanceolați și ciliați. Petale de 1,5—1,7 cm lungime, cu lamina lungă de 7 mm, de un purpuriu mai închis. Semințe de 2 mm lungime. VII.

Stațiunea. În locuri ierboase, pietroase, din regiunea montană și subalpină.

Răsp. în țară: *Reg. Baia Mare*: Mții Gutinului (Gutinul și Mt. Rojali); Mții Țibleșului; Vișeu de Sus, Mții Rodnei: Corhele Pietrosului, Pietrosul Mare, Păltiniș. *Reg. Cluj*: Mții Rodnei (Corongiș, Inău) Valea Vinului, între Rodna și Șanț (r. Năsăud); Mții Bihorului: Piatra Arsă lângă Vlădeasa; V. Cepilor sub Vf. Curcubeta; Someșul Rece (r. Cluj); Vidra de Sus la Poeni (r. Câmpeni). *Reg. Aut. M.*: Mții Călimani, Lunca Bradului, Răstolița, Bilbor (r. Toplița); Gurghiu (r. Reghin), Mții Gurghiului (Măgura); Mții Giurgeului (Hăghimașul Mare). *Reg. Stalin*: Mții Bucegi, Mt. Piatra Craiului, Mții Făgărașului: Arpașul, Creasta Tărăța, V. Bălei, V. Doamnei, Negoiu, Scara, Ciortea. *Reg. Hunedoara*: Mții Retezatului (Gropița, Custura). *Reg. Timișoara*: Mt. Țarcu la Groapa Bistra. *Reg. Pitești*: Mții Făgărașului: Capra Buda, Râiosul, Podeanul sub Negoiu. *Reg. Ploiești*: Mții Bucegi: Piatra Arsă, Jepi Mari, Jepii Mici. *Reg. Bacău*: V. Tarcăului la Gura Pâr. Brateș.

Variabilitatea speciei

f. **prelucianus** F. N. Williams in Journ. of Bot. XXIV (1886) 301. — Flori palid verzi. Caliciul verde. Ariste ± recurbate. — *Reg. Aut. M.*: Gurghiu (r. Reghin).

Planșa 33. — 1. *Dianthus barbatus* L. — 2. *D. compactus* Kit. — 3. *D. pinifolius* Sibth. et Sm. ssp. *serbicus* (Wettst.).



D.

D

f. *ramosus* Ujv. in Scripta Bot. Mus. Transs. (1944) 46. — Tulpină ramificată în partea superioară, cu ramuri lungi de 12 cm. — *Reg. Cluj*: Mții Gilăului.

f. *virescens* Zap. Consp. Fl. Galic. crit. III (1911) 138. — Caliciul și scvamele externe roșietic-verzui, ambele \pm ierbacee. — *Reg. Ploști*: Mții Bucegi.

f. *umbrósus* Nyár. in Bul. de Inf. Grăd. Bot. Cluj II (1922) 27 Adnot. ad Sched. FRE nr. 148. — Frunze mai late, mai grosicioare; inflorescență mai lată. — *Reg. Aut. M.*: Deda, Răstolița (r. Toplița).

f. *subbarbátus* (Schur) Blocki in ÖBZ XXXI (1881) 149. — *D. subbarbatus* Schur in ÖBZ XI (1861) 21. — Inflorescență laxă și paucifloră. — *Mții Rodnei*: Pietrosul.

f. *măjor* Zap. l. c. — Inflorescență multifloră. Plantă înaltă de 60 cm, cu 6 tulpini. — *Reg. Stalin*: Mții Făgărașului lângă Lacul Bălea.

f. *pocutimarmarosiensis* Zap. l. c. — Plantă înaltă de 25 — 40 cm. Caliciu lung de 1 — 1,3 cm. Petale de 4 mm lungime. Scvame involucale calicine externe 5, cele interne de 6 mm lungime. — *Reg. Baia Mare*: Mt. Piatra Albă.

Răsp. gen.: Alpii estici, Apenini, Balcanii nordici, Carpații sud-estici.

6. *D. trifasciculátus* Kit. in Schult. Öst. Fl. I, ed. II (1814) 654. — *Exs.*: FEAH nr. 2502, nr. I, II, nr. 2503, sub *D. transs.*; FRE nr. 240, a, b. — *Ic.*: Pl. 34, fig. 1.

4. Tulpină dreaptă, de 30—40 (70) cm înălțime, slab păroasă, la vârf foarte scurt trifidă, cu florile în trei fascicule terminale agregate. Tulpinele florifere fără frunze sterile. Frunze late de 4—10 mm, lat liniar lanceolate, atenuat acuminate, 7-nervate (sau 7—9-nervate), cu nervuri longitudinale (nu sunt reticulate), lungi de 7 cm, cu vagine lungi cât lățimea frunzelor, sau și mai scurte. Inflorescență compusă din 3 fascicule, terminate în capitule pauciflore (fiecare capitul compus din 6—8 flori). Scvame involucale calicine cilindrice, \pm ovate sau lanceolat subulate, ierbacee, plane, netede, pe margini scabre, se continuă în ariste mai lungi decât partea lată a scvamei, lungi cât tubul caliciului sau mai scurte. Frunzele de sub inflorescență de lungimea capitulelor, sau și mai lungi. Caliciu lung de 16 mm. Corolă expansă, de 10—20 mm în diam. Petale mari, obovate, de două ori mai scurte decât unguiculele, dințate, roșii. VII—IX.

Stațiunea. Pe coline sau în tufișuri, în regiunea de câmpie, urcându-se până în regiunea subalpină.

Răsp. în țară: *Reg. Cluj*: Sucutard, Țaga (r. Gherla); Cluj; Ajud, Băgău. *Reg. Stalin*: Arpașul de Sus (r. Făgăraș); Sibiu, Tâlmăciu, Sadu, Cisnădioara pe Mt. «Götzenberg», Rășinari, Gura Râului, Pasul Turnu Roșu, V. Lotrioarei din Mții Sibiului (r. Sibiu); Mercurea (r. Sebeș); Șeica Mare (r. Mediaș). *Reg. Oradea*: Mții Bihorului: V. Drăganului sub Mt. Vlădeasa. *Reg. Arad*: Arad, Șiria, Covășinț; Cuvin, Păuliș, Cladova (Lipova); Arăneag (r. Ineu). *Reg. Timișoara*: Lugoj; Dognecea (r. Reșița); Oravița; Mehadia, Băile Herculane, V. Cernei, Defileul Dunărei. *Reg. Craiova*: Cerneți pe V. Topolnicei (r. Tr. Severin) Tismana; V. Jiului la Pasul Lainici. *Reg. Pitești*: Căneni, Râul Vadului (r. Brezoiu).

Variabilitatea speciei

f. *nānus-pauciflorus* (Brandza). — *D. trifasciculatus* Kit. β. *nānus pauciflorus* Brandza Prodr. Fl. Rom. (1879—83) 192. — Cu port scurt și flori puține. — *Reg. Pitești*: Râmn. Vâlcea; Căineni. *Reg. București*: București (Chitila). *Reg. Bacău*: Mrea Agapia pe Dl. Pahoniei (r. Tg. Neamț); Comănești (r. Moinești).

var. *heptaneurus* (Griseb. et Schenk) F. N. Williams in Journ. of Bot. XXIII (1885) 340. — *D. heptaneurus* Griseb. et Schenk in Wiegand. Arch. XVIII, 1 (1852) 303. — *D. transilvanicus* Schur Sert. (1853) 11; n. nud. et in Verh. SVN V (1854) 82 descr. — **Exs.**: FEAH nr. 2503 sub *D. transs.* — Asemănătoare cu *D. trifasciculatus*, dar cu vagina frunzelor mai scurtă. — *Reg. Cluj*: Aiud. *Reg. Craiova*: Bălcești (r. Novaci); Simnic, Cârcea (r. Craiova); Popânzălești (r. Balș). *Reg. Pitești*: Drăgășani pe Dl. Oltului; Stolnici (r. Costești); Morteni, Vultureanca (r. Găești). *Reg. București*: Ciocănești (r. Răcari); Comana (r. Vidra); Băneasa (r. Giurgiu).

var. *Odobăscae* Prod. in Bul. Soc. Șt. Cluj, X, 2 (1948) 156. — Diferă de tip prin frunzele înguste, de 3—4 mm lățime, cu vagina lungă de 8—10 mm. Caliciu verde, lung de 2,5 cm. — *Reg. Bârlad*: Odobasca-Cotești (r. Focșani).

Răsp. gen.: Alpini estici, Apenini, Balcanii nordici.

7. *D. deserti* Prod. nova comb. — *D. trifasciculatus* Kit. var. *deserti* Prod. in Bul. Soc. Șt. Cluj X, 2 (1948) 156. — **Ic.**: Pl. 34 fig. 2.

4. Rizom lemnos, emițând numeroase tulpini, înalte de 50—70 cm, subțiri, puberule, în partea superioară ramificate sau neramificate. Frunze liniare sau lanceolate, late de 4—10 mm și lungi de 11—13 cm, glabre sau mărunț puberule, cu 9 nervuri principale și 9 nervuri secundare. Vagina frunzelor de 9—10 mm lungime. Capitule multiflore. Frunze involucale verzi, îngust lanceolate, de lungimea florilor. Scvamele involucale calicine externe de 11 mm lungime, aristate; arista tare, scabă, lungă de 6 mm și ± convolută. Scvamele involucale calicine interne 4, membranoase, albe, la mijloc liliachii, liniare, de 8 mm lungime (arista de 4 mm) și de 4 mm lățime. Foliole fulcrante verzi, de 27 mm lungime, la bază late de 2 mm. Caliciu lung de 10—11 mm, în partea superioară purpurescent, lat de 2 mm, dințat, cu dinții acumițați. Lamina petalelor lungă de 4 mm și lată de 5 mm, liliachie; unguicula lungă de 2 mm, cu margini dințate. VI—VII.

Stațiunea. In locuri ierboase, poieni, margini de păduri, îndeosebi la șes (in băragane). Endemism.

Răsp. în țară: *Reg. Craiova*: Craiova in Parc, Simnic; între Dobrosloveni și Chișle (r. Caracal). *Reg. București*: București (Chitila); Brănești.

Obs: *D. deserti* Prod. diferă de *D. trifasciculatus*, care crește mai mult in părțile păduroase ale țării, prin frunzele multinervate, mai sus de mijloc dilatate și groase, prin capitulele multiflore și scvamele calicine colorate, mai lungi și mai înguste și prin caliciul de 3 ori mai scurt și mai îngust decât la *D. trifasciculatus*.

8. *D. glabriusculus* (Kit.) Borb. in Verh. BV Brand. XIX Abh. (1877)
 19. — *D. collinus* β *glabriusculus* Kit. in Linn. XXXII (1863) 528. — **Exs.:**
 HN nr. 5431; FHE nr. 551; FRE nr. 248. — **Ic.:** Pl. 34, fig. 3, 3a, 3b.

24. Plantă de un verde viu, mai rar sur-verzuie, înaltă de 30—60 (80) cm. Tulpină erectă, cilindrică sau în partea superioară neînsemnat unghiulară, glabră și netedă. Frunze \pm rigide, îngust lanceolate până la lat lanceolate, spre bază puțin îngustate, spre vârf contrase într'o prelungire lung acuminată, lungi de 7 cm și late de 4—6 mm, 5-nervate, glabre, numai pe margini scabriuscul ciliate. Vagina frunzelor lungă de 2—4 mm. Inflorescență furcată, cu flori puține. Sevamele involucreale externe pieiloase sau foliacee, de culoare roșietică sau brunio-roșietică, la vârf adeseori purpurii, pe margini \pm ciliate, din baza lanceolată contrase într'un vârf lanceolat și subțiat, cât jumătatea caliciului sau mai lung. Caliciu de 1,5—1,7 cm lungime, la vârf puțin mai subțiat, roșietic, purpuriu intunecat sau spre bază verde, cu dinți ovat lanceolați, până la lanceolați și acuți. Lamina florilor de 1—1,4 cm lungime, lat invers ovată, la bază purpurie, pătată și barbată. Semințe lungi de 2—2,6 mm. VII—IX.

Stațiunea. Locuri ierboase, margini de păduri, poieni, rărituri, în regiunea de câmpie și montană inferioară.

Răsp. în țară: *Reg. Baia Mare:* Satu-Mare. *Reg. Cluj:* Nimigea (r. Năsăud); Beclean, Chiochiș; Țaga (r. Gherla); Cluj la Făget; Cheia Turzii. *Reg. Oradea:* Oradea, Băile Episcopoști. *Reg. Arad:* Mocrea, Ineu, Cermei (r. Ineu). *Reg. Timișoara:* citat de Heuffel din Banat fără localitate. *Reg. Bacău:* Ghimeș-Făget (r. Moinești); Piatra Neamț, Mrea Biserăni; Crăcăoani, Bălătești, Mrea Agapia, Tg. Neamț. *Reg. Iași:* Mărzești, Bărnova, Ciurea, Dancu (Păd. Iazul Chiriței), Ezăreni (V. Ursului), Țigănași (Păd. Plopu), Dl. Repedea (r. Iași) Podul Iloaiei în lunca Bahluiului (r. Tg. Frumos); Hârlău. *Reg. Suceava:* Rediu (r. Darabani).

Variabilitatea speciei

- 1 a Flori în număr redus (1 — 2)
 f. simplex Zap. Cons. Fl. Galic. crit. III (1911) 140. — Cluj și împrejurimi.
- 1 a Flori numeroase 2
- 2 a Flori adunate în 3 fascicule
 f. pseudofasciculatus Soó in BK XXIII (1925) 154, 157. — *Reg. Cluj:* Cluj (Fănațele Clujului, Fântâna lui Bilașcu); Chiochiș (r. Beclean).
- 2 b Flori adunate în 2 fascicule 3
- 3 a Inflorescența ramificată, uneori și cu ramuri laterale.
 f. furcatus Nyár. Kv. fl. III (1942) 207, c. diagn. hung. et in Bul. șt. Acad. R.P.R. Sect. șt. biol. tom. III, nr. 1 (1951) 29. — Cluj (la Făget și la Fănațele Clujului).
- 3 b Inflorescență compactă; fasciculele florale nu sunt pedicelate sau cel mult scurt pedicelate 4

- 4 a Plantă glabră, cel mult frunzele pe margini \pm scabre
f. *typicus* Nyár. Kv. fl. I. c. c. diagn. hung. ex Prod. in Add. pag. 666— Comună în întreaga țară prin fânețe, poieni și la marginea pădurilor.
- 4 b Lamina frunzelor scabră, acoperită cu peri scurți, aspri la pipăit. Tulpină netedă, mai rar scabră
f. *subcollinus* Nyár. Kv. fl. III (1942) 207, c. diagn. hung. et in Bul. șt. Acad. R.P.R. Secț. șt. biol. tom. III, nr. 1 (1951) 29. — Reg. Cluj: Chiochiș (r. Beclean); Cluj(Fânețele Murgău, V. Plecica, V. Morii).

Răsp. gen.: Carpați, Galiția.

9. **D. Piatra-Neamtzui** Prod. — *D. glabriusculus* Kit. ssp. *moldavicus* Prod. in Bul. Soc. St. Cluj X (1948) 158.

24. Rădăcină fusiformă, emite mai multe tulpini subțiri. Plantă tufoasă, de un verde mai deschis, cu tulpină înaltă de 30—35 cm, glabră, netedă, cilindrică sau subatrunchiular cilindrică, foarte noduroasă, cu cca 10 noduri apropiate, dela mijloc sau mai sus de mijloc dichotomic ramificată. Frunze ce întrec cu mult internodiile, subțiri, ierboase, destul de mari, de 32—40 (—70) mm lungime și 3—3,5 mm lățime, pe margini scabre, la vârf acute sau lung acuminate, 5-nervate; vagina acoperă numai nodul umflat al tulpinii. Flori solitare sau câte 2—3, dispuse într'un fascicul. Inflorescența multifloră, furcată sau corimboasă, pornește din 1/4 parte a tulpinii. Scvame involucrele calicine 4, verzi, cele externe lanceolate, de 10 mm lungime, din care arista are 6 mm, uneori cât jumătatea lungimii caliciului sau cu puțin mai scurte, late de 3 mm, în partea inferioară foarte îngust membranoase, cele interne de 9 mm lungime, late de 4—5 mm, ovate, pe margini mai evident membranoase, contrase într'un vârf verde, de 4 mm lungime, lanceolat subulat, rigid, pe margini scabru. Caliciu verde, lung de 18 mm și lat de 5 mm; dinții de 4—5 mm lungime, la vârf acuminați sau aristați, pe margini fin pubescenti. Petale rozee, cu lamina largă de 10 mm și lată de 6 mm, pe față fin dispers pubescentă, la bază barbulată, pe margini inegal dințată; dinții în majoritate obtuziusculi. VI—VII.

Stațiunea. Pe marginea pădurilor, în locuri ierboase, în regiunea deluroasă.

Răsp. în țară: Reg. Bacău: Piatra Neamț. Reg. Suceava: Dorohoi.

Obs. *D. Piatra-Neamtzui* Prod. diferă de *D. glabriusculus* Kit. prin tulpina mai solidă cu internodiile mai scurte și mai numeroase, prin frunzele puțin mai groase, mai apropiate. Inflorescență mare, compusă din flori numeroase, dispuse într'un corimb pornind din 1/4

Planșa 34. — 1. *Dianthus trifasciculatus* Kit., 1a. o floare mărită. — 2. *D. deserti* Prod., 2a. o floare mărită. — 3. *D. glabriusculus* (Kit.) Borb., 3a. idem, cu inflorescență adunată, 3b. o floare mărită. — 4. *D. collinus* W. et K.



parte superioară a tulpinii. Caliciu verde, cu dinți mai lați. Scvame mai late și cu arista puțin mai scurtă și mai ierbacee decât la *D. glabriusculus*.

var. *latifolius* Prod. comb. nova. — *D. glabriusculus* Prod. ssp. *moldavicus* Prod. var. *latifolius* Prod. l.c. pag. 159. — Tulpina înaltă de 40—50 cm. Frunze liniar lanceolate, de 3—5 mm lățime și 6—7 cm lungime. — *Reg. Bacău*: Piatra Neamț. *Reg. Suceava*: Dorohoi.

Răsp. gen.: Endemică.

10. *D. pubérulus* (Simk.) Kern. in Sched. ad FEAH II (1882) 63, nr. 537 non F.N. Williams. — *D. Carthus.* var. *puberulus* Simk. in Akad. Közlem. XV (1878) 531. — *D. Marisensis* Simk. in Term. füz. IX (1885) 37; Enum. Fl. Transs. (1886) 118. — *Exs.*: FEAH nr. 537, nr. 3630; HN nr. 5435.

4. Plantă înaltă de 25—50 cm, cu tulpină, frunze, scvamele caliciului și bractei, asperul puberule. Frunze tulpinale mai lungi decât internodiile, late de 2—5 mm. Vagine de 3—4 ori mai lungi decât lățimea frunzelor. Flori mai puține sau mai multe (3—12), dispuse într'un capitul terminal, roșii sau rozee. Lamina petalelor mică (5—10 mm) cuneată, la vârf trunchiată sau rotundă, dințată, pe partea internă păroasă, cu 2/3 mai scurtă decât unguicula. Scvamele involucale ale caliciului brune, uneori gălbui-alburii, coriacee, foarte fin scabru pubescente, pe margini deabia membranoase și plane, relativ mai groase și solide, alipite de caliciu, la vârf brusc contrase în ariste; aristele ajung mai sus de mijlocul tubului caliciului. Scvamele externe de obicei mai scurte decât cele interne. VI—VII.

Stațiunea. Prin livezi, poieni, răriști de pădure, din regiunea de câmpie până în cea montană.

Răsp. în țară: *Reg. Cluj*: între Rodna și Năsăud; Beclean, Chiochiș; Mții Meseșului la Fântâna Dracului; Cluj (la Fânațe), Apahida, Suat, Berchieș (r. Cluj); Cheia Turzii; între Aiud și Rimetea pe V. Aiudului; Bucium, Roșia Montană (r. Câmpeni). *Reg. Aut. M.*: Tg. Mureș; Băile Homorod, Odorhei, Corund, Sănerăieni, Băile Tușnad pe Mt. «Büdös» (r. Miercurea Ciuc); Bicsad, Bățanii Mari, Malnaș, Reci (r. Sf. Gheorghe). *Reg. Stalin*: Predeal, Sibiu, Gusterița, Veștem, Ocna Sibiului; Sebeș, Mercurea. *Reg. Hunedoara*: Alba Iulia, Oieșdea, Bărbant, Tăuș, Mții Trascăului pe Piatra Caprei și Piatra Ceții, V. Mureșului dela Alba Iulia până la Zam (r. Deva); Deva, Băița, Simeria pe Dl. Uroi; V. Streiului dela Simeria la Petroșani; Ohaba de sub Piatră, Hațeg; Bulzești, Obârșia (r. Brad). *Reg. Oradea*: Sohodol (r. Beiuș). *Reg. Arad*: Miniș, între Săvârșin și Bârzava (r. Lipova); Mții Codrului, Dezna, Moneasa, Baltele, Iosășel, Gurahonț, Hălmagiu (r. Gurahonț). *Reg. Ploesti*: Câmpina; Comarnic, Sinaia, Azuga. *Reg. Pitești*: Topoloveni pe V. Cacovei; Vultureanca (r. Găești). *Reg. București*: Moșteni-Brătășani (r. Vârtoapele); Alexandria; București; Comana (r. Vidra). *Reg. Galați*: Niculițel (r. Tulcea). *Reg. Bacău*: Bacău.

Variabilitatea speciei

var. *pubérulus* (Simk.). — *D. Carthusianorum* var. *australis* Panč. in Kern. Sched. ad FEAH II (1882) 63, nr. 537, pro syn. *D. puberuli*. — *D. Carthus.* var. *puberulus* Simk. in

Akad. Közlem. XV (1878) 531, s. str. — Scvamele caliciului și tulpina asperul puberule. — *Reg. Hunedoara*: pe V. Mureșului. *Reg. Pitești*: Câmpulung la Valea Româneștilor; Curtea de Argeș la V. Calului; Pitești la Trivalea. *Reg. București*: Mrea Căldurușani (r. Căciulați).

var. *laevigatus* (Simk.) Hand.-Mazz. in Dörf. Herb. norm. nr. 5435 et in Sched. LV—LVI (1915) 129. — *D. Marisensis* β. *laevigatus* Simk. Enum. Fl. Transs. (1886) 118. — Scvamele caliciului și tulpina glabriusculă și aproape netede. — *Reg. Hunedoara*: pe V. Mureșului.

var. *ohabensis* (Simk.). — *D. Marisensis* γ *Ohabensis* Simk. l.c. — Tulpină mică. Scvamele caliciului gălbui-alburii, asemenea celor dela *D. giganteiformis* Borb. — *Reg. Arad*: Moneasa (r. Gurahont).

⚠ Toate trei varietățile, în afară de locurile indicate, se găsesc sporadic în țară.

Răsp. gen.: In R. P. Română și Balcanii nordici.

11. *D. diutinus* Kit. in Schult. Ö.terr. Fl. I, ed. II (1814) 655. — **Exs.**: FRE nr. 403 b, sub *D. polymorpho*. — **Ic.**: Pl. 35, fig. 2, 2b. = *D. polymorphus* M.B. din sudul U.R.S.S.

4. Tulpină înaltă de 50 cm, patrunghiulară, brumat surie, ca și frunzele. Frunze îngust liniare, cele bazale setacee, convolute, de 0,5 mm late, scabre, spre bază puțin dilatate, obtuziuscule, cele tulpinale late de 1—1,5 mm, plane sau convolute. Vagine de 2—6 ori mai lungi decât lățimea frunzelor. Capitule florale compuse din 1—3 flori sesile. Scvamele involucrale ale caliciului bruniiu-albe, pe margini membranoase, la vârf rotunjite, termirate într'un mucron scurt. Scvamele abia acopăr jumătate din tubul caliciului. Caliciu de 1,2—1,5 cm lungime. Dinții caliciului rotunjiți la vârf sau obtuși, ± glabri pe margini. Lamina petalelor liliachiu-roșietică, lungă de 6—8 mm, glabră, pe margine dințată. VI—VII.

Stațiunea. Prin locuri nisipoase.


Răsp. în țară: Sporadică în nisipurile litorale și continentale. — *Reg. Constanța*: Constanța spre Palaz și la Mamaia. *Reg. Galați*: în Delta Dunărei la Caraorman și în peninsula Kaleh (r. Tulcea); în nisipurile dela Hanu Conachi (r. Măicănești).

Variabilitatea speciei

ssp. *Hajdóae* Prod. ssp. nova in Add. pag. 666.

Rădăcină fusiformă. Tulpină înaltă de 40—45 cm, cilindrică sau patrunghiulară. Frunze inferioare setacee, de 4—5 cm lungime și 0,5—1 mm lățime, cele tulpinale lungi de 5—6 cm și late de 1—2 mm; vagina de 1—1,5 cm. Capitulu compus din 7—12 (4—14) flori. Frunzele care înconjoară baza capi-

Plansa 35. — 1. *Dianthus kladovanus* Deg., 1 a. două scvame de sub caliciu, caliciu și o petală (Oltenia). — 2. *D. diutinus* Kit., 2a. caliciu mărit, 2b. *D. polymorphus*, M.B. caliciul unui exemplar din sudul U.R.S.S. — 3. *D. Henteri* Heuff., 3a. scvamă de sub caliciu, caliciu și o petală.



tulului gălbui, lat lanceolate, eliptice, pe margini membranoase, continuate într-o aristă lată de cca 2—3 mm. Scvamele caliciului gălbui, eliptice, pe margini membranoase, la vârf mucronate, late de 4—5 mm, cu membrana lată de 0,25—0,5 mm. Caliciu de 10 mm lungime, cu dinți obtuși, roșcat. Lamina petalelor roșie sau roșie închisă, mică, la suprafață păroasă, pe margini dințată.

Reg. Bârlad: în nisipurile dela Hanu Conachi împreună cu specia tipică.

O b s. Planta diferă de cea tipică prin numărul mai mare al florilor din capitule (7—12 în loc de 1—3), prin caliciul mai scurt, roșcat, corola mai mică, roșie închisă și păroasă. În general *D. diutinus* ssp. *Hajdoae* se prezintă față de *D. diutinus*, ca *D. giganteiformis* față de *D. giganteus*.

var. *luxuriosus* Nyár. et Prod. var. nova in Add. pag. 666. — Frunze în general mai late de 2—2,5 mm, cu mult mai lungi (cele inferioare de 14 cm lungime) decât la tip. Capitule mari, compuse din 12—25 (30) flori. Caliciu lung de 2 cm. — *Reg. Constanța:* Mamaia (r. Constanța. *Reg. Galați:* Letea (r. Tulcea).

Răsp. gen.: Balcani, R. P. Română, U.R.S.S. de S.

12. **D. Pontederæ** Kern. in Sched. ad FEAH II (1882) 67, nr. 539. — *D. Carthus.* var. *Pontederæ* F. N. Williams in Journ. of. Bot. XXIII (1885) 341. — **Ic.:** Pl. 36, fig. 3a, 3b, 3c, 3d.

4. Plantă glabră sau slab scabriusculă, cespitoasă, înaltă de 25—50 cm, cu tulpini erecte, rigide, svelte, 4-unghiulare. Frunze bazale liniar alungite, rigide, cele tulpinale mai late, de 2 mm, liniar ascuțite, 5-nervate, pe margini ± aspre. Vagina de 4 ori mai lungă decât lățimea frunzelor (cca 1 cm lungime). Inflorescență 6—30-floră, densă. Bractei uscate, piezoase, brune, setoase, mai scurte decât glomerulele florale. Scvamele involucreale ale caliciului uscate, brune, cât jumătate din lungimea caliciului, cele externe obovate, cele interne ovate lanceolate, terminate într-o setă scurtă. Caliciu tubulos, subțiat spre vârf, brun, dungat, lung de 15—20 mm. Dinții caliciului triunghiular subulați, Lamina petalelor cât jumătate din lungimea unguiculei, de 3—4 mm lungă și 2,5—3 mm lată, 5—6-dințată, în partea superioară purpurie și bogat păroasă, în partea inferioară rozee, pe margini 3—7-dințată. V—VI.

Stațiunea. Pe coline ierboase, însoțite și nisipuri.

Răsp. în țară: *Reg. Hunedoara:* Ciopea pe V. Bălților (r. Hațeg). *Reg. Arad:* Șiria, Măsca (r. Arad); Miniș, Păuliș, între Cladova și Radna (r. Lipova); între Agriș și Mocrea (r. Ineu). *Reg. Timișoara:* Timișoara. *Reg. Bârlad:* în forme apropiate în nisipurile dela Hanu Conachi (r. Măicânești).

Variabilitatea speciei

f. **pseudo-Pontederæ** Prod. in Bul. Soc. Șt. Cluj X (1948) 153, c. diagn. gall. et in Add. pag. 666. — Diferă de specia tipică prin capitulele cu flori mai puține, caliciu mai lat și scva-

mele calicine mai îngust membranoase. — *Reg. Cluj*: Nimigea de Jos în locul numit Streua (r. Năsăud).

Răsp. gen.: Alpii estici, Ungaria, R. P. Română.

13. *D. urziceniensis* Prod. comb. nova in Add. pag. 667. — *D. Pontederæ* Kern. ssp. *urziceni* Prod. Fl. p. det. pl. Rom. II, ed. II (1939) 1241, cum diagn. rom.

Asemănătoare cu *D. Pontederæ* de care diferă prin culoarea mai brumată, tulpina mai sveltă, frunzele înguste și mai rigide. Atât tulpinile cât și frunzele foarte evident păroase, îndeosebi pe margini cu peri lungi. Numărul florilor din capitule de obicei mai mic de 10. V—VI.

Stațiunea. Prin nisipuri și poieni nisipoase din păduri.

Răsp. în țară: *Reg. Baia Mare*: în pășunea com. Urziceni lângă Păd. Poieni (r. Carei).

var. *pauciflorus* Prod. comb. nova in Add. pag. 667. — *D. Pontederæ* Kern. ssp. *urziceni* Prod. var. *pauciflorus* Prod. l.c. cum diagn. rom. — Diferă de specia tipică prin frunzele mai înguste și mai scurte, mai verzi și capitulele cu 1—5 flori. — Impreună cu specia tipică.


Răsp. gen.: Endemică.

14. *D. giganteiformis* Borb. in Akad. Közlem. XII (1875) 83. — *D. sabuletorum* Heuff. in Verh. ZBG Wien VIII (1858) 67, Sep. pag. 32, non Willk. — Ic.: Pl. 36, fig. 2a, 2b, 2c.

4. Tulpină înaltă de 50 cm, cilindrică, verde. Frunze bazale setacee, 7-nervate, netede, cele tulpinale late de 3—5 mm, plane (nu sunt convolute) sau puțin convolute, cu vagina lungă de 1—1,5 cm. Capitule multiflore, din 3—20 flori. Bracteele de sub inflorescență obovate, la vârf subulat lanceolate, adrese și adeseori de lungimea capitulului. Scvame calicine externe alburii sau palide, cele interne lat obovate, aproape nearistate, terminate într'un vârf acut, de obicei bruniiu, strâns alipite de caliciu, mai scurte decât jumătatea caliciului. Caliciu lung de 13—15 mm. Lamina petalelor de 3 mm lungime, purpurie, la vârf acut paucidentată. VI—VII.

Stațiunea. În locuri ierboase, livezi, pe coastele dealurilor, prin poienile pădurilor, în regiunea de câmpie.

Plansa 36. — 1. *Dianthus carthusianorum* L. ssp. *pratensis* Neilr., 1 a. o petală, 1b. o petală dela ssp. *parviflorus* Čel., 1c. o bractee și câte o scvamă (interioare și exterioare). — 2a. *D. giganteiformis* Borb. (1/1), 2b. idem, cu mai puține flori, 2c. două bractee de sub inflorescență, două scvame calicine, caliciu și petală. — 3a, 3b. *D. Pontederæ* Kern. (1/1), 3c. scvame și petale, 3d. scvame, caliciu și două petale. — 4. *D. giganteus* D'Urv. (1/1), 4a. bractee, două scvame, caliciu și o petală. — La desenele de detalii un pătrățel = 1 mm.



Răsp. în țară: *Reg. Aut. M.*: Izvorul Mureșului (r. Gheorghieni). *Reg. Hunedoara*: Sântămăria, Ciopea, Pui (r. Hațeg). *Reg. Arad*: Arad. *Reg. Timișoara*: Plugova, deasupra Com. Globurău, Mehadia la Fântâna Coronini. *Reg. Craiova*: Vârciorova, Simian, Hinova pe Dl. Stârmina (r. Tr. Severin); Cetate (r. Cujmiru); Calafat; Preajba, Breasta (r. Craiova); Caracal. *Reg. București*: Bragadiru (r. Zimnicea); Ghimpați în Păd. Ghimpați (r. Mihăilești); Comana (r. Vidra).

Variabilitatea speciei

var. *baleianus* Prod. var. nova in Add. pag. 667. — Intermediară între *D. membranaceus*, *D. giganteiformis* și *D. banaticus*. Seamănă cu *D. membranaceus* prin membrana lată a scvamelor calicine interne; diferă însă de acesta prin lipsa aristei scvamelor interne, prin caliciul mai îngust și prin petalele mai mici. Se apropie de *D. giganteiformis* prin forma scvamelor calicine, prin mucronul din vârful acestora și prin culoarea deschisă de un alb-murdar, sau bruniu deschisă. Diferă de acesta prin caliciul cu mult mai lung și mai îngust, apoi prin scvamele interne mai lungi, nearistate și numai scurt mucronate. Această varietate mai diferă de *D. banaticus* prin scvamele calicine mai lungi, care nu sunt roșcate sau roșcat nuanțate ci brunii, nearistate și cu petale mai mici. — *Reg. Hunedoara*: Mții Retezatului în fânețele din jurul cabanei Baleia la Clonțul Trandafirilor.

var. *craiovensis* Prod. var. nova in Add. pag. 667. — Aduce foarte mult cu *D. giganteiformis* prin culoarea alburie a scvamelor calicine externe și interne, subțiri, membranoase. Diferă însă de tip prin scvamele externe și interne cu mult mai lungi și mai late, prin caliciul aproape cu jumătate mai lung decât la tip, mai îngust, cu dinții mai ascuțiți. Flori intens rozee. Culoarea și mărimea petalelor uneori ne reamintesc pe *D. banaticus* Heuff. — *Reg. Craiova*: Craiova în Parcul Poporului.

Răsp. gen.: Iugoslavia, R. P. Bulgaria, R. P. Română.

15. *D. banaticus* (Heuff.) Borb. in Akad. Közlem. XIII (1876). — *D. Carthusianorum* γ *banaticus* Heuff. En pl. Banat. in Verh. ZBG Wien VIII (1858) 67, Sep. pag. 32. — Exs.: FEAH nr. 3232; HN nr. 3018. — Ic.: Pl. 37, fig. 2, 2b.

4. Plantă în pâlcuri stufoase. Frunzele inovațiunilor scurte, slab scabre, pe margini scabre. Tulpină patrunghiulară, în partea inferioară scabră, înaltă de 25—60 cm, cu frunze liniare, lung acuminate, 5—9-nervate. Capitule pauciflore, cu 2—12 flori. Bracteele de sub inflorescență verzi, cele interne obovate sau alungit obcordate, scabre, puțin aristate sau nearistate, abrupt acute. Scvamele calicine externe asemănătoare cu bracteele, însă mai scurte, numai cât jumătatea caliciului, de formă \pm invers ovată, scurt aristate, foarte laxe, cu vârful adeseori reflect, \pm indoit, adeseori fin puberule. Scvamele calicine interne alungite sau lat-oblongi, la mijloc verzi, abrupt contrase într'o aristă scurtă, acuminată, cu bază lată. Toate scvamele cu margine ondulat încrețită. Caliciu de 1,5 cm lungime. Lamina

petalelor sanguinee sau purpurie, de cca 6—8 mm, aproape cât jumătatea caliciului de lungă. VI—VII.

Stațiunea. Prin livezi, locuri ierboase.

Răsp. în țară: *Reg. Timișoara:* Ciclova Română (r. Oravița); Băile Herculane pe calcare și gresii; V. Dunărei dela Coronini până la Orșova. *Reg. Craiova:* Vârciorova la Porțile de Fier.

Variabilitatea speciei

f. refléxus (Neilr.). — *D. Carthus.* β *reflexus* Neilr. Diagn. (1867) 21. — Se deosebește de tip prin involucrul scvamelor care mai târziu devine reflex și prin înflorirea mai timpurie. — După Grecescu s'a găsit în următoarele localități: *Reg. Craiova:* Vârciorova, Gura Văii (r. Tr. Severin). *Reg. Pitești:* Govora (r. Râmn. Vâlcea); Otești de Sus (r. Drăgășani); Dealul Viilor (r. Pitești). *Reg. București:* București (Chitila); Buftea, Ciocănești (r. Răcari). *Reg. Ploști:* Bucov pe Dl. Mare, Scăeni (r. Ploști). *Reg. Constanța:* Babadag. *Reg. Galați:* Filimon Sârbu (r. Tulcea); Măcin. *Reg. Bârlad:* Tecuci. *Reg. Iași:* Vaslui; Iași.

f. parvicapitatus Prod. comb. nova. — *D. banaticus* (Heuff.) Borb. var. *parvicapitulum* Prod. in Bul. Soc. St. Cluj X, 2 (1948) 152. — Diferă de *D. banaticus* Heuff. prin capitulele pauciflore (1—3), dar îndeosebi prin micimea capitulelor. Indicat de Pávai din « Transilvania » fără localitate.

f. Surólis F.N. Williams in Journ. of Bot. XXIII (1885) 342. — Glabră, înaltă de 30 cm, cu frunze tari, de 3,5 cm lungime. Bractei lanceolate obovate. Capitule numai cu 4—6 flori. Scvame calicine externe obovate, straminee, la vârf drepte. Caliciu verde la bază, cu dinți acumițați. — *Mții Făgărașului:* Mt. Surul.

Obs. *D. banaticus* Heuff. adeseori seamănă atât de mult cu *D. giganteus*, încât cu greu se poate deosebi, mai ales când mărimea caliciului este aceeași, iar culoarea caliciului este roșietică și nu verde, ca de obicei. In acest caz cele două specii le putem deosebi numai pe baza scvamelor calicine interne și anume: la *D. banaticus* Heuff. scvamele interne sunt aristate, pe când la *D. giganteus* D'Urv. și la *D. giganteiformis* Borb. sunt mai acute sau acuminate. Altă deosebire o mai constituie numărul mult mai mic al florilor dela *D. banaticus*. Petalele sunt de 2 ori mai mari la *D. banaticus* decât la *D. giganteus* și suprafața lor este acoperită de peri. Dinții caliciului, repentin alungit acumițați la *D. giganteus*, la *D. banaticus* sunt numai lent acuți. In cazul când *D. giganteus* trece spre *D. banaticus*, atunci scvamele interne au o formă triunghiulară ascuțită și alungită, în loc de obtuz sau acut triunghiulară ca la *D. banaticus*.

Răsp. gen.: Carpații din R.P.R.

16. ***D. gigantéus*** D'Urv. in Mém. Soc. Linn. Paris I (1822) 301. — *D. glaucophyllus* Hornem. in Rehb. Ic. Fl. germ. VI (1844) 44, tab. 250, fig. 5015, non Ser. — Scaunul cucului. — Magas szegfü. — Riesen-Nelke. — Exs.: FEAH nr. 535; FRE nr. 43. — Ic.: Pl. 36, fig. 4, 4a.

24. Plantă robustă, suriu verde sau verde. Rizom multicapitat, lemnos. Tulpină înaltă de 30—100 cm, simplă, în partea inferioară sublemnoasă, obtuz tetragonală, în cea superioară rotundă, glabră și împreună cu frunzele

± glaucă. Frunzele fasciculelor sterile late de 2 mm, 7-nervate, mai rar 5-nervate, mai înguste decât cele tulpinale, scabriuscul, până la hirt scabre. Frunzele tulpinale până la 3 mm lăţime, uneori late de 5—7 mm, cele inferioare mai lungi, cele superioare mai scurte decât internodiile. Vaginele laxiuscule, de 3—5 ori mai lungi decât lăţimea frunzelor. Frunzele de sub inflorescenţă bracteiforme, oblongi sau oblong ovate, foarte lung acuminate, de lungimea capitulelor. Scvamele involucale ale caliciului netede, lucitoare, coriacee, cele interne roşietice, ovate, la vârf succesiv acuminate, nearistate, ajungând numai până la jumătatea tubului caliciului. Caliciu de 18—20 mm lungime, roşietic, glabru, cu dinţi lanceolat subulaţi, brusc acumiñaţi. Capitulu multiflor (15—45). Petale sanguineu purpurii, lat obovate, pe partea inferioară mai palide, puţin păroase. Lamina de 9 mm lungime, alungită până la invers ovată, în partea inferioară dinţată, de $1/2 - 1/3$ cât unguicula de lungă. VI—VII.

Staţiunea. Pe marginea pădurilor, prin poieni, pe coline pietroase sau nisipoase (mai ales pe calcar şi trahit), în regiunea montană.

Răsp. în ţară: *Reg. Cluj:* Nimigea de Jos (r. Năsăud); Canciu (r. Dej); Cluj, Apahida; Turda; Aiud. *Reg. Aut. M.*: Mţii Giurgeului (Mt. « Öcsém »); Săndominic, Tuşnad pe Mt. « Būdös » (r. Miercurea Ciuc); Covasna (r. Tg. Săcuesc); Vâlcele (r. Sf. Gheorghe). *Reg. Stalin:* Oraşul Stalin; Rupea; Sibiu, Turnişor, Cristian, Tălmăciu, Boiţa, Pasul Turnu Roşu, Răşinari, Orlat (r. Sibiu); Apoldul de Sus, Sebeş. *Reg. Hunedoara:* Tăuţ, Ighiel (r. Alba Iulia); Orăştie; Deva, Cozia, Hărău (r. Deva); Simeria (r. Hunedoara); Haţeg, Subcetate, Răul de Mori; Petroşani. *Reg. Timişoara:* Maidan pe Faţa Mare (r. Oraviţa); Mehadia, Băile Herculane, V. Cernei la Gaura Fetei, Defileul Dunărei, Insula Ada-Kaleh (r. Mehadia). *Reg. Craiova:* Vărciorova, Marga, Cerneţi pe Dl. Cerneţului (r. Tr. Severin); Craiova, Robăneşti; Mţii Parângului la poale. *Reg. Piteşti:* Râmnicul Vâlcea; V. Oltului pe Naroţu şi Cozia; Cheile Argeşului. *Reg. Ploieşti:* Sinaia pe Mt. Cumpătu; Sărata-Monteoru (r. Buzău); Bâsca (r. Cislău), Mt. Penteleu; Beceni. *Reg. Constanţa:* Cernavodă. *Reg. Galaţi:* Isaccea, Niculiţel, Mrea Cocoş (r. Tulcea); Măcin, Greci.

Variabilitatea speciei

- 1 a Plantă biformă. La tulpină şi frunze aduce cu *D. giganteus*. La capitule, mărimea caliciului, forma scvamei calicine şi a bracteilor seamănă cu *D. capitatus*
f. *capitativiformis* Prod. f. nova in Add. pag. 667. — *Reg. Timişoara:* Băile Herculane.
- 1 b Plantă uniformă, nu prezintă însuşiri străine..... 2
- 2 a Tulpină ramificată în partea superioară
f. *ramificatus* Prod. in Bul. Soc. Şt. Cluj, X, 2 (1948) 155. — *Reg. Stalin:* Tălmăcel (r. Sibiu). *Reg. Constanţa:* Babadag.
- 2 b Tulpină neramificată, simplă 3
- 3 a Toate frunzele setacee, late de 1—1,5 mm
f. *setaceus* Prod. f. nova in Add. pag. 668. — *Reg. Piteşti:* V. Oltului la Căineni.
- 3 b Frunzele pot fi înguste, însă nu setacee 4

- 4 a Inflorescență multifloră (30—50 flori). Frunze superioare lat vaginate, cu vagina puțin balonată 5
- 4 b Inflorescență cu flori mai puține, cel mult 25 6
- 5 a Plantă glaucă, cu frunze foarte înguste, liniare, pe margini fin dințate. Bractei alungite, ovate. Scvame obovate
f. *biternatus* (Schur). — *D. biternatus* Schur Sert. (1853) 11, n. nud. et in Verh. SVN (1854) 83. — Sporadică în Transilvania.
- 5 b Plante de un verde vioi, cu frunze late, dispers dințate. Bractei și scvame alungit ovate
f. *luxurians* Prod.l.c. — *Reg. Hunedoara*: Deva.
- 6 a Nodurile tulpinii foarte groase, umflate, late de 10—12 mm. Plantă robustă
f. *grossenodorus* Prod. f. nova in Add. pag. 668. — *Reg. Craiova*: Segarcea.
- 6 b Nodurile tulpinii mai subțiri, mai mici 7
- 7 a Caliciu lung de 15—16 mm, cu bractei și scvame calicine mai scurte și mai înguste. Plante mai scunde
f. *semigiganteus* Prod. l.c. — *Reg. Cluj*: Nimigea de Jos (r. Năsăud).
- 7 b Caliciu lung de 18—20 mm 8
- 8 a Capitul prevăzut la bază cu bractei verzi, înguste, lanceolate, contrase într'o aristă de lungimea caliciului sau mai lungă. Scvame interne lung acuminate sau evident lung aristate. Frunze înguste, de 2—3 mm
f. *aristatus* Prod. l.c. — *Reg. Pitești*: V. Oltului la Călimănești.
- 8 b Bractele dela baza capitulelor brunii, late de 10—12 mm (la bază) 9
- 9 a Capitul prevăzut la bază cu bractei late, contrase într'o aristă lungă, de lungimea caliciului sau mai lungă
f. *bracteatus* Prod. l.c. — *Reg. Timișoara*: Băile Herculane. *Reg. Craiova*: Gura Văii spre Vârciorova. *Reg. Constanța*: Babadag.
- 9 b Capitul prevăzut la bază cu bractei late, foarte scurt aristate, sau aproape nearistate
f. *latebracteatus* Prod. l.c. — *Reg. Constanța*: Babadag.

Răsp. gen.: Balcani, R.P.R.

17. *D. pinifolius* Sibth. et Sm. Fl. graec. Prodr. I (1806—9) 284. — *D. serbicus* Wettst. Beitr. Fl. Alban. in Bibl. Bot. XXVI (1893) 34. — *D. pinif.* ssp. *D. Smithii* Wettst. l.c. (1893) 33. — Exs.: FRE nr. 1696; FEAH nr. 3233 sub *serbico*. — Ic.: Pl. 33, fig. 3.

4. Plantă dens cespitoasă, înaltă de 20—40 cm. Tulpină 4-unghiulară, puțin scabră. Toate frunzele setacee, convolute, de cca 1 mm lățime, solide, puțin scabre, cu vagina de 6—8 mm lungime. Capitule pauciflore. Bractele dela baza inflorescenței pielioase, ovate lanceolate, aristate. Arista scvamelor involucrale de aceeași lungime cu scvamele. Caliciu de 16—18 mm lungime. Lamina petalelor de 5 mm lungime, purpurie sau liliachie. VI—VII.

Stațiunea. În locuri stâncoase, coaste pietroase, înșorite.

Răsp. în țară: *Reg. Craiova*: Coastele pietroase între Vârciorova și Gura Văii (r. Tr. Severin).

Răsp. gen.: Balcani.

18. **D. Henteri** Heuff. in Griseb. et Schenk It. Hung. in Wieg. Arch. XVIII, 1 (1852) 303. — **Exs.**: FEAH nr. 2505; FHE nr. 547; FRE nr. 1692. — **lc.**: Pl. 35, fig. 3.

4. Rădăcină multicapitată, emițând caudiculi alungiți. Tulpina deasupra rădăcinii lemnoasă, tufoasă, glabră, puțin patrunghiulară, înaltă de 15—20 (30) cm, de obicei 1-3-floră, mai rar 6-floră, glabră sau în partea inferioară hirt scabră. Frunze liniare, foarte înguste, 3-nervate, spre vârf atenuate, pe margini puțin scabre și fin dințate, cele radicale și tulpinale late de 0,5—1 mm și de 5 cm lungime. Perechea frunzelor supreme dilatate la bază și deasupra verzi, încinge inflorescența. Vagine de 2 ori mai lungi decât lățimea frunzelor. Scvame calicine 4, obovate sau obcordate, din știrbitura neagră abrupt scurt aristate, brun ori brunii scarioase, ajungând la $\frac{1}{3}$ — $\frac{2}{3}$ din lungimea caliciului. Caliciu striat, verde, de 12—15 mm lungime și 3 mm lățime, verde, mai rar roșietic. Dinții caliciului neegali; 3 dintre ei puțin mai scurți și mai lați, obtuși, foarte scurt și abrupt mucronați, ceilalți doi succesiv acumițați și puțin mai lungi, de obicei cât $\frac{1}{5}$ din lungimea tubului caliciului. Lamina petalelor inciz alungit dințată, purpurie, lat obovat cuneată. VI—VII.

Stațiunea. În locuri stâncoase din regiunea subalpină a Carpaților sudici.

Răsp. în țară: **Reg. Stalin**: Mt. Piatra Craiului; Mții Sibiului pe V. Sadului. **Reg. Hunedoara**: Petroșani pe V. Surducului. **Reg. Craiova**: V. Jiului la Lainici și până la Păiușu. **Reg. Pitești**: V. Oltului dela Cozia până la Golotreni (r. Brezoiu), Mt. Cozia, Mrea Stănișoara; Cheile Argeșului, Mții Făgărașului (Mt. Negoiu); Rucăr pe Mt. Ghimbavu, Dâmbovicioara (r. Câmpulung).

Variabilitatea speciei


- A Lamina petalelor foarte îngustă, lată de 2,5—3 mm, oblongă, cu dinții mai adânci
Dinții caliciului lung acumițați
var. **cloșănicus** Prod. var. nova in Add. pag. 668. — **Reg. Craiova**: Mții Mehedinților pe Piatra Cloșanilor
- B Lamina petalelor cu mult mai lată de 5 mm, obovat cuneată. Dinții caliciului mucronați
var. **eu-Henteri** Prod. var. nova. in Add. pag. 668. — Are următoarele forme:
- 1 a Flori solitare, foarte mici. Caliciu de 7 mm lungime. Plantă cu tulpină filiformă, foarte subțire
f. **tenuissimus** (Schur). — **D. Henteri** a **tenuissimus** Schur Enum. pl. Transs. (1866) 97. — **Reg. Craiova**: V. Jiului în Pasul Lainici. — Sporadică în părțile sudice ale Transilvaniei.
- 1 b Florile nu sunt solitare. Caliciu mai mare 2
- 2 a Scvame calicine 6—8
f. **dúplex** Prod. et. L. Alexandr. n. novum. — **D. Henteri** Heuff. f. **forman**

- calycis duplicis* Prod. in Bul. Soc. Șt. Cluj. X, 2 (1948) 149. — *Reg. Craiova*: V. Jiului în Pasul Lainici.
- 2 b Scvame calicine 4, de obicei reduse 3
- 3 a Caliciu de mărime mijlocie, lung de 8—12 mm 4
- 3 b Caliciu mare, de 14—15 mm lungime și chiar mai lung. Inflorescență compusă din mai multe flori, cu înfățișare ca la *D. carthusianorum*. Frunze mai late și mai tari 6
- 4 a Scvamele caliciului lat obcordate, scurt aristate
f. *typicus* Prod. l.c. (1948) 149. — V. Jiului în Pasul Lainici.
- 4 b Scvame calicine late, obtuze, lung aristate; arista brunie 5
- 5 a Frunze scurte, relativ înguste. Plantă cespitoasă
f. *Solacoli* Prod. l.c. (1948) 149. — *Reg. Pitești*: Călimănești (r. Brezoiu)
- 5 b Frunze lungi și cu mult mai late. Scvame calicine interne ovate sau ovate lanceolate, la vârf lung aristate
f. *Brandzae* (Panč.) Prod. l.c. — *D. Brandzae* Panč. in litt. ap. Brandza Prodr. Fl. Rom. (1879—83) 194. — *Reg. Pitești*: Masivul Cozia (Mt. Cozia, Mt. Urzica). Golotreni pe Mt. Foarfeca și Mt. Naroțu (r. Brezoiu).
- 6 a Flori de 2 ori mai mari decât la tip, cu petale aproape rotunde și foarte mari, de un roșu spălăcit. Capitul mai desfăcut
f. *macranthus* (Schur). — *D. Henteri* b. *macranthus* Schur En. pl. Transs. (1866) 97. — Mții Sibiului pe Mt. Frumoasa (1000—1700 m.).
- 6 b Flori mai mici, cu petale cuneate, purpurii. Florile capitulului mai adunate. Scvamele caliciului mai lung aristate
f. *carthusianiformis* Prod. l.c. (1948) 150. — Mții Retezatului în V. Râul Mare.
- Obs. *D. Henteri* var. *cloșanicus* se poate deosebi la prima vedere de *D. banaticus* prin culoarea palid brunie a caliciului și a scvamelor care înconjoară caliciul, precum și prin micimea caliciului.

19. *D. carthusianorum* L. Sp. pl. ed. I (1753) 409; Schischk. in Fl. U.R.S.S. VI (1936) 814 et Ic. Pl. LI, fig. 3. — Garofițe, — Barát-szegfű. — Kärthäuser-Nelke. — Гвоздика Картузианская. — Exs.: FHE nr. 545 II sub ssp. *saxigeno*; FRE nr. 245 sub ssp. *saxig.* — Ic.: Pl. 36, fig. 1, 1 a-c., Pl. 39, fig. 5.

24. Plantă ± glabră, înaltă de 30—40 (100) cm. Tulpină în partea inferioară târătoare, ramificată, dând lăstari sterili și fertili, în partea superioară erectă, rigidă, glabră, patrunghiulară, de obicei neramificată. Frunze plane, liniare, late de 3—4 mm (cele ale lăstarilor sterili numai de 1—2 mm), la vârf acute, pe margini aspre, sesile și vaginante. Vaginele frunzelor strânse,

Plansa 37. — 1. *Dianthus tenuifolius* Schur, 1a. două scvame interioare și caliciul, 1b. o petală. — 2. *D. banaticus* (Heuff.) Borb., 2a. scvame de sub caliciu, 2b. caliciu și o petală. — 3. *D. dobrogensis* Prod., 3ab. bractei de sub inflorescență, 3c. caliciu cu scvame, 3d. scvame interne ale caliciului, 3e. scvame externe ale caliciului, 3f. dinții caliciului, 3g. petale.



până la 15 mm lungime, de obicei de 2—6 ori mai lungi decât lăţimea frunzelor. Flori dispuse în glomerule capituliforme, de obicei câte 3—6, mai rar multiflore sau pauciflore. Scvamele caliciului netede, pe margini puțin membranoase și crispule, de obicei brun întunecate, ovate, terminate subit într-o aristă lungă de 3—6 mm, împreună cu arista puțin mai lungi decât jumătatea tubului caliciului, cele interne nu cu mult mai lungi decât cele interne. Caliciu cilindric, de 15—20 mm lungime, glabru, cel puțin la vârf purpuriu. Dinții caliciului triunghiular ascuțiți. Lamina petalelor purpurie sau roșie închisă, dințată, la bază puțin barbată sau glabră, de lungimea caliciului sau $\frac{3}{4}$ din lungimea lui. Stamine 10, cu antere violete închise. Capsulă lunguiață, puțin comprimată. Semințe numeroase, rotund turtite. VI—VIII.

Stațiunea. Pe coline nisipoase, în păduri uscate, stepe nisipoase, la marginea ogoarelor, locuri însoțite, stânci, fânețe, poieni, rariști.

Răsp. în țară: Comună din regiunea de câmpie până în regiunea alpină.

Variabilitatea speciei

- 1 a Flori mari, cu lamina petalelor mai lungă decât jumătatea unguiculei, uneori aproape de lungimea ei (8—12 mm). 2
- 1 b Flori cu lamina petalelor scurtă, cât jumătatea unguiculei sau cu ceva mai scurtă (5—6 mm). 5
- 2 a Plante robuste, cu tulpini numeroase, înalte de 50—60 cm. Scvamele caliciului scurt aristate, evident mai scurte decât caliciul. Caliciu de 15—20 mm lungime. Lamina petalelor lungă de 9—10 mm 3
- 2 b Plante de statură mijlocie, cu tulpini mai puțin înalte, numai de 15—30 cm. Scvamele caliciului lung aristate, de lungimea caliciului sau uneori mai scurte. Lamina petalelor lungă de 9—10 mm 4
- 3 a Tulpini puțin numeroase, în partea inferioară lipsite de stoloni sau soboli puternici
ssp. **pratensis** Neilr. Fl. NÖ (1859) 805. — **Ic.:** Pl. 36, fig. 1. — **Reg. Baia Mare:** Mții Maramureșului, Mții Tibleșului. **Reg. Cluj:** Mții Rodnei, Canciu (r. Dej); Aluniș pe Dl. Popii (r. Gherla); Cluj; Cheia Turzii. **Reg. Aut. M.:** Mții Gurghiului pe Mt. « Délhegy »; Sovata. **Reg. Stalin:** Valea Lungă (r. Mediaș), **Reg. Arad:** Moneasa (r. Gurahont). **Reg. Pitești:** Mihăești (r. Câmpulung). **Reg. Bacău:** Mt. Ceahlău.
- 3 b Tulpini numeroase (10—15), în partea inferioară cu stoloni sau caudiculi de forma sobolilor, lungi și puternici
var. **stolonifer** Prod. var. nova in Add. pag. 668. — **Reg. Cluj:** Ilva Mare spre Mt. Cornei (r. Năsăud).
f. **subsolutus** Prod. f. nova in Add. pag. 668. — Tulpina se desface la vâr fin 3 ramuri. — La Ilva Mare în societatea precedentei
- 4 a Inflorescența sau capitulele compacte, de obicei cu 6 flori. Scvamele caliciului de culoare închisă, aproape negre, lung aristate. Frunze bazale late de 1—2,5 mm. Caliciu de 18—20 mm lungime
ssp. **alpestris** Neilr. Fl. NÖ (1859). 801 — **Mții Rodnei:** Pietrosul Mare. **Mții Giurgeului:** Mt. Suhard (Bicaz). **Mții Retezatului:** Borăscu.

- 4 b Inflorescența sau capitulele foarte desfăcute, de obicei cu 3—6 flori. Caliciu mai scurt, de 13—15 mm. Petale ceva mai mici, de 9—10 mm lungime. Frunze bazale foarte înguste, de 0,5—1,5 mm
 ssp. *Florae-Anderecoiani* Coman in Bul. Grăd. Bot. Cluj. XXVI (1946) 75. — *Mții Maramureșului*: Mt. Farcău (1697 m), Mt. Greben deasupra com. Vișeu de Sus.
- 5 a Lamina petalelor ± cât jumătatea caliciului. Plante robuste, cu tulpina de cca 60 cm înălțime. Frunze late de 3—5 mm. Inflorescența un capitul multiflor. Scvamele împreună cu aristele, mai lungi decât jumătatea lungimei caliciului, îngust obovate, scurt aristate, negre brune 6
- 5 b Lamina petalelor numai cât 1/3—1/2 caliciului de lungă. Frunze late numai de 1—3 mm 7
- 6 a Inflorescență capitată, laxă
 ssp. *latifolius* (Gris. et Schenk) Hegi in ABZ XVII, 13 Abh. (1911) 14. — *D. Carthus.* var. *latifolius* Gris. et Schenk in Wieg. Arch. XVIII (1852) 300. — *Reg. Baia Mare*: Vișeu de Jos în Zăvoiul Mare. *Reg. Cluj*: Cluj în Păd. Lomb. *Reg. Ploiești*: Mt. Penteleu.
- 6 b Inflorescență fastigiată
 f. *subfastigiatus* (Schur). — *D. Carthus.* b. *subfastigiatus* Schur Enum. pl. Transs. (1866) 92. — *Reg. Cluj*: Năsăud, Sângeorz-Băi; Cluj.
- 7 a Tulpină în partea inferioară și frunze inferioare scabre
 var. *asperulus*. Vand. ap. Čelak. in Sitzb. Böhm. Ges. (1885) 15. — *Reg. București*: Comoara (r. Alexandria); Ghimpați (r. Mihăilești).
- 7 b Tulpinile și frunzele nu sunt scabre 8
- 8 a Scvamele caliciului nu sunt glauce, cu margini membranoase
 var. *polonicus* (Zap.) Hermann Fl. Deutschl. Fennosk. (1912) 175. — *D. polonicus* Zap. Consp. Fl. Galic. crit. III (1911) 122. — *D. Carthus.* var. *subcarpaticus* Borb. in Herb. n. nud. et in Schultz Herb. norm. (1894) nr. 2916, n. nud. — *Mții Maramureșului*.
- 8 b Scvamele caliciului glauce 9
- 9 a Plante tufoase, lipsite de caudiculi (tulpini târătoare).....10
- 9 b Plante la bază cu caudiculi alungiți. Articulele tulpinii târătoare, cu puține tulpini florifere
 var. *repentiformis* Nyár. Enum. pl. vasc. Cheia Turzii (1939) 129, 245. — *Reg. Cluj*: Gherla; Cluj (la Făget), Someșul Cald; Cheia Turzii. *Reg. Aut. M.*: Turia (r. Tg. Săcuiesc); Zagon (r. Sf. Gheorghe). *Reg. Stalin*: Orașul Stalin. *Reg. Hunedoara*: Mții Trăscăului pe Piatra Ceții.
- 10 a Inflorescență compusă din 2—6 flori. Tulpină înaltă de 20—40 cm
 var. *saxigenus* (Schur). — *D. Carthus.* d. *saxigenus* Schur Enum. pl. Transs. (1866) 93. — Comună.
- 10 b Inflorescență multifloră. Tulpină înaltă de 40—50 cm.....11
- 11 a Inflorescență capitulară
 var. *parviflorus* Čelak. Prodr. Fl. Böhm. (1875) 506, non Schur. — *lc.*: Pl. 36, fig. 1b. — *Reg. Baia Mare*: Mții. Tibleș în V. Bradului. *Reg. Cluj*: Beclean; Huedin; Mihăilești, Berind, Feleac, Boj (r. Cluj); Valea Florilor, Rimetea, (r. Turda); Mții Trăscăului în Cheile Râmețului (r. Aiud). *Reg. Aut. M.*: Voșlăbeni (r. Gheorghieni); Mier-

curea Ciucului; Căpâlnița, Vlahița, Merești pe Mt. « Nagymál » (r. Odorhei). *Reg. Stalin*: Orașul Stalin.

11 b Inflorescență 3-fasciculată; fasciculi pedunculați

f. *solūtus* Zap. Consp. Fl. Galic. crit. III (1911) 120. — *Reg. Cluj*: Ardan (r. Bistrița); Turda, Rimetea; Aiud. *Reg. Stalin*: Orașul Stalin, Zărnești. *Reg. Hunedoara*: Petroșani. *Reg. Oradea*: Beiuș.

Răsp. gen.: Europa centrală și sudică.

20. *D. tenuifolius* Schur in ÖBZ VIII (1859) 22, n. nud. et in Verh. SVN (1859) 143. — *D. Carthus.* ssp. *tenuifolius* (Schur) Hegi in ABZ VII (1911) 17. — *D. Carthus* L. ssp. *capillifrons* (Borb.) Neumayer in Verh. ZBG Wien LXXIX (1930) 354. — *Exs.*: FRE nr. 244. — *Ie.*: Pl. 37, fig. 1, 1a, 1b.

4. Plantă scurdă sau Țână la 25 cm înălțime, irdesuit cespitoasă, cu rizomi târători, alungiți. TulȚini numeroase. Frunze tulpinale liniare, late de 1—2 mm, acute, trinervate, cele ale lăstarilor sterili de 0,5—1 mm lățime, mai lungi, decât internodiile. Glomerule florale cu puține flori, adeseori uniflore sau cu 1—4 (6) flori. Bractei ierboase sau uscate. Scvamele involucrale ale caliciului ovate, foarte late, negre-brunii, slab suriu brumate, abrupt subulat aristate, aproape de lungimea caliciului, cu arista de 1—8 mm lungime. Caliciu verde, la vârf brun verde. Scvamele externe de obicei mai înguste decât cele interne. DintȚii caliciului lanceolați, triunghiulari, acuti. Lamira petalelor lungă de 8—12 mm, de lungimea caliciului, la bază slab Țăroasă sau neȚăroasă, de culoare roșie închisă. VII—VIII.

StaȚiunea. Locuri stâncoase și ierboase din munȚi.

Răsp. în țară: In CarpaȚi (vezi la var. *typicus*).

Variabilitatea speciei

var. *typicus* Kárp. in BK XXXVII (1940) 16. — Plantă înaltă de 20—30 cm. Frunze bazale de 0,5—1 mm lățime, cele tulpinale până la 3 mm late și 5—6 cm lungi, erecte. InflorescenȚă cu 5—8 flori, sau până la multifloră. Scvamele calicice cu arista ajung lungimea caliciului; arista lungă; caliciul de 16 mm lungime. — *MȚii Maramureșului*; *MȚii Țibleșului*, *MȚii Rodnei*: Ineu, Corongiș, Saca, V. Vinului. *MȚii Rarăului*: Pietrele Doamnei. *MȚii Călimani*; *MȚii BistriȚei*: Burnarul, V. Neagra (la Broșteni), Mt. Ceahlău. *MȚii Giurgeului*: Lacul Ghilcoș, Mt. Suhardul, Surducul, Cheile Bicazului, Mt. Vita, Hăghimașul Mare, Piatra Singuratică, Mt. « Öcsém ». *MȚii Buzăului*: Penteleu. *MȚii Ciucașului*: Ciucașul *MȚii Bârsei*: Piatra Craiului. *MȚii Bucegi*: Furnica, Piatra Arsă, Japi, Caraiman, Coștila, V. Cerbului, Bucșoiul, V. Mălăești, Strunga, V. IalomiȚei la Schitul Peștera. *MȚii Făgărașului*: ColȚii Brezei, V. Brescioarei, Vf. Trăsnita, Arpașul, Buteanul, Lacul Bălea, Negoicul, Lespezi, Surul. *MȚii Sibiului*: Dl. Caprei. *MȚii Parângului*: Mt. Parângul, V. JieȚului. *MȚii Retezatului*: FaȚa FetiȚii, Mt. Drăcșanul. *MȚii MehedinȚilor*: Mt. Oslea.

var. *pumilus* Schur Enum. pl. Transs. (1866) 95. — *D. subneglectus* Schur. n. nud. pro syn. l.c. — *D. Carthus.* d. *pumilus* F. N. Williams in Journ. Linn. Soc. XXIX (1893) 372. —

D. tenuifolius Schur β . *subneglectus* Grec. Consp. Fl. Rom. (1898) 98. — Formă cespi-
toasă, mică (8—15 cm), unifloră sau uneori paucifloră (1—3), care aduce foarte mult cu
D. Henteri Heuff., de care diferă prin frunzele late de 1,5 mm, mai lungi decât inter-
nodurile, scvamele calicine brune, mai late și florile mai mari. — Pe coama munților înalți. —
Mții Rodnei: Înău. *Mții Bârsei*: Piatra Mare, Postăvarul, Piatra Craiului. *Mții Bucegi*: V.
Mălăești, Strunga, Vf. Omul, Coștila. *Mții Făgărașului*: Vârtopul, Arpașul. *Mții Parângului*:
Parângul, Cârja. *Mții Retezatului*: Bucura.

var. *henterioides* Kárp. in BK XXXVII (1940) 17. — Diferă de tip prin frunzele mai
înguste, patule, inflorescența 3—5-floră, caliciul cu puțin mai scurt, de 4 mm lățime și 14
mm lungime și arista scvamelor calicine mai scurte. — Carpații meridionali, dela Piatra
Craiului până la Petroșani.

f. *pulvinatus* Kárp. l.c. 18. — Diferă de tip prin frunzele bazale mai înguste, lungi
de 2—3,5 cm. — Reg. Hunedoara: V. Jiețului la Petroșani; Grădiște (r. Hateg).

var. *Gayeri* Kárp. l.c. — Diferă de tip prin inflorescență mai bogată, cu 3—10
flori, caliciu mai lat, până la 5 mm lățime și 20 mm lungime. Prin statură (cca 40 cm înăl-
țime) seamănă cu *D. carthusianorum* var. *saxigenus*. — In Transilvania, începând din *Mții*
Rodnei până în *Mții Retezatului* (Râul Mare).

f. *variifolius* Buia et Todor in An. Facult. Agron. Cluj XII (1946—47) 114. — Diferă
de tip prin aceea că pe lângă frunzele bazale aproape filiforme (de cca 0,5 mm lățime) are
și frunze mai late, de cca 1 mm. — *Mții Făgărașului*: Capra Budei și Piciorul Caprei spre
Portița (bas. V. Argeșului).

Răsp. gen.: Carpații din R.P.R.

21. **D. Rehmannii** Blocki in Kosmos V (1880) 494. — *D. pseudobarbatus*
Bess. in Rchb. Fl. germ. exc. III (1832) 805; Grec. Consp. Fl. Rom. (1898)
97. — *D. membranaceus* Blocki in Kern. Sched. ad FEAH II (1882) 62,
nr. 533. — *D. eu-ponticus* Schischk. in Fl. U.R.S.S. VI (1936) 818, non Zap. —
Ic.: Pl. 38, fig. 1, 1a, 1b; Prod. Consp. Fl. Dobr. I (1935) Pl. XIX, XX, XXI.

4. Tulpină înaltă de 30—70 cm, sub vârf \pm patrunghiulară, scabriusculă
la bază, netedă spre vârf. Frunze liniar lanceolate, de 3,5—4 (8) mm lățime
și 6—7 cm lungime, cu vagina de 8—11 lungime, cu margini scabre, pe fața
inferioară și pe nervuri scabriuseule. Flori în capitule unice sau în inflores-
cențe bi- sau trifasciculate, în capitule cu puține sau până la 20 flori. Frunzele
fulerante ale inflorescenței lanceolate, straminee, la vârf verzi, subegale sau
mai scurte decât caliciul. Scvame involucrale calicine câte 4, concave, lat
ovate sau eliptice, palide, la vârf obscure, cu o margine membranoasă, semi-
pelucidă, până la 1,5 mm lată, la vârf contrase într-o aristă de 1—2,5 mm.
Caliciu de 16—18 mm lungime, la bază verde, la vârf purpurescent,
dintat. Dinții caliciului neegali, de 3—4 mm lungime, ovat lanceolați
și membranaceu marginați. Lamina petalelor lungă de 7,5—10 (12) mm,
obovat cuneată, spre bază profund dintată, purpurie, barbulată la
bază. VI—VIII.

Stațiunea. Prin livezi și locuri deschise, pe dealuri, poieni, pe marginea pădurilor, prin tuferișuri.

Răsp. în țară: *Reg. Ploști*: Valea Călugărească pe Dl. Mare (r. Ploști); Cotorca (r. Urziceni). *Reg. Constanța*: Adamclisi, Independența (r. Băneasa); Cobadin, Mangalia (r. Constanța); Enisala (r. Babadag). *Reg. Galați*: Măcin. *Reg. Bârlad*: Focșani; Adjud; Podul Turcului (r. Răchitoasa); Bârlad. *Reg. Bacău*: Piatra Neamț către Bisericieni și Pângărați. *Reg. Iași*: Iași (la Galata). *Reg. Suceava*: Fălticeni spre Păd. Hușilor; Bosanci (r. Suceava); Botoșani spre Agafton.

Variabilitatea speciei

var. **ramificans** (Zap.) Borza Consp. Fl. Rom. I (1947) 85. — *D. Rehmanni* Blocki subvar. *ramificans* Zap. Consp. Fl. Galic. crit. III (1911) 128. — *Ic.*: Prod. Consp. Fl. Dobr. I (1935) Pl. XXII. — Tulpina ramificată în partea superioară. Inflorescența desfăcută. — Sporadică în Dobrogea.

f. **luxurians** Prod. — *D. membranaceus* Borb. f. *luxurians* Prod. in Bul. Soc. Șt. Cluj X, 2 (1948) 150. — Capitul mare, compus din 20—40 flori. Caliciu de 20—30 mm lungime. — Iași.

f. **lilacinus** Prod. comb. nova. — *D. membranaceus* Borb. f. *lilacinus* Prod. l.c. — Flori liliachii. — Iași.

Răsp. gen.: Balcani.

22. **D. dobrogeensis** Prod. Consp. Fl. Dobr. in Bul. Acad. Stud. Agron. Cluj V, 1(1934) 97, tab. XXIII. — *Ic.*: Pl. 37, fig. 3, 3 c-g; Prod. Consp. Fl. Dobr. I (1935) Pl. XXIII.

4. Tulpină înaltă de cca 50 cm, netedă sau scabriusculă, cilindrică sau subpatrunghiular cilindrică, cu numeroase noduri (până la 14). Primul internodiu dela bază este de 1 cm lungime, următorul de 2 cm, iar al treilea de 3 cm; internodiile devin astfel tot mai lungi (4—4,5 cm), cca până la mijlocul tulpinii. Frunze tulpinale mai lungi decât internodiile. Frunze mijlocii de 6,5—7 cm lungime (împreună cu vagina), liniar lanceolate, de 3—4 mm lățime, foarte scabre, multinervate, spre vârf alungit acuminate. Vagine lungi de 1 cm, cele superioare de 7—8 mm. Tulpină la vârf adeseori scurt bifidă sau trifidă, din care cauză florile sunt dispuse în glomerule. Glomerule în majoritate multiflore. Caliciu lung de 9—10 (11) mm, verde, multistriat, cu dinți ± roșietici, pe margini dispers și scurt ciliați, obtuși și scurt mucronați, aproape în întregime membranoși, uneori obtuși însă lung mucronați. Scvamele involucrale ale caliciului diferite, în general lat eliptice sau lat ovate, cu o nervură mediană evidentă, la vârf mucronate, de regulă acute, mai rar obtuze. Scvamele interne de 4—7,5 mm lungime și 3—3,5 mm lățime, cu aristă (respectiv mucron) de 0,1—2 mm; cele externe de 3,5—4,5 mm lungime și 2—3,5 mm lățime,

cu mucron lung de 0,3 mm; membrana transparentă de pe marginea scvamelor interne și externe, de 0,4—0,6 mm lățime. Lamina petalelor rozee, de 3—4 mm lungime și 2,2—2,3 mm lungime, glabră, pe margini inegal dințată. Capsula matură întrece cu mult caliciul în lungime. VI—VIII.

Stațiunea. Locuri pietroase, uscate.

Răsp. în țară: *Reg. Constanța:* Jurilovca (r. Babadag).

Răsp. gen.: Bulgaria.

23. **D. capitatus** Balb. in DC. Cat. Hort. Monsp. (1813) 103; Fl. U.R.S.S. VI (1936) 813, tab. LI, fig. 4. — **Exs.:** FRE nr. 243, 404, a,b sub ssp. *mold.* — **Ic.:** Pl. 38, fig. 2, 2a, b.

24. Plantă de 60 cm înălțime, glaucă. Frunze bazale late de 2 mm, cele tulpinale de 2 mm lățime, plane. Lățimea frunzelor variază, cele sterile fiind aproape filiforme. Nervura mijlocie la unele frunze pronunțată, la altele nedistinctă. Frunzele superioare lanceolate, dilatate la bază, verzi. Vagina frunzelor supreme ventricooasă, de 3 ori mai lungă decât diametrul tulpinii. Frunzele fulcrante (bractei) de sub inflorescență subglabre, cât 1/2 din lungimea câpitolului, palide, contrase subit într-o aristă cuspidată. Scvamele involucrale ale caliciului ovate; cele interne albe-verzui, albăstrui-pruinoase, subulat-aristate, coriacee, aproape cât 1/2 caliciului de lungi; cele externe foarte late, subconiforme, palide. Caliciul purpuriu, de 9—18 mm lungime. Lamina petalelor lungă de 5 mm, purpurie. VI—VIII.

Stațiunea. In locuri pietroase, uscate, ierboase.

Răsp. în țară: *Reg. Timișoara:* Băile Herculane (Heuffel sub *D. Balbisii*). *Reg. Craiova:* Craiova. *Reg. București:* Zimnicea, Bragadiru (r. Zimnicea); Comana (r. Vidra); Ciocănești (r. Răcari); București (Chitila). *Reg. Galați:* Măcin, Greci, Delta Dunărei, rar. *Reg. Bârlad:* Tecuci, Bârlad în Păd. Crângu. *Reg. Iași:* Miroslava (r. Iași). *Reg. Suceava:* Suceava, Bosanci.


Variabilitatea speciei

ssp. **Andrzejowskianus** Zap. Consp. Fl. Galic. crit. III (1911) 133; Schischk. in Fl. U.R.S.S. VI (1936) 813, tab. 10, fig. 6, pro sp.

Caliciu lung de 9—12 mm. Scvamele calicine pe margini nu sunt semipe-lucide, cu aristă lungă de 1,5—3 mm, atingând 2/3 din lungimea caliciului.

Reg. Constanța: între Babadag și Mihai Bravul pe Dl. Kel-Tepe, peninsula Kaleh și Kocia-Kuciuc.

Planșa 38. — 1. *Dianthus Rehmannii* Blocki, 1a. foliolă exterioară, scvame și caliciu. 1b. scvama caliciului și o petală (din reg. Ialomița). — 2. *D. capitatus* Balb., 2a. foliolă involucrală, scvamă, caliciu și o petală (din Galiția), 2b. idem (din Grecia). — 3. *D. guttatus* M.B., 3a. rădăcina. — 4. *D. Racovitzae* Prod.



ssp. **moldávicus** G. Grinț. in Bul. Inf. Grăd. Bot. Cluj, IV (1924) 57, in Sched. ad FRE nr. 404 a.

Caliciul cât jumătatea lungimii aceleuia al speciei tipice, așa încât nu se ridică dintre scvame sau deabia se ridică.

Reg. București: Brănești-Islazul în Păd. Radu Vodă. *Reg. Constanța:* Basarabi (r. Constanța). *Reg. Iași:* Iași la Valea Largă.

Răsp. gen.: Europa de SE.

24. **D. kladovánus** Deg. in MBL IV (1905) 122. — *D. polymorphus* Panč. Fl. Knez. Srb. (1874) 177 et Auct. hung., non M.B. — **Ic.:** Pl. 35, fig. 1, 1a.

4. Rădăcină multicapitată, lemnoasă, puternică, emite numeroși caudiculi radicanți, lungi de 5—5,5 cm, la vârf cu fascicule de tulpini florifere și fascicule sterile, care la început se târăsc pe pământ și apoi se ridică. Fasciculele tulpinale florifere compuse din tulpini florifere de diferite lungimi. Tulpini subțiri, de 25—36 cm lungime, subpatrunghiulare, scabre, cu 5—6 perechi de frunze. Frunzele moi, ierboase, nu ajung nodurile, cele inferioare și mijlocii lungi de 3 cm, din care 7 mm corespund vaginei; frunzele trinervate, între nervuri se văd mai multe nervuri mai spălăcite, late de 1—1,5 mm. Vaginele frunzelor dilatate spre vârf. Capitule compuse din 1—10 flori, mai adeseori cu 3—10 flori. Caliciu lung de 8—8,5 mm, lat de 2 mm, palid verde, verde-albăstrui sau verde-roșietic. Dinții caliciului lanceolați sau lanceolat ovați, pe margini membranoși, subacuți, la vârf mucronați. Bracteele de sub inflorescență membranaceu scarios marginate, la vârf evident aristate. Scvamele calicine externe brunii, acoperind caliciul pe jumătate, lat obovate, lat hialin marginate; partea hialină dinspre vârful scvamei dilatată și obtuză, marginea ondulat încrețită. Scvame lat invers cordate, hialin marginate și prevăzute cu o aristă foarte scurtă, adeseori recurbată. Flori roșii, cu petale subglabre. VI—VIII.

Stațiunea. Prin locuri ierboase, nisipoase.

Răsp. în țară: *Reg. Craiova:* Hinova (r. Tr. Severin); Craiova în Parcul Poporului și în câmpul spre Lacul Popii.

Variabilitatea speciei

var. **typicus** Prod. in Add. pag. 669. — *D. subkladovanus* Prod. Fl. p. det. pl. Rom. II ed. II (1939) 303. — Plantă de un verde puțin palid, cu tulpină și frunze moi, de obicei cu flori puține, în medie 4, excepțional 1—10. Frunzele fulcrante ale inflorescenței se aseamănă și se amestecă cu cele 4 scvame (bractei) ale caliciului, destul de solide, eliptice, scurte, foarte lat membranoase, cu apendicul de obicei în formă de mucron scurt, moale, cartilaginose; uneori scvamele aproape în întregime ± membranoase. Caliciu verde-albăstrui.

Flori rozee sau roșiatice. Petale uneori la suprafață cu peri scurți. — *Reg. Bârlad*: în nisipurile dela Hanu Conachi (r. Măicânești).

f. *alba* Prod. f. nova in Add. pag. 669. — Plantă mai robustă, cu frunze mai late. Caliciu mai lung și mai lat, de un verde deschis. Flori albe. — Impreună cu var. *typicus*.

var. *rigidus* Prod. var. nova. in Add. pag. 669. — Plantă tufoasă, de statură mică, înaltă de 20—30 cm, cu tulpini și frunze scabre, pe margini dințat scabre. Frunze înguste, până la 1 mm lățime, rigide. Bractei involucrale 2, adeseori verzi, lanceolate și lung aristate. Scvamele caliciului deobicei mai groase, cu membrana de pe margini mai îngustă; mucronul din vârful scvamelor solid și destul de lung, adeseori aristiform. Caliciu mai solid, mai îngust și mai lung, de obicei roșu sau roșu-bruniu. Flori roșii. — *Reg. Bârlad*: Hanu Conachi în nisipurile mobile. Endemică.

Răsp. gen.: Endemică.

25. **D. Vandasii** Velen. in Sitzb. Böhm. Ges. Wiss. XXXVII (1893) 16; Fl. bulg. Suppl. (1898) 47.

4. Tulpină brumată, 4-unghiulară, înaltă de 60—80 cm. Frunze bazale setacee, convolute, late de 0,5 mm, cele tulpinale subțiri, pe margini tăioase, convolute, foarte acute, de 1 mm lățime, mai scurte decât internodiile. Capitule globuloase, multiflore. Bractele (frunzele fulcrante de sub inflorescență) pielose, alburii, ovate lanceolate, contrase într'o aristă scurtă. Scvame involucrale calicine de culoare foarte deschisă (alburie), numai la vârf roșietice, cele externe lat invers ovate, alburii, contrase într'o aristă scurtă, cele interne scurt acuminate. Caliciu lung de 1 cm, atropurpuriu. Lamina petalelor glabră, atropurpurie, lungă de 3—5 mm și lată de 1—3 mm. VI—VII.

Stațiunea. Locuri ierboase.

Răsp. în țară: *Reg. Craiova*: prin livezi la Dioști (r. Caracal).

Răsp. gen.: Tracia și Rumelia de E.

Secția III. PLUMARIA (Opiz) A. et G. Syn. V. 2 (1921) 409. — *Plumaria* Opiz Sezn. 1852) 75, pro gen. — *Fimbriati* Boiss. Fl. or. I (1867) 480, 492. — *Fimbriatum* F. N. Williams (in Journ. of. Bot. XXIII (1885) 343.

Lamina petalelor fimbriat divizată, până la lacerată, mai rar neregulat dințată sau aproape întreagă.

26. **D. superbis** L. Fl. suec. ed. II (1755) 146, nr. 383 et Cent. I, nr. 30 in Amoen. Acad. IX (1759) 272; Schischk. in Fl. U.R.S.S. VI (1936) 856, tab. LIV, fig. 4. — Garoafe de munte. — Buglyos szegfü. — Pracht-Nelke. — Гвоздика пышная. — Exs.: FRE nr. 1690. — Ic.: Pl. 39, fig. 2, 2a.

4. Tulpină de 30—60 cm înălțime, cilindrică, netedă, la bază ascendentă, furcat ramificată în partea superioară, formează puțin lăstari la bază. Frunze

verzi, glabre, cele inferioare liniar lanceolate, late de 3—10 mm, cu nervura mijlocie puternică și cu 2 nervuri laterale, pe margini scabre, cele inferioare obtuziuscule, cele superioare acute până la acuminate. Vagina de 4—6 mm lungime. Inflorescență compusă din 6—12 flori. Scvame calicine glabre, îngust marginate, acute sau scurt aristate, cât jumătatea lungimii caliciului. Caliciu de 2,3—2,8 cm lungime, de 6 ori mai lung decât lat, verde sau violet maculat. Lamina petalelor aproape până la bază fimbriat divizată, albă sau roză, adeseori de 2 cm lungime, la bază barbată, cu peri liliachii. Capsulă mai lungă decât caliciul. Semințe de 2 mm lungime. VI—VIII.

Stațiunea. Prin poieni, livezi, în regiunea montană.

Răsp. în țară: Frecventă în regiunea montană a Carpaților.

Variabilitatea speciei

var. *speciosus* (Rchb.) Hay. Fl. Steierm. I (1908) 323. — *D. superbus* β . *speciosus* Rchb. Fl. germ. exc. III (1832) 808. — **Ic.:** Pl. 39, fig. 1. — Plantă de statură mijlocie, adeseori numai cu 1—4 flori. Inflorescență condensată. Caliciu violaceu. Lamina petalelor lungă de 20—25 mm, la bază întunecat barbulată. — **Reg. Baia Mare:** Mții Rodnei (Corhele Pietrosului). **Reg. Cluj:** Mții Rodnei: Corongiș, Poiana Cornii. **Reg. Aut. M.:** Borsec (r. Toplița); Mții Giurgeului (Mt. «Öcsém»); Sâncrăieni (r. Miercurea Ciuc); Vlahița, Căpâlnița, Corund, Băile Homorod (r. Odorhei), Mții Harghita. **Reg. Stalin:** Mt. Piatra Mare. **Reg. Timișoara:** citat fără localitate din «Banat» (Heuff., Neilr.) **Reg. Prahova:** Mții Bucegi.

Răsp. gen.: Europa, Transcaucazia, Asia de N și E.

27. *D. serotinus* W. et K. Pl. rar. Hung. II (1805) 188, tab. 172. — **Ic.:** Pl. 40, fig. 3; Hay. Pflzdecke. (1916) 491.

4. Plantă albăstrui brumată. Caudiculi radicali foarte ramificați. Tulpină înaltă de 20—30 cm, cilindrică, la bază ascendentă. Frunze rigide, liniar subulate, cca de 3 cm lungime, late de 1—2 mm, obtuziuscule, ciliat scabre. Inflorescență compusă din 1—3 flori. Flori solitare, slab mirositoare. Pedunculi floralii cu 1—3 perechi de frunze \pm lat membranoase, scvamiforme, cca de 5 mm lungime, aproape lipsite de lamină. Scvamele involucrale calicine ovate subrotunde, membranaceu marginate, mutice, din vârful mutic se continuă într'un mucron scurt, de 3 sau 4 ori mai scurt decât tubul. Caliciu lung de 2,2—2,7 cm și lat de 3—4 mm, de obicei palid galben. Dinții caliciului scurți, rotunjit obtuși. Petale albe, obovat cuneate, abia până la 1/3 parte digitat multifide, de 1,2—1,8 cm lungime. Petale barbulate la gât. Lamina petalelor lungă de 1—1,5 cm. Capsulă puțin mai lungă decât caliciul. Ginoforul de 2 mm lungime. Semințe lungi de 3 mm. VII—X.

Stațiunea. În locuri nisipoase, coline nisipoase.

Răsp. în țară: în lungul Someșului pe nisipuri; în lungul Prutului pe nisipuri.

Variabilitatea speciei

var. *demissorum* (Borb.) Novák. Monogr. Stud. *Dianthus* (1927) 75. — *D. spiculifolius* f. *demissorum* Borb. in Term. füz. XII (1889) 44. — *D. serotinus* var. *transsilvanicus* Novák in Věstník Královské České, Třída II (1923) 20. — Tulpini multiflore. Scvamele caliciului mai obtuze; frunze mai late, cele tulpinale mai lungi decât articulele tulpinii. — *Reg. Stalin*: Rupea, Racoșul de Jos; Orașul Stalin și V. Timișului (dubioasă după Novák l.c.); Dl. Roșu lângă Sebeș.

Răsp. gen.: Ungaria, Iugoslavia.

28. *D. spiculifolius* Schur Enum. pl. Transs. (1866) 98. — Barba ungu-
rului. — Tűlevelű szegfű. — Nadelblättrige Nelke. — Exs.: FEAH nr. 3238
sub *erythroc.*; FHE nr. 555 sub *erythroc.*; FRE nr. 241 sub f. *pseudoplum.*,
nr. 242 sub var. *petraeif.* — Ic.: Pl. 39, fig. 3a; Römer Burzenl. (1898) tab.
17; Hay. Pflzdecke. (1916) 430.

4. Rădăcină solidă, multicapitată. Plantă tufosă, cu tulpini numeroase,
tetragonale în partea superioară și cilindrice în partea inferioară, cu 1 (2)
flori albe sau rozee. Frunze verzi, liniar subulate, neîntepătoare, 3-nervate,
pe margini serulat scabre, cele inferioare lungi de 2 cm, mai scurte decât arti-
culele tulpinii, late de 1—1,5 mm, cu vagina lungă de cca 2 mm. Scvame
calicine 2—4, ovate eliptice, pelucid marginate, 3-nervate, lungi de 3 cm și
cu arista scurtă de 1—4 mm, de abia ajung până la 1/3 parte a caliciului.
Caliciu glabru, verde sau puțin purpuriu nuanțat, de 2,1—2,7 cm lungime
și lat de 4,5 mm. Dinții caliciului pe margini dens sbârlit păroși și scurt aris-
tați. Lamina petalelor lungă de 1—2 cm, albă sau rozee, subrotundă, de
2 ori mai scurtă decât unguicula, dela 1/3—1/2 laciniată; laciniile bi- sau
trifide, areola mijlocie (partea nelaciniată) ovată sau alungit romboidală.
VI—VIII.

Stațiunea. Pe stânci calcaroase din regiunea montană până în cea
alpină.

Răsp. în țară: *Reg. Cluj*: Mții Bihorului: Piatra Arsă în Vlădeasa; Cheia Turzii,
Poșaga de Sus pe Mt. Scărița, Colții Trascăului (r. Turda); Vidra (r. Câmpeni). *Reg. Aut. M.*:
Borsec (r. Toplița); Mții Giurgeului; Hăghimașul Mare, Mt. «Öcsém»; Tușnad pe Mt. Búdös
(r. Miercurea Ciuc); Merești (r. Odorhei). *Reg. Stalin*: Racoșul de Jos (r. Rupea); Orașul
Stalin, Mții Bucegi, Mt. Piatra Craiului. *Reg. Hunedoara*: Mții Trascăului pe Piatra Caprei,
Alba Iulia. *Reg. Pitești*: Mții Făgărașului: Surul, Negoicul, Moldoveanul; Mții Dâmboviței.

Plansa 39. — 1. *Dianthus superbus* L. ssp. *speciosus* (Rchb.) Hay. — 2. *D. superbus* L.,
2a. o petală mărită. — 3. *D. spiculifolius* Schur., 3a. o petală mărită. — 4. *D. J. - Wolffii*
Pét., 2 petale. — 5. *D. carthusianorum* L., 2 petale. — 6. *D. spiculifolius* Schur var. *petraei-*
formis (Pét.), 2 petale (lamine). — 7. *D. spiculifolius* Schur var. *integripetalus* (Schur), 3
petale (lamine).



Reg. Ploesti: Mții Bucegi: Vf. cu Dor, Piatra Arsă, Jepi, V. Cerbului, Schitul Peștera; Mții Buzăului: Penteleu. *Reg. Bacău*: Tulgheș la Pietrile Roșii, Cheile Bicazului, Mții Giurgeului: Mt. Ghilcoș, Surduc, Suhardul Mic, Piatra Glodului, Piatra Panțirului, Mt. Vita.

Variabilitatea speciei

- 1 a Baza corolei florilor fără pată evidentă de culoare mai închisă..... 2
1 b Baza corolei florilor cu o pată murdară sau de culoare măslinie, barbată tot în aceeași culoare

var. *Csapodyae* Jáv. et Újhelyi in BK XL (1943) 48. — *Mții Giurgeului*: Mt. Vitai

- 2 a Flori mari. Lamina petalelor lungă cât jumătatea unguiculi sau mai lungă decât aceasta, până la mijloc sau mai profund laciniat multipartită, albă sau palid roză, mai adeseori cu peri purpurii, fin barbată. Plantă verde, abia suriu nuanțată, cu frunze de 1—1,5 mm lățime

var. *pseudoplumarius* Péterfi in MBL XV (1915) 9, cu următoarele forme:

f. *Péterfi* Kárp. in Borbásia I (1938—39) 11. — Plantă foarte pruinoasă, cu frunze mai late, de 1,5—2 mm lățime. — *Mții Bârsei*: Mt. Piatra Mare. *Mții Bistriței*: Mt. Măgura.

f. *roseiflorus* (Schur). — *D. plumarius* b. *roseoflorus* Schur Enum. pl. Transs (1866) 98, excl. syn. — Cu flori rozee. — Mții Bucegi.

f. *erythrocalyx* (Schott). — *D. erythrocalyx* Schott Pl. Transs. nr. 444, sec. Borb. in Term. füz. XII (1889) 42. — Caliciul roșu. — *Mții Rodnei*: Corongiș. Mt. Rarău

- 2 b Flori mijlocii. Lamina petalelor relativ scurtă. Dinții caliciului scurt mucronați 3
3 a Lamina petalelor scurt fimbriată; partea fimbriată mai scurtă decât partea întreagă uneori aproape numai crenată pe margini, \pm cât 1/2 lungimii unguiculi, la bază fin barbulată sau nebarbulată. Scvamele caliciului obtuze. Frunze late de 0,5 mm. Seamănă cu *D. petraeus*

var. *petraeiformis* (Péterfi). — *D. spiculifolius* f. *petraeiformis* Péterfi in MBL XV (1916) 10. — *Exs.*: FRE nr. 242. — *Ic.*: Pl. 39, fig. 6. — *Reg. Cluj*: Cheia Turzii, Rii metea (r. Turda). *Reg. Aut. M.*: Mții Giurgeului (Mt. «Öcsém»). *Reg. Stalin*: Mții Bucegi.

- 3 b Lamina petalelor pe margini aproape întreagă, la gât aproape nudă. Scvamele caliciului la vârf cu mult mai obtuze și mai scurt aristate

var. *integripetalus* (Schur). — *D. integripetalus* Schur. Enum. pl. Transs. (1866) 98. — *D. spiculifolius* f. *integripetalus* Péterfi l.c. — *Ic.*: Pl. 39, fig. 7. — *Reg. Cluj*: Cheia Turzii, Rimetea (r. Turda). *Reg. Stalin*: Mții Bucegi.

Răsp. gen.: Endemism în Carpații sudestici.

29. *D. Simonkaianus* Péterfi in MBL XV (1916) 14. — *D. integripetalus* Simk. Enum. Fl. Transs. (1886) 121, p.p., non Schur, l.c. — *D. integripetalus* G. et J. Wolff ap. Vierh. in Kern. Sched. ad FEAH IX (1902) 16. — *Exs.*: FEAH nr. 3239 sub *integripet.*; FHE nr. 556; FRE nr. 45, a, b. — *Ic.*: Pl. 40, fig. 1.

4. Plantă de culoare verde vie, dens cespitoasă, formează covoare. Tulpină înaltă de 10—30 cm, simplă sau ramificată, cu 1—6 flori, multifo-

liată. Frunze foarte rigide, de 2 cm lungime, liniar subulate, acute 3-nervate, înțepătoare, glaucescente. Scvame calicine 4, cele externe eliptice până la ovate eliptice, acute sau acuminate. Caliciu cilindric, lung de 20—26 mm și lat de 2 mm, la vârf atenuat. Scvame de 5 ori mai scurte decât caliciul. Lamina petalelor odorantă, lungă de 4—8 mm, inegal dentată sau aproape întreagă, albă, se ridică mult din caliciu. VI—VII.

Stațiunea. Locuri stâncoase, calcaroase.

Răsp. în țară: *Reg. Cluj*: Poșaga de Sus, Belioara și în Cheile Runcului (r. Turda).

Răsp. gen.: R. P. Română, R. P. Bulgaria, Macedonia.

30. **D. Kitaibelii** Janka in Panč. Nov. elem. Fl. princ. Bulg. (1886) 78, non M.B. (1808) cf. Schischk. in Fl. U.R.S.S. VI (1936) 845. — *D. petraeus* W. et K. Pl. rar. Hung. III (1812) 246, tab. 222. — Exs.: FHE nr. 557, I, II; FRE nr. 247 sub *Kitaib.* — Ic.: Pl. 40, fig. 2, 2a; W. et K. Pl. rar. Hung. III (1812) 246, tab. 222.

4. Plantă cespitoasă (adeseori formează covoare), glabră. Caudiculi radicanți, foarte ramificați. Tulpinile cu baza culcată, mai sus devin erecte, 4-unghiulare, înalte de 20—30 cm, 1—3-flore (deobicei uniflore). Frunze uniform liniar subulate, ciliat scabre, slab înțepătoare, lungi de 3,5 cm, pe dos proeminente 3—5-nervate, tari, la bază late de 1—3 mm, pe margini scabre. Flor odorante. Scvame calicine 4—6, ovate, obtuze, scurt aristate, cu arista de 1—2 mm, de 4 ori mai scurte decât tubul caliciului. Caliciu de 3 cm. Dinții caliciului aristați. Petale albe, de cca 1 cm lungime, nebarbulate, cu lamina până la 1/2 digitat multifidă; areola mijlocie oblongă sau \pm lat romboidală, din care cauză petalele alcătuiesc un cerc închis. Capsula nu întrece caliciul în lungime. V—VII.

Stațiunea. În fânețele din regiunea subalpină.


Răsp. în țară: *Reg. Timișoara*: Ciclova (r. Oravița), Băile Herculane, munții din defileul Dunării; Mții Mehedinților: V. Teșnei la Gaura Fetei. *Reg. Pitești*: V. Mănăstirii Bistrița, frecventă (r. Horezu).

Variabilitatea speciei

var. *hunyadiensis* Jáv. in BK XX (1922) 149. — Petale adeseori mai lung laciniate. Scvamele externe calicine se contrag într-o aristă lungă de mai mulți mm. Marginea frunzelor adeseori în întregime netedă. Se aseamănă atât cu *D. Kitaibelii*, cât și cu *D. spiculifolius*. — *Reg. Hunedoara*: Mții Retezatului și în jurul Petroșanilor.

Răsp. gen.: Balcanii de E.

Planșa 40. — 1. *Dianthus Simonkaianus* Pét. — 2. *D. Kitaibelii* Jka. 2a. idem., cea mai sectată petală. — 3. *D. serotinus* W. et K. — 4. *D. nardiformis* Janka.



Sect. IV. BARBULATUM F. N. Williams in Journ. of. Bot. XXIII (1885) 344; in Journ. Linn. Soc. XXIX (1893) 355, 412.

Plante ramificate, unele purtând pe lângă tulpini fertile și tulpini sterile neramificate. Rădăcinile groase, uneori fusiforme și îngroșate. Lamina petalelor rozee până la purpurie sau albă, pe margini dințată și la bază slab barbulată. Flori de obicei solitare, mai rar capitate.

31. *D. collinus* W. et K. Pl. rar. Hung. I (1802) 51, tab. 38. — Ic.: Pl. 34, fig. 4; W. et K. Pl. rar. Hung. I (1802) tab. 38.

4. Tulpina dens foliată, mărunț scabru pubescentă. Frunze liniar lanceolate, brusc contrase într'un vârf acuminat; cele inferioare late de 5—8 mm, cele mijlocii și superioare late de 3—5 mm, cu vagina scurtă, de 2 mm lungime, 3—5- sau multinervate, pe ambele fețe scurt scabru pubescente (mai evident pe margini și pe nervura mijlocie). Flori scurt pedicelate, așezate în capitule pauciflore, cu 2—8 flori. Scvamele externe ale caliciului la bază membranacee, ovate, contrase într'un vârf ierbaceu, lung cât jumătatea caliciului, pe margini scabru. Caliciu cilindric, de 1,4—1,8 mm lungime, longitudinal nervat, glabru, de un verde palid, rar roșietic nuanțat la vârf. Lamina petalelor lungă de 7—12 mm, purpurie, la vârf inegal dințată, la bază barbulată și maculată. VII—X.

Stațiunea. Prin locuri ierboase, poieni.

Răsp. în țară: Plantele indicate de pe teritoriul țării noastre aparțin la *D. glabriusculus* Kit. f. *subcollinus* Nyár. Numai o parte neînsemnată, adunată de pe Mt. Ceahlău la alt. 1300—1800 m, sunt *D. collinus* W. et K., având forma frunzelor, cât și părozitatea tulpinii și a frunzelor la fel cu cele autentice din Ungaria.

Variabilitatea speciei

var. *sylvaticus* (Hoppe). — *D. sylvaticus* Hoppe in Willd. Enum. Hort. Berol. (1809) 467. — Întreaga plantă netedă, glabră. Flori câte 2. Scvamele externe calicine ovate, neciliate, contrase într'o aristă lungă cât 1/3 parte a caliciului. Caliciu cu dinți lat lanceolați. — Indicat fără localitate din centrul Transilvaniei.

Răsp. gen.: Alpii estici, Balcanii de N, U.R.S.S. de S.

32. *D. deltoides* L. Sp. pl. ed. I (1753) 411; Schischk. in Fl. U.R.S.S. VI (1936) 838. — Ic.: Pl. 41, fig. 4.

4. Tulpini sterile neramificate, alungite, de 5—15 cm lungime, dens foliate, cu frunze eliptic lanceolate, obtuze, 3-nervate, scurt ciliate. Tulpini florifere lung ramificate, pubescent scabre, înalte de 20—45 cm, cu frunze liniare sau liniar lanceolate, late de 1—3 mm, 3-nervate, pe margini fin scabre. Vagine foarte scurte. Flori numeroase, solitare, pe pedunculi lungi

de 1,2—2,5 cm. Scvame calicine externe eliptice, ierboase, pe margini membranoase, la vârf contrase într-o aristă ierbacee, lanceolată, lungă cât $1/2$ din lungimea caliciului. Caliciu cilindric, uneori purpuriu, de 1,5 cm lungime și 2 mm lățime, glabru sau rar fin păros. Lamina petalelor obovată, purpurie sau de un roșu-carmin, alb maculată, dințată, mai lungă decât jumătatea caliciului. Capsulă de lungimea caliciului sau puțin mai lungă, aproape sesilă, cilindrică. Semințe mici, de 2—2,5 mm lungime, ovate, negre, ascuțite spre vârf. VI—IX.

Stațiunea. În poienile pădurilor, în locuri ierboase și uscate din regiunea dealurilor.

Răsp. în țară: *Reg. Baia Mare:* Vișeu de Sus pe Cozia, Borșa sub Dl. Bălan. *Reg. Cluj:* Văleni (r. Huedin); Neagra spre Mt. Cucurbeta (r. Câmpeni). *Reg. Aut. M.: Turia pe Mt. «Büdös»* (r. Tg. Săcuesc). *Reg. Stalin:* Mt. Postăvarul, Mții Bucegi. *Reg. Galați:* pe coastele dela Barboși (r. Galați). *Reg. Bacău:* Mrea Neamț. *Reg. Suceava:* Fălticeni.

Răsp gen.: Eurasia, America de N.

33. **D. Racovitzae** Prod. in Bul. Soc. Șt. Cluj. X, 2 (1948) 162. — *D. pratensis* Auct. rom., non M.B. — **lc.:** Pl. 38, fig. 4.

4. Rădăcină verticală, fusiformă, cu mai multe tulpini formând tufe. Tulpina de 40—60 cm înălțime, la bază lemnoasă, glabră, ramificată în $1/4$ — $1/3$ superioară, cu cca 8 noduri. Frunze liniar lanceolate, de 4—4,5 cm lungime și 3—4 mm lățime, glabre, numai pe margini puțin scabre, cu 3—5 nervuri mai pronunțate. Vagina frunzelor de 2—4 mm lungime. Flori solitare sau câte 2, la vârful tulpinii sau al ramurilor laterale. Scvamele caliciului 4, pieleose, ovate, cu vârful îngustat, ascuțit și ierbos, cele externe lungi de 11—12 mm, cu o aristă verde de 5,5 mm lungime, cele interne lungi de 12 mm, cu o aristă de 3,5 mm lungime. Toate scvamele pe margini alb membranoase. La multe exemplare, pe lângă cele 4 scvame calicine, se găsesc deseori și bractei care uneori acoperă scvamele caliciului. Caliciu verde, striat, cilindric, de 16—20 mm lungime și 4 mm lățime, cu dinții lungi de 3 mm, ascuțiți, brunii. Petale rozee sau purpuriu rozee, de 20 mm lungime. Limbul de 7 mm lungime și 5 mm lățime, cu suprafața slab pubescentă, spre bază cu un șir de puncte roșii așezate în zig-zag, cu marginea neregulat dințată. V—VI.

Stațiunea. Prin locuri alcaline.

Răsp. în țară: *Reg. Galați:* în jurul Lacului Sărat la Brăila. *Reg. Iași:* șesul Prutului la Sculeni (r. Iași).

Răsp. gen.: Endemism.

D. Racovitzae comparat cu *D. pratensis* din U.R.S.S.*D. pratensis* M. B.

Tulpină de 15—40 cm înălțime, ierboasă și numai la bază fin lignificată, glabră, neramificată sau rar unele exemplare foarte slab dichotomic ramificate.

Internodiile mijlocii de 15—16 (21) mm lungime.

Frunze tulpinale liniare, moi, lungi de 18—20 mm, late de 1—1,5 mm, 3—5-nervate, cu nervura mediană foarte pronunțată.

Scvamele externe lanceolate, lungi de 3—4 mm și late de 2,5 mm, contrase într'un apendicel de 2 mm lungime.

Scvamele interne lungi de 5 mm, contrase abrupt într'un apendicel de 2 mm lungime.

Scvamele caliciului cât jumătatea caliciului de lungi.

Caliciu lung de 20 mm.

D. Racovitzae Prod.

Tulpină robustă, de 40—60 cm înălțime, sublemnoasă, glabră, în 1/2—1/4 parte dichotomic ramificată.

Internodiile mijlocii de 4—5 cm lungime.

Frunze tulpinale liniare sau liniar lanceolate, lungi de 4—4,5 cm, late de 2—4 mm, 3—5-nervate și cu mai multe nervuri mai puțin pronunțate.

Scvamele externe de 11,5 mm lungime, din care partea inferioară lungă de 6 mm, iar arista lungă de 5,5 mm.

Scvamele interne lungi de 12 mm, continuate într'o aristă lungă de 3,5 mm.

Unele scvame cât jumătatea caliciului, altele ating dinții caliciului și mai rar unele de lungimea caliciului.

Caliciu lung de 16—20 mm.

34. *D. guttatus* M.B. Fl. taur.-cauc. (1808) 328; Schischk. in Fl. U.R.S.S. VI (1936) 829, tab. LII, fig. 4. — *D. guttatus* M.B. var *typicus* Prod. f. *latifolius* Prod. in Bul. Soc. Șt. Cluj X, 2 (1948) 180. — Ic.: Pl. 38, fig. 3, 3a.

24. Plantă gracilă, cu rizom gros, prevăzut cu rădăcini numeroase, emite o tulpină înaltă de 40—50 cm, foarte puțin arcuită în partea inferioară, iar în 1/3 superioară dichotomic ramificată, cu 4—8 ramuri. În general tulpina 4-unghiulară, subțire de 1—1,5 mm, glabră, netedă, în partea inferioară fin striată, noduroasă; noduri 5, rar până la 7. Internodii lungi, cele mijlocii de 45—65 mm lungime. Frunze îngustate la ambele capete, graminiforme, moi, liniare sau îngust liniare, lungi de 5—8,5 cm, împreună cu vagina late de 3—4 mm, cu 3 nervuri proeminente, pe ambele fețe glabre, la vârf acuminate, alungit acuminate sau aproape aristate. pe margini scabre, cele inferioare încep a se vesteji pe timpul înfloririi. Vagina frunzelor de 3,5—4,5 mm lungime, aproape de lățimea frunzelor. Flori solitare. Scvame calicine 4, gălbui-brunii, sau stramineu-verzui, ovate lanceolate, lungi de 6 mm și late de 3 mm, pe margini îngust membranoase, destul de solide, contrase într'un acumen verde, lanceolat subulat, solid, lung de cca 14 mm, pe dos 5-nervat (-7) și scabriuscul; scvamele interne uneori la fel cu cele externe, cel mult acumenul la unele exemplare mai scurt,

adeseori însă scvamele calicine interne mai late și pe margini mai lat membranoase, iar acumenul numai de 8 mm lungime. Toate scvamele calicine de culoare straminee sau stramineu-verde, cu marginea membranoasă, fin și scurt ciliată, uneori numai în parte. Caliciu verde în partea inferioară și de culoare straminee în partea superioară, de 18—19 mm lungime, uneori din loc în loc slab scabru pubescent, cu dinții lungi de 5 mm, la vârf de obicei membranoși, mai acuti sau acumițați, pe margine îngust membranoși și scurt ciliați. Petale roze, cu lamină rotund cuneată, lungă de 9 mm și lată de 7 mm, pe față la bază punctată (uneori prin unirea punctelor formându-se o linie roșcată sau brună) și răriț barbulată, pe margini inegal scurt dințată. Capsulă de lungimea caliciului. VI—VIII.

Stațiunea. Prin poienile pădurilor și prin fânețele de luncă.

Răsp. în țară: *Reg. Ploști*: Buzău, în pădurea Crângu.

Variabilitatea speciei

ssp. **pseudo-Grisebachii** (Grec.).— *D. Pseudo-Grisebachii* Grec. Consp. Fl. Rom. (1898) 100.

Planta se prezintă ca o tufă mică de 8—10 cm înălțime, verde, pubescentă, compusă din 3—5 tulpini subțiri, simple sau puțin ramificate, care pornesc dintr-o rădăcină fusiformă, verticală, simplă. Frunze moi, uninervate, de 2 cm lungime și late de 2 mm, acute sau obtuze și scurt vaginate. Scvame involucreale calicine 2, ovate lanceolate, contrase într'un acumen alungit, moale, verde și acuminat, ce abia egalează tubul caliciului, care este puberul. Petale oblongi, cu lamină paucidentată, barbulată, purpurie, semănată cu puncte alburii, la mijloc și la bază cu puncte închise ce descriu un arc. — Crește pe locuri cu iarbă.

Reg. Bârlad: în lunca Zeletinului lângă Podul Turcului (r. Răchitoasa).

Plante care nu sunt absolut identice cu ssp. au fost colectate din următoarele localități:

Reg. Craiova: fânețele din Lunca Craiovei la Popoveni. **Reg. Ploști:** Coșereni, Armășești, Bărbulești (r. Urziceni); Policiori (r. Beceni) **Reg. Galați:** Gara Roșeti (r. Filimon Sârbu).

var. **tarutinoensis** Prod. et Borza in Bul. Soc. Șt. Cluj, X, 2 (1948) 166 — Tulpină dreaptă; ramurile înaintază paralel cu tulpina principală. Acumenul sau prelungirea arsitiformă a scvamelor uneori ajunge dinții caliciului, alteori nu îi atinge. — **Reg. Ploști:** Tăbăraști (r. Buzău); Pogoanele.

var. **latifolius** Prod. l.c. (1948) 168. — Statură mai înaltă. Ramuri răsfirate. Frunze mai late, evident 3—5-nervate. Scvame calicine foarte bine dezvoltate. Caliciu mai lung. — **Reg. Ploști:** Buzău în pădurea Crângu.

Planșa 41. — 1. *Dianthus campestris* M.B. — 2. *D. callizonus* Schott et Ky. — 3. *D. gelidus* Schott, Nym. et Ky., 3a. idem, cu statură mică, 3b. petală de *D. glacialis* Hke., 3c. petală de *D. gelidus*, pentru comparație. — 4. *D. deltoides* L.



var. *Porciusii* Prod. l.c. (1948) 169. — Tulpină mai mică, mult ramificată; ramurile răsfirate. Intreaga plantă de un verde mai deschis, glaucă, cu frunze mai late și scvame mai verzi. — *Reg. Ploști*: prin livezile Călmățuiului aproape de Comuna Caragelele (r. Pogoanele).

ssp. *divaricatus* Prod. ssp. nova in Add. pag. 669.

Plantă gracilă, înaltă de 40—50 cm, cu tulpină verzuie, netedă, divaricat ramificată, prevăzută cu numeroase noduri puțin umflăte; distanța dintre nodurile mijlocii de 4,5—5 cm. Frunze scabre, liniare, late de 2,5 mm și lungi de 4—5,5 cm, lung acuminate, cu vagina scurtă de 2—4 mm (atât cât înconjură nodul tulpinii), 3-nervate, pe margine scabru dințate. Frunzele inferioare și mijlocii de obicei mai lungi decât distanța dintre noduri. Flori solitare, dispuse la vârful ramurilor. Scvame involucrale calicine 4, la bază alburii, pe margini \pm membranoase, în rest verzi, nervate, ovat lanceolate, lungi de 16 mm, contrase într'un acumen alungit, verde, acuminat, ce ajunge sau abia ajunge la vârful caliciului. Tubul caliciului lung de cca 18 mm și lat de 4 mm. Petale oblongi, cu lamina liliachiu-albastră, paucidentată, barbulată pe față. — Prin semănături.

In jurul Craiovei.

Răsp. gen.: Europa sud-estică.

35. *D. campestris* M.B. Fl. taur.-cauc. I (1808) 326, 427; Schischk. in Fl. U.R.S.S. VI (1936) 830, tab. LI, fig. 6. — Ic.: Pl. 41, fig. 1.

4. Plantă multicaulă, de 15—35 cm înălțime, ierboasă sau numai puțin lemnoasă, la bază pubescentă, mai rar glabră. Tulpinile și frunzele \pm rigide. Frunze 3-nervate, înguste sau lanceolat liniare, acuminate, glabre sau pubescente, de obicei mai lungi decât internodiul, de 3—7 cm lungime și 2—4 cm lățime. Teaca scurtă, de 2—4 mm lungime. Flori de obicei solitare sau câte 2, dispuse la vârful tulpinii și al ramurilor, formând o paniculă rară, foarte lax fasciculată. Scvame calicine 4—6, coriacee, ovate, contrase dela bază într'un vârf scurt subulat, lung cât jumătatea caliciului. Caliciu cilindric, lung de 16—18 mm. Lamina petalelor invers ovată, rozee sau purpurie, pubescentă la bază, pe dos gălbuie sau verzui galbenă și pe margini dințată, de 6—7 mm lungime și lată de 3 mm, constituie 1/3 parte din lungimea caliciului. VI—VII.

Stațiunea. Pe dealuri, în pajiști uscate.

Răsp. în țară: *Reg. Bacău*: Mrea. Agapia, Mrea. Neamț (r. Tg. Neamț).

Răsp. gen.: Europa centrală și sud-estică.

36. *D. Șerbanii* Prod. comb. nova. — *D. campestris* M.B. ssp. *Șerbanii* Prod. Cons. Fl. Dobr. in Bul. Acad. Stud. Agron. Cluj V, 1 (1935) 259, Sep. p. 87, tab. 18, cum descr. rom. et germ. — Ic.: Prod. Cons. I (1935) Pl. 18, pro ssp.

4. Plantă gracilă, dar mai robustă decât precedenta, glaucă, cu rizom gros și lemnos, din care ies numeroase tulpini subțiri (1—1,5 mm) însă destul de solide, lungi de 30—46 cm, la bază puțin culcate, apoi erecte, în partea superioară bifidat ramificate, mai rar simple. Tulpina în partea superioară cilindrică sau subpatrunghiulară, mărunț scabriuscul pubescentă, de obicei cu 6—9 noduri frunzoase. Îndesuite în partea inferioară (internodiile de cca 1,5—3 cm lungime), iar în partea superioară rărite, cu internodiile de 6—6,5 cm lungime. Frunze subțiri, ierboase, moi, îngust liniare, lungi de 3,5—4,5 cm și late de 1,5—2,5 mm, cu 5 nervuri pronunțate și cu câteva mai puțin pronunțate, pe fața superioară scabre sau scabriuscule, pe fața inferioară scabre sau mărunț scabru-pubescente, cu deosebire pe nervuri, pe margini foarte scabre, la vârf acute, atenuat acuminate, uneori puțin convolute spre vârf. Vagina frunzelor lungă de 5—7,5 (10) mm, evident striată și scabriusculă sau aproape netedă. Flori în capitule pauciflore, solitare sau subfasciculat agregate, cu 2—3, rar 4 flori. Foliiolele bracteiforme de sub inflorescență cu margini membranoase, lungi de 9,5 mm, din care 2,5 mm are arista verzuie și scabră. Scvamele caliciului 4—6, inegale, de 10 mm lungime, din care cca 2 mm are arista scabră, cu margini lat membranoase, late de 3,5 mm, lat lanceolate sau alungit ovate, cele 2 interne ceva mai membranoase. Scvamele cât jumătatea caliciului sau cu puțin mai scurte. Caliciu de obicei verde, foarte rar slab purpuriu pătat, cu dinții inegali, lungi de 4—4,5 mm, pe margine îngust membranoși și scurt ciliați, la vârf acuți sau aristați. Lamina petalelor purpurie pe ambele fețe, de 10 mm lungime și lată de 5 mm, la bază barbulată, pe margini inegal denticulată. VI—VIII.

Stațiunea. Prin fânețele din regiunea de câmpie.

Răsp. în țară: *Reg. Constanța*: dealungul căii ferate dela Medgidia spre Negru Vodă.

Răsp. gen.: Endemism.

Obs.: *D. Șerbanii* are multă asemănare cu *D. campestris*, *D. guttatus* și *D. Racovitzae*. *D. campestris* diferă de *D. Șerbanii* prin tulpina mult mai scundă, prin frunzele mărunț pubescent scabre (iar nu mărunț scabriuscule), precum și prin vaginele cu mult mai scurte. *D. guttatus* M.B. se deosebește de *D. Șerbanii* Prod. prin internodiile mai lungi și mai puține, ramificația mai evidentă în partea superioară, tulpini și frunze glabre, frunze mai late. Vaginele mai scurte, scvamele calicine de lungimea caliciului sau ceva mai scurte. Caliciul întotdeauna de un verde mai deschis, iar dinții la vârf mai membranoși. Petale de un roz mai deschis, cu lamina de altă formă și punctată.

D. Racovitzae diferă de *D. Șerbanii* prin tulpina mai solidă, sublemnoasă, cu noduri mai evidente, frunze mai lungi și mai late. Mai diferă prin scvamele calicine de obicei cu mult mai lungi decât jumătatea caliciului și mai membranoase.

37. **D. nardiformis** Janka in ÖBZ XIII (1873) 195. — **Exs.:** FRE nr. 402. — **Ic.:** Pl. 40, fig. 4; Prod. Consp. Fl. Dobr. I (1935) Pl. 26.

24. Plantă cenușie, glabră, îndesuit tufoasă, relativ mică, de cca 10—15 cm, cu numeroase tulpini drepte, la vârf dichotomic ramificate, cu câte 2—3 flori apropiate. Frunze liniar setacee, aciculare, lungi de 2,5 cm, foarte subțiri, aproape setiforme, late de 0,5—1 mm, \pm tari, adeseori rigide, pe margini cartilagos serulate, cu vagină foarte scurtă. Scvame calicine 4—6, palide, brunii, subcartilaginoase, eliptic oblongi, alungite într'o aristă patulă, scurtă. Caliciu lung de 18—20 mm. Lamina petalelor deschis purpurie sau roșie-liliachie, la bază barbată. VI—VIII.

Stațiunea. Pe stânci, în locuri pietroase, prin pășuni foarte uscate.

Răsp. în țară: *Reg. Constanța*: Bălăgești pe Dl. Alah-Bair (r. Hârșova); *Constanța*. *Reg. Galați*: Filimon Sârbu pe Dl. Consul, Niculițel (r. Tulcea); Măcin pe Dl. Suluc și Dl. Pricopan, Turcoaia pe Dl. Pricopcea, Greci pe Dl. Tuțuiatul (r. Măcin).

Variabilitatea speciei

f. *sobolifer* Prod. f. nova in Add. pag. 670.

Rădăcina principală emite numeroși stolonii subțiri, subterani (soboli), de 4—5 cm lungime, lipsiți de frunze. — *Reg. Galați*: Tulcea.

Răsp. gen.: Iugoslavia, Bulgaria.

Secția V. LEIOPETALI Boiss. Fl. or. I (1867) 479. — *Tetralepides leiopetala* F.N. Williams in Journ. of. Bot. XXIII (1885) 346.

Plante perene de stepă caldă (plante înalte) sau rece (plante scunde). Caliciul cu 4 scvame.

38. *D. pällens* Sibth. et Sm. Fl. graec. Prodr. I (1806—9) 286. — **Exs.**: FRE nr. 1695. — **Ic.**: Pl. 42, fig. 1.

☉ — 24. Tulpină de 80 cm înălțime, paniculat corimboasă. Frunze liniare, pe margini scabre, cu vagina de diametrul tulpinii. Scvame calicine 4, obovate, coriacee, scurt cuspidat acuminate, \pm lat marginate. Caliciu de 20—24 mm lungime. Lamina petalelor cuneat obovată, emarginată, obtuz dințată, pe față albă, pe dos spălăcit verzuie. VI—VII.

Stațiunea. Câmpuri însoțite, stepe.

Răsp. în țară: *Reg. Constanța*: stepele Ialomitei la Fetești, Hagieni; între Cernavodă și Constanța, Constanța, Techirghiol, Tuzla, Mangalia, Cobadin (r. Constanța); Corbu (r. Medgidia); Săcele (r. Babadag); Independența (r. Băneasa).

Răsp. gen.: Balcani, U.R.S.S. de S, Caucaz, stepele chirghize până în Songaria.

39. *D. leptopetalus* Willd. Enum. Hort. Berol (1809) 468; Schischk. in Fl. U.R.S.S. VI (1936) 840, tab. LIII, fig. 1. — **Ic.**: Pl. 42, fig. 3; Săv. et Rayss Mat. Fl. Bas. II (1926) tab. IX; Prod. Consp. I (1935) tab. XVI.

☉ — 24. Tulpină lignificată, la bază dreaptă, înaltă de 50—60 cm, slab ramificată, cu noduri îngroșate, la bază pubescentă, în partea superioară

netedă, împreună cu frunzele de culoare verde glaucescentă. Frunze liniare, \pm rigide, cele inferioare alungite, cele superioare scurte și subsetacee. Flori solitare, lung pedunculat. Scvame involucrale calicine 4, de 4 ori mai scurte decât caliciul, obovate, obtuze, trunchiate, foarte scurt mucronate la vârf. Caliciu îngust (23—30 mm), cilindric, cu dinți lanceolați, pe margini îngust membranoși. Lamina petalelor cuneiformă, îngustă, oblong liniară, de 12—15 mm lungime, lată de 3—7 mm, de culoare albă-gălbuie, pe fața inferioară plumburie sau plumburiu-violacee, cu vârful întreg, retuz sau prevăzut cu dințișori mici, ascuțiți sau obtuși. VI—VII.

Stațiunea. Dealuri însoarte, stepe.

Răsp. în țară: Reg. Craiova: în stepele din S. Reg. Constanța: Fetești, Hagieni, Constanța, Techirghiol, Tuzla, Mangalia, Cobadin; Corbu (R. Medgidia), Săcele (r. Babadag), Independența (r. Băneasa).

Răsp. gen.: Balcani, U.R.S.S. de S, Caucaz, stepele chirghize până în Songaria.

40. *D. glaciális* Haenke in Jacq. Collect. II (1788) 84. — Ic.: Pl. 41, fig. 3b.

4. Planta formează covoare. Tulpină scurtă (până la 10 cm), cu 1—3 flori, dreaptă sau ascendentă, cilindrică, glabră de obicei cu 1—2 perechi de frunze. Frunze înguste, de cca 2 mm lățime, proeminent uninervate, pe margini foarte fin scabru dințate. Vagina foarte scurtă, cât lățimea frunzelor. Scvamele calicine externe lungi de 1,2 cm, lanceolate, se continuă lent într-o aristă verde și moale, cca de lungimea caliciului. Caliciu lung de 1,2—1,6 cm. Lamina petalelor rozee, lungă de 5—10 mm, lată de 4—7 mm, invers ovată, la vârf \pm rotunjită. Culoarea laminei variază, poate fi și albă, iar pe dos verzuie. Lungimea laminei cât $1/4$ sau $1/2$ din lungimea unguiculei. VII—VIII.

Stațiunea. Pe culmile alpine stâncoase și ierboase.

Răsp. în țară: Mții Retezatului: Mt. Custura deasupra V. Lăpușnicul Mare, 1800—2100 m. Mții Făgărașului: Mt. Capra Budei.

Răsp. gen.: Carpații nordici, Alpi.

41. *D. gelidus* Schott, Nym. et Kotschy Anal. Bot. (1854) 53. — Garofiță de munte. — Havasi szegfű. — Alpen-Nelke. — Exs.: FEAH nr. 2498; FRE nr. 1691. — Ic.: Pl. 41, fig. 3, 3a-c.

4. Frunze în partea superioară \pm lățite, obtuziuscule, până la acute, 1—3-nervate. Vagina foarte scurtă. Scvame externe calicine 2—6, liniare,

Planșa 42. — 1. *Dianthus pallens* Sibth. et Sm. — 2. *D. pratensis* M. B. — 3. *D. leptopetalus* Willd.



înguste, cu vârful reflect. Lamina petalelor lungă de 10—12 mm, aproape tot atât de lată, invers ovat triunghiulară, la vârf aproape retezată, adânc dințată. VII—VIII.

Stațiunea. Pe culmile alpine ale Carpaților din R. P. R.

Răsp. în țară: *Mții Tibleșului*. *Mții Rodnei*: Ineu, Corongiș, Galați. *Mții Călimani*. *Mții Bârsei*: Piatra Mare, Piatra Craiului. *Mții Bucegi*: Vf. cu Dor, Furnica, Jepi, Caraiman. Coștila, Babele, V. Cerbului, Vf. Omul, V. Mălăești, Bătrâna, Strunga, Schitul Peștera. *Mții Făgărașului*: Colții Brezii, Creasta Târâța, Lacul Bălea, V. Doamnei, Negoiu. Surul, *Mții Parângului*.

Răsp. gen.: Endemism în Carpații din R.P.R.

42. *D. callizonus* Schott et Kotschy in BZ IX (1854) 192. — Garofița Pietrei Craiului. — Királyköi szegfű. — Königsteinische Nelke. — **Exs:** FRE nr. 246; FEAH nr. 877. — **Ic.:** Pl. 41, fig. 2; Pax Grundz. II (1908) 199, fig. 19; Hayek Pflzdecke (1916) 436.

4. Tulpină glabră, unifloră, de 10—20 cm lungime, neramificată, rar cu 2—5 flori. Caudiculi alungiți. Frunze bazale mai scurte decât cele tulpinale, adesea formează rozete, pe timpul înfloririi ± uscate. Frunze tulpinale puțin rigide, lanceolat liniare, obtuziuscule, acuminate, 3—5-nervate, la bază mai late, lungi de 3,7 cm, cu margini scabre. Aristele sevămelor calicine liniare, mai lungi sau mai scurte decât caliciul, în partea inferioară purpurii. Sevămele calicine mai lungi decât jumătatea caliciului, negre-purpurii, cu arista liniară, verde. Caliciu lat cilindric, de cca 16 mm lungime, purpuriu, glabru, cu dinți lat ovat lanceolați, la vârf acuminați. Petale de 1—2 cm lungime, cu puțin mai scurte decât tubul caliciului. Flori de culoare carmin, cu o zonă barbulată alburiu-brumată și catifelată, purpurie. VII—VIII.

Stațiunea. Prin locuri stâncose, ierboase.

Răsp. în țară: Mt. Piatra Craiului, în tot cuprinsul, pe versantul de V.

Răsp. gen.: Endemism în Mt. Piatra Craiului din R. P. Română.

Hibrizi

× *D. muresensis* Prod. in Bul. Soc. Șt. Cluj X (1948) 150 = *carthusianorum* var. *repentiformis* × *glabriusculus* f. *subcollinus*.

Dela *D. carthusianorum* are frunzele cu vagine lungi și lățimea frunzelor, consistența membranoasă, culoarea sevămelor, precum și arista numai de 3 mm ca și lungimea sevămelor calicine. Caliciu mai scurt. Dela *D. glabriusculus* are frunzele mai ierboase, mai subțiri, culoarea verzuie a caliciului (deobicei numai dinții și partea de sub ei slab purpurescentă), petale rozee și mai mari, de 6—7 mm lungime.

Reg. Aut. M.: Tg. Mureș pe Dl. «Bese».

× *D. subtrifasciculatus* Prod. Bul. Soc. Șt. Cluj, X (1948) 157 = *carthusianorum* × *trifasciculatus*.

Planta aduce mai mult cu *D. carthusianorum* prin nodurile mai evidente și mai depărtate ale tulpinii, forma frunzelor, împreună cu vagina destul de lungi, forma și culoarea sevămelor calicine și arista acestora. Seamănă cu *D. trifasciculatus* Kit. prin frunzele ierbacee, prin numărul nervurilor, prin foliolele involucale ierbacee de sub inflorescență, lungimea caliciului, capitulul pauciflor și prin mărimea petalelor.

Recoltat de J. Barth din Transilvania, fără indicarea localității.

× *D. szebenensis* Kárp. in Borbásia I (1938) 13 = *trifasciculatus* × *puberulus*.

Statura, inflorescența, forma sevămelor calicine, nervația frunzelor ca la *D. trifasciculatus*. Frunzele înguste, vaginele lungi de 5–6 mm, sevămele calicine roșietice și tulpinile sterile, ca acelea dela *D. puberulus*. Hibridul seamănă mai mult cu *D. trifasciculatus*, de care diferă prin frunzele mai înguste, vaginele mai lungi și tulpinile sterile.

Reg. Stalin: Turnu Roșu (r. Sibiu).

× *D. Grintzescui* Prod. in Bul. Soc. Șt. Cluj X (1948) 156 = *deserti* × *carthusianorum*.

Planta la prima vedere seamănă cu *D. deserti* Prod., de care diferă prin frunzele mai lung vaginate, dar în deosebi prin sevămele calicine externe și interne lanceolate sau ovate, cu arista mai scurtă decât caliciul. Diferă de *D. carthusianorum* prin vaginile mai lungi ale frunzelor, sevămele calicine mai late și lamina petalelor mai mare.

Reg. Timișoara: Mții Semenicului.

× *D. Jávorkae* Kárp. in Borbásia V–VI (1946) 88–89 = *Armeria* × *carthusianorum* ssp. *saxigenus*.

Plantă anuală sau bianuală, înaltă de 40–50 cm. Diferă de *D. carthusianorum* ssp. *saxigenus* Schur prin tulpina ramificată, capitulele florilor mai imputinate, sevămele calicine mai înguste și mai lungi, iar de *D. Armeria* prin statură, ramificația mai slabă, sevămele calicine mai late, mai scurte și îndeosebi prin pubescenta lor redusă. Lamina petalelor de 4–5 mm lungime.

Reg. Baia Mare: Crăcești pe V. Mara (r. Sighet).

× *D. Comanae* Prod. comb. nova = *capitatus* × *giganteiformis*. — *D. giganteiformis* Borb. var *Comanae* Prod. in Bul. Soc. Șt. Cluj X (1948) 154.

Plansa 43. — 1. *Dianthus carpaticus* Borb. = *callizonus* × *tenuifolius*, 1a. o floare. — 2. *D. chinensis* L. — 3. *D. Caryophyllus* L.



Dela *D. giganteiformis* Borb. are culoarea roșietică, precum și mărimea mai redusă a caliciului. Dela *D. capitatus* are bracteele fulcrante dela baza capitulului obovate și lățite. Diferă însă de acesta prin scvamele externe și interne nearistate, cu margini evident lat semipelucide. Diferă de toate speciile asemănătoare prin lipsa aristelor scvamelor calicine.

Reg. București: Comana (r. Vidra).

× **D. banaticiformis** Prod. l.c. pag. 152 = *banaticus* × *giganteus*.

Cu *D. banaticus* seamănă la frunzele graminiforme (de forma și consistența celor ale gramineelor), scvamele caliciului de culoare verde, asemănătoare cu frunzele și ca consistență, florile rozee mai mari, scvamele mai scurte și acoperind numai baza caliciului, cu partea liberă lungă, nu scurtă ca la *D. giganteiformis*, la care de abia se vede. Dela *D. giganteus* are forma scvamelor interne ale caliciului, lipsite de aristă. Această plantă la prima vedere apare ca un *D. giganteus* cu scvame și caliciu verzi, nu roșietice și moi, subțiri, și dinții caliciului neacuminați.

Reg. Pitești: Oteștii de Sus (r. Drăgășani), Dealul Viilor (r. Pitești)

× **D. vârciorovensis** Prod. sp. hybr. nova in Add. pag. 671 = *banaticiformis* × *capitatus*.

Dela *D. banaticiformis* are frunzele tulpinale mai mici, graminiforme și petalele mai mari. Dela *D. capitatus*, are capitulii mai mici, cu flori mai puține, caliciul mai scurt și forma scvamelor lat invers ovată.

Reg. Craiova: Vârciorova.

× **D. Tzopae** Prod. sp. hybr. nova in Add. pag. 671 = *banaticus* × *giganteiformis*.

Dela *D. banaticus* are tulpina mai bogat frunzoasă, frunze mai verzi, relativ mai moi, capituli mai lungi, mai mari, ariste scvamelor mai late și mai lungi. Asemănarea cu *D. giganteiformis* constă în scvamele calicine interne aproape nearistate, scurt acuminate, scvamele externe de culoare straminee, florile mai mici și frunzele mai late.

Reg. Timișoara: Orșova (r. Mehadia).

× **D. Borzacanus** Prod. in Bul. Inf. Grăd. Bot. Cluj. V (1925) 41 et Consp. Fl. Dobr. in Bul. Acad. Stud. Agron. Cluj V (1934) 101, tab. XXIV = *capitatus* × *giganteus*. — Ic.: Prod. Consp. I (1935) tab. XXIV.

De *D. giganteus* se apropie prin lungimea caliciului, și culoarea roșie a acestuia. Dela *D. capitatus* are frunzele fulcrante ale inflorescenței lățite la bază, precum și scvamele calicine interne aristate.

Crește în R. P. Bulgaria aproape de frontiera noastră și este posibil că va fi găsită și la noi, în sudul Reg. Constanța.

× *D. Caliacrae* Prod. in Bul. Soc. Șt. Cluj X (1948) 151 = *capitatus* × *carthusianorum*.

Dela *D. capitatus* are internodiile mai lungi ale tulpinii, frunzele mai scurte, care nu ajung până la nodul următor, mai înguste și culcate pe tulpină, glauce și numărul și lățimea mai mare a bracteiilor de sub inflorescență. Celelalte caractere, forma capitulelor, dar îndeosebi aristele foarte pronunțate ale scvamelor, culoarea caliciului și mărimea florilor, sunt dela *D. carthusianorum*.

Intre Babadag și Tulcea; între Babadag și Căugăgia (r. Babadag).

× *D. Domuglédi* Prod. l.c. pag. 150 = *capitatus* × *carthusianorum* × *giganteiformis*.

Plantă cu statură și frunze asemănătoare, cu acelea ale lui *D. carthusianorum*. După capitule, numărul florilor din capitule, forma scvamelor calicine, precum și prin vârful acuminat al scvamelor, seamănă cu *D. giganteiformis*. Culoarea scvamelor și culoarea roșietică a caliciului ne reamintesc pe *D. capitatus*. Dela *D. carthusianorum* are frunzele cu vagine lungi și arista scvamelor calicine scurtă, numai de 3 mm lungime. Caliciu mai scurt. Dela *D. giganteiformis* are frunzele mai ierbacee, mai subțiri, culoarea verzuie a caliciului (de obicei numai dinții și partea de sub ei este purpurescentă), petalele rozee și mai mari.

Reg. Timișoara: Băile Herculane pe Mt. Domogled.

× *D. Julii-Wolffii* Péterfi in MBL XV (1916) 19, excl. syn. *D. Courtoisi* Rehb. (*barbatus* × *superbus*) = *spiculifolius* × *carthusianorum* ssp. *saxigenus*. — *D. Wolffii* Janka in Herb. ap. Péterfi l.c., non Wetter in Bul. Soc. Murith. XI (1885) 32. — Exs.: FRE nr. 44 sub var. *aemulo*. — Ic.: Pl. 39, fig. 4.

De *D. spiculifolius* diferă prin tulpina mai înaltă, de 25–35 cm, ± ramificată, cu 1–5 flori. Frunze mai lungi, cele inferioare lungi de 4 cm, vagina mai lungă, de 2–3 ori cât lățimea frunzei, până la 5 mm lată. Flori mai mici, aproape fasciculate. Scvame calicine externe mai tari, aproape pielose, de culoarea paielor, până la brun roșietice, ± mai lungi decât cele dela *D. saxigenus*. Caliciu mai scurt, de 1/2–2 cm lungime. Petale mai mici, palid rozee, cu lamina de 0,7–1,2 cm, lungime, numai dințată sau slab fidată. De *D. carthusianorum* diferă prin inflorescența 1- rar bifloră.

Reg. Cluj: Poșaga de Sus (r. Turda).

var. *genuinus* (Pét.). — *D. Julii-Wolffii* a. *genuinus* Péterfi in MBL XV (1916) 19. — Flori scurt pedunculate, reunite câte 2. Scvame calicine externe palid roșietice, brune, câte 2–3 perechi, acuminate sau aristate. Petale adânc dințate, până aproape fimbriate. — Reg. Cluj: Poșaga de Sus (r. Turda).

var. *aemulus* (Pét.). — *D. Julii-Wolffii* b. *aemulus* Péterfi l.c. — Exs.: FRE nr. 44. — Flori solitare, lung pedunculate. Tulpină cu 2–4 flori Scvame calicine externe aproape ierboase, verzi, violet nuanțate, acuminat aristate. Petale slab fimbriate. — Reg. Cluj: Cheia Turzii.

× **D. Emilii-Popii** Prod. in. Bul. Soc. Șt. Cluj. X, (1948) 172) = *spiculifolius* × *carthusianorum* var. *subcarpaticus*.

Dela *D. spiculifolius* are tulpinile numeroase, pruinozitatea, frunzele fasciculelor sterile lungi de 4 cm și late de 1—1,5 mm, caliciul cu dinți obtuși, lamina ± albă a petalelor, dinții profunzi ale acestora, care uneori se transformă în fimbrii. Dela *D. carthusianorum* var. *carpaticus* are tulpini mai lungi, frunzele tulpinale, scvamele calicine (4, rar 6) de formă obovată sau cordat ovată, mai scurte decât caliciul și de culoare liliachiu-ruginie.

Reg. Hunedoara: Mții Trascăului pe Piatra Ceții.

× **D. Burciae** Péterfi et Görtler in MBL XV (1916) 20 = *callizonus* × *spiculifolius*.

Seamănă mai mult cu *D. callizonus*, însă este ceva mai înaltă. Tulpină înaltă de 15—22 cm, scabră, 1- rar 2-floră. Frunze liniar lanceolate, lungi de 15—30 mm, late de 2—4 mm, acute sau cuspidate, 3—5-nervate, cu nervurile mijlocii și laterale pronunțate, pe margini cu denticuli mici, asperul scabri; nervura mijlocie pe dos cu tuberculi asperuli. Vagina de lățimea frunzelor. Scvame 4, rar 2, cât jumătate din lungimea caliciului sau mai lungi, puțin patente, multinervate, spre bază membranaceu marginate, evident ciliate, contrase într'un vârf ierbaceu. Caliciu cilindric, verde sau violaceu, lung de 16—20 mm, lat de 4—5 mm, cu dinții lungi de 6—7 mm. Lamina petalelor lungă de 12—15 mm și lată de 10—14 mm, de un roz palid, ușor șimbriată (în 1/4—1/3 parte inciz-laciniată), la bază barbulată, cu cili purpurii fi semănată cu puncte colorate ce descriu un arc.

Reg. Stălin: Mt. Piatra Craiului: Piatra Craiului Mică, deasupra Crăpăturii.

× **D. carpaticus** Borb. in Term. füz. XII (1889) 44 = *callizonus* × *tenuifolius*. — **Ic.:** Pl. 43, fig. 1, 1a.

Plantă glabră. Tulpină de 7 cm de înaltă, subțire, patrunghiulară. Frunze liniar lanceolate, patente, cele bazale de cca 6 cm lungime, acuminate, cele tulpinale lungi de 5 cm, acute. Vagina de 2 ori mai lungă decât lățimea frunzei. Flori solitare, de 2,4—3 cm în diam. Caliciu foarte scurt, de 1,2 cm, cu dinți brunii patenți, lanceolat filiformi. Scvame calicine 2 perechi, invers lanceolate, roșietic-brunii, acuminate, cu acumen înțepător. Lamina petalelor rotundă, purpurie, pe margini dintată, în partea internă lung păroasă, de lungimea unguiculei, mai târziu reflectă. VIII.

Reg. Stălin: Mt. Piatra Craiului (2000 m).

Garoafe străine des cultivate la noi

* **D. Caryophyllus** L. Sp. pl. ed. I (1753) 410; Schischk. in Fl. U.R.S.S. VI (1936) 847. — *D. coronarius* Lam. Fl. fr. II, ed. I (1779) 536. — Garoafă. — Pomfás szegfű. — Pracht-Nelke. — Гвоздика садовая. — **Ic.:** Pl. 43, fig. 3.

4. Plantă verde-cenușie, glabră. Tulpină înaltă de 30—90 cm, la bază lemnoasă, ramificată. Frunze liniar lanceolate, late de 2—5 mm, pe margini

netede, la bază scabre. Flori solitare sau fasciculate, odorante, mari, de 2,5—5 cm. Scvame externe de obicei 4, se continuă într'o aristă verde, scurtă. Caliciu de 7—8 mm lăţime. — Inrudită cu *D. silvestris*.

Originară din Europa sud-vestică. La noi cultivată ca plantă ornamentală.

* *D. chinensis* L. Sp. pl. ed. I (1753) 411; Schischk. in Fl. U.R.S.S. VI (1936) 823. — Garofițe. — Kinai szegfű. — Chinesische Nelke. — Гвоздика Китайская. — Ic.: Pl. 43, fig. 2.

○. Plantă glabră, cu frunze liniare sau lat lanceolate, acute, scurt petiolate și pe margini fin ciliate. Scvame externe cu baza lată, se continuă într'o parte îngustă, terminându-se în aristă. Petale roșii sau albe, pe față întunecat pătate.

Originară din Asia estică. Se cultivă la noi ca plantă ornamentală.

Ob s.: O altă garoafă des cultivată la noi este *D. barbatus* (vezi pag. 227)

Genul 101. SAPONĂRIA¹⁾ L.

Gen. pl. [ed. I (1737) 130, nr. 365], ed. V (1754) 191, nr. 499. — O d o g a c i

Caliciu de obicei cilindric, rareori puțin umflat, 5-dințat, 15—25-nervat, de structură ierboasă, fără scvame. Lamina corolei se continuă într'o unguiculă, purtând la mijloc o dungă îngustă. Stamine 10. Ovar unilocular. Stile 2, 3 sau 4. Capsulă scurt pedunculată, deschizându-se prin 4—6 dinți. Semințe turtite, reniforme. Embrion răsucit în cerc.

Determinarea speciilor

- 1 a Plantă scundă, formează tufe îndesuite, cu tulpini uniflore; florile roșietice 3. **S. pumila**
- 1 b Plante mai înalte, cu tulpina multifloră 2
- 2 a Flori galbene, rar albe sau alburii, terminale și capitate. Tulpină cu 1—4 perechi de frunze. Frunze radicale spatulate, cele tulpinale liniar lanceolate. Plantă cespitoasă 2. **S. bellidifolia**
- 2 b Flori roșii sau albe, dispuse în dichazii paniculate, compuse din flori glomerate și scurt pedunculate 3
- 3 a Caliciu cilindric și gros. Lamină roșietică sau albă, lungă de 1 cm
1. **S. officinalis**

*) Derivat din cuvântul «sapo» = săpun, deoarece rădăcinile sale zdrobite și frecate în apă fac spumă, cu care se spală ca și cu săpunul.

Planșa 44. — 1. *Saponaria glutinosa* M.B., 1a. pistilul și o petală. — 2. *S. officinalis* L., 2a. ovarul deschis și o petală, 2b. o capsulă deschisă. — 3. *S. pumila* (St. Lag.) Janch., 3a. pistilul mărit și câteva stamine.



3 b Caliciu glandulos păros, subțire, cilindric, roșietic. Lamină lungă de 3—5 mm, sanguinee 4. *S. glutinosa*

1. *S. officinalis* L. p. pl. ed. I (1753) 408; Gorschk. in Fl. U.R.S.S. VI (1936) 863. — Odogaci. — Kőzönséges szappanvirág. — Gemeines Seifenkraut. — Мыльнянка лекарственная. — Exs.: HN nr. 5238; FRE nr. 2209. Ic.: Pl. 44, fig. 2, 2 a, 2 b.

4. Rizom cilindric, puternic ramificat, târător, cu lăstari sterili și fertili. Tulpini ascendente sau erecte, de 30—70 cm înălțime, în partea superioară puțin ramificate. Frunze alungit eliptice, atenuate spre extremități, 3-nervate, aproape glabre, aspre pe margini. Flori mirositoare, dispuse în dichazii paniculate și glomerate. Caliciu tubulos cilindric, până la 20 mm lung, palid verzui, diseminat păros, cu 5 dinți scurți și inegali. Petale albe sau rozee, cu lamină cuneat obovată, în partea anterioară ușor emarginată, cu coronulă laciniată. Ovar lunguiet, aproape cilindric, cu 2 stile filiforme. Capsulă cu o lojă, de lungimea caliciului, deschizându-se la maturitate prin 4 sau 5 dinți inegali. Semințe numeroase, ușor turtite, reniforme, negre. VI—IX.

Stațiunea. Pe marginea râurilor, pe lângă garduri, drumuri și locuri cultivate.

Răsp. în țară: *Reg. Baia Mare*: Vișeu de Jos; Răzoare (r. Tg. Lăpușului). *Reg. Cluj*: Năsăud; Beclean; Dej; Luna de Jos (r. Gherla); Cluj, Florești; Cheia Turzii; frecventă în Câmpia Transilvaniei. *Reg. Stalin*: Orașul Stalin; Sighișoara; Sibiu. *Reg. Oradea*: Oradea. *Reg. Arad*: Arad, Glogovăț, Pecica; Pădureni (r. Chișineu-Criș); Ineu, Cermeiu, Bocsig (r. Ineu); Desna, Iosășel, Hălmagiu, Gurahonț (r. Gurahonț). *Reg. Timișoara*: Comună (Heuff.). *Reg. Craiova*: Cerneți pe V. Topolniței (r. Tr. Severin); Strehăia, Broșteni; Tg. Jiu; Craiova. *Reg. Pitești*: Govora (r. Râm. Vâlcea); Stolnici (r. Costești); Curtea de Argeș; Câmpulung. *Reg. București*: Titu, Ciocănești, Bufta (r. Răcari); București; Comana (r. Vidra). *Reg. Ploiești*: Pucioasa; Câmpina; Ploiești în lunca Teleajenului, Crivina; Buzău; Masivul Penteleu. *Reg. Bacău*: Tg. Neamț. *Reg. Suceava*: Mălini, Fălticeni; Botoșani.

Variabilitatea speciei

- 1 a Plantă cu flori pline (bătute)
 - f. *pleniflora* (Schur). — *S. officinalis* a. *pleniflora* Schur Enum. pl. Transs. (1866) 99. — Cultivată și spontană. — *Reg. Craiova*: Dioști (r. Caracal).
- 1 b Flori simple 2
- 2 a Frunze și caliciu glabre sau aproape glabre
 - f. *glaberrima* (Ser.). — *S. officinalis* β. *glaberrima* Ser. in DC. Prodr. I (1824) 365. — *Reg. București*: Comana (r. Vidra).
- 2 b Frunze și caliciu păroase 3
- 3 a Frunze late de 4 — 6 mm, îngust liniare
 - f. *angustifolia* (Schur). — *S. officinalis* var. *angustifolia* Schur in Verh. NV Brünn

- XV, 2 1876 (1877) 129.— *Reg. Cluj*: Cojocna (r. Cluj).
- 3 b Frunze late de 2 — 5 cm. 4
- 4 a Plantă scundă, înaltă de 25 cm, dela bază ramificată și foliată. Frunze înguste, cel mult de 2 cm. Inflorescență foarte laxă, compusă din 1 — 6 flori
f. *oligántha* Soó in litt. ad Graebn in A. et G. Syn. V. 2 (1923) 484.— Cluj.
- 4 b Plante puternice, înalte de 60 — 100 cm. 5
- 5 a Frunze ovate, late de 4 — 5 cm
f. *latifolia* (Waisb.). — *S. officinalis* var. *atifolia* Waisb. Kőszeg fl. ed. II (1895) 53. — *Reg. Cluj*: Apahida (r. Cluj).
- 5 b Frunzele nu sunt ovate, dispers păroase sau scabre 6
- 6 a Caliciu scurt păros, glabrescent. Frunze dispers păroase
f. *typica* (Beck.). — *S. officinalis* α. *typica* Beck Fl. NÖ I (1890) 376. — Cluj.
- 6 b Caliciu sur păros. Frunze și tulpini scabre
f. *Wierzbickiana* Soó in litt. ad Graebn in A. et G. l. c.— Timișoara.

Răsp. gen.: Europa sudică și mijlocie, Asia, Japonia.

Intrebuintări: Drogul acestei plante este cunoscut sub denumirea de: Folia, Summitates et Radix Saponariae, folosindu-se frunzele, vârfurile florale și rădăcina plantei. Drogul se ia sub forma de ceai, fiertură, sirop și se utilizează contra catarului pulmonar, tusei, a diferite boli de piele, gută, reumatism, scrofuloză. Are proprietăți sudorifice și depurative. Rădăcina plantei se mai folosește în spălătorii pentru scoaterea petelor de grăsime din haine, la fabricarea săpunurilor, pentru spălarea mătăsii și a rufelor de mătase.

2. *S. bellidifolia* Sm. Spicil. bot. I (1791—92) 5. — Exs.: FEAH nr. 1284; FRE nr. 46. — Ic.: Pl. 25, fig. 3, 3 a; Pax Grundz. II (1908) 259 fig. 28 A—B; Hay. Pflzdecke. (1916) 452.

4. Rizom orizontal sau oblic. Plantă cespitoasă, glabră, înaltă de 30—40 cm, cu tulpini erecte, fiecare cu 1—4 perechi de frunze. Frunze tulpinale depărtate, cele radicale și tulpinale inferioare spatulate, spre vârf lățite, cu margini ciliate, cele superioare liniar lanceolate. Flori galbene, rar albe sau alburii, mici, dispuse în capitule terminale. Caliciu ovat, lung de 7—10 mm, ± hirsut. Lamina petalelor liniară, cuneată, ± îngustă; paracorola lipsește. VI—VII.

Stațiunea. In locuri stâncoase și pietroase din munții calcaroși.

Răsp. în țară: *Reg. Cluj*: Runc pe Valea Pociovaliștei, Poșaga de Sus pe Mt. Beli-oara și Mt. Scărița (r. Turda).

Răsp. gen.: Franța, Italia de N, Balcani.

3. *S. pumila* (St. Lag.) Janch. in Mitt. Nat. Ver. Univ. Wien V (1907) 90. — *Cucubalus pumilio* L. Mant. I (1767) 71. — *Silene pumila* St. Lager in

Ann. Soc. Bot. Lyon VII (1880) 135. — *S. nana* Fritsch Excurs. fl. Öst. ed. II. (1909) 217. — **Exs.**: FRE nr. 2210. — **Ic.**: Pl. 44, fig. 3.

4. Tulpini scurte, uniflore, formează tufe scunde, indeseuite. Frunze liniare, lăţite spre vârf, obtuze, pe margini aspre. Flori terminale, solitare, mari, scurt pedunculat sau sesile, scufurdate în tufe formate de tulpini. Caliciu tubulos campanulat, puţin umflat, până la 15 mm lungime, obtuz dentat, păros, verde, adeseori roşcat. Petale roşietice, cu coronule bifide. Lamina lungă de 7—9 mm, emarginată. Stile 3, filiforme. Capsulă mai scurtă decât caliciul. Seminţe brune, de 2 mm în diam. VIII—IX.

Staţiunea. Prin locuri ierboase din munţi.

Răsp. în ţară: *Reg. Stalin*: Mţii Făgăraşului: pe coama ierboasă deasupra Văii Pojortei spre Lacul Urlea; *Reg. Stalin*: Mţii Bârsei, rară.

Răsp. gen.: Alpi (Tirol, Italia de N până în Stiria, Salzburg şi Carintia).

4. *S. glutinosa* M. B. Fl. taur.-cauc. I (1808) 322; Gorschk. in Fl. U.R.S.S. VI (1936) 863. — **Exs.**: FEAH nr. 1695; FRE nr. 2651. — **Ic.**: Pl. 44 fig. 1; Hay. Pflzdecke. (1916) 446.

○. Plantă înaltă de 25—50 cm, robustă, erectă, în partea superioară glandulos viloză, cu glandulele roşii. Frunze ± glandulos violacee, 3-nervate, cele inferioare spatulate, cele superioare ovate. Inflorescenţă mult ramificată. Caliciu lung de 2 cm, atropurpuriu, cilindric, foarte îngust, glandulos-păros, roşietic. Lamina petalelor lungă de 3—5 mm, sanguinee. V—VI.

Staţiunea. Prin locuri stâncoase.

Răsp. în ţară: *Reg. Timişoara*: Defileul Dunării dela Sviniţa până la Orşova. *Reg. Craiova*: frecventă pe coastele munţilor dela Vărciorova.

Variabilitatea speciei

var. *calvescens* Borb. in Term. füz. XVI (1893) 45. — Plantă în partea inferioară, glabră cu frunze mai late. — *Reg. Timişoara*: Sviniţa (r. Mehadia). *Reg. Craiova*: Vărciorova.

Răsp. gen.: Europa de S, Asia Mică.

Ordinul TRICÓCCAE

Fam. 28. EUPHORBIACEAE J. St. Hill. *)

Expos. fam. II (1805) 276, tab. 108, Müll. - Arg. in DC. Prodr. XV 2 (1862) 1, Pax, in Engl. et Prantl Nat. Pflzfam. III. 5 (1890) 1.

*) Prelucrată de I. Prodan.

Plante ierbacei, anuale, bianuale sau perene, în alte regiuni și arbuști, arbori sau plante suculente, asemănătoare cu Cactaceele, de cele mai multe ori secretând latex, cu frunze alterne sau opuse, de regulă simple, cu sau fără stipele. Flori monoice sau dioice, rar hermafrodite, cele masculine cu mai multe stamine (*Mercurialis*) sau de obicei formate dintr'o singură stamină, nude (*Euphorbia*); cele femele deasemenea nude, constând dintr'un singur ovar superior trilocular, cu câte 1 ovul pendul, epitrop, în fiecare carpelă. Stile 2—3. Florile masculine așezate (la *Euphorbia*) în 5 cinci de jur împrejurul florii femele, iar toate inflorescențele sunt înconjurate de un involucre (ciatiu) de obicei pentamer, pe margini cu 4—5 glande (nectarii) transversal eliptice sau semilunare, până la lung bicornute. Periant simplu, petaloid (*Mercurialis*) sau lipsește (*Euphorbia*). Fruct capsulă uscată, rar cărnoasă, 3 (2) loculară, la maturitate se desprinde de pe coloana pe care este așezată.

Determinarea genurilor

- 1 a Frunze foarte mari, palmati lobate, cu segmente serate, acute. Capsulă mare, de 13—15 mm — **Ricinus**
- 1 b Frunzele nu sunt palmati lobate. Capsulă mică, rareori de 10 mm . . . 2
- 2 a Plante cu suc lăptos. Flori monoice, fără perigon, incluse în involucrel ciatiform sau urceolat (cyathium), născut din unirea bracteilor. Laciniile involucrelui transformate în glande . . . 102. **Euphorbia**
- 2 b Plante fără suc lăptos. Flori dioice, neincluse în involucrel comun. Frunze opuse 103. **Mercurialis**

Genul 102. **EUPHORBIA** *) L.

Gen. pl. [ed. I (1737) 152, nr. 429], ed. V (1754) 208, nr. 536, Boiss. in DC. Prodr. XV. 2 (1862) 7, Pax in Engl. et Prantl Nat. Pflzfam. III. 5 (1890) 103. — Lăptele cucului, Lăptele câinelui, Alior.

Plante ierbacei, anuale, bianuale sau perene, în alte regiuni și arbuști sau arbori, adeseori cu tulpini groase, aproape fără frunze, asemănătoare cu ale Cactaceelor, rotunde sau muchiate, conținând adeseori suc lăptos, toxic, iritant și vezicant. Frunze simple, cu margini întregi sau \pm dințate, alterne sau opuse, stipelate sau nestipelate. Flori monoice, foarte rar dioice, întotdeauna fără petale și în majoritatea cazurilor și fără sepale. Flori masculine întotdeauna formate dintr'o singură stamină, florile femele dintr'un singur ovar trilocular, cu câte un ovul în fiecare carpelă. Inflorescența elementară este un ciatiu, dând impresia unei flori hermafrodite (floare falsă, pseudantiu). Ciatiul este un involucre campanulat, în formă de pahar, concrescut din 4—5 (8) foliole. Pe marginea acestui involucre găsim nectariile orizontale, cărnoase, în număr de 5, sau prin avortare și mai puține, întregi sau semilunare, \pm bicornute (vezi planșele 51, 52, 53, 56, 57, 58, 59, 64,

*) După numele lui Euphorbos, medic al curții regelui Juba al Mauritaniei, primul care a utilizat în scopuri medicinale drogul Euphorbium, extras din specii de *Euphorbia* din Maroc.

figurile însemnate cu a). Axa ciatiului se termină cu o singură floare femelă, ce iese din ciatiu pe un pedicel la urmă încovoiat. La baza ciatiului se găsesc 5 cincine de flori masculine numeroase (10—40). Inflorescența generală compusă din radii inferioare alterne în subțioara frunzelor, cele superioare dela 2 — multe, așezate într'o umbelă în subțioara foliolelor, adeseori grupate în jurul unui ciatiu central. Radiile de obicei de 1—2 ori bifurcate, cu foliole la bifurcațiuni, terminându-se în ciatiul descris mai sus. Fruct capsular, deschizându-se prin 3 valve și separându-se de o axă centrală, cu 2—6 nucule monosperme. Semințe netede sau reticulate, bogate în endosperm, adesea prevăzute cu un apendice (carunculă). Embrion drept, cu cotiledoane late și plane.

Întrebuințări. Euphorbiile sunt plante toxice. Laptele lor este iritant, vomitiv și purgativ. Substanța activă este « Euphorbina », în afară de care laptele mai conține cauciuc, rășină, gumă, amidon, mult tanin, zahăr, albumină, uleiuri grase și eterice, etc. Aceste din urmă substanțe fiind în cantitate mică, planta nu este bună pentru scopuri industriale. Unele specii, de ex. *F. Esula*, *E. Peplus*, sunt atât de iritante, încât poporul le întrebuințează pentru cauterizarea negilor și a bătăturilor. Sucul aplicat pe piele produce bășici, folosit intern cauzează inflamații, ajuns la ochi poate produce orbirea. Unele specii în trecut aveau un rol important în medicină. Animalele nu le consumă, ceea ce este o împrejurare favorabilă pentru răspândirea lor. Dacă se consumă cu fânul, cauzează diaree și urinări cu sânge. Aceste plante sunt deci buruieni vătămătoare și nefolositoare. Sămânța de *E. Lathyris* (Semen Cataputiae minoris) în trecut era întrebuințată ca purgativ și vomitiv. Dintre Euphorbiile din străinătate, unele sunt foarte toxice. Astfel *E. cotinifolia* constituie unul din veninurile întrebuințate la săgețile indienilor.

Determinarea speciilor

- | | | |
|-----|---|----------------------|
| 1 a | Plante lipsite de stipele | 2 |
| 1 b | Plante cu stipele, purtând frunze opuse și flori mici, de obicei mult ramificate | 37 |
| 2 a | Capsulă de 1 cm lungime. Plantă anuală puternică, cu frunze cruciat opuse | — <i>E. Lathyris</i> |
| 2 b | Capsulă mai mică. Frunzele nu sunt cruciat opuse, ci de obicei alterne. | 3 |
| 3 a | Glandele ciatiului transversal eliptice sau lat triunghiular eliptice, cu margini întregi | 4 |
| 3 b | Glandele ciatiului semilunare, bicornute (numai excepțional unele glande sunt eliptice) | 22 |
| 4 a | Capsulă acoperită cu tuberculi semiglobuloși, scurt cilindrici și filiformi. Semințe netede | 5 |
| 4 b | Capsulă netedă, fin punctată sau alb păroasă, netuberculată, cel mult verucoasă. Unele frunze în partea anterioară adeseori fin serate. | 14 |
| 5 a | Umbelă terminală, 2—5 - radiată, proporțional alungită | 7 |
| 5 b | Umbelă terminală multiradiată (mai mult de 5 radii); radiile proporțional scurte, mai scurte decât pedunculii ce se nasc din partea laterală a tulpinii | 6 |

- 6 a Capsulă nepăroasă, numai cel mult pe tuberculi. Tuberculi capsulei scurt cilindrici, nu mai lungi decât lați. Frunze glabre, lanceolate, oblongi, sesile. Tulpină de 1,5 m înălțime, goală pe dinăuntru 8. **E. palustris**
- 6 b Capsulă păroasă. Tuberculi capsulei mult mai lungi decât lați, cilindrici, cca de 1 mm lungime. Frunze pe dos păroase, oblong-lanceolate 9. **E. carpatica**
- 7 a Foliiolele involucelelor (dichaziilor) triunghiular ovate, cu baza trunchiată sau aproape cordată, aproape tot așa de late cât și de lungi, împreună cu frunzele \pm fin serate. Capsule de 2,5 — 3 mm lungime, dispers acoperite cu verucozități hemisferice. Semințe de cca 2 mm lungime, netede 8
- 7 b Foliiolele involucelelor de altă conformație 9
- 8 a Tulpină cilindrică, păroasă 13. **E. dulcis**
- 8 b Tulpină pronunțat brăzdată, ascuțit muchiată, glabră 11. **E. angulata**
- 9 a Tuberculi capsulei filiformi, lungi. Frunze sesile sau scurt petiolate împreună cu tulpina îndesuit păroase. Sub umbela terminală nu se află dichazii laterale 10
- 9 b Tuberculi capsulei semiglobuloși sau foarte scurt cilindrici. Frunze îngustate spre bază. Speciile anuale sub umbela terminală (cu radiile multifurcat-ramificate) cu numeroase dichazii laterale, cele perene lipsite de atari dichazii 11
- 10 a Inflorescență mai adunată, cu radii mai scurte. Capsulă lungă de 4 mm. Semințe de 2,5 mm lungime. Foliiole involucrale ovate, emarginate. Frunze sesile, lat sau îngust oblongi 10. **E. polychroma**
- 10 b Inflorescență mai laxă, cu radii mai lungi. Frunze scurt petiolate, uneori îngustate spre bază. Semințe de 2,5 mm lungime 12. **E. lingulata**
- 11 a Plante anuale. Radiile umbelii de mai multe ori bifidate, multiramificate, sub umbelă și cu pedunculi secundari 12
- 11 b Plante perene, sub umbelile terminale fără pedunculi laterali 13
- 12 a Umbelă de obicei 5 - radiată. Tuberculi capsulei semiglobuloși. Capsulă lată de 3—5 mm. Semințe până la 2 mm lungime, rotund-ovate 16. **E. platyphyllos**
- 12 b Umbelă de obicei 3 - radiată. Tuberculi capsulei scurt cilindrici. Capsulă lată de cca 2 mm. Semințe ovat-sferice, abia mai lungi de 1 mm 17. **E. stricta**
- 13 a Rizom lemnos, erect. Capsulă de 3—4 mm lungime. Semințe globuloase, netede, de 2—2,5 mm lungime 14. **E. verrucosa**
- 13 b Rizom nelemnos, orizontal. Capsulă lungă de 5 mm. Semințe netede, de 4 mm lungime 15. **E. carniolica**
- 14 a Plantă anuală. Frunzele și foliolele involucelelor obovate sau suborbicular rotund obtuze, în partea anterioară serate 18. **E. helioscopia**
- 14 b Plante perene. Frunze alungite, lanceolate sau liniare 15

- 15 a Umbelă terminală de obicei 5-radiată. Frunze cu baza \pm rotunjită, aproape cordată sau \pm atenuată, sesile, spre vârf mai adeseori serate, lanceolat oblongi, păroase sau glabrescente. Foliiolele involucelelor rotund ovate 16
- 15 b Inflorescență (2) 5 (8) - radiată sau multiradiată. Frunze cu baza îngustată, mai adeseori cu margini întregi, glabre, sur-verzui. Foliiolele involucelelor mai late decât lungi, lat romboidal ovate sau reniforme 17
- 16 a Capsulă glabră sau dispers păroasă, cu suprafața fructului întotdeauna bine vizibilă. Tulpină și ramuri mai slab păroase sau glabrescente
6. *E. villosa*
- 16 b Capsulă albă în întregime, acoperită cu peri lungi și foarte deși, suprafața capsulei din cauza lor nefiind vizibilă. Tulpină și ramuri mai păroase 7. *E. valdevillosocarpa*
- 17 a Inflorescență 2—5 (7) - radiată. Plante relativ mici, destul de tufoase, cu tulpini scurte, de 10—20 (25) cm lungime, subțiri dar foarte solide, aproape lemnoase (cu deosebire la bază) 18
- 17 b Inflorescență multiradiată. Plante mai înalte 19
- 18 a Semințe alveolate (cu mici gropițe). Capsulă globulos-conică, spre vârf lent contrasă. Inflorescență mică, de obicei 5-radiată, numai excepțional 6—7-radiată 34. *E. Cadrilateri*
- 18 b Semințe netede. Capsulă mai îngust ovat conică, spre vârf repentin îngustată, aproape acută, netedă. Inflorescență mai mare, cu mult mai extinsă, de obicei 5 - radiată. Radiile de 4—6 cm lungime
33. *E. dobrogensis*
- 19 a Frunze liniar lanceolate sau liniare, de 4—5 (6) mm lățime, mucronat acuminate, glauce, glabre. Foliiolele involucelelor lat romboidale sau cordat triunghiulare 29. *E. Seguieriana*
- 19 b Frunze lat sau oblong lanceolate, late de 5—15 (— 30) mm, obtuze sau acute 20
- 20 a Radiile umbelii lungi până la 4 cm, simple. Capsulă glabră, netedă sau zgrăbunțoasă. Semințe prevăzute cu mici gropițe, adeseori mai alungit ovate. Frunzele și foliolele involucelelor cu nervurile laterale mai puțin pronunțate 31. *E. stepposa*
- 20 b Radiile umbelii de 5—15 cm lungime, adeseori biramificate. Capsulă glabră sau păroasă. Semințe mai scurt ovate și netede 21
- 21 a Plantă ramificată în partea superioară, de culoare palid verde, cu frunze invers ovate, ovat-lanceolate sau eliptice, de 3 — 6 cm lungime și 15—20 mm lățime, mai verzi, la vârf obtuze și scurt mucronate. Frunzele și foliolele involucelelor cu nervurile laterale pronunțate 30. *E. pannonica*
- 21 b Plantă ramificată dela mijloc, de culoare mai palidă, cu frunze lanceolate, de 2,5 — 4,5 mm lungime și 8—10 mm lățime, la vârf acute.

- Frunzele și foliolele involucelelor cu nervurile laterale mai puțin pronunțate. Radiile umbelii mai lungi 32. **E. bazargica**
- 22 a Plante perene. Semințe netede 23
- 22 b Plante anuale, rar perene. Semințe zbârcite (rugoase), foveolate (cu gropițe) sau brăzdate 32
- 23 a Foliolele involucelelor libere 24
- 23 b Foliolele involucelelor cu marginile unite, plane. Plante de pădure
38. **E. amygdaloides**
- 24 a Plante diferite terenuri și localități, cu umbelă terminală multiradiată, cu radiile din nou bifurcate, sub umbelă de obicei cu o mulțime de dichazii laterale 25
- 24 b Plantă litorală, robustă (— 60 cm), tufoasă, cu frunze foarte îndesuite, glauce, ± cărnoase, liniar oblongi, la vârf ± acute. Capsulă glabră, granulat rugoasă, cu mult mai lată decât lungă . . . 37. **E. Paralias**
- 25 a Frunze îndesuit pubescente și glanduloase, lanceolate sau oblongi. Tulpinile cel puțin în partea inferioară îndesuit pubescente
24. **E. salicifolia**
- 25 b Frunze glabre 26
- 26 a Frunze îngustate dela vârf spre bază. Stoloni groși. Glandele ciatiului galbene, cu coarnele mai scurte decât lățimea glandei 27
- 26 b Frunze dela vârf spre bază ± dilatate, nervate, uneori cu baza rotundă sau cordată 28
- 27 a Tulpină înaltă de 50 cm, ramificată, îndesuit foliată. Frunze îngust liniare, moi, late de 0,5 — 5 mm, foarte îndesuite . . . 28. **E. Cyparissias**
- 27 b Tulpină înaltă de 80 cm, în partea superioară adeseori ramificată. Frunze liniar oblongi sau oblanceolat oblongi, la vârf scabru dințate, cele ale ramurilor laterale late de cca 2,5 mm 27. **E. Esula**
- 28 a Coarnele glandelor ciatiului mai scurte decât lățimea glandei, la vârf întregi. Tulpină dreaptă, înaltă de 40—60 cm, îndesuit foliată. Frunze cu baza cordată sau subhastată, sesile 29
- 28 b Coarnele glandelor ciatiului de lățimea glandelor sau mai late decât acestea, la vârf adeseori dințate sau ramificate 30
- 29 a Frunze late de 2—3 cm, cordat eliptice, pe margini subcartilaginoase, scabre. Umbelă terminală 6—15 - radiată; radiile din nou bifide
35. **E. agraria**
- 29 b Frunze înguste, late de 0,5 — 1,5 cm, cordat oblong lanceolate sau liniar lanceolate. Umbelă terminală 6 - radiată. Radiile umbelii bifide 36. **E. basarabica**
- 30 a Frunze lucitoare, de un verde gălbui, lanceolate sau ovat-lanceolate, de 5—15 cm lungime și 1—3 cm lățime, obtuze, mai rar auriculate. Nervurile laterale formează cu nervura principală un urghi de 45—80°. Plantă robustă 23. **E. lucida**

- 30 b Frunze nelucitoare, mai înguste și mai scurte, glauce sau opace. Capsule proeminent punctate 31
- 31 a Frunze opace, oblongi, liniar lanceolate sau \pm liniare, de 2—10 mm lățime și 3—5 cm lungime, netede; pe lângă nervura principală se mai observă și nervuri secundare care formează cu nervura principală un unghi de 15—30° 25. **E. virgata**
- 31 b Frunze glauce, liniare, de 1—2 mm lățime și toate de 28—48 mm lungime, acute, pe ambele fețe cu încrețituri. Nervuri secundare nu se observă 26. **E. leptocaula**
- 32 a Plantă perenă, sură, tufoasă, extinsă, cu tulpină groasă, procumbentă sau ascendentă. Frunze îndesuite, glauce, cărnoase, ovate oblongi sau obovate, obtuze sau scurt acuminate 39. **E. Myrsinites**
- 32 b Plante anuale cu frunze subțiri 33
- 33 a Foliiolele involucelelor linear-lanceolate, sau lat lineare, cu baza ovate cordată. Frunze liniare 19. **E. exigua**
- 33 b Foliiolele involucelelor ovate, romboidale sau reniforme 34
- 34 a Frunze tulpinale lat ovate, scurt pețiolate, la vârf obtuze sau rotunjite. Capsulă lungă de 2,5 mm, aripată 20. **E. Peplus**
- 34 b Frunze tulpinale lanceolate sau mai înguste, \pm sesile 35
- 35 a Coarnele glandelor ciatiului setiforme, cu mult mai lungi decât grosimea glandei. Semințe foveolate. Frunze mai înguste 36
- 35 b Coarnele glandelor ciatiului \pm mai scurte decât grosimea glandelor. Glandele ciatiului galbene. Foliiole involucrale romboidale sau oblice ovate, evident cartilagineu mucronate. Plantă erectă sau procumbentă, ramificată în partea superioară sau adeseori dela bază
22. **E. falcata**
- 36 a Tulpină rărit foliată. Frunze superioare lat liniare, cele inferioare cuneat ovate, cuneat cordate sau cuneat spatulate . . 21. **E. graeca**
- 36 b Tulpină dens foliată. Frunze glauce, liniare sau liniar lanceolate
40. **E. segetalis**
- 37 a Tulpină erectă sau ascendentă, păroasă în partea superioară. Inflorescență compusă din ciatii așezate în dichazii la vârful tulpinii și al ramurilor. Frunze mai mici și mai mari, cele mai mari de 2—3 cm lungime, împreună cu tulpinile roșietice. Semințe negricioase
1. **E. nutans**
- 37 b Tulpină în toată lungimea ei culcată la pământ 38
- 38 a Semințe transversal rugoase, cu încrețituri neregulate sau transversal brăzdate 39
- 38 b Semințe netede. Plante glabre 40
- 39 a Semințe transversal rugoase; încrețiturile neregulate se contopesc. Glomerule florale dispuse subbifurcat. Frunze subrotunde sau obovate, la vârf obtuze sau trunchiate, emarginate, cu margini fin crenulate. Plantă glabră sau adesea (f. *pilosa*) păroasă . . . 4. **E. Chamaesyce**

- 39 b Seminte 3—5, transversal brăzdate. Glomerule florale dispuse în raceme false, dens foliate. Frunze oblic oblongi sau obovat lanceolate, obtuze, pe fața superioară de obicei roșu maculate, \pm serat dințate. Plantă cu peri patenți 5. **E. maculata**
- 40 a Capsulă de 4—5 mm lungime. Seminte de 3 mm lungime, ovate conice. Glandele ciatiului transversal ovate, întregi 2. **E. Peplis**
- 40 b Capsulă de 1,5 — 2 mm lungime. Seminte de 1 mm lungime, oblongi. Glandele ciatiului transversal oblongi, trilobate . . 3. **E. humifusa**

Secția I. ANISOPHYLLUM (Haw.) Roep. in Duby Bot. Gall. I (1828) 412. — *Anisophyllum* Haw. Syn. pl. succ. (1812) 159, pro genere.

Plante ierbacei, mici, culcate, mai rar semiarbuști sau arbuști, cu frunze opuse, reunite la bază într-o teacă scurtă. Stipele de obicei desvoltate. Ciatiiile solitare sau grupate în dichazii. Glande adeseori cu apendicul petaloid.

1. ○ **E. nutans** Lag. Gen. et sp. nov. (1816) 17; Prokh. in Fl. U.R.S.S. XIV (1949) 485, tab. XXIV, fig. 1. — *E. maculata* L. Mant. II (1771) 392, non L. Sp. pl. ed. I (1753) 455. — *E. hypericifolia* Jan Elench. (1826) 7, non L. — *E. Preslii* Guss. Fl. sic. Prodr. I (1827) 539. — Ic.: Pl. 45, fig. 2 sub f. *colorata*.

○. Tulpină erectă sau ascendentă, ramificată, până la 20 cm înălțime, în partea superioară răzleț păroasă. Frunze scurt pețiolate, oblic cordate sau din baza rotundă, oblongi, 3—5-nervate, cu margini întregi sau serate, cele mai mari de 2—3 cm lungime și 8—12 mm lățime, verzi sau împreună cu tulpina adeseori roșietice. Stipele triunghiulare. Inflorescență compusă din ciatii dispuse la vârful axei și al ramurilor. Foliiolele involucelelor oblongi. Glandele ciatiului ovate orbiculare. Capsulă lată de 2—2,5 mm, glabră, netedă. Seminte tetragonale, transversal rugoase, negricioase, de 1—1,2 mm lungime. VII—IX.

Stațiunea. Prin semănături.

Răsp. în țară: *Reg. Stalin*: între Bodoc și Oltani (r. Sf. Gheorghe), adventivă

Variabilitatea speciei

colorata (Thell.). — *E. nutans* lus. *colorata* Thell. in A. et G. Syn. VII (1916) 431. — Intreaga plantă \pm roșietic nuanțată. — Impreună cu specia tipică.

Răsp. gen.: America de N.

O b s.: Planta a fost introdusă și cultivată pentru prima dată în Grădina Botanică din Paris în anul 1781. — Peste 35 ani a apărut adventiv în Italia, pe litoralul Mării Adriatice,

Plansa 45. — 1. *Euphorbia variegata* Sims., 1a. fruct mărit. — 2. *E. nutans* Lag. f. *colorata* (Thell.). — 3. *E. graeca* Boiss., 3a. floare mărită.



la Fiume, iar cu timpul a pătruns în Europa Centrală și meridională. În anul 1947 a fost citată printre speciile evadate din culturi în peluzele Grădinii Botanice Cluj. În 1949 a mai fost găsită și dealungul liniei ferate dela Bodoc spre Olteni.

În patria ei, America de N, trece ca buruiana sămănăturilor de plante furajere și este probabil că se va răspândi, cu timpul, și la noi ca buruiană comună.

2. **E. Péplis** L. Sp. pl. ed. I (1753) 455; Prokh. in Fl. U.R.S.S. XIV (1949) 486. — **Exs.**: FRE nr. 434 b. — **Ic.**: Pl. 46, fig. 4, 4 a; Prod. Consp. II (1936) Pl. XXVI, fig. 2.

○. Tulpini prostrate, dichotomic ramificate, împreună cu frunzele glabre și puțin cărnoase. Frunze opuse, scurt pețiolate, ovat-oblongi, cu baza cordată, inegală, obtuze, emarginate, întregi sau crenulate în partea inferioară, cu stipele subulate, bi- sau trifide. Flori axilare, solitare. Glandele ciatiului roșii, transversal ovate. Capsule mari, lungi de 4—5 mm, netede, glabre. Semințe ovat-conice, de 3 mm lungime, glabre. V—X.

Stațiunea. Pe nisipuri litorale.

Răsp. în țară: Sulina (r. Tulcea); Cetatea Istria (r. Babadag); Capul Midia, Constanța, Tuzla, Techirghiol.

Răsp. gen.: Țărmurile maritime din Europa de S și E, Asia de E și Africa de N.

3. **E. humifusa** Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl. (1813) 27; Prokh. in Fl. U.R.S.S. XIV (1949) 487, tab. XXIV, fig. 2. — **Ic.**: Pl. 46, fig. 3, 3 a.

○. Plantă albăstrui-verde, mai târziu roșietică. Tulpină culcată la pământ, gracilă, furcat ramificată, lungă de 5—15 cm, glabră. Frunze de 1 cm lungime, foarte scurt pețiolate, obovate, la bază mai puțin inegale ca la *E. Peplis*, obtuze, pe margini spre vârf fin serate, glabre sau slab păroase pe fața inferioară. Stipele subulate, la bază puțin dințate. Glande transversal oblongi, trilobate. Capsule de 1,5 — 2 mm lungime, trigone, glabre, netede, cu coastele rotunjite. Semințe de 1 mm, oblongi, alb-cenușii, tetragone, netede. VI—VII.

Stațiunea. În semănături, adventivă.

Răsp. în țară: *Reg. Stalin*: Drașov (r. Sebeș).

Răsp. gen.: Asia.

4. **E. Chamaesyce** L. Sp. pl. ed. I (1753) 455; Prokh. in Fl. U.R.S.S. XIV (1949) 488. — **Ic.**: Pl. 46, fig. 1, 1 a—b; Prod. Consp. II (1936) tab. XXVI, fig. 3.

○. Plantă adeseori păroasă, cu tulpini prostrate, ramificate, până la 20 cm lungime. Internodiile ramificațiilor florale de lungimea frunzelor cores-

punzătoare. Frunze nesimetrice la bază, ovate sau eliptice, până la 7 mm lungime și până la 4 mm lățime, cu margini crenate, la vârf obtuze sau trunchiate. Stipele setacee, la bază adeseori dințate. Inflorescențe bifurcate. Ciatii campanulat infundibuliforme, verzi sau roșcate, cu vârfuri triunghiulare, cu margini întregi sau slab dințate, adeseori ciliate. Glande transversal ovat lunguiețe, cu margine albicioasă, trilobată. Capsulă lată de 1,5 — 2 mm, glabră sau păroasă, trigonă, cu coaste ascuțite. Semințe tetragonale, ovate, de 1 — 1,3 mm lungime și 0,7 mm lățime, transversal rugoase, la început roșcate, mai târziu albicioase sau cenușiu-brune. VI—IX.

Stațiunea. Prin semănături, în locuri nisipoase, pe prundișurile râurilor.

Răsp. în țară: *Reg. Stalin:* între Făgăraș și Breaza; Slimnic (r. Sibiu). *Reg. București:* București (în grădina Botanică dela Cotroceni, pe alei). *Reg. Constanța:* Techirghiol pe malul lacului. *Reg. Galați:* pe malurile Dunării.

Variabilitatea speciei


f. glăbra Roeper Enum. Euphorb. Germ. Pannon. (1824) 58 et in Duby Bot. Gall. I, ed. II (1828) 412. — Intreaga plantă glabră sau acoperită cu peri răsfirați. — *Reg. Timișoara:* pe malul Dunărei între Svinița și Moldova Nouă, Buziaș. *Reg. Constanța:* Mamaia (r. Constanța).

Răsp. gen.: Europa centrală și de SE, Mediterana.

5. *E. maculata* L. Sp. pl. ed. I (1753) 455, non L. Mant. II (1771) 392, nec Auct. europ. plurim.; Prokh. in Fl. U.R.S.S. XIV (1949) 494, tab. XXIV, fig. 4. — **Exs.:** FRE nr. 1513 sub *E. Chamaesyce* ssp. — **Ic.:** Pl. 46, fig. 2, 2 a.

○. Plantă culcată la pământ, lungă de 5—15 cm, dens dichotomic ramificată, scabră, acoperită cu peri setiformi, patuli, la început verde, mai târziu roșietică. Frunze de 5—9 mm lungime și 2—4 mm lățime, la bază puțin inegal oblong ovate sau oblong liniare, până la ovat lanceolate, la vârf obtuze sau obtuziuscule, serat dințate, pe față glabre, pe dos pubescente, pe față superioară cu pete roșietice. Glomerule florale dispuse în raceme false, îndesuite și foliate. Glandele ciatiului transversal ovate, cu margine 2—3-lobată. Capsula tânără lucitoare, la maturitate lată de 1,5 mm, alipit păroasă. Semințe ovat tetragonale, de 0,8 mm lungime, cu cele 2 fețe dorsale parcurse de 3—5 brazde transversale, paralele. VI—IX.

Planșa 46. — 1. *Euphorbia Chamaesyce* L., 1a. floare mărită, 1b. sămânță mărită. — 2. *E. maculata* L., 2a. sămânță mărită. — 3. *E. humifusa* Willd., 3a. sămânță mărită. — 4. *E. Peplis* L., 4a. sămânță mărită.



Stațiunea. Pe lângă căi ferate, străzi, în locuri ruderaie, nisipoase și pe prundișuri. Adventivă.

Răsp. în țară: *Reg. Cluj:* Sângeorz-Băi, Ilva Mică (r. Năsăud). *Reg. Hunedoara:* Simeria. *Reg. Timișoara:* Gătaia, Jebel, Liebling (r. Deta). *Reg. Craiova:* Craiova în parc, Cernelele. *Reg. București:* în jurul Bucureștilor. *Reg. Galați:* Sulina.

Răsp. gen.: America de N.

Obs. În Europa această specie a fost adusă din America și cultivată încă din anul 1660 la Londra. Ea s'a instalat repede în toate țările din Apus. În părțile răsăritene ale Europei și-a făcut apariția mai târziu, așa în Ungaria, în Croația și recent în U.R.S.S. pe malul Mării Negre, apoi în Caucaz la Batum și de aici până în Extremul Orient, în Usuria. — În R.P.R. planta a fost găsită pentru prima dată în anul 1931 la Sulina și a fost publicată în FRE (vezi mai sus).

Secția II. TITHYMÁLUS (Scop.) Pers. Ench. II (1807) 10. — *Tithymalus* Scop. Fl. carn. I, ed. II (1772) 332, pro genere.

Plante ierboase, rareori arbuști, puțin ramificate, cu frunze inferioare alterne, cele superioare de obicei opuse. Stipele lipsă. Axe florale dichotomic ramificate, cele superioare umbeliforme. Glande fără apendiculi.

* **E. Lathyris** L. Sp. pl. ed. I (1753) 457; Prokh. in Fl. U.R.S.S. XIV (1949) 479. — **Ic.:** Pl. 47, fig. 1.

☉, ☉. Tulpină de 50 (— 100) cm, glabră. Frunze cruciat opuse, glabre, cele inferioare liniar oblongi, sesile, cele superioare oblongi sau ovat oblongi, la bază cordate, cele involucrale triunghiular ovate, cordate, lung acuminate. Ciatii așezate în dichaziu terminal. Glande cu 2 cornițe gălbui. Capsulă la început abia scvaroasă, la maturitate evident scabru scvaroasă, de 1 cm lungime. Semințe de culoare gălbuie sau galbene-surii, zgrăbunțoase. VI—VII.

Stațiunea. Cultivată prin grădini și uneori sălbătică.

Răsp. în țară: Indicată din Moldova și din Crișana (Reg. Arad.)

Răsp. gen.: Italia.

Întrebuintări. Semințele acestei plante conțin un ulei de culoare galbenă care se întrebuintează ca ulei lampant. Este otrăvitoare.

6. **E. villósa** W. et. K. in litt. ad Willd. Sp. pl. II. 2 (1800) 909 et Pl. rar. Hung. (1802) 96, tab. 93; Prokh. in Fl. U.R.S.S. XIV (1949) 359. — **E. procera** M. B. Fl. taur.-cauc. I (1808) 378. — **E. pilosa** Neilr. Fl. Wien (1846) 579, non L. — **Exs.:** FRE nr. 437. — **Ic.:** Pl. 47, fig. 2, 2a; W. et K. l.c.; Roch. Pl. Ban. (1828) tab. VI, fig. 15 sub *E. pilosa*.

4. Plante tufoase, cu rizom puternic, multicapitat și stoloni subterani. Tulpini numeroase, până la 120 cm înălțime, fistuloase, glabre sau scurt

păroase, mai rar vilos păroase, cu numeroase ramificații florifere sau sterile, care depășesc umbela terminală. Frunze nestipelate, sesile, alterne, oblong lanceolate, serulate, spre bază întregi, pe ambele fețe viloase, mai rar glabrescente, de 2—5 cm lungime și 1—2 cm lățime. Foliiolele involucelelor lat ovate, mai late decât lungi, rotunjite, rar acute, la început gălbui-verzui. Umbele terminale 5 — multiradiate; radiile trifide, mai târziu bifide. Ciatii de 3 mm lungime, cu glande la început galben-verzui, mai târziu galben-roșcate, cu margini întregi. Capsule netede, glabre sau dispers păroase, de 3 — 3,5 mm lungime. Seminte ovate globuloase, netede sau rugoase, lungi de 2 — 2,5 mm, lucitoare. V—VI.

Stațiunea. Prin locuri umede, tufișuri, mlaștini, păduri.

Răsp. în țară: *Reg. Baia Mare*: Leordina la Lazul Popii, Vișeu de Jos în V. Strâm-turei (r. Vișeu). *Reg. Cluj*: Rodna (r. Năsăud); Bistrița, Domnești; Beclean, Chiochiș; Dej; Gherla; Cluj, Mihăești, Berindu, Boj (r. Cluj); Valea Florilor (r. Turda), Cheia Turzii; Zăul de Câmpie (r. Luduș). *Reg. Aut. M.*: Tg. Mureș; Vârghiș (r. Sf. Gheorghe); Covasna (r. Tg. Săcuesc). *Reg. Stalin*: Orașul Stalin; Sighișoara; Blaj; Sibiu, Gușterița, Șura Mare, Șura Mică, Noul, Veștem, Bradu, Ocna Sibiului, Slimnic, Cisnădioara (r. Sibiu). *Reg. Hunedoara*: Bărbant, Oieșdea (r. Alba Iulia); Hunedoara; Bretea de Mureș, Gurasada (r. Deva). *Reg. Oradea*: Oradea, Săldăbagiu Mic, Băile Felix. *Reg. Arad*: Arad; Cladova (r. Lipova). *Reg. Timișoara*: Comună (Heuff.). *Reg. Pitești*: Horezu. *Reg. București*: București (Chitila); Ciocănești (r. Răcari); Comana (r. Vidra). *Reg. Ploiești*: Câmpina. *Reg. Constanța*: Babadag, Căugăgia. *Reg. Galați*: Mrea Cocos (r. Tulcea); Măcin pe Dl. Pricopanului; Galați. *Reg. Bârlad*: Bârlad. *Reg. Suceava*: Bosanci (r. Suceava); Iacobenii, Cărlibaba (r. Vatra Dornei).

Variabilitatea speciei

- 1 a Tulpină fistuloasă. Frunze glabrescente
f. *pseudopalustris* (Schur). — *E. procera* M. B. h. *Pseudo-palustris* Schur Enum. pl. Transs. (1866) 594. — *Reg. Cluj*: Cluj; Chiochiș (r. Beclean).
- 1 b Tulpină plină, nefistuloasă 2
- 2 a Capsulă cu mici tubercule
f. *tuberculata* (Koch). — *E. procera* M. B. γ. *tuberculata* Koch Syn. ed. I (1836) 630. — Cluj.
- 2 b Capsulă netedă, glabră sau păroasă 3
- 3 a Capsulă ± păroasă, tulpină și frunze păroase
f. *trichocarpa* (Koch). — *E. procera* M. B. β. *trichocarpa* Koch Syn. ed. I (1836) 630. — *Reg. Constanța*: Babadag. *Reg. Suceava*: Ciocănești (r. Vatra Dornei).
- 3 b Capsulă glabră. Frunze ± zbârlit-păroase
f. *leiocarpa* Neilr. Fl NÖ (1859) 846. — *Reg. Suceava*: Ciocănești (r. Vatra Dornei).

Răsp. gen.: Europa, Transcaucasia, Siberia.

Planșa 47. — 1. *Euphorbia Lathyris* L. — 2. *E. villosa* W. et K., 2a. o floare văzută din două poziții. — 3. *E. valdevillosocarpa* Arv. et Nyár., 3a. o frunză tulpinală.



7. *E. valdevillosocarpa* Arv. et Nyár. in Bul. Grăd. Bot. Cluj XV (1935) 190, 191. — Ic.: Pl. 47, fig. 3, 3 a.

4. Tulpină groasă, de 30—40 cm înălțime, cu ramuri bine dezvoltate, bogat patent viloase, mult mai păroase decât la *E. villosa*. Frunze lanceolate, cele tulpinale mari, lungi de 9—10 cm, sesile, atenuate spre bază, aproape cordate, pe margini \pm serulate, spre vârf lent contrase, prelungite. Capsulă albă din cauza perilor lungi și foarte deși. V—VI.

Stațiunea. Prin locuri expuse soarelui, prin tufișuri, păduri.

Răsp. în țară: *Reg. Galați*: Horia (r. Tulcea).

Răsp. gen.: U.R.S.S. de V.

8. *E. palustris* L. Sp. pl. ed. I (1753) 462; Prokh. in Fl. U.R.S.S. XIV (1949) 355, tab. XIX, fig. 5. — Ic.: Pl. 48, fig. 1, 1 a.

4. Rizom puternic, ramificat, multicapitat. Stoloni lungi, orizontali. Tulpini până la 150 cm înălțime, groase, la interior goale, ramificate în partea superioară, glabre, ușor albastrui, spre bază adeseori roșcate, cu ramificații superioare sterile, depășind umbela terminală. Frunze alterne, lanceolate, oblongi, glabre, verzi-albastrui, acute sau obtuze, îngustate spre bază și spre vârf, sesile, întregi sau subdenticulate. Foliiolele involucrale și ale involucelelor ovate rotunjite, obtuze, gălbui. Umbela multiradiată; radiile trifide, apoi din nou bifide. Ciatii lungi de 3,5—4 mm, 4-fide, cu vârfuri ascuțite, verzi și cu glande gălbui, mai târziu brunii. Capsulă glabră, lungă de 5—6 mm, acoperită cu tuberculi care nu sunt mai lungi decât lați, scurt cilindrici, de culoare gălbui-brunie. Semințe netede, de 3 mm lungime, cu carunculă rotundă. V—VI.

Stațiunea. Prin locuri mocirloase, pe malul apelor și mlaștinilor.

Răsp. în țară: *Reg. Aut. M.*: Gurghiu. *Reg. Stalin*: Sighișoara, Proștea Mică, Valea Lungă (r. Medias); Sibiu, Bradu, Șura Mică (r. Sibiu). *Reg. Hunedoara*: Alba Iulia. *Reg. Arad*: Păd. Pecica și Păd. Ciala lângă Arad. *Reg. Timișoara*: Liebling, Cerna (r. Deta); Dubova, Orșova (r. Mehadia). *Reg. Craiova*: Piscul Nou (r. Calafat). *Reg. București*: București (Băneasa, Herăstrău); Comana pe lângă calea ferată spre Grădiștea (r. Vidra); Giurgiu spre Slobozia și Malu. *Reg. Galați*: Delta Dunărei la Letea, Periprava, Sf. Gheorghe, Grindul Sărăturii; Galați lângă Lacul Brateș. *Reg. Bacău*: Făurei (r. Roman).

Răsp. gen.: Europa, Asia vestică.

9. *E. carpatica* Wol. in Sprawozd. Kom. Fisyogr. XXVII (1892) 153; Prokh. in Fl. U.R.S.S. XIV (1949) 357. — Ic.: Pl. 48, fig. 2, 2 a.

4. Rădăcină puternică. Tulpină mai solidă la bază, însă subțire, înaltă până la 120 cm, ramificată în partea superioară, având și ramuri sterile. In

general această plantă se aseamănă foarte mult cu *E. palustris*, de care diferă prin frunzele inferioare păroase, alungit lanceolate, mai late la mijloc, \pm acute, pe margini serate. Capsulă păroasă, acoperită cu tuberculi mai lungi decât lați, cilindrici, de 1 mm lungime. Plantă mai gracilă. VI—VII.

Stațiunea. Locuri păduroase, mocirloase.

Răsp. în țară: *Reg. Baia Mare*: Baia Mare în împrejurimile Dealului Rojali.

Răsp. gen.: Carpații Galiției estici din U.R.S.S.

10. *E. polychroma* Kerner in ÖBZ XXV (1875) 395; Prokh. in Fl. U.R.S.S. XIV (1949) 364. — *E. epithymoides* Jacq., Baumg. et Auct. transs., non L. — Exs.: FRE nr. 1514. — Ic.: Pl. 49, fig. 1, 1 a.

4. Rizom gros, puternic, multicapitat. Tulpini erecte, până la 50 cm înălțime, spre bază vilos păroase și acoperite cu solzi roșcați. Frunze sesile, alungit ovate sau oblongi, spre extremități îngustate, obtuze, cu margini întregi, păroase pe fața inferioară, mai puțin pe cea superioară. Foliolenle involucrale ovate, de culoare galbenă deschisă, mai târziu portocalie, cele ale involucelului alungit ovate, emarginate. Inflorescență 5-radiată, cu radii bifide. Ciatii de 3—4 mm lungime, cu 5 vârfuri fidate și glande galbene ca de ceară. Capsulă lungă de 4 mm, acoperită cu tuberculi cilindrici, răsușiți, cu vârful colorat în portocaliu sau roșu. Semințe netede, de 2,5 mm lungime, cu carunculă reniformă. V—VI.

Stațiunea. Prin tufișuri, crânguri, locuri pietroase, însorite.

Răsp. în țară: *Reg. Cluj*: Cepari, Năsăud; Domnești (r. Bistrița); Beclean, Chiochiș; Dej; Gherla; Cluj, Cojocna; Valea Florilor, Turda, Rimetea, Valea Ierii (r. Turda); Ocna Mureșului (r. Aiud); Zăul de Câmpie (r. Luduș). *Reg. Aut M.*: Tg. Mureș; Odorhei. *Reg. Stalin*: Orașul Stalin; Dumbrăveni (r. Sighișoara); Valea Lungă (r. Mediaș); Blaj; Sibiu, Șura Mare. *Reg. Hunedoara*: Deva, Zam. *Reg. Oradea*: Oradea. *Reg. Arad*: Șiria (r. Arad); Mocrea (r. Ineu); Cladova (r. Lipova); Mții Codrului până la Hălmațiu (r. Gurahonț). *Reg. Timișoara*: Mehadia pe stâncile Străjuț, Defileul Dunărei la Cazane între Plavișevița și Ogradena. *Reg. Craiova*: Vârciorova; Craiova. *Reg. Pitești*: Pitești la Trivalea și la Valea Mare; Câmpulung. *Reg. București*: Ciocănești, Buftea (r. Răcari); Periș (r. Căciulați); București (Băneasa); Comana (r. Vidra). *Reg. Ploiești*: Câmpina. *Reg. Bârlad*: Focșani. *Reg. Bacău*: Făurei (r. Roman). *Reg. Iași*: Iași.

Variabilitatea speciei

- 1 a Frunze tulpinale și foliolele dela baza umbelei principale, late, cele tulpinale eliptice, de 52 mm lungime și 25 mm lățime, la vârf emarginate, pe dos răzleț păroase, pe față

Plansa 48. — 1. *Euphorbia palustris* L., 1a. fruct mărit. — 2. *E. carpatica* Wol., 2a. fruct mărit.



glabre. Foliiolele dela baza umbelei principale eliptice, în număr de 4, lungi de 4 cm și late de 3,5 cm, spre bază cuneate, la vârf emarginate. Radiile principale ale umbelei 5, lungi de 8 cm, cu umbele mici, de 12 mm lungime, la bază cu foliole eliptice, late.

var. *latifolia* Prod. var. nova in Add. pag. 671. — *Reg. Timișoara*: Defileul Dunărei la Cazane.

1 b Frunze mult mai înguste, la fel și foliolele umbelelor. 2

2 a Frunze mai late de 10 mm, împreună cu tulpina sbârilit păroase. 3

2 b Frunze mai înguste, mai lungi, lanceolate. Apendiculi capsulei mature mai scurți și mai dispersi. Radiile umbelei lungi

var. *longifolia* Beck in Glasn. XXXII (1920) 89. — *Reg. Cluj*: Dej pe Dl. Florilor; Cluj pe Dl. Hoia.

3 a Seminte mici, reduse

f. *microspërma* (Murb.). — *E. polychr.* var. *microspërma* Murb. in Beitr. Fl. Südbosn. in Lund's Univ. Arssk. XXVII (1891) 41; cf. ÖBZ XLI (1891) 212. — *Reg. Cluj*: Chiochiș (r. Beclean).

3 b Seminte mai mari 4

4 a Radiile inflorescenței lungi și glabre

f. *glábra* Prod. f. nova in Add. pag. 671. — *Reg. Cluj*: Chiochiș (r. Beclean).

4 b Radiile inflorescenței relativ scurte. Cima redusă. Bracteile inflorescenței mai scurte

f. *subepithymoides* Prod. f. nova in Add. pag. 672 — *Reg. Timișoara*: Vf. Șușcului la Băile Herculane.

Răsp. gen.: Europa.

11. *E. anguláta* Jacq. Coll. II (1783) 309; Prokh. in Fl. U.R.S.S. XIV (1949) 381. — Lăptele căinelui. — Szegletes fűtej. — Kantige Wolfsmilch. — Молочай ребристый. — Exs.: FRE nr. 436. — Ic.: Pl. 50, fig. 1, 1 a, 1 b.

4. Rizomi orizontali, puternici, puțin ramificați. Tulpini erecte sau ascendente, la bază tuberculată îngroșate, glabre, unghiulare, pronunțat brăzdate. Frunze de 2 cm lungime și 2 mm lățime, sesile, oblong ovate sau oblongi, spre vârf fin serate, îngustându-se spre extremități, glabre sau de ambele părți sericeu păroase. Foliiole involucrale triunghiular ovate sau eliptice, acute, mai scurte decât radiile, cele ale involucelului triunghiular rotunjite, cu baza trunchiată sau aproape cordată, egal de lungi și de late. Umbela terminală 3—5-radiară; radiile dichazii simple. Ciatii de 2 mm lungime, cu glande brunii-roșietice. Capsulă glabră, lungă de 2,5 — 3 mm, dispers acoperită cu tuberculi globuloși. Seminte netede, de 2 mm lungime, cu carunculă. V—VI.

Stațiunea. Prin locuri pietroase, fânețe, tufișuri, pe coaste și în păduri umbroase.

Răsp. în țară: *Reg. Baia Mare*: Petrova la Chicera (r. Vișeu). *Reg. Cluj*: Mții Rodnei (Corongiș); Bistrița; Canciu (r. Dej); Cluj, Cojocna, Boj; Vâlcele, Cheia Turzii (r. Turda). *Reg. Aut. M.*: Tg. Mureș; Reghin, Gurghiu; Odorhei. *Reg. Stalin*: Orașul Stalin, Predeal;

Sighișoara, Dumbrăveni, Cristur (r. Sighișoara); Proștea Mare, Proștea Mică, Mediaș, Valea Lungă, Biertan, Șeica Mare (r. Mediaș). Gușterița, Șura Mare, Roșia, Tâlmăciu, Bradu (r. Sibiu); Apoldul Mare, Mercurea (r. Sebeș). *Reg. Hunedoara*: Alba Iulia pe Dl. Mamut, Oieșdea pe Dl. Bilac, Bucerdea Vinoasă; Orăștie; Hunedoara; Deva, Mintia. *Reg. Ploiești*: Sinaia, Bușteni. *Reg. Suceava*: Valea Seacă (r. Fălticeni).

Răsp. gen.: Europa sudică.

12. **E. lingulata** Heuff. Enum. pl. Banat. in Verh. ZBG Wien VIII (1858) 192, Sep. pag. 156. — **lc.**: Pl. 49, fig. 2.

4. Rizom vertical. Tulpină erectă, acoperită cu peri moi. Frunze scurt pețiolate, oblongi sau oblong eliptice, la ambele capete rotunjite, uneori îngustate spre bază, pe față răzleț, pe dos dens pubescente, cele florale ovat oblongi, verzi-gălbui. Umbelă 5 - radiată; radiile întrec în lungime foliolele involucrului. Capsulă lungă de 6 mm. Tuberculii capsulei filiformi, roșii. Seminte de 2,5 mm lungime, netede. V—VI.

Stațiunea. Tufișuri, crânguri, pe lângă păduri.

Răsp. în țară: *Reg. Timișoara*: Băile Herculane pe Mt. Domogled la Jerălău, Defileul Dunărei la Cazane, între Dubova și Ogradena. *Reg. Craiova*: Vârciorova către Porțile de Fier și pe V. Bahnei, Cerneți, Tr. Severin pe Dl. Buliga; Craiova; Robănești (r. Balș). *Reg. Pitești*: Govora pe V. Hîntei (r. Râm. Vâlcea). *Reg. București*: Ciocănești (r. Răcari); Pasărea (r. Brănești); Comana (r. Vidra).

Răsp. gen.: Jugoslavia.

13. **E. dulcis** L. Sp. pl. ed. I (1753) 457, em. Jacq. Fl. austr. III (1775) 8; Prokh. in Fl. U.R.S.S. XIV (1949) 379. — **lc.**: Pl. 50, fig. 2, 2a; W. et K. Pl. rar. Hung. III (1812) tab. 280 sub *E. viridiflora*.

4. Rizom articulată, cu articule oblongi sau tuberculate; din cel superior se dezvoltă tulpina ascendentă, lungă de 20—60 cm, cilindrică, păroasă. Frunze oblong lanceolate, obtuze, atenuate spre bază, lungi de 3—6 cm și late de 12—22 mm, cu margini întregi sau în partea anterioară fin dințate, glabre sau puțin păroase pe fața inferioară. Foliole involcrurale lanceolate, fin dințate în partea anterioară și dispers ciliate, cele ale involucelului triunghiulare. Umbele 3—5 - radiate. Ciatii de 2—3 mm lungime, cu glande oblice ovate, la început galbene, mai târziu purpurii închise. Capsulă lungă de 3 mm, glabră sau păroasă, rugoasă. Seminte de 2 mm lungime, netede, lucitoare, brun deschise, cu caruncula reniformă V—VI.

Plânșă 49. — 1. *Euphorbia polychroma* Kern., 1a. fruct mărit. — 2. *E. lingulata* Heuff. — 3. *E. helioscopia* L., 3a. fruct mărit, 3b. sămânță mărită.



Stațiunea. Prin păduri umbroase, jilave, tufişuri, fânețe turboase.

Răsp. în țară: *Reg. Oradea*: Mții Codrului pe coama dela N de pâraul Ursului. *Reg. Suceava*: Fânețele Horaieț între Bălcăuți și Calafindești (r. Rădăuți).

Răsp. gen.: Europa.

14. ***E. verrucōsa*** L. Sp. pl. ed. I (1753) 459. — **Ic.**: Pl. 50, fig. 3, 3 a.

4. Rizom erect, lemnos, multicapitat. Tulpini erecte sau ascendente, până la 50 cm înălțime, rotunde, glabre sau păroase, ramificate dela bază. Frunze alterne, oblong eliptice sau oblong ovate, îngustate spre bază, ± sesile, obtuze sau acute, uneori emarginate, păroase sau glabre, fin serate. Foliolate involucrale obovate, gălbui, acute, cele ale involuclului eliptice sau obovate, obtuze sau acute, fin serate. Inflorescență ± indesuită, 5 - radiată, de culoare roșcată, sub umbелеle terminale fără pedunculi laterali. Ciatii de 3—4 mm lungime, cu glande gălbui și vârfuri late, rotunjite. Capsulă globuloasă, lungă de 3—4 mm, globulos tuberculată, netedă. Semințe ovat-sferice, netede, lungi de 2—2,5 mm, brun-roșcate, lucitoare, cu caruncula reniformă. V—VI.

Stațiunea. Prin locuri mai uscate, calde, însorite, rareori prin locuri umbrite și reci.

Răsp. în țară: *Reg. Oradea*: Briheni la Poiana Ponorăș din Mții Codrului (r. Beiuș). *Reg. Timișoara*: dubioasă. Mai este citată de Brândză din «Moldova» prin tufişuri și păduri.

Răsp. gen.: Spania de N, Europa centrală, R. P. Română și Balcanii de N.

15. ***E. carniolica*** Jacq. Fl. austr. V (1778) 34, in App. tab. 14; Prokh. in Fl. U.R.S.S. XIV (1949) 365. — *E. ambigua* W. et K. Pl. rar. Hung. II (1805) 144, tab. 135. — **Exs.**: FRE nr. 1517. — **Ic.**: Pl. 50, fig. 4, 4 a; W. et K. l. c. sub *E. ambigua*.

4. Rizom orizontal, tuberculat, multicapitat. Tulpini până la 40 cm înălțime, păroase și aripate, numai cu ramificații fertile, uneori roșcate. Frunze până la 7 cm lungime și până la 1,6 cm lățime, cuneat obovate, sesile sau scurt pețiolate, mai mari în partea superioară a tulpinii, pe dos de obicei păroase, obtuze sau acute, cu margini întregi. Inflorescențe 3—5-radiate; radiile în dichazii dublu bifide. Ciatii de 3 mm lungime, pe pedunculi lungi de 5—13 mm, cu glande brune-gălbui. Foliolate involucrale obovate sau eliptice, sesile, ± păroase, cele ale involuclului ovat lanceolate, acute, ondulate pe margini, de culoare gălbuie. Capsulă de 5 mm lungime, acoperită de tuberculi puțini, semiglobuloși. Semințe de 4 mm lungime, netede, brune-verzui, cu caruncula pedicelată. IV—VI.

Stațiunea. Pe coaste înșorite, prin tufişuri, în păduri, fânețe montane.

Răsp. în țară: *Reg. Baia Mare*: Vișeu de Sus pe Mt. Zănoaga și Mt. Greben, Mții Rodnei (Pietrosul Mare). *Reg. Cluj*: Rodna, Valea Vinului (r. Năsăud), Mții Rodnei (Repedea, Obârșia Rebri); Bistrița; Canciu (r. Dej); Scărișoara spre Ghețar, Neagra în Mții Bihorului, Mt. Găina, Bucium pe Detunata (r. Câmpeni). *Reg. Aut. M.*: Sovata (r. Sângeorgiul de Pădure); Suseni (r. Gheorghieni); Mții Giurgeului (Hăghimașul Mare, Mt. «Öcsém»); Băile Homorod, Dealu (la «Ördögtó»), Zetea (r. Odorhei); Comandău (r. Sf. Gheorghe). *Reg. Stalin*: Orașul Stalin, Predeal, Mții Ciucașului, Mt. Piatra Mare (V. Gârcinului), Mt. Piatra Craiului (r. Stalin); Cârțișoara la Glăjărie (r. Făgăraș); Gușterița, Bradu, Tâlmăciu, Râul Sadului pe Mt. Preajbă și pe Dl. Porcovița, Cislădioara pe Mt. «Götzenberg». *Reg. Hunedoara*: Zampe dealuri (r. Deva); Mții Retezatului pe V. Lăpușnicului. *Reg. Oradea*: Ciucea, Valea Drăganului, Traniș spre Mt. Vlădeasa (r. Aleșd). *Reg. Arad*: Moneasa în Mții Codrului (r. Gurahonț). *Reg. Timișoara*: Mții Semeniciului pe V. Carașului; Băile Herculane pe V. Cernei. *Reg. Pitești*: Arefu (r. Curtea de Argeș); Câmpulung. *Reg. Ploiești*: Sinaia, Bușteni (V. Jepilor); Mt. Penteleu. *Reg. Suceava*: Mt. Rarău.

Variabilitatea speciei

f. expansa (Jka.) Porcius Enum. pl. Nasz. in Suppl. ad MNL II (1878) 51. — *E. expansa* Jka. in Linn. XXX (186) 600. — Radiile umbelei extinse. — *Reg. Cluj*: Rodna.

f. elliptica Czetz et Prod. f. nova in Add. pag. 672. — Frunze eliptice. — *Reg. Cluj*: Valea Vinului (r. Năsăud).


f. cordato-bracteata Prod. f. nova in Add. pag. 672. — Bractei cordate. — *Reg. Cluj*: Bistrița.

Răsp. gen.: Italia de N, Tirol, Stiria, Ungaria, Jugoslavia.

16. *E. platyphyllos* L. Sp. pl. ed. I (1753) 460; Prokh. in Fl. U.R.S.S. XIV (1949) 367. — Laptele câinelui. — Nagylevelű fűtej. — Breitblättrige Wolfsmilch. — Молочай расширеннолистный. — **Exs.**: FRE nr. 1516 a, b. — **Ic.**: Pl. 51, fig. 2, 2 a, 2 b; Roch. Pl. Ban. rar. (1828) tab. VII, fig. 17.

☉. Plantă cu rădăcină fusiformă și miros neplăcut de șoareci. Tulpini ascendente sau erecte, până la 60 cm înălțime, simple sau bifurcate la bază, glabre sau împreună cu radiile umbelelor păroase. Frunze eliptic lanceolate, acute, dela mijloc în sus fin serate, glabre sau dispers patent păroase, rar îndesuit păroase, îngustate spre bază și cordate, sesile, cele inferioare obovate, obtuze. Foliolate involucrale ovate lanceolate, acute, fin dentate, cele ale involucelului triunghiular ovate, mucronate. Umbelă terminală de obicei 5-radiată; radiile la început trifurcate, apoi bifurcate. Ciatii de 2,5 mm lungime,

Planșa 50. — 1. *Euphorbia angulata* Jacq., 1a. fruct mărit, 1b. o porțiune mărită din partea superioară a tulpinii. — 2. *E. dulcis* L., 2a. fruct mărit. — 3. *E. verrucosa* L., 3a. fruct mărit. — 4. *E. carniolica* Jacq., 4a. fruct mărit cu ciatu.



cu glande galbene-verzui. Capsulă de 3 mm lungime, acoperită cu tuberculi semiglobuloși. Semințe lungi de 1,5 — 2 mm, rotund ovate, netede, brune-verzui, cu carunculă reniformă. VI—IX.

Stațiunea. Prin locuri cultivate și ruderaie, pe lângă râuri și ape, în tufișuri, fânețe și în jurul așezărilor omenești.

Răsp. în țară: Comună în întreaga țară: în părțile muntoase crește și pe terenuri fugitive. Mai rară în Dobrogea.

Variabilitatea speciei

f. *typica* Nyár. Kv. fl. V (1943) 346, cum diagn. hung. ex Prod. in Add. pag. 672.— Frunze dispers păroase. — Comună în jurul Clujului.

f. *literata* (Jacq.). — *E. literata* Jacq. Ic. rar. III (1786 — 93) tab. 481; Coll. II (1788) 340. — Frunze dens păroase și adeseori brunii maculate. — Fânețele Clujului.

f. *obtusifolia* Roch. Pl. Ban. rar. (1828) 43, tab VII, fig. 17. — Cu frunze mai mari și obtuze. — Indică de Rochel din Banat.

Răsp. gen.: Europa, Asia Mică, Africa de N. — Adventivă în America de N.

17. *E. stricta* L. Syst. nat. II, ed. X (1759) 1049; Prokh. in Fl. U.R.S.S. XIV (1949) 366. — **Ic.:** Pl. 51, fig. 1, 1 a.

○. Rădăcină fusiformă. Tulpini erecte, până la 70 cm înălțime, simple sau puțin ramificate, rotunde, glabre, adeseori spre bază roșcate. Frunze atenuate spre bază, sesile, cele inferioare obovate, obtuze, cele superioare lanceolate, acute, toate dela mijloc în sus fin dințate, glabre sau răzleț păroase. Foliiolele involucrale și ale involuclului fin dințate. Sub umbela terminală se află numeroase umbele laterale, lung pedunculate. Umbelă terminală de obicei 3 - radiată (rar 5), cu ramificații trifide sau bifide. Ciatii de 2 mm lungime, glabre, cu glande brune-gălbui, lat ovate. Capsulă de 2 mm lungime, cu tuberculi scurt cilindrici. Semințe ovate, de cca 1,5 mm lungime, netede, brune, lucitoare, cu carunculă reniformă. Plantă cu miros neplăcut. VI—VIII.

Stațiunea. Locuri cultivate, ruderaie, pe lângă ape, păduri umbroase.

Răsp. în țară: Comună în cea mai mare parte a țării.

Variabilitatea speciei

f. *latifolia* Murb. Beitr. Fl. Südbosn. in Lund's Univ. Arsskr. XXVII (1891) 41.— Frunze eliptice, lungi de 3—4 cm și late de 1,6—2 cm. — *Reg. Timișoara:* Orșova, Cazane (r. Mehadia); Liebling (r. Deta). *Reg. Craiova:* între Mofleni și Leamna (r. Craiova).

Răsp. gen.: Europa mijlocie și sudică, Caucaz, Persia de N.

18. *E. helioscopia* L. Sp. pl. ed. I (1753) 459; Prokh. in Fl. U.R.S.S. XVI (1949) 383. — Laptele cucului. — Napraforgó fűtej. — Sonnenwendige

Wolfsmilch. — Молочай солнцегляд. — Exs.: FRE nr. 2552. — Ic.: Pl. 49, fig. 3, 3 a—b.

○. Rădăcină pivotantă. Tulpini până la 40 cm înălțime, erecte sau ascendente, simple sau ramificate, puțin foliate, spre maturitate aproape nefoliate, patent păroase sau glabre. Adeseori întreaga plantă îmbracă o nuanță purpurie. Frunze late de 1,5 — 3 cm, împreună cu foliolele involucrelor obovate sau suborbicular rotund obtuze, serate în partea anterioară, cele inferioare pețiolate, toate glabre sau dispers păroase, moi, verzi sau verzi-gălbui. Foliole involucrale mari, obtuze, în partea anterioară serate, cele ale involucrelor obovate, sau suborbicular rotunde, obtuze. Umbele 5-radiate, cu radii trifide sau bifide. Ciatii de 3 mm lungime, cu glande gălbui ca de ceară. Capsulă lungă de 3 mm, netedă, punctată. Semințe ovat globuloase, până la 2,5 mm lungi și 2 mm late, rugos foveolat reticulate, cenușii sau brune, cu carunculă proeminentă. IV—XI.

Stațiunea. Constituie asociații prin locuri ruderaie și cultivate, grădini, vii și în apropierea așezărilor omenеști.

Răsp. în țară: Comună în întreaga țară, uneori vegetează chiar și sub zăpadă.

Răsp. gen.: Eurasia, Africa de N.


19. *E. exigua* L. Sp. pl. ed. I (1753) 456; Prokh. in Fl. U.R.S.S. XIV (1949) 460, tab. XXIII, fig. 9. — Exs.: FRE nr. 1081 a, b. — Ic.: Pl. 52, fig. 2, 2 a—b.

○. Rădăcină subțire. Tulpină până la 25 cm înălțime, erectă, ascendentă sau culcată, simplă sau ramificată dela bază, glabră, verde, adeseori roșcată. Frunze liniare, lungi de 1 — 2,5 cm și late de 1 — 4 mm, subțiri, glabre, spre bază mai late, la vârf acuminate sau \pm retuze. Foliolele involucrale și ale involucrelului lat liniare sau liniar lanceolate, acute sau emarginate, verzi, cu baza ovat-cordată. Umbele îndesuit multiradiate (de obicei 3—4-radiate), cu radii repetat bifide. Ciatii de 1 mm lungime, cu 2 glande bicornute, galbene. Capsulă lungă de 2 — 2,5 mm, netedă, glabră. Semințe lungi de 1,5 mm, late de 0,9 mm, 4-unghiulare și tuberculat rugoase, la început gălbui, mai târziu brune negricioase, cu carunculă reniformă. V—XI.

Stațiunea. Prin semănături, locuri cultivate, pe lângă drumuri.

Răsp. în țară: Comună în întreaga țară, lipsește însă în raionul Arad.

Plansa 51. — 1. *Euphorbia stricta* L., 1a. fruct mărit. — 2. *E. platyphyllos* L., 2a. fruct mărit, 2b. ciatu mărit.



Variabilitatea speciei

f. *acuta* (L.). — *E. exigua* L. α . *acuta* L. Sp. pl. ed. I (1753) 456. — Frunze acute la vârf. — *Reg. Oradea*: în Mții Codrului.

f. *retusa* (L.) Nyár. Kv. fl. V (1943) 352. — *E. retusa* L. Sp. pl. ed. I (1753) 456. — *E. exigua* β . *retusa* Roth. Tent. II 1 (1789) 526, em. Boiss. in DC. Prodr. XV. 2 (1862) 139. — *E. exigua* L. β . *truncata* Koch Syn. ed. I (1836) 634. — Frunze retuze sau emarginate, din loc în loc mucronate. — *Reg. Cluj*: Cluj la Fânațe. *Reg. Oradea*: Oradea. *Reg. Iași*: Brătuleni, Cucuteni (r. Iași).

f. *tricuspidăta* (Lapeyr.) Borza Consp. Fl. Rom. II (1949) 178. — *E. tricuspidata* Lapeyr. Hist. abr. pl. Pyr. (1813) 271. — Frunze la vârf tridentate. — *Reg. Aut. M.*: Reghin. *Reg. Iași*: Sculeni, Soloneț (r. Iași).

Răsp. gen.: Europa, Insulele Canare, Africa de N, Asia Mică.

20. **E. Péplus** L. Sp. pl. ed. I (1753) 456; Prokh. in Fl. U.R.S.S. XIV (1949) 463, tab. XXIII, fig. 10. — **Exs.**: FRE nr. 1082 b, c. — **Ic.**: Pl. 52, fig. 3, 3 a, 3 b.

○. Rădăcină subțire, ramificată. Tulpini erecte, până la 40 cm înălțime, de obicei ramificate dela bază, rar simple, glabre, verzi, uneori roșcate. Frunze ovate până la rotunde, atenuate într'un pețiol scurt, cu margini întregi, la vârf obtuze sau rotunjite, adeseori emarginate, glabre, verzi deschise sau roșcate. Foliiolele involucale ovate, spre bază atenuate, cele ale involuclului scurt pețiolate și oblic ovate, la bază puțin unghiulare. Umbele cu 3—4 radii, însoțite adesea de ramuri laterale dichaziale. Ciatii de 1,5 mm lungime, cu glande bicornute, lungi, albe. Capsulă lungă de 2,5 mm, netedă, glabră, aripată. Semințe de 1,5 mm lungime, prevăzute cu 6 striățuni albe, printre care se găsesc gropițe transversale. VI—IX.

Stațiunea. Mult răspândită ca buruiiană, prin semănături, grădini, vii, locuri ruderaale.

Răsp. în țară: *Reg. Cluj*: Cluj; Muntele Filii (r. Turda). *Reg. Timișoara*: rară (Heuffel). *Reg. Constanța*: Teckirghiol. *Reg. Suceava*: aproape de frontieră.

Răsp. gen.: Euro-Siberia.

21. **E. graeca** Boiss. et Sprun. in Boiss. Diagn. sér. I, 5 (1844) 53; Prokh. in Fl. U.R.S.S. XIV (1949) 461, tab. XXIII, fig. 3. — *E. segetalis* Kit. in Sadl. Fl. Pest. II, ed. I (1826) 320, non L. — **Ic.**: Pl. 45, fig. 2, 3 a.

○. Tulpină erectă, glabră, dispers foliată. Frunze subțiri, înguste, glabre, cele superioare lat liniare, cele inferioare cuneat obovate, cuneat obcordate sau cuneat spatulate. Foliiolele involucalelor triunghiulare sau deltoide, mai lungi decât late. Radiile umbelei 5—3, subțiri, alungite, repetat bifide. Coarnele glandelor involucale setiforme, cu mult mai lungi decât grosimea

glandelor. Capsulă ovată, granulos rugoasă. Semințe foveolate (cu gropițe). VI—VIII.

Stațiunea. In deosebi prin semănături și coaste pietroase.

Răsp. în țară: Adventivă la Vârciorova (r. Tr. Severin).

Răsp. gen.: Europa de SE.

22. **E. falcăta** L. Sp. pl. ed. I (1753) 456; Prokh. in Fl. U.R.S.S. XIV (1949) 464, tab. XXIII, fig. 12. — **Ic.:** Pl. 53, fig. 3, 3a — c.

○. Rădăcină alungit fusiformă. Tulpini până la 40 cm înălțime, erecte sau procumbente, simple sau ramificate în partea superioară și adesea dela bază, rotunde, glabre, glaucescente. Frunze glabre, cu margini întregi, cele inferioare spatulate, obtuze sau emarginate, cele superioare lanceolate, acute, de 2 cm lungime și 5 mm lățime, toate atenuate spre bază. Foliolate involucale oblic ovate sau romboidale, mucronate, evident cartilagineoase, cele ale involuclului oblic sau triunghiular ovate, mucronate, fin dințate, la bază albicioase. Umbele terminale însoțite de numeroase ramificații axilare, 3 (5) radiate, cu radii repetat bifide. Ciatii de 1,5 mm lungime. Glarde semilunare, galbene, cu coarne mai scurte decât grosimea glardei. Capsulă lungă de 2 mm, netedă, glabră. Semințe 4 - unghiulare, brăzdate, cu carunculă mărunță, verucoasă. VI—X.

Stațiunea. Locuri aride și cultivate, ogoare, coaste uscate.

La noi se găsește în următoarea subspecie:

ssp. **acuminăta** (Lam.) Nyár. Kv. fl. V (1943) 352. — *E. acuminata* Lam. Encycl. II (1786) 427. — *E. falcata* var. *acuminata* St. Am. Fl. agen. (1821) 189. — *E. obscura* Lois. Fl. gall. I, ed. II (1828) 339. — *E. erythrosperma* Borb. in ÖBZ XXXV (1885) 76.

Foliolate involucale oblic lanceolate, ușor crenulate, la vârf abia scurt cartilagineu mucronate sau nemucronate, la bază de un verde închis. Glande involucale adeseori roșietice.

Reg. Cluj: Chiochiș (r. Beclean); Câmpia Transilvaniei; Cluj; Turda. **Reg. Hunedoara:** Vințul de Jos (r. Alba Iulia); Turdaș (r. Orăștie). **Reg. Stalin:** Valea Lungă (r. Mediaș); Sura Mare, Gușterița, Sibiu.

f. **grácilis** Prod. f. nova in Add. pag. 672. — Intreaga plantă mai gracilă, cu mult mai puțin ramificată în partea superioară. Toate părțile plantei reduse, începând dela tulpină până la flori. Foliolatele umbelei și involuclului mai alungite. — **Reg. Constanța:** Intre Tuzla și Techirghiol (r. Constanța).

Planșa 52. — 1. *Euphorbia Myrsinites* L., 1a. ciatu mărit., 1b. sămânță mărită. — 2. *E. exigua* L., 2a. idem, fără ramuri, 2b. sămânță mărită. — 3. *E. Peplus* L., 3a. ciatu mărit, 3b. sămânță mărită.



f. prostrata Prod. f. nova in Add. pag. 672. — Din tulpina culcată la pământ pornesc numeroase ramuri subțiri și mai groase, toate terminate cu flori. — *Reg. Cluj*: Cojocna, Boj, Tunelul Cojocnei, Cluj; Iclod (r. Gherla).

O b s. Este una din plantele cele mai bune fixatoare de teren din Câmpia Transilvaniei, îndeosebi pentru locurile argiloase.

R ă s p. g e n.: Europa centrală, regiunea mediteraneeană.

23. **E. lucida** W. et K. Pl. rar. Hung. I (1802) 54, tab. 54; Prokh. in Fl. U.R.S.S. XIV (1949) 434. — Lăptele câinelui. — Fényes fűtej. — Glänzende Wolfsmilch. — Молочай Глянцевидный. — **Ic.:** Pl. 54, fig. 3, 3 a; W. et K. l.c.

4. Plantă robustă cu rizom scurt, repent, negricios. Tulpină până la 120 cm înălțime, erectă, rotundă, fistuloasă, glabră, cu ramificații ce depășesc umbela terminală. Frunze lanceolate sau ovate lanceolate, mai late în treimea inferioară, lungi de 5—15 cm și late de 1—3 cm, obtuze, mai rar auriculate la bază, cu baza îngustată. Frunze lucitoare, de un verde-gălbui, la bătrânețe pielose, cu nervurile laterale în partea inferioară aproape perpendiculare pe nervura mediană. Foliole involucrale ovate, cele ale involucrelului gălbui, lat cordate, mucronate sau acute. Umbelă terminală multiradiată, cu radii repetat bifide. Ciatii lungi de 3—4 mm, cu glande în formă de semilună, gălbui, mai târziu brune. Capsulă de 3 mm lungime, glabră, profund 3-sulcată, punctat scabră. Semințe de 2,5 mm lungime, netede, gălbui. **V—VII.**

Stațiunea. Prin locuri umede, lunci, pe lângă bălți.

R ă s p. în țară: *Reg. Cluj*: Chiochiș (r. Beclean); Cluj, rară pe V. Someșului Mic. *Reg. Aut. M.*: Sâncraiu de Mureș (r. Tg. Mureș). *Reg. Stalin*: pe V. Homorodului Mic, între Homorod și Mercheașa, Rupea. *Reg. Hunedoara*: Deva pe malul Mureșului. *Reg. Timișoara*: Lugoj. *Reg. Craiova*: Coțofenii din Față (r. Craiova). *Reg. București*: București (Băneasa, Herăstrău, în lungul râului Colentina); Comana în lunca Călniștei (r. Vidra); Giurgiu spre Oinacu, Malu. *Reg. Galați*: Delta Dunărei; Galați în lunca Brateșului. *Reg. Iași*: Zahorna, Văiluța, Tăutești (r. Iași).

Variabilitatea speciei

f. latifolia (Koch.). — *E. lucida* W. et K. *α. latifolia* Koch Syn. ed. I (1836) 632. — Frunze late. — *Reg. Timișoara*: Timișoara.

f. puberula I. Pop in litt. ad Prod. f. nova in Add. pag. 672. — **Ic.:** Pl. 54, fig. 3a. — Marginile și dosul foliolelor involucrului și îndeosebi ale involucrelor, dela jumătate în sus acoperite cu peri moi, dintre care unii glanduloși. — *Reg. Oradea*: Salonta în apropierea Canalului nou, înspre comuna Tulcea, pe teren nisipos.

R ă s p. g e n.: Europa centrală, Balcanii estici, U.R.S.S. de S, Asia de V.

24. **E. salicifolia** Host Syn. Pl. Austr. (1797) 267; Prokh. in Fl. U.R.S.S. XIV (1949) 429. — Alior. — Füzlevelű fűtej. — Weidenblättrige Wolfsmilch. — Молочай иволжистый. — **Exs.:** FEAH nr. 508; FRE nr. 2246 a, b. — **Ic.:** Pl. 54, fig. 2, 2a; W. et K. Pl. rar. Hung. I (1802) tab. 55; Roch. Pl. Ban. rar. (1828) tab. VII, fig. 16 sub b. *angustata*.

4. Rizom repent, multicapitat. Tulpini până la 70 cm înălțime, erecte, dens foliate, în partea superioară adesea cu ramificații sterile, cel puțin în partea inferioară des pubescente. Frunze sesile, lanceolate sau oblongi, cu lățimea maximă sub mijloc, la vârf acute, cu margini întregi, fin ciliate, pe ambele fețe glandulos păroase. Foliiole involucrale lat lanceolate sau ovate, obtuze sau acute, în timpul înfloririi gălbui. Foliiolele involuclului triunghiular cordate, mai late decât lungi, acute, glabre, intens galbene, libere. Umbele terminale multiradiate, însoțite de ramuri laterale dichaziale de lungimea frunzelor. Ciatii de 3 mm lungime, cu glande gălbui, bicornе. Capsulă lungă de 3,5 mm, adânc 3-brăzdată. Semințe de 2 mm lungime, rotund ovate, netede, cu carunculă rotundă. V—VI.

Stațiunea. Pe drumuri, locuri cultivate, prin tufișuri, garduri, semănături.

Răsp. în țară: Comună în toată țara.

Răsp. gen.: Europa de S, regiunea pontică.

25. **E. virgata** W. et K. Pl. rar. Hung. II (1805) 176, tab. 162; Prokh. in Fl. U.R.S.S. XIV (1949) 443. — Laptele cucului. — Vesszős fűtej. — Rutenförmige Wolfsmilch. — Молочай лозный. — **Exs.:** FRE nr. 1515 a, b. — **Ic.:** Pl. 54, fig. 1; W. et K. l.c.

4. Rizom profund, ramificat, aproape drept. Tulpină erectă, până la 1 m înălțime, cu numeroase ramificații sterile ce nu depășesc axa principală. Frunze lungi de 3—5 cm, late de 2—10 mm, cu lățimea maximă aproape de bază, spre vârf atenuate, opace, oblongi, liniar lanceolate sau liniare, acuminate, fin mucronate, pe ambele fețe netede, cu nervuri secundare în unghi ascuțit. Foliiole involucrale lat ovate, acute, verzi, cele ale involuclului lat cordate, evident acuminate, late de 10—12 mm, gălbui spre vârf, pe dos fin pubescente. Umbelă multiradiată, cu radii bifide, însoțită de ramuri laterale dichaziale. Ciatii de 3 mm lungime, cu glande la început verzi, mai

Planșa 53. — 1. *Euphorbia Cadrilateri* Prod., 1a. ciatiu mărit după căderea nuculelor. — 2. *E. Cadrilateri* Prod. var. *transitoria* Prod., 2a. ciatiu mărit, 2b. fruct mărit. — 3. *E. falcata* L., 3a. ciatiu mărit, 3b. fruct mărit, 3c. sămânță mărită. — 4. *E. falcata* L. ssp. *acuminata* (Lam.) Nyár. — 5. *E. leptocaula* Boiss., 5a. ciatiu mărit.



târziu gălbui, apoi brune, bicornе. Capsulă de 3 mm lungime, glabră, profund 3-sulcată. Semințe până la 2 mm lungime, lucitoare, brun-violete, cu carunculă reniformă. V—VIII.

Stațiunea. În fânețe, tufișuri, poieni de păduri, ogoare, prin șanțuri.

Răsp. în țară: *Reg. Baia Mare*: Satu Mare; Șomcuța Mare. *Reg. Cluj*: Năsăud; Bistrița; Beclean, Chiochiș, Lechința; Dej; Gherla; Mihăești, Berindu, Cluj, Cojocna, Boj, Suat, Berchieșu (r. Cluj); Valea Florilor, Aiton, Turda; în întreaga Câmpie a Transilvaniei. *Reg. Aut. M.*: Tg. Mureș; Gurghiu. *Reg. Stalin*: Tiur (r. Blaj); Mănărade, Valea Lungă, Proșteia Mică, Medias, Bazna (r. Medias); Sighișoara; Merghindeal (r. Agnita); Orașul Stalin; Slimnic, Ocna Sibiului, Șura Mare, Noul Sibi, Gușterița, Bungard, Tâlmăciu, Bradu (r. Sibi); Mercurea, V. Secășului (r. Sebeș). *Reg. Hunedoara*: Alba Iulia, Bărbant, Micești, Oarda de Sus, Oieșdea, Ighiu (r. Alba Iulia); Orăștie; Deva, Hărău, Mintia; Hunedoara, Ocoliușul Mare. *Reg. Oradea*: Oradea. *Reg. Arad*: Arad și în tot raionul; Miniș (r. Lipova); Mocrea (r. Ineu). *Reg. Timișoara*: Băile Herculane. *Reg. Craiova*: Gura Văii, Schela Cladovei, Tr. Severin; Craiova, Păd. Bucovăț, Balta Verde, Coțofeni; Maglavit (r. Calafat); Urzicuța (r. Băilești). *Reg. Pitești*: Câmpulung. *Reg. București*: Ciocănești (r. Răcari); București (Chitila); Comana (r. Vidra); Băneasa (r. Giurgiu). *Reg. Constanța*: Păd. Babadag. *Reg. Galați*: Delta Dunărei în Păd. Letea, Mălcoci (r. Tulcea), Greci, Cerna (r. Măcin); Brăila. *Reg. Iași*: Moinești, Ciurea, Valea Adâncă, Coadă Stâncii, Cucuteni, Cristești, Vlădiceni, Mărzești, V. Stăvnic (r. Iași); Podul Iloaiei (r. Tg. Frumos).

Variabilitatea speciei

var. typica Nyár. Kv. fl. (1941 — 44) 352, sine nomine sed cum diagn. hung. et in Add. pag. 672. — Frunze liniar lanceolate sau îngust lanceolate. Plantă gracilă, în partea superioară cu mlădițe sterile. — *Reg. Cluj*: în întreaga Câmpie a Transilvaniei. — *Reg. Pitești*: Piatra Olt prin semănături.

var. orientalis Boiss. in DC. Prodr. XV. 2 (1862) 160. — Frunze alungite, lungi de 6 — 8 cm și late cel mult de 10 mm. Tulpină de obicei mult ramificată. — *Reg. Timișoara*: V. Dunărei la Cazane, Sviniața.

f. angustissima Schur En. pl. Transs. (1866) 598. — Frunze late de 2 — 8 mm. — *Reg. Oradea*: Salonta sub vii.

f. serotina Nyár. l. c. et in Bul. șt. Acad. R.P.R. Sect. șt. biol. tom. III, nr. 1 (1951) 32. — Frunze late de 7 — 17 mm și până la 7 cm lungime. Tulpina la mijloc cu numeroase ramuri lungi, subțiri, dens foliate. Formă dimorfă de sezon. — *Reg. Cluj*: Florești pe locuri cultivate (r. Cluj).

var. lutescens Rehm. et Wol. in Fl. Polon. exs. Cent. II et III; cf. ÖBZ XLIV (1894) 237. — Diferă de tip prin frunzele inferioare atenuate spre bază, patente sau reflecte și prin bracteele mai mari. Intreaga plantă verde-gălbuie. — *Reg. Timișoara*: Sviniața (r. Mehadia).

f. latibasis Nyár. Kv. fl. l. c. cum diagn. hung. et in Bul. șt. Acad. R.P.R. l. c. — Frunze late, ovate lanceolate, spre bază lățite. — *Reg. Cluj*: Cluj, Someșeni, Boj.

Răsp. gen.: Europa centrală și de E, Balcani, Asia de V.

26. **E. leptocaula** Boiss. in DC. Prodr. XV. 2 (1862) 159; Prokh. in Fl. U.R.S.S. XIV (1949) 443. — *E. tenuifolia* M. B. Fl. taur.-cauc. I (1808)

372, non. Lam.; Ldb. Fl. ross. III (1846—51) et Auct. plur. — **Ic.**: Pl. 53, fig. 5, 5 a.

4. Rizom subțire. Tulpină subțire, la început glaucă, de 1—1,5 mm grosime, înaltă de 35—45 cm. Frunze glauce, liniare, de 3—5 cm lungime și 1—2 mm lățime, acute sau mai rar obtuziuscule, pe ambele fețe cu încrețituri, cu nervuri secundare nedistincte. Frunzele superioare și cele dela baza radiilor inflorescenței adeseori dilatate la bază (deltoide). Foliiolele involu-celilor glaucescente, mai mici, late de 7,5 mm, mai scurt acuminate sau mucronate. Glandele ciatului bicornute, galbene ca ceara. Capsule proemi-nent punctate, lungi de 2—3 mm și late de 2,5 — 3 mm. Semințe brunii, lungi de 2 mm. V—VI.

Stațiunea: Prin nisipuri.

Răsp. în țară: *Reg. Galați*; Letea în Delta Dunării.

Răsp. gen.: U.R.S.S. și Dobrogea.

27. **E. Esula** L. Sp. pl. ed. I (1753) 461; Prokh. in Fl. U.R.S.S. XIV (1949) 419. — **Ic.**: Pl. 55, fig. 3.

4. Rizom cilindric, ramificat, repent, cu stoloni târători. Tulpină până la 80 cm înălțime, rotundă, glabră, spre bază cu solzi, spre vârf dens foliată, adeseori ramificată. Frunze liniar oblongi sau oblong lanceolate, de 4—6 cm lungime și cca 1 cm lățime, cu lățimea maximă în treimea superioară, obtuze, uneori acute, sesile, spre vârf adeseori puțin scabre, cele inferioare patente și foarte scurt pețiolate, cele superioare erecte, cele ale ramurilor laterale late de cca 2,5 mm. Toate frunzele moi, glabre, ± albastrii pe fața inferioară. Foliiole involucrale ovat lanceolate, acute, cele ale involuclului triunghiulare, mai late decât lungi, mucronate, gălbui sau roșcate. Umbele terminale 7—13-radiate, cu radii lungi, la bază cu numeroase dichazi laterale. Ciatii de 2—5 mm lungime, cu glande bicornute, gălbui sau brune. Capsulă lungă de 3 mm, glabră, profund trisulcată, rugos verucoasă. Semințe de 2 mm lungime și 1,8 mm lățime, rotund ovate, brune, cu carunculă re-niformă. VI—VIII.

Stațiunea. Prin vii, arături, fânețe, stepe, tuferișuri.

Răsp. în țară: *Reg. Cluj*: V. Șieului (r. Beclean); Canciu, Dej; Cluj, Someșeni, Apahida, Cojocna, Boj (r. Cluj); Valea Florilor, Turda. *Reg. Aut. M.*: Sândominic, Nicoleşti. (r. Miercurea Ciuc). *Reg. Stalin*: Valea Lungă, Micăsasa, Mediaș; Sighișoara; Orașul Stalin; Sibiu, Noul, Bungard, Tâlmăciu. *Reg. Hunedoara*: Orăștie; Bretea de Mureș (r. Deva). *Reg.*

Planșa 54. — 1. *Euphorbia virgata* W. et K. — 2. *E. salicifolia* Host, 2a. un ciatiu. — 3. *E. lucida* W. et K., 3a. f. *puberula* I. Pop, o frunză de involucru și de involucl.



Oradea: Oradea (rară). *Reg. Arad*: în întreg raionul. *Reg. Timișoara*: indicată de Heuffel din Banat, fără localitate. *Reg. Craiova*: Craiova în parc; Zăvalu (r. Bechet); Segarcea. *Reg. Ploști*: Bărcănești-Speteni pe coastele Ialomiței, Borănești (r. Urziceni). *Reg. Constanța*: Techirghiol (r. Constanța). *Reg. Bacău*: Cheile Bicazului, Mt. Suhardul. *Reg. Iași*: Cristești, Vlădeni în V. Miletinului, Mârzești (r. Iași), V. Bahluiului dela Vlădiceni (r. Iași) până la Podul-Iloaiei (r. Tg. Frumos); Munteni, Belcești pe Dl. Ciomag (r. Hârlău). *Reg. Suceava*: Bosanci (r. Suceava); Calafindești (r. Rădăuți).

Variabilitatea speciei

var. *tristis* (Bess.). — *E. tristis* Bess. Catal. hort. Cremen. Suppl. IV (1811) 27. et Catal. (1816) 57, ex M. B. Fl. taur.-cauc. III (1819) 326. — Plantă gracilă, slab ramificată, glabră, fără ramuri sterile. Inflorescența o umbelă terminală, multiradiată, dedesubt cu multe dichazii laterale. Frunze oblongi sau alungit ovate. — *Reg. Suceava*: Câmpulung.

var. *cyparissioides* Boiss. in DC. Prodr. XV. 2 (1862) 161. — *E. gracilis* Bess. Catal. hort. Cremen. (1816) 56. — Plantă glabră, gracilă, cu frunze înguste, mult asemănătoare cu *E. Cyparissias*, însă cu frunze mai rărite. — *Reg. Pitești*: Câmpulung.

var. *lingulata* Nyár. var. nova in Add. pag. 672 — Tulpină de 20 — 25 cm înălțime, neramificată, până la vârful uniform de groasă, la bază arcuită, decumbentă, abia ascendentă, dens și uniform foliată. Frunze lungi de 5 — 6 cm, late de 12 — 15 mm, la vârful rotunjite, la extremitatea superioară mai late, în pețiol cuneiform atenuate, pe margini cartilaginee, întregi, glabre ca și tulpina. La subțioara frunzelor superioare se află puțini lăstari sterili. Pedunculii cu frunze egal de lungi. Vârful tulpinii umbelat, cu 6 radii, cu bractei lanceolate, la fel cu frunzele, însă mai mici. Foliiolele involucrelor mai late decât lungi, la vârful rotunjite. Glande ovate, bicornute. — *Reg. Iași*: In V. Jijiei mai sus de Iași.

var. *ripária* Schur Enum. pl. Transs. (1866) 596. — *E. Esula* 9. *latifolia* Ldb. Fl. ross. III (1846 — 51) 576, non *E. latifolia* C. A. Mey. — Tulpină înaltă de 20 — 30 cm, cu frunze glabre, glauce, oblongi, pețiolate, obtuziuscule, pe margini ondulate. Foliiolele involucrelor subreniforme, cu baza trunchiată, pe margini ondulate, mucronate. Glande semiorbiculate, necorniculate. — *Reg. Stalin*: Tâlmaci. (r. Sibiu). *Reg. Hunedoara*: Mții Metalici, între Brad și Băița; între Deva și Hărău.

Răsp. gen.: Eurasia.

28. *E. Cyparissias* L. Sp. pl. ed. I (1753) 461; Prokh. in Fl. U.R.S.S. XIV (1949) 439. — Exs.: FRE nr. 2244. — Ic.: Pl. 56, fig. 1—4.

4. Rizom oblic, ramificat și lignificat, cu stoloni repenți. Tulpini stufoase, până la 50 cm înălțime, glabre, galbene-verzui, spre bază adeseori roșietice, îndesuit foliate, cu ramificații sterile de obicei numai în partea superioară. Frunze îngust liniare, moi, late de 0,5 — 5 mm și lungi de 1—2 cm, dispuse în spirală, patente, imbricate spre vârful tulpinilor, obtuze sau retezate. Foliiole involucrale asemănătoare frunzelor, cele ale involucrelor romboide sau subtriunghiular ovate, întregi, scurt acuminate, de culoare verde deschisă sau gălbuie, mai târziu adeseori roșietice. Umbele terminale multi-

radiate; radii dichaziale 1—2 ori furcate. Ciatii de 3 mm lungime, cu glande bicornute, gălbui sau brune; coarneau mai scurte decât lățimea glandei. Capsula lungă de 3 mm, glabră, adânc 3-sulcată, subtil punctat scabră. Semințe netede, de 2 mm lungime, rotund ovate, cenușii, cu carunculă reniformă. IV—VII.

Stațiunea. În locuri ruderaie și cultivate, pășuni, locuri uscate, pietroase și însoarite.

Răsp. în țară: Foarte comună în întreaga țară, formează asociații dela câmpie până în regiunea subalpină (1200 m); în munți adeseori fixează terenurile fugitive.

Variabilitatea speciei

Planta este sezondimorfă și poate fi împărțită în următoarele 2 varietăți:

var. **vernălis** Nyár. in Acta Univ. Szeged. I (1942) 38; Kv. fl. V (1943) 351 fig. 44, nr. 1,2. — **Ic.:** Pl. 56, fig. 1. — Ramurile tulpinii principale mărunte și chiar dacă se alungesc, rămân sterile; frunze tulpinale rărite, de 1 — 2,5 cm lungime. IV — VI.

var. **serótina** Schur Enum. pl. Transs. (1866) 595; Nyár. in Acta l. c.; Kv. fl. 351, fig. 45, nr. 3,4. — **Ic.:** Pl. 56, fig. 2, 3. — Tulpină principală lipsită de frunze, cu ramurile fertile foarte alungite, virgate, dens acoperite cu frunzișoare obtuze sau rotunjite, acoperind complet tulpina și depășind umbela axei. În vârful tulpinii o inflorescență relativ mică, cu flori sesile, uneori și cu mlădițe sesile. VII — X.

Obs.: Primăvara, foarte frecvent, se găsesc exemplare de *E. Cyparissias* atacate și deformate de ciuperca *Uromyces Pisi* (vezi Pl. 56, fig. 4).

Răsp. gen.: Euro-Siberia.

29. **E. Seguieriana** Neck. in Acta Akad. Theod. - Pal. II (1770) 433; Prokh. in Fl. U.R.S.S. XIV (1949) 395. — *E. Gerardiana* Jacq. Fl. austr. V (1778) 17, tab. 135. — Laptele cucului. — Pusztai fűtej. — Steppen Wolfsmilch. — Молочай сетнепов. — **Exs.:** FRE nr. 439, sub *E. Gerard.* — **Ic.:** Pl. 57, fig. 2, 2 a — c; Hay. Pflzdecke. (1916) 49.

24. Rizomi groși și rădăcină până la 1,5 m lungime. Tulpină înaltă până la 60 cm, erectă sau ascendentă, sulcată, glabră, verde-gălbuie. Frunze dispuse în spirală, acoperindu-se în parte, lungi de 1—2 cm și late de 4—5 mm, liniare sau liniar lanceolate, mucronat acuminate, glauce și glabre. Foliiole involucrale scurt ciliate, de forma frunzelor superioare. Foliiolele involucrelului lat romboidale sau cordat triunghiulare, aristat mucronate, gălbui, mai târziu verzi. Umbelă terminală multiradiară, cu radii repetat bifide sau trifide. Ciatii de 2,5 mm lungime, cu glande semilunare, la început verzi,

Plansa 55. — 1. *Euphorbia paradoxa* (Schur) Podp. — 2. *E. agraria* M. B., 2a. var. *euboea* (Hal.) lăstari sterili. — 3. *E. Esula* L.



mai târziu gălbui. Capsulă de 3 mm lungime, glabră, fin punctată. Seminte de 1,7 mm lungime, ovate, netede, gălbui sau cenușii, cu carunculă de forma ombilicului. VI.

Stațiunea. Prin locuri uscate, însorite, nisipoase, în stepe, locuri sterile, fânețe.

Răsp. în țară: *Reg. Cluj*: Cluj în Păd. Hoia, Suatu; Frata (r. Sărmășel); Turda Luncani. *Reg. Stalin*: Cetatea de Baltă, Bălcaciu (r. Târnăveni); Șeica Mică (r. Mediaș); Gușterița (r. Sibiu). *Reg. Hunedoara*: Alba Iulia pe Dl. Mamut și Dl. Bilac; Băcia (r. Deva); Râul Bărbat (r. Hîțeg). *Reg. Arad*: în lungul Mureșului între Miniș (r. Lipova) și Semlac (r. Arad). *Reg. Timișoara*: Timișoara. *Reg. Craiova*: Craiova la Fântâna Obedeianu, Cernelele. *Reg. Pitești*: Piatra Olt. *Reg. Ploiești*: Buzău; V. Slănicului spre Beceni; Râmnicul Sărat, Puești. *Reg. Constanța*: Fetești, Tândărei, Hagieni; Constanța, Mamaia, Tuzla, Agigea, Techirghiol. *Reg. Galați*: Delta Dunărei la Sf. Gheorghe și Letea, între Isaccea și Mrea Cocos (r. Tulcea); Măcin; Hanu Conachi (r. Măicănești).

Variabilitatea speciei

f. minor (Duby). — *E. Gerardiana* Jacq. *β. minor* Duby Bot. gall. I (1828) 415. — **lc.**: Pl. 57, fig. 1. — Plantă mică, de cca 10 cm înălțime, cu frunze scurte și înguste. Inflorescență scurtă, cu radii mui puține. — *Reg. Cluj*: pe dealurile calcaroase dela Stâna (r. Huedin).

f. măjor Neilr. Fl. NÖ (1859) 847. — Înaltă de 50 — 60 cm, ramificată. — *Reg. Suceava*: Ipotești (r. Suceava).

f. virgatifórmis Prod. f. nova in Add. pag. 673. — Frunze foarte mult asemănătoare atât ca formă, cât și la culoare cu acelea dela *E. virgata*. Fructe foarte mari, aproape de 2 ori mai mari ca la specia obișnuită. — *Reg. Craiova*: în jurul Craiovei.

f. longifolia Prod. f. nova in Add. pag. 673. — Frunze lungi de 4 cm și late de 4 mm. — *Reg. Constanța*: Agigea, Mamaia (r. Constanța).

f. oblongifolia Prod. f. nova in Add. pag. 673. — Plantă înaltă de 14 — 20 cm, ramificată, cu frunze egal de lungi, oblongi, spre bază lățite, la vârf obtuze și mucronate, lungi de 12 — 15 cm și late de 3,5 — 5,5 mm. Foliiolele umbelei la unele exemplare aproape rotunde. Prin umbela scurtă se aseamănă cu *E. platyphyllos*. — *Reg. Stalin*: Șeica Mare (r. Mediaș). *Reg. Oradea*: Beiuș.

f. brevifolia Prod. f. nova in Add. pag. 673. — Frunze mici, până la 16 mm lungime de 1 — 2 mm lățime. — *Reg. Cluj*: Band (r. Luduș). *Reg. Galați*: Măcin.

Răsp. gen.: Europa, Caucaz, Urali, Siberia de V, Songaria.

30. **E. pannónica** Host Fl. austr. II (1831) 566. — *E. nicaeensis* Barth in Arch. Sieb. Landesk. XV (1879) 115, non alior. — *E. glareosa* Auct. plur., non M. B. cf. Prod. Consp. Fl. Dobr. II in Bul. Acad. Stud. Agron. Cluj VI (1936) 283, Sep. 51, Pl. XXVII a-d.

4. Plantă de culoare palid verde. Tulpini până la 40 cm înălțime, ramificate în porțiunea superioară și dens foliate, glabre. Frunze în spirală, lungi de 30—60 mm și late de 15—20 mm, invers ovate, ovat lanceolate sau eliptice, la vârf obtuze și scurt mucronate. Nervurile laterale formează cu

cea principală un unghi foarte ascuțit. Folirole involucrale obovate, mai scurte decât frunzele superioare, cele ale involuclului cordat reniforme sau ovate, acute și de obicei mucronate, galbene. Frunzele și foliolele involuclului cu nervuri laterale pronunțate. Umbele multiradiate, cu radii repetat bifide. Radiile umbelei mai lungi, de 5—11 cm, mai numeroase, iar sub umbela principală cu numeroase dichazii laterale care poartă umbele. Ciatii de 3 mm lungime, cu vârfuri tridentate și glande trapezoidal rotunde, galbene. Capsulă lungă de 3 mm, netedă, glabră sau păroasă. Semințe lungi de 2,5 mm, netede, adeseori glauce, cu carunculă conică. V—VII.

Stațiunea. Prin locuri însorite, pe marginea drumurilor, rară.

Răsp. în țară: *Reg. Baia Mare*: Carei. *Reg. Arad*: în jurul com. Pecica și Semlac (r. Arad).

Răsp. gen.: Basinul vienez, Balcanii de E, U.R.S.S. de S.


31. *E. steppōsa* Zoz ap. Prokh. in Fl. U.R.S.S. XIV (1949) 401 et in Add. XIII, 738. — *E. glareosa* M.B. var. *elatior* M.B. Fl. taur. - cauc. III (1819) 325. — *E. glareosa* Auct. rom., non M.B. — *E. pannonica* Auct. rom. non Host. — Exs.: FRE nr. 1519 a,b, sub *E. glareosa*. — Ic.: Pl. 58, fig. 1, 1a-b.

4. Rizom multicapitat. Tulpini numeroase, înalte de 20—60 cm, groase de 3—7,5 mm. Frunze glabre, oblong lanceolate, spatulate, oblong obovate sau eliptice, lungi de 2,2—9,2 cm, late de 4—21 mm, cu baza rotunjită, obtuze la vârf, cu margini întregi, sub vârf serulate, coriacee, 3—5-nervate. Umbele 7—13-radiate, cu radii până la 4 cm lungime. Ramuri divaricate, multifurcate. Frunze involucrale lanceolat eliptice, oblongi sau subovate, lungi de 1,6—4 (8) cm, late de 9—14 mm. Folirolele involuclului cordat reniforme, cele superioare rotund romboidale, lungi de 15—18 mm, mucronate, cu margini întregi. Frunzele și foliolele involuclului cu nervuri laterale mai puțin pronunțate. Ciatii tubulos campanulat, de cca 1,75 mm lungime, glabru, cu glande semiromboidale. Capsulă ovoidă, lungă de 2,7—3,7 mm, glabră, netedă, slab zgrăbunțoasă. Semințe ovate, lungi de 2—3 mm și late de cca 1,3 mm, suriu verzui, brunii maculate, cu gropițe mici. VI—VII.

Stațiunea. În stepe, coline stepoase, locuri pietroase.

Răsp. în țară: *Reg. Timișoara*: Buziaș (r. Moldova Nouă). *Reg. Craiova*: Maglavit (r. Calafat); Zăvalu (r. Bechet); Caracal. *Reg. București*: București; Comana, Mihai

Plansa 56. — 1. *Euphorbia Cyparissias* L. var. *vernalis* Nyár., 1a. ciatii mărit. — 2,3. Idem, var. *serotina* Schur. — 4. *E. Cyparissias* deformată de ciuperca *Uromyces Pisi*.



Bravu (r. Vidra). *Reg. Ploești*: Mizil la pepinieră, Dl. Istrița; Buzău; Urziceni. *Reg. Constanța*: Fetești, Platonești; Basarabi, Mangalia (r. Constanța); Babadag. *Reg. Galați*: Galați. *Reg. Iași*: Bucium, Dl. Repedeș (r. Iași).

Variabilitatea speciei

var. squarrosa (Prod.). — *E. glareosa* M.B. var. *squarrosa* Prod. Consp. Fl. Dobr. II (1936) 253, Pl. XXIX, fig. a—f, Pl. XXX, fig. a—f. — **Ic.**: Pl. 58, fig. 2. — Diferă de specia tipică prin frunzele mai evident dințate spre vârf, radiile umbelei mai scurte, capsulele mai pronunțat granulate și prin semințele scabre. — *Reg. Constanța* și *Reg. Galați* între Dunăre și Mare.

Răsp. gen.: U.R.S.S. de S.

32. **E. bazargica** Prod. Consp. Fl. Dobr. II (1936) 254, Sep. 52. — *E. bazargica* (*E. glareosa*—*esula*) Prod. Pl. Nov. rar. in Bul. Acad. Stud. Agron. Cluj, I (1930) 39.

4. Rizom ramificat. Tulpini înalte de 20—30 cm, ramificate dela mijloc, de culoare mai palidă. Frunze lanceolate, de 2,5—4,5 cm lungime și late de 8—10 mm, la vârf acute. Frunze și foliole involucrale cu nervurile laterale mai puțin pronunțate. Radiile umbelei mai lungi, bifide. Ciatii cu glande galbene. Capsula și semințele mature necunoscute. V—VII.

Stațiunea. Pe lângă drumuri, în locuri pietroase.

Răsp. în țară: *Reg. Constanța*: Jurilovca la Capul Dolojman (r. Babadag).

Răsp. gen.: Bulgaria.

33. **E. dobrogensis** Prod. Consp. l. c. — **Ic.**: Pl. 58, fig. 3; Prod. Consp. (1936) tab. XXXI, XXXII.

4. Rizom ramificat, lemnos, multicapitat, Tulpină erectă, înaltă de 25—30 cm, de 2—2,3 mm grosime, lemnoasă, verde sau brunu roșietică. Frunze pieleose, glabre, lanceolate sau oblong liniare, lungi de 1,5—3,5 cm și late de 4—5 mm, palid verzui sau din loc în loc roșu maculate, acute sau acuminate, mucronulate, întregi, spre bază puțin atenuate. Umbele de obicei 5-radiate; radiile de 4—6 cm lungime, din nou bifidate. Foliolele involucrului pieleose, sesile, eliptic ovate, obtuze sau puțin acuminate. Ciatii campanulat, glabru, cu lobii ovați. Glande semilunar trunchiate sau bicornute, cu margini puțin crenate. Capsulă ovat conică, spre vârf brusc îngustată, aproape acută, trisulcată, glabră, netedă, lungă de 4 mm. Semințele netede, împreună cu caruncula lungi de 2 mm. VI—VII.

Stațiunea. Prin locuri pietroase și ierboase.

Răsp. în țară: *Reg. Constanța*: Basarabi (r. Constanța); Babadag pe Dl. «Kel-Tepe». Caugagia, Mihai Bravu (r. Babadag).

Variabilitatea speciei

f. *latebracteata* Prod. Consp. Fl. Dobr. II, l.c. (1936) 254, Sep. p. 52. — **Ic.:** Prod. Consp. l.c. tab. XXXII. — Umbele triradiate. Foliiolele involucelelor mai late. — In herbarul Sinenis, din « Dobrogea », fără localitate.

Răsp. gen.: Endemism.

Obs.: *E. dobrogensis* Prod. și *E. glareosa* Pall. din Crimeea sunt plante apropiate. Comparând exemplarele noastre din Dobrogea cu *E. glareosa* Pall. din Crimeea, rezultă că *E. dobrogensis* Prod. este o specie de sine stătătoare și deosebită. Se deosebește de *E. glareosa* din Crimeea prin rizomul și părțile inferioare ale tulpinii lemnoase sau aproape lemnoase, deși sunt subțiri, prin ramurile sterile destul de lungi, cu frunze liniare numeroase și foarte acuminate și prin frunzele tulpinale lanceolate sau liniar lanceolate, pronunțat și lung acuminate, foarte pieiloase, rigide, puțin succulente, glauce. Consistența foliolelor involucrale la fel cu a frunzelor tulpinale. Nervurile secundare ale foliolelor involucrale mai puțin pronunțate, iar marginea hialină a foliolelor puțin mai lată și mai netedă. Radiile umbelelor și ale dichaziilor mai subțiri și mai rigide. Capsulă globulos conică, mai alungită, spre vârf îngustată.

34. **E. Cadrilatéri** Prod. Consp. Fl. Dobr. II, l.c. (1936) 255, Sep. 53, Pl. XXXVII a-g. — **Ic.:** Pl. 53, fig. 1, 1a, 2, 2a-b; Prod. Consp. l.c. tab. XXXVII—XLII.

24. Plantă glabră, sur verzuie, Rizom vertical, lemnos, gros, alungit, emite numeroase tulpini florifere și sterile, dens foliate. Tulpini subțiri, striate lemnoase, verzi sau brunii roșietice, erecte sau ascendente, înalte de 9—11 (12) cm, destul de dens foliate, în partea inferioară cu cicatrice. Frunze tulpinale mici, variate, palid verzi, sau din loc în loc roșu maculate, de (9) 11 (15) mm lungime și (2) 4 (6) mm lățime, cele inferioare obovate, mucronate, cele mijlocii oblong lanceolate, la vârf mucronate, cele superioare ovate, acute. Toate frunzele la vârf foarte slab serulate, cele florale cordat orbiculare. Inflorescență de regulă 5-radiată (mai rar 6—7-radiată). Sub umbela terminală numai rareori se află dichazii laterale. Radiile umbelei terminale de 9—10 (15) mm lungime. Ciatii cuneat oblong. Glandele ovate, triunghiulare sau triunghiular ovate. Capsulă globulos conică, glabră sau puțin ruguloasă, lungă de 3 mm. Seminte ovate, lungi de 2 mm, oliviu-verzi sau suriu-albe, brun foveolat punctate, sau neregulat foveolat sulcate, pe dos carinate. Carunculă albă, puțin depres punctată. VI—VIII.

Stațiunea. Prin locuri aride, pietroase.

Răsp. în țară: Reg. Constanța: pe Dl. «Kel-Tepe» între Babadag și Mihai Bravul.

Variabilitatea speciei

var. *transitoria* Prod. Consp. Fl. Dobr. II, l.c. (1936) 258, Sep. 56, Pl. XXXVIII a-g et XXXIX a-g. — *E. cadrilateri* Prod. var. *transitoria* Prod. (*E. cadrilateri* — *glareosa* <

pannonica) Prod. l.c. — **Ic.:** Pl. 53, fig. 2, 2 a, b; Prod. Consp. l.c. — Diferă de specia tipică prin frunzele mai late și mai obtuze, 5-nervate, prin tulpina cu ramuri florale și sub umbelă, prin radiile mai lungi, glandele puțin mai late, semințele mai îngust ovate și la vârf relativ mai ascuțite și mai des alveolate. *E. Cadrilateri* poate avea și alte tranziții, așa spre *E. glareosa* și spre *E. dobrogensis*. — **Reg. Galați:** Greci (r. Măcin).

Răsp. gen.: Bulgaria.

O b s. Exemplarele de *E. Cadrilateri* se deosebesc \pm între ele, dar au următoarele caractere comune: scabritatea de pe marginea frunzelor, numărul mic al radiilor umbelii (3—5) și lungimea acestora, forma ovată sau ovat triunghiulară a glandelor nectarifere, capsula \pm granulată și indeosebi semințele neregulat scrobiculat punctate. Dealtfel această plantă face parte din același grup cu *E. pannonica* și *E. glareosa*. *E. Cadrilateri* Prod. se aseamănă cu *E. glareosa* M.B. la dințătura \pm evidentă din vârful frunzelor, forma foliolelor involucelelor, forma capsulei și rugozitatea acesteia, dar mai ales prin forma și culoarea brună a semințelor, precum și gropițele punctate, neregulate, ale acestora. *E. glareosa* M.B. diferă de *E. Cadrilateri* Prod., pe lângă statura sa cu mult mai robustă și înaltă, prin mărimea frunzelor, prin radiile umbelii mult mai numeroase, 7—9 (10), și prin glandele aproape semilunare.

Unii indivizi de *E. Cadrilateri*, prin frunzele lor mai alungite și prin forma glandelor, se aseamănă cu *E. dobrogensis* Prod. Acești indivizi diferă de *E. Cadrilateri* prin statura cu mult mai robustă, prin frunzele mai lungi și mai ascuțite, prin radiile cu mult mai lungi și ramificate, prin foliolele involucelelor mai late, capsula spre vârf mai îngustată și prin semințele gălbui și netede. În cazuri dificile semințele ne vor servi ca un indice foarte prețios.

E. Cadrilateri se aseamănă și cu *E. petrophila* C. A. Mey. din U.R.S.S. sudică, de care se deosebește însă prin statura mai înaltă, frunzele superioare lanceolate (nu spatulate), prin numărul mai mare și lungimea mai mare a radiilor, prin glandele ovate, triunghiulare (nu corniculate) și nepăroase și prin capsula globuloasă, conică iar nu ovată, mai puțin granulată.

35. **E. agraria** M.B. Fl. taur-cauc. I (1808) 375; Prokh. in Fl. U.R.S.S. XIV (1949) 430, tab. XXII fig. 2. — *E. transilvanica* Schur in Verh. SVN II (1852) 124. — **Laptele cucului.** — Keleti fűtej. — Orientalische Wolfsmilch. — **Молочай пашенный.** — **Exs.:** FRE nr. 2243. — **Ic.:** Pl. 55, fig. 2, 2a; Prod. Consp. Fl. Dobr. l.c. Pl. XXVI, fig. 1.

4. Plantă glaucă, cu rizom repent și tulpină dreaptă, de 40—60 cm înălțime, simplă, \pm glabră, dens foliată. Frunze glabre, la bază cordate sau subhastate, sesile, scurt ovate sau triunghiulare, late de 2—3 cm, cu margini subcartilaginee, scabre și subtil crenulate, toate sau numai cele inferioare obtuze la vârf. Foliolele involucelelor orbicular reniforme, mai late decât lungi, obtuze sau mucronate. Umbela terminală cu 6—15 radii; radiile din nou bifide. Glandele ciatiului semilunare, cu cornițe liniare, mai lungi sau mai scurte. Capsulă mică, ovată, granulat scabră. Semințe netede. VII—VIII.

Stațiunea. Locuri uscate, tufișuri, fânețe, locuri de cultură, vii,

Răsp. în țară: *Reg. Stalin*: Blaj; Valea Lungă, Șeica Mare, Proștea Mică (r. Medias); Sighișoara; Gușterița (r. Sibiu); Ghijasa de Jos, Alțina (r. Agnita); Cunța (r. Sebeș). *Reg. Craiova*: Segarcea. *Reg. Pitești*: Stolnici (r. Costești); Ionești, Vultureanca (r. Găești). *Reg. București*: Flămânda (r. Tr. Măgurele); Ciocănești (r. Răcari); București (Chitila, Băneasa); Comana (r. Vidra); Giurgiu. *Reg. Constanța*: Fetești, Basarabi, Mamaia, Agigea (r. Constanța); Atmagea (r. Babadag). *Reg. Galați*: Letea în Delta Dunării, Malcoci, Tulcea, Agighiol, Balabancea, Nifon (r. Tulcea); Greci la V. Racului, între Măcin și Greci, Cerna. *Reg. Suceava*: Bosanci (r. Suceava).

Variabilitatea speciei

ssp. *Borzae* Prod. ssp. nova in Add. pag. 673.

Tulpină înaltă și gracilă, cu frunze eliptice sau triunghiulare și nu ovate eliptice, la bază nesagitate sau foarte slab sagitate, lungi de 2—3 cm și late de 0,5 cm, cu ramuri foarte numeroase care descind dela mijlocul tulpinii; ramurile de sub umbela centrală numeroase și foarte lungi, prin aceasta aducând cu *E. pannonica*.

Reg. Galați: Tulcea.

var. *pubérula* Prod. — *E. agraria* M.B. ssp. *puberula* Prod. Pl. nov. rar. in Bul. Acad. Stud. Agron. Cluj I (1930) 43, Pl. II, fig. 2. — Tulpină des puberulă în partea inferioară. Frunze la bază cordate, ovate, alipit puberule. Umbelă terminală mică, cu radii scurte. Capsulă globuloasă, granulat scabru și puțin puberulă. Seminte din loc în loc cu peri lungi. — *Reg. Constanța*: Mihai Bravul (r. Babadag).

var. *arenăria* Prod. l.c. (1930) 45, Pl. III, fig. 1, 2. — Tulpină puțin lemnoasă, în partea inferioară cu numeroase ramuri sterile. Frunze tulpinale oblongi sau oblong lanceolate, lungi de 6—8,5 cm și late de 14—20 mm. Frunzele ramurilor sterile cu mult mai înguste, ate de 2,5—6 mm. Sub umbela terminală se află numeroase dichazii laterale. — *Reg. Constanța*: în nisipuri la Agigea (r. Constanța). *Reg. Galați*: între Isaccea și Mrea Cocos (r. Tulcea)

var. *subhastata* (Vis. et Panč.) Gris. in Aschers. et Kanitz Catal. (1877) 92. — *E. subhastata* Vis. et Panč. Pl. Serb. rar. Dec. I (1862) 444/18, tab. 7; Prod. l.c. (1930) 47, Pl. IV, fig. 3 a, b. — Frunze la bază subhastate, lingulate sau aproape panduriforme, rotunjit obtuze. — *Reg. București*: Băneasa (r. Giurgiu); Comana (r. Vidra). *Reg. Galați*: Tulcea, Măcin.

var. *latifolia* Prod. l.c. (1930) 47, Pl. IV, fig. 2. — Frunze ovate eliptice, de 5,5 cm lungime și 3,5 cm lățime, pe margini lat subcartilaginoase. Umbele mari. — *Reg. Stalin*: Blaj. *Reg. București*: pe marginea pădurii Cioflec-Copaciu între Naipu și Copaciu (r. Mihăilești).

var. *euboëa* (Hal.). — *E. euboea* Hal. Consp. Fl. graec. III (1904) 107. — *E. agraria* var. *angustifolia* Uechtr. et Sint. in Kanitz Pl. Rom. (1879—81) 111. — Frunze oblongi sau oblong lanceolate, cu mult mai înguste. Radiile umbelei din nou ramificate. — *Reg. București*: Comana (r. Vidra). *Reg. Constanța*: Cernavoda. *Reg. Galați*: Dl. Pricopanului între Măcin și Greci.

Planșa 57. — 1. *Euphorbia Seguieriana* Neck. f. *minor* (Duby). — 2. idem, tipul. 2 a. ciatiu mărit, 2 b. fruct mărit, 2 c. sămânță mărită. — 3. idem, plantă înaltă de nisipuri.



L.

var. *Cavarnae* Prod. — *E. agraria* M.B. f. *cavarnae* Prod. l.c. (1930) 47, Pl. III, fig. 3. — Frunze eliptice sau subrotunde, scurte, de 27 mm lungime și 24 mm lățime. Radiile umbelei din nou bifide. — Reg. Constanța: Babadag. Reg. Galați: Tulcea.

Răsp. gen.: Europa de E, Asia Mică.

36. *E. basarabica* Prod. Pl. nov. rar. in Bul. Acad. Stud. Agron. Cluj, I (1930) 40, Pl. I, fig. 1a-e.

4. Plantă glabră, înaltă de 40 cm. Frunze înguste, de 1,5—2,5 cm lățime, cordat oblong lanceolate sau liniar lanceolate, lungi de 7,5—8,5 cm, cu margini subcartilaginoase, întregi, obtuze sau acute, mucronate, glabre, pe față verzi, pe dos palid verzi. Nervurile laterale ale frunzelor mai depărtate între ele. Umbela terminală 6-radiată, dedesubt cu numeroase umbele axilare. Radiile umbelei bifide. Capsulă mică, ovată, granulat verucoasă. Semințe netede. VI—VII.

Stațiunea. Locuri aride, ierboase.

Răsp. în țară: Reg. Bacău: Urzici (r. Buhuși).

Răsp. gen.: U.R.S.S. de V.

37. *E. Paralias* L. Sp. pl. ed. I (1753) 458; Prokh. in Fl. U.R.S.S. XIV (1949) 391. — Exs.: FRE nr. 440. — Ic.: Pl. 59, fig. 2, 2a; Prod. Consp. Fl. Dobr. II (1936) Pl. XLV.

4. Rizom puternic, emite mai multe tulpini. Plantă tufoasă, robustă, de 60 cm înălțime, dens foliată. Frunze foarte îndesuite, glabre, glauce, puțin cărnoase, cele inferioare mici, oblongi, obtuze, în rest \pm acute, liniar oblongi. Involvecul cu foliole cordat reniforme, libere, mucronate. Umbele 6—9-radiate; radiile din nou ramificate. Capsulă glabră, cu mult mai lată decât lungă și granulat rugoasă. V—VII.

Stațiunea. Prin locuri nisipoase.

Răsp. în țară: În nisipurile din Delta Dunării la Sulina, Sf. Gheorghe.

Răsp. gen.: Litora l. maritim din Europa de V și S.

38. *E. amygdaloides* L. Sp. pl. ed. I (1753) 463; Prokh. in Fl. U.R.S.S. XIV (1949) 453. — Alior. — Erdei fűtej. — Wald-Wolfsmilch. — Молочай ниндалевидный. — Exs.: FRE nr. 441. — Ic.: Pl. 59, fig. 1, 1a.

4. Plantă până la 70 cm înălțime, cu rizomi lemnoși, ramificați. Tulpini sterile, lignificate, numeroase, formând tufe. Rozeta terminală a acestora persistă peste iarnă. Tulpinile fertile pornesc din cele ale anului precedent, fiind lax foliate, brun păroase sau glabre. Frunzele tulpinilor sterile mari, de 4—7 cm lungime și 2—2,5 cm lățime, obovate, acute sau obtuze, îngustate

în pețiol, de consistență aproape pielasă, adeseori roșcate, cele ale tulpinilor fertile mult mai mici, de cca 4 mm lățime, obovate, obtuze, moi, pe dos de obicei pubescente, gălbui. Foliiolele involucale obovate, obtuze, slab emarginate sau puțin acute, cele ale involuclului semiorbiculare, gălbui, concrescute câte 2. Umbele terminale 5—9-radiate, cu radii repetat bifide. Ciatii de 3—4 mm lungime, cu glande bicornute, gălbui sau purpurii. Capsulă lungă de 4 mm, adânc trisulcată, glabră, aspră. Semințe netede, de 2,5 mm lungime, cenușii, cu carunculă lobată. IV—VI.

Stațiunea. Prin păduri și tufișuri.

Răsp. în țară: Comună în întreaga țară, din regiunea de câmpie până în etajul subalpin.

Variabilitatea speciei

f. foliōsa Simk. in MTK XV (1878) 595. — Tulpini cu frunze mari, oblong cuneat ovate, până sub inflorescență. Inflorescența verde, în deosebi foliolele involuclurilor. — *Reg. Timișoara:* Svinița pe Dl. Trescovăț (r. Mehadia).

Răsp. gen.: Europa centrală și de S, Asia de V.

39. E. Myrsinites L. Sp. pl. ed. I (1753) 461; Prokh. in Fl. U.R.S.S. XIV (1949) 408, tab. XXI, fig. 5. — *E. curtifolia* Chaub. et Bory Exped. Mor. (1832) 135. — **Ic.:** Pl. 52, fig. 1, 1a-b; Prod. Cons. Fl. Dobr. II (1936) Pl. XLVI.

4. Plantă tufoasă, sură, cu numeroase tulpini procumbente sau ascendente, groase, glauce. Frunze foarte îndesuite, glauce, glabre, cărnoase, obovat oblongi sau obovate, obtuze sau scurt acuminate, mucronate, pe margini scabriuscule. Foliiolele involuclurilor reniforme, mucronulate. Radiile umbelei 7—12, bifide. Glarde galbene, bicornute, cu coarnele dilatate. Capsula tânără glabră, netedă, uscată, ruguloasă. Semințe subtetragone, foveolat rugoase. VI—VII.

Stațiunea. În stepe aride, cu pietriș calcaros mărunț și pe stânci.

Răsp. în țară: *Reg. Timișoara:* V. Dunărei la Cazane, între Plavișevita și Dubova, între Drencova și Svinița. *Reg. Constanța:* Independența, pe stâncile dela Bașpunar (r. Băneasa); Enisala, Caramanchioi (r. Babadag). *Reg. Galați:* Niculițel, Agighiol (r. Tulcea).

Răsp. gen.: Europa de S și SE.

40. E. segetalis L. Sp. pl. ed. I (1753) 458. — **Ic.:** Pl. 60, fig. 3 a,b,c.

○, **4.** Rădăcină fusiformă, ramificată. Tulpini erecte sau ascendente, până la 30 cm înălțime, ramificate la bază, dens foliate, în porțiunea infe-

Planșa 58. — 1. *Euphorbia stepposa* Zoz, 1a ciatiu mărit, 1 b. fruct glabru și păros. — 2. *E. stepposa* Zoz var. *squarrosa* Prod. — 3. *E. dobrogensis* Prod., 3 a. ciatiu mărit.



rioară nefoliată. Frunze de 30 mm lungime, glabre, mucronate, albastrii, cele inferioare liniare sau liniar lanceolate, îndreptate în jos, cele superioare mai late și perpendiculare pe tulpină. Foliiolele involucrale de sub umbelă lanceolate, mucronate, cele ale involucelului reniforme, mucronate. Umbele terminale 5-radiate; radiile repetat bifide, adeseori însoțite de ramificații axilare fertile. Ciatii de 1,5 mm lungime cu glande bicornute, de culoare portocalie. Capsulă lungă de 3,5 mm, ovat cenușie. Carunculă scurtă, conică. VI—VII.

Stațiunea. Prin locuri cultivate, semănături, în jurul gărilor.

Răsp. în țară: Oradea; Arad. Citată de Heuffel din « Banat », fără localitate.

Răsp. gen.: Europa de Sud, Africa de N, până în Insulele Canare.

* *E. variegata* Sims in Curt. Bot. Mag. (1815) tab. 1747. — *E. marginata* Pursh Fl. Am. Sept. (1816) 607. — Ic.: Pl. 45, fig. 1, 1a.

Tulpină înaltă de 40—80 cm, brumată, păroasă mai ales în partea superioară, cu frunze mari, groase. Umbele foarte mari. Flori albe, înconjurate de numeroase foliole mari, albe, la mijloc cu câte o dungă verde longitudinală. — Specie adesea cultivată prin grădini.

Hibridi

× *E. angustifrons* Borb. Magy. homokpuszt. növ. (1886) 30, 96, 101 et in ÖBZ XXXVI (1886) 400 = *glareosa* × *Seguieriana*. — *E. Seguieriana* f. *glareosiformis* Todor in Anal. Fac. Agr. Cluj XI (1947) 187.

Acest hibrid prezintă caractere intermediare între părinți în ce privește lungimea și grosimea tulpinilor, dimensiunile și forma frunzelor. Dela *E. glareosa* are rădăcina groasă, rizomul scurt, umbela cu 7—8 radii. Cu *E. Seguieriana* seamănă prin frunzele lanceolate, late de 5—6 mm și lungi de 4—5 cm, ascuțite sau ușor acuminate. Hibridul înfloarește mai târziu decât părinții.

Reg. Baia Mare: în nisipurile din apropierea orașului Carei. *Reg. Craiova*: Craiova. *Reg. Galați*: Cerna (r. Măcin); Hanu [Conachi (r. Măicănești). *Reg. Bârlad*: [Cosmești] (r. Tecuci).

× *E. Procopianii* Săvul. et Rayss Contrib. Fl. Bas. in Bul. Inf. Grăd. Bot. Cluj V (1925) 77 et Mater. Fl. Bas. II in Suppl. Bul. Agric. III (1926) 118 = *agraria* × *salicifolia*.

Prezintă caractere intermediare între părinți la nervațiunea frunzelor și forma inflorescenței. Dela *E. agraria* are forma frunzelor iar dela *E. salicifolia* pubescența frunzelor și a tulpinii.

Reg. Constanța: Babadag.

× ***E. paradóxa*** (Schur) Podp. in Domin et Podp. Klič. Úpl. Květ. Rep. Čes. (1928) 778. = *Esula* × *salicifolia*. — *E. Esula* L. e. *paradoxa* Schur Herb. Transs. et Enum. pl. Transs. (1866) 596. — *E. Esula* var. *pubescens* Gris. et Schenk Iter hung. in Wieg. Arch. (1852) 297, non *E. pubescens* Vahl. — Exs.: FEAH nr. 505; FRE nr. 438. — Ic.: Pl. 55, fig. 1.

Hibrid foarte ușor de recunoscut întrucât se prezintă în majoritatea cazurilor cu frunze de *E. Esula*, adică liniar oblongi sau lanceolat oblongi, late de 4—12 mm, rărite, de mărime mijlocie între *E. Esula* și *E. salicifolia*, iar păroșitatea și ramificația bogată a inflorescenței sunt asemănătoare celor dela *E. salicifolia*; într'un cuvânt este o *E. Esula* păroasă.

Reg. Cluj: Buza (r. Beclean); Canciu (r. Dej); Gherla, Borșa; între Călata și Baci (r. Huedin); Cluj pe malul Someșului și la Hajongard, Gârbău, Apahida, Cojocna; Aiud. *Reg. Aut. M.*: Tg. Mureș, Cocoși, Corunca; între Corund și Firtușu (r. Odorhei). *Reg. Stalin*: Blaj; Sebeș, Mercurea (r. Sebeș). *Reg. Hunedoara*: în lungul Mureșului dela Alba Iulia până la Zam (r. Deva). *Reg. Oradea*: Vadul Crișului (r. Aleșd); Călugări în Mții Codrului (r. Beiuș). *Reg. Arad*: Arad. *Reg. Timișoara*: Lugoj.

Obs. *E. paradoxa* fiind mult asemănătoare cu *E. Esula*, uneori este considerată ca plantă dubioasă, deoarece este luată când drept un hibrid între *E. Esula* și *E. salicifolia* când ca var. *pubescens* Gris., o varietate păroasă a speciei *E. Esula*. Luând însă în considerare că *E. paradoxa* se găsește numai în cercul de răspândire al speciei *E. salicifolia*, trebuie să o considerăm ca o specie bună hibridă și nu ca o varietate. Dacă ar fi altfel, atunci *E. paradoxa* ar fi cunoscută și din alte părți ale Europei, unde *E. Esula* este comună.

× ***E. pseudoesula*** Schur Enum. pl. Transs. (1866) 595 = *Cyparissias* × *Esula*.

Portul, frunzele îndesuite, îndeosebi cele superioare aglomerate și înguste și foliolele involucelelor mai mici le are dela *E. Cyparissias*. Frunzele lanceolat oblongi, obtuze la vârf, uneori de 1 cm lățime și ramurile lungi ale inflorescenței sunt asemănătoare cu cele dela *E. Esula*.

Reg. Stalin: Sibiu și împrejurimi. *Reg. Ploști*: Mții Bucegi: V. Cerbului (1800—2500 m), V. Mălăești (1700—1900 m).

× ***E. pseudolúcida*** Schur in Verh. SVN III (1852) 124 et Enum. pl. Transs. (1866) 598 = *lúcida* × *virgata*.

Dela *E. lúcida* are grosimea tulpinii, frunzele cu mult mai late și lucitoare, mărimea involucelelor și a capsulelor. Dela *E. virgata* are portul, forma frunzelor, involucelelor și a capsulei.

Reg. Cluj: Chiochiș (r. Beclean). *Reg. Stalin*: Tâlmăciu (r. Sibiu). *Reg. Timișoara*: V. Dunărei la Cazane, între comunele Plavișevia și Ogradena. *Reg. Galați*: Dl. Pricopcea aproape de Greci spre Cerna (r. Măcin).

Plansa 59. — 1. *Euphorbia amygdaloides* L., 1 a. ciatiu mărit. — 2. *E. Paralias* L., 2 a. fruct mărit.



× **E. angustata** (Roch.) Borza Consp. Fl. Rom. II (1949) 179 = *salicifolia* × *virgata*. — *E. salicifolia* Host b. *angustata* Roch. Pl. Ban. rar. (1828) 43, nr. XVII, tab. 7, fig. 16.

Hibridul este ușor de recunoscut, având port de *E. virgata* și frunzele puțin mai alungite. Părozitatea fină a frunzelor și uneori și a tulpinii, arată însă influența plantei *E. salicifolia*. Unele exemplare de *E. angustata* se deosebesc de *E. salicifolia* numai prin] frunzele mai înguste și foliolele involucale lanceolate.

Reg. Cluj: Chiochiș sub vii (r. Beclean); Cluj la Fânațe. *Reg. Aut. M.*: Tg. Mureș. *Reg. Oradea*: Oradea; Vadul Crișului (r. Aleșd). *Reg. Arad*: Arad. *Reg. Timișoara*: Lugoj.

× **E. pseudovirgata** (Schur) Soó in Veröff. Geob. Inst. Rübel VI (1930) 252 = *Esula* × *virgata*. — *E. virgata* W. et K. b. *Pseudo-virgata* Schur En. pl. Transs. (1866) 598. — *E. intercedens* Podp. in Dom. et Podp. Klíč Úpl. Květ. Rep. Česk. (1928) 778.

Frunze oblong lanceolate sau liniar lanceolate, nelucitoare, ± glauce, acute. Foliolele involucelelor ± mucronate. Umbelă multiradiată. La înfățișare aduce cu *E. virgata*, având frunze înguste și inflorescența îndreptată spre vârful tulpinii. Dela *E. Esula* are frunzele și foliolele involucelelor mai moi, de culoare gălbuie.

Reg. Cluj: Juc pe dealurile din dosul gării (r. Cluj). *Reg. Stalin*: Orașul Stalin; Sibiu. *Reg. Timișoara*: Defileul Dunărei la Cazane.

× **E. Wagneri** Soó in BK XXII (1925) 67 = *Esula* × *lucida*. — *E. pseudo-lucida* Schur b. *brevifolia* Schur. l.c. 599, non alior.

Dela *E. Esula* are tulpina mai subțire, statura mai gracilă, frunze mai înguste, mai scurte, late numai de 4,5—7 mm și lungi de 6,5—9 cm. Dela *E. lucida* are frunzele mai groase, pe față lucitoare și de culoare verde mai închisă, pe dos de culoare mai deschisă. Frunzele în general mai mici, obtuze sau scurt acute și nu alungit acute sau acuminate.

Reg. Stalin: Tâlmăciu (r. Sibiu). *Reg. Timișoara*: între Orșova și Ogradena (r. Mehadia).

× **E. Wimmeriana** Wagn. in BK (1922) 85 = *Cyparissias* × *lucida*.

Dela *E. lucida* are radiile puține ale umbelelor, culoarea mai închisă și luciul frunzelor, precum și dimensiunile acestora (4 cm lungime și 4—5 mm lățime). Dela *E. Cyparissias* are frunzele mai înguste, mai scurte, acute și îndesuite pe tulpini. Acest hibrid seamănă cu *E. Cyparissias*, însă frunzele sunt mai late, pe față lucitoare iar radiile umbelei mai puține și mai scurte. Deasemeni, inflorescența și foliolele involucale mici, arată influența lui *E. Cyparissias*.

Reg. Timișoara: Baziaș (r. Moldova Nouă).

× **E. peisónis** K. Rech. in Fedde Rep. fasc. XXII (1926) 186/810 = *Cyparissias* × *salicifolia*.

Se aseamăna cu *E. Cyparissias* prin frunzele mai înguste și indesuite, cât și prin inflorescența mai adunată. Se deosebește însă prin foliolele involu- celor mai mari, ramurile ceva mai lungi și mai ales prin părozitate, caractere luate dela *E. salicifolia*. Părozitatea este variabilă; la unele exemplare frun- zele, cel puțin în partea inferioară sunt dens și scurt păroase, la altele numai tulpinile sunt păroase.

Reg. Cluj: Cluj pe malul Someșului și la Hajongard. — *Reg. Oradea*: Vadul Crișului (r. Aleșd).

× **E. Schurii** Simk. in Term. füz. IX (1886) 183 et Enum. Fl. Transs. (1886) 482 = *Esula* var. *riparia* × *salicifolia*.

Asemănătoare cu *E. salicifolia* de care se deosebește prin frunzele mai slab pubescente, ramurile laterale glabre și frunzele mai mult ovate sau ovat lanceolate, la vârf rotunjite, obtuze.

Reg. Stalin: Sibiu, Turnișor. *Reg. Craiova*: Păd. Bucovăț (r. Craiova).

O b s. J á v o r k a, care a văzut exemplarele originale ale lui Simonkai în Herb. Muz. Naț. din Budapesta, afirmă (BK XV (1916) 15) că exemplarele de *E. Schurii* Simk. nu sunt altceva decât *E. salicifolia* L. în faza de vară, exemplare la care de obicei ramurile sterile de sub inflorescență se alungesc și adeseori devin glabre.

× **E. júcula** Prod. sp. hybr. nova. in Add. pag. 673 = *Esula* × *virgata*.

Frunze liniar lanceolate, de 4 cm lungime și 3 — 3,5 mm lățime, acute, nelucitoare. Frunzele involucrale ± mucronate. Prin statură, culoarea verde negricioasă, frunzele înguste și inflorescența îngrămădită la vârful tulpinii, se aseamăna cu *E. virgata*. Prin frunzele și bracteele mai moi și gălbui și prin inflorescența mai mică, se aseamăna cu *E. Esula*.

Cluj pe colinele de lângă gară.

× **E. Gușuleacii** Prod. et Soran sp. hybr. nova in Add. pag. 674 = *salicifolia* × *virgata* f. *serotina*.

Tulpina erectă, păroasă, ramificată, cu ramuri suriu păroase, cele superioare de sub umbelă fertile, celelalte sterile. Frunze sesile, liniar lanceolate, întregi, păroase pe ambele fețe, cu margini revolute și nervuri proeminente, gălbui. Partea superioară a plantei verde negricioasă. Foliolele involu- celor reniforme, subcordate, glabre. Umbele multiradiate. Ramuri dich- ziale de 2 sau 3 ori bifurcate. Glandele ciatinului bicornute, brunii galbene. Capsulă scabru punctată, glabră; semințe obovate, nelucitoare, suriu roșcate.

Planșa 60. — 1. *Ricinus communis* L., ramură floriferă, — 1 a. o frunză, 1 b. o sămânță. — 2. *Buxus sempervirens* L., 2 a. fruct mărit. — 3. *Euphorbia segetalis* L., 3 a. ciatu mărit, 3 b. fruct mărit, 3 c. sămânță mărită.



Reg. Oradea: Vadul Crișului (r. Aleșd) pe locurile ruderaale dela gară, împreună cu *Chaenorhinum minus*, *Lepidium virginicum*, *Vicia lutea*, etc.

Obs. Planta diferă de *E. angustata* Roch. (*virgata* × *salicifolia*) prin tulpina foarte ramificată, ramurile și frunzele dens suriu păroase, nervurile frunzelor verzi gălbui, culoarea verde negricioasă a părții superioare, prin ciatiul întotdeauna glabru și prin glandele galbene-brunii.

× **E. măcinensis** Prod. sp. hybr. nova in Add. pag. 674 = (*agraria* × *glareosa*) × *pannonica*.

Tulpină de 40 cm înălțime, rigidă, puternică, glabră. Frunze mici, de 3 cm lungime și 1 cm lățime, sesile, triunghiular ovate, cele florale ovate romboidale, cuspidat mucronate. Umbelă terminală până la 10-radiată: radiile de 7 cm lungime, bifide. Sub umbela terminală se află mai multe dichazii laterale, lungi de 8—10 cm.

Reg. Galați: Măcin, pe coline.

Obs. Planta aduce la înfățișare cu *E. pannonica*, având tulpini solide, groase și radiile umbelii terminale mai lungi. Prin frunzele cordate și nervațiunea acestora se aseamănă cu *E. agraria*, iar frunzele groase amintesc pe *E. glareosa*.

× **E. pseudovillōsa** Prod. sp. hybr. nova in Add. pag. 674 = *villosa* × *virgata*.

Plantă asemănătoare cu *E. virgata* însă mai slab ramificată, cu ramuri sterile reduse și frunze mai late. Dela *E. virgata* are statura, tulpina mai rigidă și culoarea frunzelor, iar dela *E. villosa*, frunzele pieiloase, mai late (12 mm), glabre pe față, alungit lanceolate, cu marginea aproape cartilaginoasă, obtuze sau emarginate.

Reg. Cluj: Chiochiș (r. Beclean).

× **E. Csatói** (Simk.) Borza Consp. Fl. Rom. II (1949) 179 = *agraria* × *paradoxa*. — *E. agraria* M.B. var. *Csatói* Simk. Enum. Fl. Transs. (1886) 481. — × *E. Csatói* Simk. (*E. agraria* × *salicifolia*) Borza l.c.

Dela *E. agraria* are portul mai gracil, inflorescența mai redusă, nervatura mai slabă și baza slab cordată a frunzelor, Prin frunzele mici, înguste, gălbui și pubescente, se aseamănă cu *E. paradoxa* sau cu *E. salicifolia*.

Reg. Cluj: Aiud. *Reg. Stalin*: Valea Lungă (r. Medias).

Genul 103. MERCURIÁLIS *) L.

Gen. pl. [ed. I (1737) 307, nr. 756], ed. V (1754) 457, nr. 998. — *Trepădătoare*, *Brei*.

Plante ierboase. mai rar subfrutescente, fără suc lăptos, cu frunze întregi, opuse, pețiolate. Stipele mărunte, glabre sau lanat păroase. Flori dioice.

*) După Plinius, era iarba lui Mercur, care a descoperit proprietățile tămăduitoare ale acestei plante și s'a folosit de ea.

Periant cu 3 diviziuni conerescute la bază. Flori bărbătești dispuse în inflorescențe spiciforme, cele femele axilare, în raceme pauciflore. Flori masculine cu 9—12 sau chiar mai multe stamine, cele femele cu ovar 2-, rar 3-locular; lojele uniovulate. Flori femele cu 2—3 staminodii alternate cu carpelele și îngroșate la bază. Stile 2—3. Fruct capsular format din 2—3 loje monosperme, care se desprind la maturitate de pe coloana mediană. Sămânță globuloasă sau ovată, netedă sau cu asperități, cu aril micropilar bilobat sau înfășurând sămânța ca într'un voal subțire.

Determinarea speciilor

- 1 a Plantă anuală, ramificată, care înflorește vara și toamna. Frunze lung pețiolate, ovate sau ovat-lanceolate 1. **M. annua**
- 1 b Plante perene, cu rizom lung, repent și tulpini simple. Infloresc primăvara de timpuriu 2
- 2 a Frunze pețiolate (pețiol lung de 0,5—2 cm), lanceolate sau ovate, crenat serate, de 2—3 ori mai lungi decât late, glabre sau păroase. Tulpină foliată numai spre vârf. Pe tulpini sub frunze se găsesc bractei în formă de solzi 2. **M. perennis**
- 2 b Frunze sesile sau foarte scurt pețiolate, lat ovate sau ovate, la bază adeseori rotunjite, aproape de aceeași lungime și lățime, mai îndesuit dințate, glabre. Bractei mici, dar nu în formă de solzi . . 3. **M. ovata**

1. **M. annua** L. Sp. pl. ed. I (1753) 1035; Pojarkova in Fl. U.R.S.S. XIV (1949) 298. — Trepădătoare. — Egynyári szelfű. — Einjähriges Bingelkraut. — Пролесник однолетний — Exs.: FRE nr. 1512. — Ic.: Pl. 61, fig. 5, 5a-b.

○. Rădăcina pivotantă. Tulpini înalte până la 40 (70) cm, ramificate și cu noduri îngroșate. Frunze lungi de 5—15 mm, lung pețiolate, ovat lanceolate sau ovate, crenat serate, la început ciliate. Stipele liniar lanceolate. Flori ♂ dispuse în glomerule mai îndesate sau mai distanțate și stând pe pedunculi filiformi mai lungi decât bracteea, cele ♀ solitare sau câte 2—3, dispuse axilar la baza frunzelor. Periant cu 3 diviziuni, la florile ♂ lat ovate, acute, lungi de 1,5—2 mm, la cele ♀ ovate, acute, îngustate spre bază. Stamine 8—12. Capsulă lungă de 2,5—3 mm, alb păroasă și aspră la suprafață. Sămânțe globulos ovate, moi, brune. V—X.

Stațiunea. Prin locuri cultivate și ruderaie, pe lângă garduri și ziduri umbrite, în jurul așezămintelor omenești.

Răsp. în țară: Reg. Cluj: Cluj, Reg. Stalin: Sighișoara; Sibiu. Reg. Oradea: Oradea în fața gării. Reg. Timișoara: indicat de Heuff. din « Banat » fără localitate; Defileul

Planșa 61. — 1. *Mercurialis perennis* L., exemplar florifer. — 2. idem, exemplar fructifer. — 3. *M. ovata* Stern. et Hoppe, exemplar florifer. — 4. idem, exemplar fructifer. — 5. *M. annua* L., 5 a. floare masculă, 5 b. floare femelă.



Dunării. *Reg. Constanța*: Constanța; Hârșova. *Reg. Iași*: Chiperești (r. Iași). *Reg. Bacău*: Mrea Neamțu (r. Tg. Neamț).

Răsp. gen.: Europa, Africa de N, Asia de SV, Indii, America de N.

Intrebuințări. Plantă otrăvitoare.

2. *M. perennis* L. Sp. pl. ed. I (1753) 1035; Pojark. in Fl. U.R.S.S. XIV (1949) 296. — Brei. — Evelő szélfű. — Ausdauerndes Bingelkraut. — Пролесник многолетний. — Exs.: FRE nr. 2242. — Ic.: Pl. 61, fig. 1, 2.

4. Rizom târător, ramificat, din loc în loc cu noduri. Tulpini erecte, până la 40 cm înălțime, simple, cu două muchii pronunțate, foliate numai spre vârf. Frunze petiolate, cu petioli de 0,5—2 cm, lanceolate sau ovate, spre bază de regulă îngustate, de 2—3 ori mai lungi decât late, glabre sau păroase, rareori împreună cu tulpina îndesuit păroase și mai înguste. Plantele ♂ și ♀ ușor de deosebit, ultimele fiind de obicei mai înalte. Inflorescențe ♂ mici, întrerupte, ocupând numai porțiunea superioară a axei florale. Perigon verde, de 2 mm lungime. Flori ♀ solitare sau câte 2 la subțioara frunzelor, lung pedunculate. Capsulă cu 2 noduri, setacee, lungă de 4—5 mm. Semințe aproape rotunde, runcinate, alb murdare, de 3 mm lungime. IV—VI.

Stațiunea. Formează de obicei asociații prin păduri, în locuri umbroase, bogate în humus, uneori și pe grohotișuri calcaroase.

Răsp. în țară: Frecventă în întreaga țară, dela câmpie până în etajul subalpin.

Variabilitatea speciei

1 a Plantă aproape glabră

f. *genūina* Müll. Arg. in DC. Prodr. XV, 2 (1866) 796, pro p. — *M. perennis* a. *subalpina* Schur Enum. Pl. Transs. (1866) 600.

1 b Plantă păroasă 2

2 a Plantă dens păroasă, cu frunze înguste, de 4—5 ori mai lungi decât late
f. *saxicola* Beck in Ann. Hofmus. Wien II (1887) 89.

2 b Plantă alipit păroasă 3

3 a Frunze ovate sau alungit ovate

f. *ovatifolia* Hausskn. in Vollm. Fl. Bay. (1914) 503.

3 b Frunze lanceolat eliptice, acuminate

f. *silvatica* (Hoppe) Rouy et Fouc. Fl. Fr. XII (1910) 134. — *M. sylvatica* Hoppe in Fl. I (1818) 472.

Răsp. gen.: Europa, Asia de V și Africa de N.

3. *M. ovata* Sternb. et Hoppe in Denkschr. Bot. Ges. Regensb. I (1815) 170, tab. 4; Pojark. in Fl. U.R.S.S. XIX (1949) 297, tab. XVII, fig. 5. — Exs.: FRE nr. 1511. — Ic.: Pl. 61, fig. 3, 4.

4. Rizom repent, rotund, ramificat și prevăzut cu noduri. Tulpină înaltă de 20—40 cm, la bază colorată în violet, simplă, glabră sau păroasă. Frunze

verzi închise, sesile sau foarte scurt (—2 mm) pețiolate, rotund ovate, la fel de lungi cât de late sau până la de 2 ori mai lungi decât late, spre bază rotunjite, spre vârf ascuțite, indesuit dințate, glabre sau scurt păroase. Stipele membranoase, triunghiular lanceolate, de 2 mm lungime. Flori ♂ glomerate, dispuse în inflorescențe spiciforme lung pedunculate, cele ♀ mai scurt pedunculate decât la *M. perennis*. Capsulă galben indesuit setoasă, lungă de 4 mm. Semințe globuloase, punctate, ± albăstrui, de 2,5 mm lungime. IV—V.

Stațiunea. Prin tufișuri, margini de păduri, fânețe, poieni, pe soluri pietroase, bogate în humus.

Răsp. în țară: *Reg. Cluj:* Cluj (la Fânețe), Cojocna, Boj (r. Cluj); Valea Florilor, Cheia, Cheia Turzii, Colții Trascăului (r. Turda). *Reg. Stalin:* Tiur, Bachnea (r. Târnăveni); Orașul Stalin; Slimnic (r. Sibiu); Sebeș pe Dl. Roșu. *Reg. Hunedoara:* Bărbant pe Dl. Bilac (r. Alba Iulia). *Reg. Craiova:* Caracal la Păd. Preajba. *Reg. București:* Comana pe V. Gurbanului (r. Vidra). *Reg. Galați:* Galați. *Reg. Bârlad:* Păd. Drăgăneasa (r. Tecuci). *Reg. Bacău:* Bicaz; Mrea Neamț. *Reg. Iași:* Mârzești, Șorogari, Focuri în Păd. Cioara (r. Iași).

Variabilitatea speciei

var. **gentiana** Pax et K. Hoffm. in Engl. Pflzreich. IV, 147. VII, Heft. 63 (1914) 279. — Cu frunze lat ovate, aproape sesile. — *Reg. Cluj:* Cheia Turzii.

var. **longistipes** Borb. ap. Jáv. Magy. Fl. (1925) 679. — Frunzele împreună cu tulpinile dens păroase. — *Reg. Cluj:* Cheia Turzii.

Obs. Probabil este identică cu *M. Paxii* Graebn. in A. et G. Syn. VII (1916) 408 = *ovata* × *perennis* Pax et A. Käthe Hoffm. in Engl. Pflzreich. VII (1914) 281.

Intrebuințări. *M. annua* și sămânța sa conțin metilamină, trimetilamină și un ulei eteric. Era cunoscută de Greci ca plantă purgativă. În unele locuri încă și azi este întrebuințată în medicina populară. Fiartă, pierde din efectele sale drastice și se poate întrebuința, constituind în acest caz un purgativ cu efecte reduse. *M. perennis* conține aceleași materii chimice ca și *M. annua*, dar are efecte cu mult mai puternice, în așa măsură, încât consumarea plantei de către animale, le poate cauza pieirea. La oameni produce vărsături, diaree, somn și turmentare. În trecut era întrebuințată ca medicament.

Genul **RÍCINUS** *) L.

Gen. pl. [ed. I (1737) 295, nr. 734], ed. V (1754) 437, nr. 962, Pax in Engl. et Prantl Nat. Pflzfam. III 5 (1890) 70. — Căpușe, Ricin.

Flori monoice, dispuse în racem ramificat. Flori ♂ la vârful inflorescenței. Caliciu 2—3-partit. Filamentul staminelor multiramificat. Flori ♀ cu caliciu 4—5-partit, deciduu (căzător). Ovar 3-ocular, cu loculi uniovulați.

✕ **R. communis** L. Sp. pl. ed. I (1753) 1007; Schischk. in Fl. U.R.S.S. XIV (1949) 300. — Căpușe, Ricin. — Csudafa. — Wunderbaum. — Клещевина обыкновенная. — Ic.: Pl. 60, fig. 1, 1a-b.

*) După numele latin, ricinus, al căpușei, pentru asemănarea semințelor ricinului cu acest mic animal.

Plantă ierbacee anuală (în sudul Europei și Africa arbust sau arbore), de 1—3 m înălțime, cu rădăcină puternic ramificată și tulpini erecte, verzi sau roșietice, glabre sau glauce, fistuloase. Frunze mari, late, peltat orbiculare, 5—7-palmat lobate, cu lobi acuți, serțați. Inflorescențe terminale, aparent laterale, cu flori monoice, cele ♀ roșcate, situate la vârful inflorescenței, cele ♂ la bază. Flori ♂ formate dintr'un perigon 5-fid (rar 3-fid) și din numeroase stamine puternic ramificate. Flori ♀ 3- până la 5-fidate, cu ovar trilocular. Stile scurte cu 3 stigmat bifide, roșcate. Fructul capsulă spinoasă sau glabră, lungă de 13—15 mm, globuloasă, conținând de obicei 3 semințe pestrice, ovat-lunguete, puțin comprimate, lungi de 8—24 mm, late de 5—12 mm și groase de 4—8 mm. Semințe marmorate, cu endosperm alb și bogat în ulei. VIII—X.

Cultivată ca plantă oleaginoasă și ornamentală. Subspontană în Reg. Craiova.

Variabilitatea speciei

1 a Plante cu capsule netede, glabre, neaculeate sau cu ușoare rudimente de spinișori la suprafață

var. *rugosus* Müll.-Arg. in DC. Prodr. XV. 2 (1866) 1018. — Cultivată.

1 b Capsule aculeate, acoperite pe toată suprafața cu spini

var. *lividus* (Jacq.) Müll.-Arg. l.c. — Cultivată.

O b s. Atât var. *rugosus*, cât și var. *lividus* sunt foarte variabile în ce privește culoarea tulpinii, a ramurilor și a petiolului, precum și prin pruinozitatea lor.

Întrebuințări. Uleiul extras din semințele acestei plante, se întrebuințează ca laxativ, purgativ și antihelmintic. Proporția de ulei ce se poate extrage pentru scopurile medicinale, este de 26—29%, iar restul până la 52—57% din greutatea semințelor, se întrebuințează pentru felurite scopuri industriale, ungerea motoarelor (uleiul nefiind solubil în benzină), la aviație, iluminat și la tăbăcirea pieilor. Uleiul de ricin medicinal, al cărui principiu activ este acidul ricinoleic, constă în proporție de 80—90% dintr'o substanță grasă, uleioasă, ricinoleina, un ester al glicerinei cu acidul ricinoleic (ricinolic, ricinolinic) și alte gliceride cu diferiți acizi grași. Turtele rămase după extragerea uleiului sunt toxice din cauza ricinei, o toxalbumină hematoaglutinantă extrem de toxică, deci nu pot fi date ca hrană animalelor, dar pot fi folosite la îngrășatul solului.

Răsp. gen.: India, Africa tropicală.

Fam. BUXACEAE Dumort. *)

Comm. bot. (1822) 54.

Plante sempervirente, majoritatea lemnoase. Frunze simple, alterne, subopuse până la opuse, coriacee, fără stipele. Flori monoice, unisexuate, dispuse în spice sau în glomerule. Flori ♂ cu 4 tepale și 4 stamine, cele ♀ cu 4—8

*) Prelucrată de Em. Topa.

tepale, ovar superior, 3-locular, cu 3 stile. Fructul capsulă sau drupă 1—2-spermă.

Familia cuprinde 6 genuri, cu aproximativ 30 de specii. La noi se cultivă 2 genuri.

Determinarea genurilor

- 1 a Plante semierboase cu frunze alterne, lung pețiolate, dințate; inflorescențele spice **Pachysândra**
 1 b Plante lemnoase, cu frunze opuse, scurt pețiolate, întregi; inflorescențele dispuse în glomerule **Buxus**

Genul **PACHYSÂNDRA**¹⁾ L.C. Rich.

in Michx. Fl. bor. am. II (1803) 177, tab. 45

Plante scunde, târâtoare, lungi de 20—30 cm. Frunze alterne. Flori în spice lungi de 4—12 cm.

Genul cuprinde 2 specii, dintre care la noi se cultivă numai *P. terminalis*, mai ales prin grădini botanice, apreciată ca plantă meliferă.

* *P. terminalis* Sieb. et Zucc. in Abh. Akad. Münch. IV, 2 (1843) 142; Pojark. in Fl. U.R.S.S. XIV (1949) 504, tab. XVI, fig. 6.

4. Plantă glabră, în medie lungă de 25 cm. Frunze cu pețiol lung de 1,5—2 cm; limbul lung de 6 cm și lat de 3,5 cm, îngust romboidal, la vârf dur dințat. Spic florifer simplu, terminal, de 4 cm lungime, cu flori ♀ la bază și ♂ la vârf. Periantul verde sau purpuriu. Fruct alb, drupaceu. V—VI.

Stațiunea. Pe stâncării semiumbroase. — Cultivată și sălbătică în Grădina Botanică dela Cluj, precum și în parcul « Vasile Roaită » dela Simeria (r. Hunedoara).

Răsp. gen.: Japonia.

Genul **BUXUS**²⁾ L.

Gen. pl. [ed. I (1737) 284, nr. 712], ed. V (1754) 423, nr. 934. — Cimișir, Merișor.

Arbori sau arbuști sempervirenți. Lujerii 4-muchiați. Inflorescențe dispuse în glomerule formate din câte o floare ♀ înconjurată de mai multe flori ♂. Florile ♂ lipsite de bractee, cu periant verde gălbui, tetramer, cele ♀

¹⁾ După grecescul « pachys » = gros și « anér », = bărbat (la plante, stamine), adică plantă cu stamine îngroșate.

²⁾ Derivă dela cuvântul « pyxos » = cimișir; lemnul acestei plante se întrebuința încă din antichitate la facerea cutiilor.

cu bractei și periant verde albicios, 4—8- respectiv 5—6-mer. Semințe lucioase, 3-costate, cu carunculă minusculă.

Genul cuprinde 20 de specii, dintre care la noi se cultivă una.

* *B. sempervirens* L. Sp. pl. ed. I (1753) 983; Pojark. in Fl. U.R.S.S. XIV (1949) 509. — Cimișir, Merișor. — Puspzâng. — Buxbaum. — Самшит вечноезеленый. — Ic.: Pl. 60, fig. 2, 2a.

5, 5. Tulpina înaltă de 0,15—8 m, foarte ramificată, cu frunziș des. Frunze opuse, simple, persistente (1—4 ani), scurt pețiolate, eliptice, ovate sau oblongi, de 1—3 cm lungime, pielose, la vârf obtuze sau emarginate, cu margini întregi, pe fața superioară verzi întunecate, pe cea inferioară verzi-gălbui, glabre, lucioase pe ambele fețe, în stadiul tânăr acoperite cu peri unicelulari. Cuticula este prevăzută cu ceară. Flori monoice, apetale, lungi de 2 mm. Flori ♂ cu 4 tepale și 4 stamine, cele ♀ cu 6 tepale și 1 ovar cu 3 stile. Capsulă globuloasă sau ovoidă, de cca 6—8 mm lungime se desface în 3 valve cu câte 2 prelungiri în formă de coarne, în fiecare loje cu câte 2 semințe negre, lucioase. III—VI.

Stațiunea. Nefiind pretențios în ceea ce privește solul și lumina, se poate cultiva în tot cuprinsul țării cu excepția regiunilor muntoase. Suportă bine atmosfera orașelor industriale cu fumul uzinelor și al locomotivelor. Suferă de pe urma înghețului și a insolațiilor timpurii.

Răsp. în țară: Ca plantă ornamentală se cultivă foarte mult în grădini, parcuri și mai ales în cimitire.

În trecutul geologic planta era mult răspândită pe teritoriul R.P.R., dovadă sunt fosilele aflate la Sibiu (Barbu, 1932), Timișani, Reg. Craiova (Barbu, 1933), Borsec, Reg. Aut. M. (Pop, 1936) și Bontăști, Reg. Bârlad (Popovici, 1935).

Variabilitatea speciei

var. *arborescens* L. Sp. pl. ed. I (1753) 983. — Arbore sau arbust de 1—8 m, înălțime, fertil. — Reprezintă varietatea tipică, cea mai frecventă.

f. *grandifolia* (Müll. - Arg.). — *B. semperv.* α. *grandifolia* Müll. - Arg. in DC. Prodr. XVI 1 (1869) 19. — Frunze de 2 ori mai lungi decât late.

f. *angustifolia* (Loud.). — *B. semperv.* var. *angustifolia* Loud. Arb. brit. I (1838) 1332. — Frunze de 3—4 ori mai lungi decât late.

f. *rotundifolia* (Baill.). — *B. semperv.* var. β. *rotundifolia* Baill. Monogr. Bux. (1859) 61. — Frunze subrotunde, de 1,5 ori mai lungi decât late.

f. *argentea* (Loud.). — *B. semperv.* var. *arborescens* subvar. *argentea* Loud. l.c. (1838) 1332. — Frunze împestrițate cu alb.

f. *aurea* (Loud.). — *B. semperv.* var. *arborescens* subvar. *aurea* Loud. l.c. (1838) 1332. — Frunze împestrițate cu galben.

f. *marginata* (Loud.). — *B. semperv.* var. *arborescens* subvar. *marginata* Loud. l.c. — *B. semperv.* var. α. *arborescens* subvar. *aurea marginata* Baill. Monogr. Bux. (1859) 61. — Frunze cu marginea colorată în galben.

var. *suffruticosa* L. Sp. pl. ed. I (1753) 983. — Arbusti scunzi, sterili, cel mult de 1 m înălțime. — Varietate horticolă.

f. *myrtifolia* (Lam.). — *B. myrtifolia* Lam. Encycl. I (1783) 541. — Frunze mici, eliptic-oblongi, la vârf acute.

f. *rosmarinifolia* (Baill.). — *B. semperv.* var. *rosmarinifolia* Baill. l.c. (1859) 61. — Frunze mici, liniar-oblongi, de 4—6 ori mai lungi decât late.

Răsp. gen.: Europa de V și S, Algeria, Asia Mică.

Intrebuintări. *B. sempervirens* este o plantă ornamentală mult folosită, mai ales că prin tăiere i se pot da diverse forme, iar frunzișul întotdeauna verde, se folosește pentru cununi și buchete. Lemnul său compact și foarte dur este prețuit și întrebuințat în strungărie și xilografie. Scoarța și frunzele conțin o serie de alcaloizi, dintre care buxina provoacă otrăviri, îndeosebi la porci și cai.

O b s. Cu frunzele de *B. sempervirens* se falsifică frunzele de *Arctostaphylos Uva-ursi*, fapt care se poate lesne verifica, tratând drogul suspect cu o soluție de sulfat feros, știind că lichidul cu frunzele de *A. Uva-ursi* se colorează în violet, pe când cu cele de *Buxus* rămâne incolor.

Fam. 29. CALLITRICHACEAE Lindl. *)

Nat. Syst. ed. II (1836) III

Plante anuale sau perene, monoice, gracile, glabre sau cu peri stelați, submerse, plutitoare, amfibii sau limniciole. Frunze opuse, întregi, fără stipele, cele superioare îngrămădite în vârful tulpinii într'o rozetă. Plantele tinere prezintă întotdeauna stomate, care la soiurile amfibii, din secția *Eucallitriche*, sunt persistente, pe când la *Pseudocallitriche* ele dispar, spre a fi înlocuite cu câte un por. Flori axilare, foarte mici, unisexuate, sau aparent bisexuate. Invelișul floral lipsește, dar poate fi înlocuit cu 2 bracteole opuse, membranacee, alburii, falcate, caduce. Florile ♂ constau dintr'o singură stamină cu filamentul lung și antere reniforme. Florile ♀ cu un ovar bilocular, ce devine 4-locular prin apariția unui perete fals. Stile 2, filiforme. Fructul o nuculă indehiscentă, comprimată, aproape rotundă, 4-loculară, pe muchii cu o brazdă profundă. Fiecare locul cu câte o sămânță bogată în ulei. Embrionul puțin curbat.

Această familie cuprinde numai un singur gen.

Genul 104. CALLITRICHE¹⁾ L.

[Diss. nov. pl. gen. resp. Chenon, nr. 1104 in Amoen. acad. III (1751) 24], Gen. pl. ed. V (1754) 5, nr. 13. — *Drențe*.

Caracterizarea genului identică cu a familiei.

*) Prelucrată de Em. Topa.

¹⁾ Derivat dela cuvântul grecesc « kállos » = frumusețe și « thrix, trichos » = păr, adică păr frumos, planta având înfățișarea unor fire lungi.

Determinarea speciilor

- 1 a Plante submerse, cu frunze liniare uninerve. Flori fără bractei. Polenul sferic, neted — **C. autumnalis**
- 1 b Plante amfibii sau limnocolle, cu frunze heteromorfe, 1-plurinerve. Flori bracteate. Polenul elipsoid, rugos 2
- 2 a Fructul pe margini lat aripat, subrotund, de obicei mai lat decât lung, de 1,5–2 mm lungime și 2 mm lățime 1. **C. stagnalis**
- 2 b Fructul abia marginat sau îngust muchiat, însă nearipat 3
- 3 a Cele 2 stigmatе la bază răsfărâte, alipite de fructul comprimat, caduce. Fruct \pm subrotund, de 1,2–1,5 mm lungime — **C. hamulata**
- 3 b Cele 2 stigmatе la bază drepte 4
- 4 a Stigmatе de 4–6 mm lungime, necaduce. Fructul mai lat decât lung (1,2–1,5 mm lățime) 2. **C. polymorpha**
- 4 b Stigmatе de 1–2 mm lungime, de obicei caduce. Fructul mai lung decât lat (1 mm lungime) 3. **C. verna**

? **C. autumnalis** L. Fl. suec. ed. II (1755) 2, nr. 4, em. Whlb. Fl. lapp. (1812); Krecz. in Fl. U.R.S.S. XIV (1949) 502, tab. XXVI, fig. 3, 7. — *C. hermaphroditica* L. Diss. Cent. pl. I resp. Juslen, nr. 89, in Amoen. acad. IV (1755) 293. — *C. angustifolia* Gilib. Exerc. phyt. II (1792) 421. — *C. virens* Goldb. in Mém. Soc. Nat. Mosc. V (1817) 119. — *C. hamulata* Ldb. Fl. ross. II (1844) 121, non Kütz. — Ic.: Pl. 62, fig. 5, 5a.

☉ — 4. Plantă submersă, delicată, fără peri stelați. Tulpina lungă de 5–80 cm. Frunze de un verde viu, întotdeauna uninerve, liniare sau liniar lanceolate, glabre, spre bază lățite, sesile, cu vârful retezat, \pm bifidat. Celulele epidermice de pe ambele fețe ale limbului egale. Flori fără bracteole. Polenul neted, fără verucozități. Stile lungi. Fructe sesile, aproape circulare, până la 5,5 mm în diam., pe muchii cu două brazde profunde. VII–IX.

Stațiunea. In ape stagnante și în curgătoare.

Răsp. în țară: După Baumgarten (1816), Herbieh (1859), Brândză (1879–83), este frecventă în Transilvania, Bucovina și Moldova, iar după Prodan (1939) și Borza (1947) este dubioasă. Knapp (1872) și Simonkai (1877) o elimină cu totul din Flora noastră.

Răsp.: gen.: Eurasia, Groenlanda, America de N și S.

1. **C. stagnalis** Scop. Fl. carn. II, ed. II (1772) 251; Krecz. in Fl. U.R.S.S. XIV (1949) 501, tab. XXVI, fig. 10. — *C. platycarpa* Kütz. in Rehb. Ic. Bot. Cent. IX (1831) tab. 883–889; in Linn. VII (1832) 181. — Ic.: Pl. 62, fig. 3, (3 a-c).

☉ — 4. Plantă submersă sau amfibie, cu peri stelați. Tulpină de 5–50 (100) cm lungime. Frunze submerse liniare, de regulă uninervate, gracile.

cu vârful scobit; frunzele natante adunate \pm evident în formă de stea, de un verde viu, îngroșate, lucitoare, alungite până la ovate sau lat ovate, cu vârful aproape întreg, 3 (sau pluri) -nervate, de regulă cu stomate. Florile se dezvoltă numai deasupra apei și au la bază 2 bracteole late. Stamine de regulă erecte, lungi de 5—6 mm. Polenul aproape sferic, (elipsoid) foarte rugos. Flori ♀ potrivit de mari, cu stile erecte, de 2 mm lungime, persistente până la maturitatea fructelor. Fruct \pm circular, de 1,5—2 mm lungime și 2 mm lățime, scurt pedicelat sau sesil, pe margini lat aripat. V—X.

Stațiunea. În ape limpezi, lin curgătoare.

Răsp. în țară: Planta este citată din următoarele localități: *Reg. Cluj:* Cluj, Someșul Rece. *Reg. Aut. M.:* Borsec; Mții Gurghiului pe Dl. Crucii; Tușnad. *Reg. Stalin:* Orașul Stalin; Sibiu. *Reg. Timișoara:* Orșova. *Reg. București:* Titu pe gârlița Suța (r. Răcari). *Reg. Bacău:* Mrea Cașin (r. Tg. Ocna). *Reg. Suceava:* Solca (r. Gura Humorului). — Aceste date, în cea mai mare parte sunt contestate de autorii mai noi, astfel că planta trebuie considerată ca dubioasă la noi. După unii autori, *C. stagnalis* dela Orșova ar corespunde cu *C. polymorpha*, *C. stagnalis* citată la Cluj de Schur și luată de Simonkai drept *C. transsilvanica*, ar fi *C. verna*, iar materialul în general de *C. stagnalis* din Transilvania ar corespunde cu *C. polymorpha*.

Variabilitatea speciei

f. heterophylla Glück Wasser- und Sumpfgew. IV (1924). — Plantă de apă adâncă, cu frunze parte scufundate, parte natante, spatulate. — Ici colo prin ape stătătoare. — **Ic.:** Pl. 62, fig. 4, 4 a.


f. submersa Glück l.c. — Plantă submersă. — *Reg. Ploști:* Mt. Penteleu (gura Bălescului, Curuiu).

Răsp. gen.: Eurasia, Africa de N.

? **C. hamulata** Kütz. in Koch Syn. ed. II (1843) 271. — *C. autumnalis* Kütz. in Linn. VII (1832) 186, non L.

○ — 24. Plantă submersă, natantă sau amfibie, cu peri stelați. Tulpină lungă până la 80 cm, filamentoasă, pronunțat turtită. Frunze submerse lini-

Planșa 62. — 1. *Callitriche polymorpha* Lönnr., 1a fruct mărit. — 2. *C. verna* L., 2a. *f. angustifolia* Hoppe. — 3. *C. stagnalis* Scop. 3a. floarea bărbătească. — 3b. floare femelă., 3c. fructul și secțiunea transversală. — 4. *C. stagnalis* Scop. *f. heterophylla* Glück, fruct în profil, sub el secțiunea transversală., 4a. idem, în secțiunea orizontală, fără partea superioară. — 5. *C. autumnalis* L., fruct și secțiunea sa transversală., 5a. o parte din tulpină cu câte o floare bărbătească și femelă. — 6. *C. polymorpha* Lönnr., ovar cu stigmat răsfrânt și un fruct cu stigmatul căzut și secțiunea lui transversală. — 7. *C. stagnalis* Scop., 1—2. frunze natante, 3—4. frunzele următoare sub cele natante, 5—10. frunze submerse. — 8. *C. verna* L., frunze natante și submerse, 8a. vârful frunzelor submerse (fig. 1—2 orig., 3—8 după Hegi).



are, foarte fin uninervate, până la 42 mm lungime și 1,5 mm lățime, sau \pm spatulate și plurinervate, spre bază cu un pețiol cuneat; frunze natante îngrămădite într'o rozetă ovat circulară, de 14 mm lungime și 3,8 mm lățime, cu pețiolul îngustat, de 1—2 ori mai lung decât limbul. Frunzele formelor terestre sunt mici, lat liniare, până la liniar lanceolate, pe fața superioară de un verde închis și fin punctate, pe cea inferioară de un verde alburui. Bracteele de regulă lipsesc, iar atunci când se află sunt pronunțat falcat reflecte, lungi de 1 mm și adeseori foarte înguste. Stamina de 2,5—3 mm lungime. Polenul aproape sferic, foarte rugos. Stigmate de 5—6 ori mai lungi decât pistilul, dela bază reflecte și alipite de fruct, caduce. Fructe lungi de 1,2—1,5 mm \pm subrotunde îngust muchiate, dar nearipate (în general). IV—X.

Stațiunea. În ape stagnante și în curgătoare

Răsp. în țară: Citată din Mții Harghitei dela Sâncrăieni (r. Miercurea Ciuc) și din Reg. București dela gara Titu, pe apa Suța (r. Răcari). — Aceste date sunt contestate de Prodan (1933) și de Soó (1940). Materialul editat în FRE nr. 1286 dela Sâncrăieni corespunde cu *C. polymorpha*, iar cel dela Titu a fost eliminat de către Grecescu (Consp. Fl. Rom. 1898).

Răsp. gen.: Europa, Groenlanda.

2. *C. polymorpha* Lönner. Obs. crit. pl. suec. (1854) 19; Krecz. in Fl. U.R.S.S. XIV (1949) 498, tab. XXVI, fig. 2. — *C. cophocarpa* Sendtn. Veg. Südbayerns (1854) et in Hegelm. Mon. Callitr. (1864) 55. — *C. dioica* Schur in Verh. SVN IV (1859) 98. — *C. aestivalis* Schur in ÖBZ X (186) 325. — *C. transsilvanica* Schur. Enum. pl. Transs. (1866) 216. — *C. verna* ssp. *transsilvanica* Simk. Enum. Fl. Transs. (1886) 234. — *C. hamulata* Auct. non Kütz. — Exs.: FRE nr. 1286 sub *hamulata*. — Ic.: Pl. 62, fig. 1, 1 a, b.

○ — 4. Plantă submersă, natantă sau amfibie, gracilă, de un verde închis, cu tulpină de 4—30 cm lungime. Frunze submerse liniare sau liniar lanceolate, cele natante spatulate sau obovate, trinervate, cu pețiol scurt, deabia lătit, trunchiat. Formele terestre au frunzele subfalcate, decusate. Flori unisexuate, cele superioare masculine, cele inferioare femele. Formele submerse sunt sterile. Stamene cu filamente alungite. Stigmate la bază drepte, persistente, de 4—6 mm lungime. Fructe globuloase, mai late decât lungi (1,2—1,5 mm lățime), crenate, sesile. V—IX.

Stațiunea. Prin bălți, pâraie, ape stagnante, margini de lacuri, din regiunea de câmpie până în etajul montan.

Răsp. în țară: Reg. Baia Mare: Borșa (r. Vișeu); Sighet. Reg. Cluj: Năsăud; Cluj, Cojoana; Câmpeni, Roșia Montană. Reg. Aut. M.: Borsec (r. Toplița); Tg. Mureș; Sâncrăieni, Tușnad pe Mt. «Büdös» (r. Miercurea Ciuc); Reci (r. Sf. Gheorghe). Reg. Stalin:

Aita de Mijloc (r. Rupea); Orașul Stalin, Predeal pe V. Râșnoavei; Făgăraș, Cârțișoara; Sibiu; Sebeș, Apoldul Mare. *Reg. Hunedoara*: Alba Iulia, Ighiel; Orăștie; Hunedoara; Petroșani, Câmpul lui Neag, Mții Parângului, Mții Retezatului la Lacul Zănoaga; Zam (r. Deva). *Reg. Oradea*: Oradea, Tărian. *Reg. Arad*: Arad, Dezna Veche, Moneasa (r. Gurahonț). *Reg. Timișoara*: Lugoj; Glimboca, Obreja (r. Caransebeș); Orșova (r. Mehadia); Drencova, Buzias (r. Moldova Nouă). *Reg. Iași*: Bucium (r. Iași). *Reg. Suceava*: Boroaia (r. Fălticeni).

Variabilitatea specie

- 1 a Plante acvatice 2
- 1 b Plante terestre 3
- 2 a Frunze mai întotdeauna liniare. Tulpini submerse de regulă sterile
f. *pseudofluitans* Soó Arch. Balaton. (1928) 62.
- 2 b Frunze superioare spatulate sau obovate, cele inferioare liniare sau liniar lanceolate, rareori mai târziu în întregime spatulate. Tulpini submerse fertile
f. *aquátilis* Soó l.c. — *Reg. Suceava*: Baia, Moişa, Boroaia (r. Fălticeni).
- 3 a Frunze mai întotdeauna liniare, sau ici-colo lanceolate, Tulpini culcate, lungi de 10 cm, cu rădăcini fixatoare
f. *terricola* Soó l.c. — *Reg. Baia Mare*: Sighet. *Reg. Cluj*: Mt. Găina din Mții Biho-rului. *Reg. Aut. M.*: Tușnad. *Reg. Hunedoara*: Mții Retezatului la Lacul Zănoaga; Câmpul lui Neag (r. Petroșani). *Reg. Timișoara*: Lugoj.
- 3 b Frunze adeseori spatulate sau lanceolate. Tulpini tuloase, suberecte, înalte de 30 cm
f. *limnicola* Soó l.c. — *Reg. Aut. M.*: Tușnad; Reci (r. Sf. Gheorghe). *Reg. Stalin*: Cârțișoara (r. Făgăraș); Cărpiniș (r. Sebeș).

Răsp. gen.: Europa cu excepția cursului inferior al Donului și al Volgei, Caucaz, Siberia.

3. **C. vérna** L. Fl. suec. ed. II (1755) 2, nr. 3, em. Lönnr. Obs. crit. plant. suec. (1854) 19; Kütz. in Rehb. Iconogr. bot. Centr. IX (1831) 33, tab. 881; Krecz. in Fl. U.R.S.S. XIV (1949) 496, tab. XXVI, fig. 1. — *C. palustris* L. Sp. pl. ed. I (1753) 969, p.p. — *C. androgyna* L. Diss. Cent. pl. I, resp. Jusl., nr. 88, in Amoen. Acad. IV (1755) 293, p.p. — Drențe. — Tavaszi mocsárhúr. — Frühlings - Wasserstern. — Болотник весенний. — Exs.: FRE nr. 1287. — Ic.: Pl. 62, fig. 2, 2a, 8, 8a.

☉ — 4. Plantă cu peri stelați, cu tulpină lungă de 3—50 cm. Frunze submerse liniare, cu vârf puțin crestă, pe fața superioară mai întunecate decât pe cea inferioară, cele natante întotdeauna în rozete, spatulate, spre bază îngustate; ambele feluri de frunze liniare până la lanceolate, cel puțin cele natante cu stomate. Formele submerse de regulă lipsite de flori. Bractei ușor falcate, lungi de 0,5 mm. Antere de 5 mm lungime, la început erecte, apoi îndoite. Polenul eliptic, cu multe verucozități mici. Stigmat erecte sau ușor răsfrânte, de 1—2 mm lungime, filiforme, de obicei cad târziu. Fructul cel mult de 1 mm lungime, aproape cordat sau ovat, cu spatele și cusăturile pronunțat brăzdate. IV—X.

Stațiunea. In ape limpezi, ușor curgătoare, rovinoase sau stagnante, dela câmpie până în etajul alpin.

Răsp. în țară: *Reg. Baia Mare:* Satu Mare; Petrova pe Mt. Șerban, Bistra lângă Poloneanca, Mții Rodnei pe Pietrosul Mare (r. Vișeu). *Reg. Cluj:* Lacul Sălicea (r. Turda). *Reg. Au. M.:* Ungheni (r. Tg. Mureș); Remetea, Joseni (r. Gheorghieni); Mții Harghita pe Dl. Crucii; Sântimbru, Tușnad pe Mt. «Büdös» (r. Miercurea Ciuc); Reci (r. Sf. Gheorghe); Comandău (r. Tg. Săcuesc). *Reg. Stalin:* Orașul Stalin; Sibiu. *Reg. Hunedoara:* Râul de Mori (r. Hațeg); Petroșani. *Reg. Oradea:* Băile Episcopoști lângă Oradea; Stâna de Vale (r. Aleșd). *Reg. Arad:* Lipova. *Reg. Timișoara:* Rusca (r. Caransebeș). *Reg. Craiova:* Cerneți pe Dl. Iorgutovei și Dl. Dumbrăviții (r. Tr. Severin). *Reg. Pitești:* Gara Clucereasa (r. Pitești). *Reg. București:* Titu pe gârlița Suța (r. Răcari); Comana pe malul Călniștei (r. Vidra); *Reg. Ploiești:* V. Slănicului; Mt. Penteleu (Lacul Tulbelor și la Lacuri pe Pâr. dela Stâna Zănoaga). *Reg. Suceava:* Vălenii Stănișoarei pe V. Suha Mare (r. Fălticeni); Solca (r. Gura Humorului).

Variabilitatea speciei

- 1 a Plante acvatice 2
- 1 b Plante terestre 4
- 2 a Frunze întotdeauna înguste, de 5—30 mm lungime și 0,5 — 1,5 mm lățime. Tulpini submerse, până la 25 cm lungime, aproape întotdeauna sterile
f. angustifolia (Hoppe). — *C. angustifolia* Hoppe Taschenb. (1792) 160. — *Reg. Cluj:* Lacurile dela Sălicea (r. Turda). *Reg. Ploiești:* Mt. Penteleu. *Reg. Bacău:* Grumăzești, Ocea (r. Tg. Neamț)
- 2 b Frunze superioare spatulate 3
- 3 a Frunze aproape întotdeauna spatulate, lungi de 4—12 mm, late de 2—5 mm.
f. fontana (Scop.). — *C. fontana* Scop. Fl. carn. II, ed. II (1792) 251. — *Reg. Cluj:* Cluj la Fânațe; lacurile dela Sălicea (r. Turda).
- 3 b Frunzele superioare spatulate sau ovate, cele inferioare liniare sau liniar lanceolate
f. stellata (Hoppe). — *C. stellata* Hoppe l.c. (1792) 158. — *C. verna* β *stellata* Kütz. in Rchb. l.c. (1831) fig. 1180, 1181. — *Reg. Baia Mare:* Vișeu de Jos. *Reg. Ploiești:* Mt. Penteleu. *Reg. Bacău:* Broșteni pe brațul mort al Bistriței (r. Ceahlău).
- 4 a Frunze aproape întotdeauna liniare, de 1—5 mm lungime, 0,5 — 1 mm lățime. Tulpină culcată, de 3 — 12 cm lungime, cu rădăcini adventive.
f. minima (L.). — *C. palustris* α *minima* L. Sp. pl. ed. I (1753) 969. — *C. verna* δ *minima* Kütz. in Rchb. l.c. (1831) fig. 1183. — *Reg. Au. M.:* Reci (r. Sf. Gheorghe). *Reg. Hunedoara:* Râul de Mori (r. Hațeg). *Reg. Oradea:* Băile Episcopoști lângă Oradea. *Reg. Timișoara:* Timișoara la Păd. Casa Verde.
- 4 b Frunze mai întotdeauna spatulate, de 6 — 15 mm lungime, 2,5 — 5 mm lățime. Tulpini cespitoase, suberecte, până la 30 cm înălțime
f. caespitosa (Schultz). — *C. caespitosa* Schultz Prodr. Fl. Starg. (1806) 2. — *C. verna* γ *caespitosa* Kütz. in Rchb. l.c. (1831) fig. 1182. — *Reg. Suceava:* Solca (r. Gura Humorului).

Răsp. gen.: Europa, Asia temperată, Africa de N., America de N și S, Groenlanda, Islanda.

Subclasa **Dialypetale**

Periant dublu. Corolă cu petale libere.

Ordinul **RANÁLES** (Polycarpicae)

Fam. — **CALYCANTHACEAE** *) Lindl.

Nat. syst. ed. II (1836) 159.

Plante lemnoase aromatice. Frunze opuse, simple, căzătoare toamna, fără stipele. Flori solitare, hermafrodite, dispuse pe o singură spirală și păstrând aceeași divergență, dela tepale până la carpele. Periant petaloid, cu numeroase tepale. Stamine și carpele numeroase. Fructe apocarpice, monosperme, așezate într'un receptacul urceolat, deschis. Embrion dispus în spirală.

Genul **CALYCÁNTHUS** ¹⁾ L.

Syst. nat. ed. X (1759) 1066.

Caracterizarea genului corespunde cu cea a familiei.

Determinarea speciilor

- | | | |
|-----|---|------------------------|
| 1 a | Frunze păroase pe ambele fețe, cu limbul ovat sau îngust eliptic. Flori roșii brunii, cu miros de fragi | C. floridus |
| 1 b | Frunze păroase pe dos, cu limbul \pm obovat. Flori roșii-cărămizii, cu miros de oțet | C. occidentalis |

* **C. floridus** L. l.c. — *Butneria florida* Kearney in Bull. Torr. Club XXI (1894) 175. — Ic.: Pl. 63, fig. 3.

Arbust înalt de 1—2 (3) m. Frunze păroase pe ambele fețe, cu pețiole de 0,6 cm lungime și limbul ovat, eliptic sau îngust eliptic, de 6—11 cm lungime. Flori roșii-brunii, de 4—5 cm în diam., cu miros puternic de fragi.

*) Prelucrată de Em. Topa.

¹⁾ Derivă dela grecescul « kályx » = caliciu și « anthos » = floare, pentru a arăta că are caliciu petaloid.

Plansa 63. — 1. *Liriodendron Tulipifera* L., 1 a. fruct. — 2. *Laurus nobilis* L. 1a. fruct. — 2. *Laurus nobilis* cu flori, 2 a. cu fructe. — 3. *Calycanthus floridus* L. — 4. *Magnolia stellata* Maxim., 4 a. stamine și pistil, 4 b. frunze și un fruct tânăr.



sau ananas. Ramurile zdrobite cu un miros propriu de scorțișoare și rășină de conifere. VI—VII.

Stațiunea. Crește bine în sol fertil, în loc ferit de prea mari insolații și îngheț.

Răsp. în țară: Se cultivă ca tufă ornamentală prin grădini și parcuri.

Răsp. gen.: America de N (în partea răsăriteană).

Intrebuintări. Datorită frumuseții sale, a fost introdusă în Europa în secolul al XVIII-lea. Scoarța conține un ulei eteric (0,25 — 0,50%), rășini, tanin și altele, iar semințele au un alcaloid toxic, calicantina. Florile și scoarța sunt tonice și stimulente.

* **C. occidentális** Hook. et Arn. Bot. Capt. Beech. Voy. (1841) 340, tab. 84. — *Butneria occidentalis* Greene in Erytea I (1893) 207.

Arbust până la 4 m înălțime. Frunze păroase numai pe dos, cu petioli de 0,8 cm lungime și limbul ± obovat, de 12—18 cm lungime. Flori de un purpuriu aprins sau roșii-cărămizii, de 5—6 cm în diam., cu miros slab de oțet. VI—VII.

Răsp. în țară: Crește în aceleași condițiuni ca și precedentul și este cultivat ceva mai rar.

Răsp. gen.: Originar din California și Oregon.

Obs. În grădinile botanice se mai cultivă și **C. praecox** L. Sp. pl. ed. II (1762) 718. — *Chimonanthus praecox* Link Enum. hort. Berol. II (1822) 66. — Tufă mică, înaltă de 1 — 1,5 m. Spre deosebire de speciile precedente, mugurii sunt acoperiți cu solzi. Florile cu miros puternic și plăcut, apar înainte de înfrunzire pe tulpinile mai în vârstă (cauliflorie). Tepale de un alb gălbui spre interior și ± purpurii spre partea internă. II—III. — Originară din China.

Fam. LAURACEAE *) Lindl.

Veg. Kingd. (1847) 535.

Arbori sau arbuști. Frunze de regulă persistente, alterne, lanceolat eliptice, cu margini uneori fin ondulate, fără stipele. În frunze și scoarță se află punși secretoare de ulei eteric. Flori actinomorfe, dioice sau hermafrodite, mici. Stamine 10—16, în 3—4 verticile. Anterele se deschid prin 2 căpăcele. Gineceu compus din 3 carpele. Ovar unilocular cu un singur ovul. Fruct bacă sau drupă, cu pedunculul adesea îngroșat.

În Europa astăzi reprezentată printr'un singur gen. În țara noastră din această familie se cunosc din terțiar resturile genului *Cinnamomum* din V. Jiului și dela Borsec.

*) Prelucrată de St. Csűrös.

Genul **L Á U R U S**¹⁾ L.

Gen. pl. [ed. I (1737) 120, nr. 338], ed. V (1754) 173, nr. 452.— **D a f i n**

Caracterizarea genului la fel cu a speciei.

* **L. nóbilis** L. Sp. pl. ed. I (1753) 529; Palib. in Fl. U.R.S.S. VII (1937) 572. — **Dafin**. — Babérfa. — Lorbeer. — Лавр благородный. — Ic.: Pl. 63, fig. 2, 2a.

♂, ♀. Tulpina înaltă până la 10 m, cu scoarța neagră. Frunze până la 10 cm lungime, scurt pețiolate, lat sau îngust lanceolate, acute la ambele capete, pe margini ondulate, scurt pețiolate, pielioase, glabre, de culoare verde închisă. Flori hermafrodite sau în urma reducerii dioice, mici, albe-verzui sau albe-gîlbui, dispuse în inflorescențe scurte, racemoase sau în umbelule la subțioara frunzelor. Inveliș floral simplu, cu 4 tepale, la bază puțin concrescute. Flori ♂ cu 10—12 stamine; anterele se deschid prin 2 clape, transversale. Flori ♀ cu 4 staminodii. Fruct bacă ovală, la început verde, la maturitate neagră, de 1—2 cm lungime, cu peduncul de grosime uniformă. IV—V.

Răsp. în țară: Plantă mediteraneeană; la noi se cultivă în sere, numai vara afară.

Răsp. gen.: Originară din Asia Mică și Balcani, astăzi răspândită în toată regiunea Mării Mediterane. Se mai găsește în Alpii sudici, Crimea și Mții Caucaz.

Întrebuințări. Frunzele uscate, aromatice, se întrebuințează la pregătirea mâncărilor ca un prețios condiment, comercializat ca «foi de dafin». Din ele se mai extrage prin distilare cu vapori de apă un ulei eteric. Din fructele uscate se prepară un praf condimentar. Se mai extrage un ulei («Oleum Lauri»), întrebuințat la fricțiuni și ca diuretic. În industrie se folosește la fabricarea săpunurilor, a lichiorurilor, precum și contra insectelor.

Fam. **MAGNOLIACEAE** *) Jaume St. Hill

Expos. fam. II (1805) 74, tab. 83.

Arbuști până la 3 m sau arbori înalți de 25—30 m înălțime. Frunze simple, relativ mari, cu margini întregi, rar lobate, pețiolate, însoțite de o pereche de stipele căzătoare, alipite, care la început învelesc întreg mugurele foliar și floral, ca într-o glugă. Frunze alterne. Ramurile tinere la noduri, cu un inel sau o linie circulară foarte caracteristică. Flori hermafrodite,

¹⁾ Numele laurului la romani.

*) Prelucrată de E. Ghișa.



cu simetrie radiară, mari, solitare la vârful ramurilor sau laterale, niciodată grupate în inflorescențe. Elementele periantului asemănătoare între ele, petaloide, așezate spirociclic sau verticilat, de cele mai multe ori numeroase. Prin deplasarea spre floare a unor hipsofile, apar formațiuni protectoare de natura sepalelor, care ocrotesc mugurii și bobocii floralii și care cad curând la înflorire. Stamine numeroase, libere, dispuse spirociclic la baza carpelelor. Carpele numeroase, întotdeauna libere (apocarpe), așezate spirociclic dealungul unui receptacul proeminent, fiecare carpelă închizând câte 1—2 sau mai multe ovule învelite pe un receptacul alungit. Sămânță ovoidă sau sferică, bogată în endosperm uleios, cu un embrion mic.

O b s. Familia cuprinde cca 100 specii cu originea în ținuturile tropicale ale Asiei, Australiei și Americii. În era terțiară, Magnoliaceele erau larg răspândite și în afara limitelor arealelor lor actuale, ajungând până în zonele arctice, după cum dovedesc numeroasele impresiuni și resturi fosile.

Determinarea genurilor

- 1 a Frunze lobate, caracteristice, în formă de liră, cu pețiol lung de 5—10 cm și cu vârful spintecat. Fiecare nuculă prevăzută pe o margine cu o aripă foliacee. La maturitate, nuculele uscate se desprind de pe axă
Liriodendron
- 1 b Frunze întregi, nelobate, cu vârful \pm acut, scurt pețiolate. Foliculele grupate spiralat în jurul receptaculului alungit. Foliculele se deschid pe linia dorsală, la început rămânând prinse de receptacul. Semințele la exterior cărnoase, înainte de diseminare atârnă la extremitatea unor filamente subțiri **Magnolia**

Genul **MAGNOLIA** *) L.

Gen. pl. [ed. I (1737) 162, nr. 456], ed. V (1754) 240, nr. 610.—**Magnolie.**

Arbori sau arbuști. Frunze simple, cu marginea întreagă, cu vârful \pm acuminat, în general mai late în jumătatea dinspre vârf, cu baza îngustată, cordată sau \pm rotunjită, pețiolate. La început frunzele sunt închise complet în niște teci protectoare, de natură stipelară. Flori hermafrodite, solitare, radiar simetrice, formate din 3 (4) sepale petaloide și din 6 sau mai multe petale relativ mai mari, albe, gălbui, verzui sau roșietice. Stamine și carpele numeroase. Antere lungi, întrorse, cu filamente scurte și late. Folicule numeroase cu 1—2 semințe \pm globuloase, care atârnă de câte un filament lung și subțire.

Din cele vreo 26 de specii, la noi se cultivă câteva specii și hibrizi, ca plante ornamentale.

*) După numele lui Pierre Magnol, profesor la Montpellier, autorul mai multor opere botanice (1638—1715).

Determinarea speciilor

- 1 a Lujerii tineri și mugurii glabri. Frunze mari, de 20—50 cm lungime 2
- 1 b Mugurii (uneori și lujerii tineri) hirsuți sau pubescenti. Frunze mici, de 4—20 (24) cm lungime..... 4
- 2 a Frunze cu baza cordată. Flori de 25—30 cm în diam. **M. macrophylla**
- 2 b Frunze cu baza îngustată. Flori de 14—25 cm în diam..... 3
- 3 a Frunze oblong ovate, spre bază treptat îngustate. Flori de 18—20 cm în diametru. Fruct lung de 6—10 cm. Muguri acumițați. **M. tripetala**
- 3 b Frunze obovate, spre bază brusc îngustate. Flori de 14—16 cm în diametru. Fruct lung de 12—18 cm. Muguri obtuți..... **M. obovata**
- 4 a Flori verzui sau gălbui, apar după înfrunzire. Arbore înalt **M. acuminata**
- 4 b Flori albe sau purpurii. Arbuști sau arbori scunzi 5
- 5 a Flori cu petale purpurii, cel puțin pe partea din afară.... **M. liliiflora**
- 5 b Flori cu petale albe sau cel mult la exterior cu o dungă slăă purpurie 6
- 6 a Sepale verzui, în număr de 3, cu mult mai scurte și mai înguste decât petalele albe, în număr de 6 **M. Kobus**
- 6 b Sepale petaloide, de aceeași mărime ca petalele sau numai cu puțin mai scurte decât acestea..... 7
- 7 a Frunze mici, de 4—10 cm lungime și mai înguste de 5 cm. Perigon cu 9—18 foliole albe, stelat divergente..... **M. stellata**
- 7 b Frunze lungi de 6—15 cm și mai late de 5 cm. Perigon campanulat sau globulos, cu 6—12 foliole 8
- 8 a Frunze eliptice sau oblong lanceolate, pe dos de un verde-albăstrui. Flori de 7—10 cm în diametru, apar după înfrunzire..... **M. glauca**
- 8 b Frunze obovate sau oblong obovate, pe dos verzi. Flori de 12—15 cm în diametru, apar deodată cu frunzele..... **M. Yulan**

O b s. Dintre speciile enumerate în această cheie dichotomică vom prezenta și descrie mai pe larg numai pe cele mai frecvent întâlnite prin parcurile și grădinile din R.P.R.

* **M. acuminata** L. Syst. nat. ed. X (1759) 1082. — *M. virginiana* = *acuminata* L. Sp. pl. ed. I (1753) 536. Ic.: Pl. 64.

5 — 20 m, cu aspect piramidal. Lujeri anuali la început verzi, la maturitate brun roșcați, glabri, lucitori. Frunze mari, de 10—20 cm lungime sau și mai mult și late de 6—12 (18) cm, de formă eliptică, ovată, oblong ovată sau oblong obovată, cu vârf scurt acuminat, de culoare verde pe fața superioară și verde cenușie pe cea inferioară, acoperită de numeroși periși

fini, alburii. Pețiol de 2—4,5 cm lungime. Flori semideschise, galbene verzui, formate din 3 sepale lanceolate, mai scurte și 6 petale de 6—8 cm, dispuse în 2 cicluri, apar după înfrunzire. Apocarp oblong, de 4—8 cm lungime, roșu intens la maturitate. V—VI.

Răsp. în țară: Cultivată prin parcuri și grădini, de exemplu la Cluj în Grădina Botanică, Simeria în parcul dendrologic, etc.

Răsp. gen.: America de N, unde formează păduri împreună cu *Liriodendron*.

Obs. Se cultivă ca plantă de ornament, fiind mult mai rezistentă la frig decât alte specii de *Magnolia*.

✱ *M. obovata* Thunb. in Trans. Linn. Soc. II (1794) 336. — *M. hypoleuca* Sieb. et Zucc. in Abh. Akad. Münch. IV, II (1843) 187.

♂, ♀ — 10 m, cu ramuri puternice, brun-roșcate, glauce. Muguri mari, obtuși. Frunze obovate, deosebit de mari, de 15—40 cm lungime și 7,5—17,5 cm lățime, de obicei cu baza contrasă în pețiol și vârful obtuz sau ușor acut, dispuse pe o spirală foarte apropiată, încât fac impresia unor verticile la vârful lujerilor tineri. Fața superioară verde-gălbuie, cea inferioară glaucescentă, la început pubescentă apoi complet glabră. Nervura principală proeminentă, alburie. Pețiol puternic, de 2,5—7 cm lungime. Flori solitare, mari, apar după înfrunzire. Perigon petaloid, format din 3 foliole externe albroșcate și din 6—9 foliole interne albe-gălbui, consistente, de forma linguirii, foarte odorante. Apocarp cilindro-conic alungit sau măciucat, de 12—18 cm lungime și 6 cm în diametru, roșu-stăcojiu. V—VI.

Răsp. în țară: Cultivată prin parcuri și grădini, de exemplu la Cluj în Grădina Botanică, Simeria în parcul dendrologic.

Răsp. gen.: Japonia, R.P. Chineză, unde formează păduri pe versanții nordici ai munților.

✱ *M. Kobus* DC. Syst. nat. I (1818) 456.

♂ — 10 m sau ♀, cu lujeri verzi, glabri, mai târziu roșietici. Frunze oblong obovate, de 6—16 cm lungime și 2,5—9 cm lățime, acuminate, cu baza în general treptat îngustată și pețiol de 1—1,8 cm lungime. Dosul frunzei cu nervuri pronunțate, reticulate, alburii, datorită unor peri albi ± încrețiți. Fața frunzei deplin desvoltată glabră, netedă, de un verde lucitor. Flori albe, mari, de aproximativ 10 cm în diam., apar înainte de înfrunzire. Foliolele periantului constau din 3 sepale înguste, verzui, lungi de 1,5 cm și din 6—9 petale oblong obovate, albe, la exterior și spre bază cu o dungă

spălăcit purpurie. Stilul recurbat spre vârf. Apocarp cilindric, lung de 10—12 cm, ușor roșcat. Sămânța închis roșcată. IV—V.

Răsp. în țară: Cultivată prin parcuri și grădini, de exemplu la Cluj în Grădina Botanică, Simeria în parcul dendrologic, Timișoara în parcul Școlii Silvice.

Răsp. gen.: Japonia.

* **M. stellata** Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. XVII (1872) 419. — Ic: Pl. 63, fig. 4, 4a—b.

5—3 m, cu lujerii tineri și mugurii acoperiți cu peri mătăsoși, Frunze de forme și mărimi diferite, obovate, îngust eliptice sau oblong obovate, până la 10 cm lungime și cca 5 cm lățime, cu vârful aproape obtuz și cu baza treptat atenuată într'un pețiol scurt, de 0,9—1,3 cm lungime. Frunzele pe față de un verde pronunțat și cam sbârcite, pe dos de un verde mai deschis, glabre sau slab pubescente dealungul nervurilor reticulate. Flori albe, scurt pedunculate, de cca 8 cm diametru, cu 9—18 foliole perigoniale, conforme, îngust alungite, radier sau stelat divergente, mai târziu răsfrânte în jos. Stamine puține. Apocarp de 3—5 cm lungime, cu mai multe folicule. Infloresțe cu mult înainte de înfrunzire. III—IV.

Răsp. în țară: Cultivată în parcuri și grădini, de exemplu la Cluj în Grădina Botanică, Timișoara în Parcul Școlii Silvice, București în Grădina Botanică, în Grădina Cișmigiu, etc.

Răsp. gen.: Japonia, unde formează păduri.

* **M. glăuca** L. Syst. nat. ed. X (1759) 1082. — *M. virginiana* α *glauca* L. Sp. pl. ed. I (1753) 535.

5, 5—10 m. Scoarța cenușie, se exfoliază în solzi mărunți. Lujeri păroși numai în tinerețe, apoi de obicei glabri, măslinii-verzui. Muguri slab păroși, ± glauci, de cca 2 cm lungime. Frunze eliptice sau oblong lanceolate, pe față glabre, de culoare verde intens, pe dos verzi albăstrui, până la aproape abe și ± fin păroase, de 6—18 cm lungime și 3—6 (7,5) cm lățime, cu pețiole de 1—2,5 cm lungime. Florile de 7—10 cm diametru, albe gălbui, cu un perigon cu 9—12 foliole, apar după înfrunzire. Apocarp roșu închis, glabru. VI—VIII.

Răsp. în țară: *Reg. Hunedoara*: Simeria în Parcul dendrologic (singurul exemplar din țară).

Răsp. gen.: America de N.

* × **M. Soulangeana** Soulange-Bodin in Ann. Soc. d'Hort. Paris (1826) 90 = *Yulan* × *liliflora*.

♂. Frunze obovate, de obicei acuminate, spre bază treptat îngustate, pe dos dealungul nervurilor, pubescente, cu pețiol de peste 2 cm lungime. Flori albe, formate din 3 foliole perianțiale petaloide externe, mai scurte și din 6 interne mai lungi (—10 cm), uneori și foliolele externe sunt aproape la fel de lungi, iar la bază și dealungul nervurii mediane \pm roșcate. Florile se deschid concomitent cu frunzele sau și după înfrunzire. Apocarp cilindric, cu axa ușor curbată.

Acest hibrid prezintă caractere variabile, apropiindu-se când de unul, când de celălalt părinte. Pe lângă aceasta prezintă mai multe forme și variații de cultură: var. *amabilis*, var. *Lennei*, var. *Alexandrinae* Hort., mult cultivate ca plante de ornament.

Intrebuintări. Datorită florilor lor mari și în general frumos mirositoare, ce apar primăvara de timpuriu, la unele chiar înainte de înfrunzire, speciile de *Magnolia* sunt cultivate prin grădini ca plante ornamentale.

Obs. În cheia analitică a speciilor genului *Magnolia* figurează și următoarele specii: *M. macrophylla* Michx. Fl. Bor. Am. I (1804) 327, *M. tripetala* L. Syst. ed. X (1759) 1082, *M. liliiflora* Desr. in Lam. Encycl. III (1789) 675 și *M. Yulan* Desf. Hist. Arb. II (1809) 6. Ele n'au fost descrise detaliat, deoarece sunt numai foarte rar cultivate la noi; vor putea fi identificate totuși după caracterizarea scurtă din cheia de mai sus.

Genul **LIRIODENDRON** *) L.

[Coroll. gen. (1737) 9, nr. 960], Gen. pl. ed. V (1754) 239, nr. 609.

Caracterizarea genului la fel cu cea a speciei.

L. Tulipifera L. Sp. pl. ed. I (1753) 535; Palib. in. Fl. U.R.S.S. VII (1937) 565, tab. XXXIX, fig. 1. — Ic.: Pl. 63, fig. 1, 1a.

♂ — 30 m, cu trunchi puternic, abundent ramificat. Lujerii tineri de culoare brună sau brună-verzuie, glabri, lucitori sau ușor brumați. Măduva discontinuă, întreruptă. Muguri comprimați lateral și \pm pedicelați, înveliți complet într-o pereche de solzi bracteali bruni, glabri. Frunze lungi de 7—12 cm, de formă caracteristică, aproape pătrată, cu vârful știrbit, prezentând 4 lobi acuți, glabre, în general polimorfe, de culoare verde lucitoare pe fața superioară și verde deschis sau verde-albăstruie pe cea inferioară, cu pețiolul lung de 5—10 cm; toamna iau o colorație intens galbenă, aurie. Stipele întregi, ovate, mari, acopăr la început mugurii, apoi cad de timpuriu. Flori mari, campanulate, cu

*) După grecescul «leirion» = crin și «dendron» = arbore, din cauza asemănării florilor acestui arbore cu lălelele (nu cu crinul adevărat — *Lilium candidum*), de aici și numele specific de *Tulipifera*.

aspect de lalele, galbene-verzui sau galbene-sulfurii, cu dungi portocalii, așezate solitar la extremitatea ramurilor. Periant compus din 3 foliole externe verzui, ovat lanceolate, divergente sau reflecte, caduce și 6 foliole interne, erecte, oblong obovate, galbene-sulfurii, la bază cu o pată alungită, portocalie. Stamine numeroase, cu antere extrorse. Apocarp conic, de 6—8 cm lungime, cu numeroase nucule libere, cu câte o aripă unilaterală, de 2,5—3,5 cm lungime. VI—VIII.

Introdus în Europa din 1688, se găsește uneori subspontan, în stațiuni adăpostite, pe soluri fertile, lutoase, permanent reavăne.

Răsp. în țară: Cultivat ca arbore ornamental prin parcuri și grădini.

Răsp. gen.: America de N.

Fam. 30. RANUNCULÁCEAE *) A.L. Juss.

Gen. (1789) 231.

Plante anuale până la perene, uneori arbuști. Frunze alterne, mai rar opuse, de obicei divizate, rar întregi, nestipelate. Flori hermafrodite, actinomorfe, rar zigomorfe, așezate în inflorescențe cimoase sau racemoase. Periant ¹⁾ de regulă simplu, petaloid, cu 4—5 piese. Între periant și androceu se află foliole nectarifere, foarte variate ca formă și mărime (uneori lipsesc). Stamine numeroase, așezate spiralat, \pm libere, deschizându-se longitudinal. Gineceu superior, cu 1-multe carpele apocarpe (la *Nigella* 5 carpele concrescute), cu 2 rânduri de ovule prevăzute cu 1—2 tegumente, așezate pe sutura ventrală a carpelei. Fructe folicule (triburile *Paconiaee* și *Helleboreae*) sau nucule ²⁾ uscate sau \pm cărnoase (tribul *Anemoneae*). Seminte cu endosperm bogat în ulei. Embriion mic, drept.

Familia Ranunculaceae cuprinde cca 1200—1500 specii, majoritatea răspândite în regiunile extratropicale nordice. La noi se cunosc 25 genuri cu peste 100 specii și numeroși hibrizi.

*) Prelucrată de A. Nyárády, excl. Genul *Aconitum*.

¹⁾ La unele genuri (*Hepatica*, *Clematis*, *Thalictrum*, *Caltha*, *Actaea*, *Isopyrum* p.p.) periantul este simplu și nectariile lipsesc. Altă categorie de genuri prezintă, pe lângă periant, nectarii de diferite forme și dimensiuni. Astfel la genurile *Atragene*, *Trollius*, *Helleborus*, *Eranthis*, *Nigella*, *Isopyrum* p.p. *Cimicifuga*, *Anemone*, *Pulsatilla* p.p., nectariile sunt mai mici decât periantul și au forma de cornet, pungă sau limbă. La genurile *Delphinium*, *Aquilegia*, *Aconitum*, nectariile sunt mari, depășesc periantul și au forma de cornete sau pinteni. La genurile *Callianthemum* și *Ranunculus*, precum și la genurile înrudite *Myosurus*, *Ceratocephalus*, *Batrachium* și *Ficaria*, nectariile sunt mari, foliiforme, colorate, depășesc periantul, în care caz pot fi considerate drept petale, alcătuind un al doilea înveliș floral (periant dublu).

²⁾ Pentru fructele apocarpe nedehiscente dela *Ranales* și *Rosales*, întrebuițăm termenul de *nucule* în loc de achene, fructulețe, nucușoare, etc., iar pentru cele dehiscente, termenul de *foliculă* în loc de capsulă, termen rezervat pentru fructele sincarpice. Termenul *achenă* rămâne rezervat pentru fructele sincarpice provenite dintr'un gineceu inferior (Fam. *Compositae*). Nueulele și foliculele sunt grupate pe un receptacul de diferite forme, alcătuind un *apocarp*, grupare numită și fruct multiplu (incorect numit policarp, poliachenă, cariopsă, etc.).

Determinarea genurilor

- 1 a Flori cu simetrie bilaterală (zigomorfe) 2
- 1 b Flori cu simetrie radiaară (actinomorfe) 3
- 2 a Foliola superioară a periantului petaloidă, transformată în coif, acoperind 2 pintenii lung stipitați 116. **Aconitum**
- 2 b Foliola superioară a periantului netransformată în coif, cu pinteii nestipitați 115. **Delphinium**
- 3 a Frunzele tulpinale opuse 4
- 3 b Frunzele tulpinale alterne, uneori numai frunze involucrale sau bazale 5
- 4 a Periant format din 4 (5) foliole mari, albastre-violete, Nectarii 10—12 sau mai multe, spatulate, albe, mai scurte decât periantul. Frunze biternate, cu pețioii lungi, cu 8—9 foliole ovate oblongi, acuminate, inegal și îndesuit inciz serate. Plantă de pădure din etajul montan și subalpin, cu tulpină urcătoare sau volubilă; cu flori solitare, lung pedunculata 120. **Atragene**
- 4 b Periant simplu, numai din 4 (5) foliole petaloide, albe, roșii sau violete. Nectarii reduse sau lipsă. Frunze întregi, sesile sau compuse și pețiolate, cu foliole întregi, lobate sau crenate. Plante cu tulpină erectă sau volubilă 121. **Clematis**
- 5 a Flori pinate 6
- 5 b Flori nepinate 7
- 6 a Flori 1-multe, albastre, albastre-purpurii sau albe. Frunze mari, compuse. Folicule (5) mari. Plante perene ± înalte . . . 114. **Aquilegia**
- 6 b Flori mici, galbene, solitare și terminale, pe tulpină scapiformă. Frunzele tulpinale lipsesc, cele bazale întregi, liniare, Nucule mici, multe, așezate pe un receptacul lung de 1—6 cm. Plante mici, anuale 122. **Myosurus**
- 7 a Fructe nucule monosperme, numeroase 8
- 7 b Fructe 1-multe folicule polisperme sau bace 17
- 8 a Periant simplu, cu 4 sau mai multe foliole petaloide 9
- 8 b Periant compus din caliciu și corolă sau din 3—5 foliole sepaloide și nectarii petaloide 12
- 9 a Frunzele involucrale lipsesc. Flori mici, numeroase, adunate în inflorescențe. Periant simplu, din 4 (5) foliole albe, caduce. Stamine numeroase, colorate în galben sau violet viu. Frunze compuse . . . 128. **Thalictrum**
- 9 b Tulpină cu 3 frunze involucrale sesile sau pețiolate, întregi sau profund divizate, dispuse în verticil. Flori cu periant simplu, din 5-multe foliole viu colorate, bine dezvoltate 10
- 10 a Frunze involucrale mai mici decât foliolele albastre ale periantului, întregi sau cu 1—2 dinți, așezate imediat sub floare, apar ca niște seale. Frunze radicale 3-lobate, cu lobi întregi sau crenati. . . . 118. **Hepatica**

- 10 b Frunze involucale mari, profund divizate sau ternate, asemănătoare celor bazale, așezate îndepărtat de floare 11
- 11 a Nucule cu câte o prelungire lungă, păroasă. Periant albastru-violet sau liliachiu, la exterior vilos păros 119. **Pulsatilla**
- 11 b Nucule fără prelungire pronunțat păroasă, de regulă numai cu cioc scurt, nepăros. Periant alb sau galben 117. **Anemone**
- 12 a Periant dublu, cu caliciu verde sau altfel colorat, din 5 sepal și corolă cu 5-multe petale galbene sau roșii 129. **Adonis**
- 12 b Periant din 3—5 foliole sepaloide (caliciu). Nectarii 5 petaloide (corolă), depășind periantul 13
- 13 a Nucule turtite lateral, lung rostrate, cu rostru drept sau falcat, la bază cu 2 tuberozități (loje) goale. Receptacul foarte alungit. Flori mici, solitare, terminale, galbene, pe tulpini scapiforme, scurte. Frunze bazale sectate, cu lobi liniari. Intreaga plantă dens suriu-alb păroasă 123. **Ceratocephalus**
- 13 b Nucule \pm globuloase, cu rostru scurt, drept sau \pm curbat. Plante mai înalte, cu tulpini de obicei frunzoase 14
- 14 a Tulpină numai cu 1—2 frunze involucale sesile, cu 1—2 flori. Flori cu 5—10 sepal și 10—20 petale albe sau albe-liliachii, numai în jurul gropițelor nectarifere colorate în galben. Frunze bazale lung petiolate, ca și cele involucale, de 2—3 ori ternat penate. Plantă perenă, glabră, din regiunea subalpină și alpină 124. **Callianthemum**
- 14 b Plante cu alte caractere 15
- 15 a Toate frunzele lat ovate, nedivizate, cu margini întregi, la vârf rotunjite, la bază cordate. Sepale 3 (—7), petale 8—10 (12) galbene. Rădăcină cu fibre tuberizate și bulbili în subțioara frunzelor . . 126. **Ficaria**
- 15 b Cel puțin frunzele inferioare lobate, partite sau sectate, adesea cu segmente liniare sau filiforme, uneori numai pe margini crenate, dințate sau serate, mai rar lanceolate sau alungit îngust ovate, cu margini întregi. Flori albe sau galbene 16
- 16 a Flori solitare, pedunculate, axilare, opuse frunzelor involucale (tulpinale). Sepale 5. Petale de obicei 5, albe, la bază cu gropițe nectarifere deschise, galbene. Peduncul fructifer \pm arcuit. Plante acvatice, cu frunze natante cordat reniforme, lobate sau submerse, cel puțin în parte multifidate, sectate până la bază, cu lacinii \pm îngust liniare sau filiforme. Specii cu frunze natante și submerse (heterofilie); vremelnic pot viețui și în nămol umed, în care caz laciniiile frunzelor devin mai late 125. **Batrachium**
- 16 b Flori terminale sau axilare, pedunculate, rar sesile, se dezvoltă din subțioara frunzelor involucale (tulpinale). Peduncul fructifer erect. Sepale 3—7, de obicei 5. Petale 5 (—12), galbene sau albe, la bază cu gropițe nectarifere de obicei acoperite cu scvame. Plante terestre sau numai cu partea inferioară a tulpinii în apă . . 127. **Ranunculus**

- 17 a Fructe 1 (2) bace ovoide, multisperme, lucioase, negre. Inflorescența un racem scurt, cu flori mici, albe, scurt pedunculate. Frunze mari, pețiolate, de 2—3 ori ternat sectate, cu segmente ovate sau ovate acuminat, pe margini acuminat biserate 112. **Actaea**
- 17 b Fructe 1 până la multe folicule 18
- 18 a Frunze nedivizate, rotunde sau rotund reniforme, cu margini dințate sau crenate, pețiolate sau cele superioare sesile. Tulpină \pm ramificată, multifloră, cu flori galbene. Folicule multe. Plantă perenă din locuri umede sau mocirloase 107. **Caltha**
- 18 b Frunze \pm adânc divizate sau compuse 19
- 19 a Floare cu involucru multipartit, cu segmente îngust liniare sau mai late 20
- 19 b Floare lipsită de involucru 21
- 20 a Frunze involucrale multipartite, cu segmente liniare. Flori azurii. Tulpină \pm ramificată, frunzoasă, cu frunze de 2—3 ori penatipartite, cu lacinii înguste, liniare. Folicule umflate, până la vârf concrescute. Plante anuale 110. **Nigella**
- 20 b Frunze involucrale 3, verticilate, \pm până la bază palmatipartite. Tulpină neramificată, lipsită de frunze tulpinale, unifloră. Flori galbene. Baza tulpinii (în sol) globulos tuberizată. Frunza bazală lung pețiolată și palmat fidată, de obicei se desvoltă după înflorire. Plante perene 109. **Eranthis**
- 21 a Folicule 2—5, mari, des catifelat păroase. Flori solitare foarte mari. Sepale 5, persistente. Petale 5—8 sau mai multe, lungi de cca 6 cm, roșii-purpurii sau roze, rar albe. Frunze de 2—3 ori ternate, cu foliole late, eliptice sau lanceolate sau multiternat penate, cu foliole îngust liniare. Rădăcină cu ramuri tuberizate 105. **Paeonia**
- 21 b Folicule 2, sau mai multe, glabre. Plante cu alte caractere. 22
- 22 a Periant persistent, verde sau la exterior roșu-violet nuanțat, pielos. Frunze palmatisectat pedate, cu segmente \pm dințate pe margini. Nectarii în formă de cornet 108. **Helleborus**
- 22 b Periant caduc 23
- 23 a Flori mici, albe, scurt pedunculate, dispuse în racem compus, lung și des. Frunze mari, compuse, de 2—3 ori ternat-sectate, cu segmente ovale, acuminate, cu margini dințate. Folicule 2—8 113. **Cimicifuga**
- 23 b Flori puține, de obicei lung pedunculate 24
- 24 a Flori albe. Frunze de 1—2 ori ternat compuse, cu foliole late, obtuz lobate. Folicule 1—3, scurt rostrate. Plante din locuri umbroase 111. **Isopyrum**
- 24 b Flori galbene sau albastre, rar albăstrui 25
- 25 a Flori galbene, mari, bulbucate. Frunze mari, \pm până la bază palmatisectate. Folicule mici, numeroase. Plante perene 106. **Trollius**

- 25 b Flori albastre sau albăstrui-albe. Frunze cu segmente îngust liniare. Folicule 3—5 (6) la bază sau până la mijloc \pm concrescute. Plante anuale 110. *Nigella*

Tribul I. *Paeoniae* Bernh. in Linn. VIII (1833) 452, excl. *Caltha* et *Actaea*.

Flori mari, de obicei solitare, fără nectarii, cu înveliș floral diferențiat în caliciu persistent și corolă caducă, viu colorată. Carpele cu pereți cărnoși. Fructe folicule multisperme, la exterior catifelat des păroase, numai rar glabrescente. Ovule cu 2 integumente, cel extern mai gros și mai lung. Placenta ovulelor marginală; ovulele așezate în 2 șiruri, dealungul suturii ventrale.

Genul 105. *PAEONIA* *) L.


Gen. pl. [ed. I (1737) 157, nr. 445], ed. V (1754) 235, nr. 600. — *B u j o r*.

Plante perene, la noi erbacei, cu tulpini erecte, simple sau rar (cele cultivate) lemnoase, ramificate. Rădăcină groasă, noduros lemnoasă, cu fibre tuberizate. Frunze alterne, de 2—3 ori ternate sau ternat multipartite. Flori mari, actinomorfe, solitare. Sepale 5, lat ovate, inegale, persistente. Petale 5—8, obovate, de cca 5—6 cm lungime, mai lungi decât separele, roșii sau purpurii, la specii cultivate și de alte culori. Sub caliciu se află adeseori frunze involucreale întregi sau divizate. Stamine numeroase, uneori transformate în petale. Carpele 1—5, de obicei păroase, cu stigmat sesil sau aproape sesil. Fructe 1—5 folicule mari, polisperme, cu pereți cărnoși, lanuginoase sau catifelte, rar \pm glabrescente. Semințe mari, netede lucitoare, fixate pe două șiruri dealungul suturii ventrale a foliculelor.

Determinarea speciilor

- 1 a Frunze ternat multipartite, cu segmente îngust liniare, late de 1—2 mm sau mai rar îngust lanceolate, late de 3—8 (—10) mm 4. *P. tenuifolia*
- 1 b Frunze de 2—3 ori ternate, cu foliole ovate sau lat lanceolate, de regulă mai late de 2 cm, întregi sau din nou divizate 2
- 2 a Foliole întregi, de regulă nu sunt lateral lobate 3
- 2 b Foliole, mai ales cele terminale, uni- sau bilateral lobate, sectate sau penatilobate, numai rar unele rămân întregi 4
- 3 a Foliole lat ovate sau aproape subrotunde, obtuze, rar acute. Foliole terminale petiolate, cele laterale sesile sau subsesile, la bază rotunde, numai foarte rar \pm cuneate, \pm glaucescente, glabre 2. *P. triternata*

*) După numele plantei «paionia», bujor la Theophrastos (372—287 î. e. n.).



- 3 b Foliole lat lanceolate, lat eliptice sau oblong eliptice, la bază \pm cuneate și decurente, glaucescente 1. **P. corallina**
- 4 a Foliole lanceolate sau îngust lanceolate, \pm întregi sau unilateral lobate, cele terminale adeseori bilateral lobate sau sectate, verzi, pe dos glaucescente \pm dispers păroase și lung decurente . . . **P. officinalis**
- 4 b Foliule ovate oblongi, rar lanceolate, 2—3- sectate sau \pm penatilobate, cu lobi ovate lanceolați, întregi sau \pm inciz dințați . 3. **P. peregrina**

1. **P. corallina** Retz. Obs. III (1783) 34. — *P. officinalis* β *mascula* L. Sp. pl. ed. I (1753) 530. — *P. banatica* Auct. hung et alii, non Roch. — Exs.: FHE nr. 739, sub *P. off.* var. *banatica*, p.p. — Ic.: Pl. 65, fig. 2, pro var. *triternatifomis*.

4. Fibrele radicale fusiform îngroșate, sesile sau scurt pedunculate. Tulpini neramificate, înalte de cca 50—70 cm, uniflore. Frunze inferioare și mijlocii biternate, mari, cele următoare se micșorează treptat. Frunze superioare simplu ternate, cele supreme simple sau puțin divizate. Foliule întregi, lat lanceolate, lat eliptice sau oblong eliptice, la vârf acute, obtuze sau \pm rotunjite, la bază \pm cuneate și decurente, pe dos alb glaucescente, \pm pubescente sau glabriuscule, pe față subglaucescente. Flori purpurii. Folicule 2—5, orizontal divergente, \pm curbate, des păroase IV—V.

Stațiunea. Prin locuri ierboase, coaste cu tuferișuri și păduri rărite.

Răsp. în țară: Răspândită mai ales în Reg. Timișoara în diverse forme, după cum urmează.

Variabilitatea speciei

var. **typica** Huth in Engl. Jahrb. XIV (1891) 269. — *P. off.* var. *banatica* Jáv. in Sched. ad FHE nr. 739, non Rochel. — Foliule lat lanceolate sau obovat lanceolate, \pm acute sau obtuze, la bază \pm cuneate, adeseori cele laterale contopite, pe dos glaucescente, pubescente sau glabrescente. — **Reg. Timișoara:** pe coaste ierboase, stâncoase, deasupra comunei Baziaș (r. Moldova Nouă).

var. **triternatifórmis** A. Nyár. var. nova in Add. pag. 675. — Ic.: Pl. 65, fig. 2. — Foliule lat ovate sau lat obovate, uneori aproape subrotunde, subacute, obtuze sau subrotunjite, pe dos albe-glaue, de obicei glabre, pe față glaucescente, \pm pielose, subrotunde, \pm cuneate mai rar decurente. — **Reg. Timișoara:** împreună cu var. *typica* la Baziaș.

Răsp. gen.: Europa de S.

2. **P. triternáta** Pall. Ind. pl. Taur. in Nov. Act. Petrop. X (1797) 312; Schipcz. in Fl. U.R.S.S. VII (1937) 28. — *P. corallina* β *triternata* Boiss. Fl. or. I (1867) 97. — *P. corallina* Auct. rom., [non Pall. — Ic.: Pl. 66, fig. 2 (din Simferopol); Dobrescu in Ann. Scient. Iassy XXVI (1949) 7—9, cum tab.

4. Unele fibre fusiform îngroșate, sesile sau subsesile. Frunze 2 (3)-ternate, cu foliole lat ovate sau aproape rotunde, obtuze sau subrotunde, rar

acute, pieiloase, pe ambele fețe \pm glauce, la bază rotunde, numai foarte rar \pm cuneate, cele laterale sesile sau subsesile, cele terminale pețiolulate, peste tot glabre. V—VI.

Stațiunea. Pe coaste deschise sau păduroase și stâncoase.

Răsp. în țară: *Reg. Craiova*: Mt. Ciocanu (Drumul Hoțesc și « Gionovăț ») aproape de Vârciorova (r. Severin). *Reg. Ploiești*: Salcia pe « Plaiul Sărății », Mrea Ciolanu pe Dl. « Poiana Rotundă » (r. Buzău).

Răsp. gen.: Crimeea, Caucaz.

3. **P. peregrina** Mill. Gard. Dict. ed. VIII (1768) nr. 3. — *P. decora* Anders. in Trans. Linn. Soc. XII (1817) 273. — *P. officinalis* Auct. rom., non. L. — Bujor românesc. — Idegensöldi bazsarózsa. — Gemeine Pfingstrose. — Exs.: FRE nr. 1698 sub *P. rom.* — Ic.: Pl. 65, fig. 3 Țro var *romanica*.

4. Unele fibre radicale tuberizate, oblong elipsoide. Tulpină erectă, înaltă de 50—80 cm, neramificată, de obicei unifloră, subcilindrică sau subsulcată, glabră. Frunze inferioare lung pețiolate, biternate, cu foliole ovate oblongi, rar lanceolate, 2—3-sectate sau \pm penati lobate, cu lobi ovate lanceolați, întregi sau \pm dințați, cele superioare succesiv mai puțin sectate, cele supreme cu rol de involucriu. Foliole terminale \pm lung pețiolulate, glabre, pe față verzi închise, pe dos verzi deschise, glaucescente. Flori mari, de culoarea sângelui. Sepale 5—6, inegale, subfoliacee. Petale 7—11, obovat cuneiforme, lungi de 5—7 cm. Stamine numeroase, cu antere mai scurte decât jumătatea filamentelor. Carpele (ovare) 2—3 (4), catifelat tomentoase, la maturitate divergente, \pm subarcuite. Stigmat lung, roz sau purpuriu, lameliform, recurbat. V—VI.

Stațiunea. Poieni și marginea pădurilor, în regiunea de câmpie.


Răsp. în țară: Vezi la varietățile de mai jos.

Variabilitatea speciei

var. **typica** A. Nyár. var. nova in Add. pag. 675. — Exs.: FRE nr. 1698 sub *P. romanica*. — Foliolele frunzelor în parte întregi, unele la vârf sectate sau numai dințate. — *Reg. Craiova*: Plenița. *Reg. București*: Comana (Păd. Comana la Crucea lui Gligore, V. Gurbanului), Mihai Bravu (r. Vidra); Ghimpați în Păd. Ghimpați (r. Mihăilești). *Reg. Galați*: Greci pe Dl. Grecilor (r. Măcin); Filimon Sârbu pe Mt. Consul (r. Tulcea); Puțeni în Păd. Găunoasa, Băneasa în Păd. Rediul Dogarului pe V. Slivna (r. Bujoru). *Reg. Bârlad*: Bârlad (Grec. Cnsp.).

var. **românica** (Brandza). — *P. decora* Brandza in Bul. Soc. geogr. rom. (1876) 77, non Anders. — *P. romanica* Brandza Prodr. Fl. Rom. (1879) 38. — Ic.: Pl 65, fig. 3; Brandza

Plansa 66. — 1. *Paeonia tenuifolia* L., 1a. fruct. — 2. *P. tritermata* Pall. — 3. *Myosurus minimus* L., 3a. o porțiune din fruct (mărit).



in Anal. Acad. Rom. Ser. II. tom. II, sect. II (1881) 537 — 538, tab. 1. — Foliole \pm segmentate, mai rar cele terminale penatisectate, adeseori cu segmente 1 — 3 dințate. — *Reg. Constanța*: Basarabi, între Tuzla și Mangalia (r. Constanța); Babadag, Baia. *Reg. Galați*: Niculițel, între Agighiol și Mihail Cogălniceanu (r. Tulcea). — Impreună cu tipul însă foarte rar, mai ales în *Reg. Constanța*.

Răsp. gen.: Balcani.

O b s. Recent, de multe ori a fost pusă în sinonimie la *P. peregrina* și *P. romanica* Brandza. *P. peregrina* tipică crește în mai multe locuri la noi, însă cele ce cresc mai ales în Dobrogea au frunze și foliole mai adânc și mai dens sectate. Pentru aceasta trebuie să menținem numele de *romanica*.

* *P. officinális* L. Sp. pl. ed. I (1753) 530, excl. var. β em. Gouan Fl. Monsp. (1765) 266. — *P. mascula* Mill. Gard. Dict. ed. VIII (1768) nr. 1, non Desf. — *Ic.*: Pl. 66, fig. 1, 1a.

4. Tuberculii radicali alungiți, pedunculați. Tulpină de obicei neramificată, înaltă de 30—60 cm, unifloră, glabră. Frunze de 2—3 ori ternate, cu foliole îngust lanceolate până la lat lanceolate, acute, \pm întregi sau unilateral lobate, cele terminale de obicei bilateral lobate sau sectate, verzi, pe dos \pm glaucescente, \pm răzleț păroase, lung decurente. Petale 5—8 (-10) obovate, de 5—6 cm lungime, roșii. Folicule 2—3 (4), catifelat dens păroase, mature \pm divergente. Semințe mari, ovate, negre-albăstrui, lucitoare. V—VI.

Stațiunea. Frecvent cultivată, uneori sălbătică. Spontană numai sub var. *banatica*.

Variabilitatea speciei

* var. *eufeminea* Graebn. in A. et G. Syn. V. 2 (1923) 555. — Reprezintă tipul speciei. Frunze 2 — 3-ternate. Foliole îngust lanceolate sau lanceolate, întregi sau unele unilateral adânc sectate, cele terminale adeseori în formă de evantai, adânc 2 — 4-lobate, cu lobi întregi. Se cultivă foarte frecvent pretutindeni, în diferite forme horticole, ca plantă ornamentală, precum și ca plantă medicinală. Uneori sălbătică.

var. *banatica* (Roch.) Graebn. l. c. (1923) 556. — *P. banatica* Roch. Pl. Ban. rar. (1828) 48, tab. XI, fig. 25. — *Ic.*: Roch. l. c.; Rechb. Ic. Fl. germ. IV. tab. 125, fig. 4741 c, pl. ex Banatu. — Frunze biternate, cu foliole lanceolate, lat lanceolate sau oblanceolate, întregi, rareori cele terminale până la bază fidate; segmentele asemănătoare foliolelor. — *Reg. Timișoara*: rar la Baziaș (r. Moldova Nouă); Lugoj, Buziaș. *Reg. Oradea*: Dumbrăvița (r. Beiuș). — Locul clasic al acestei plante este în Jugoslavia, pe nisipurile Deliblatului (« Bielo-Brdo »), aproape de frontiera noastră.

O b s. După datele literaturii, în privința cunoștințelor formelor de *Paeonia* ce cresc spontan în flora R.P.R., există nesiguranță. În special *P. banatica* Roch. a fost dubioasă. În ultimul timp, în FHE cu nr. 739, a fost editată planta colectată dela Baziaș sub numele de *P. off.* var. *banatica*. Pentru a putea desluși chestiunea, în primul rând trebuie să cercetăm planta clasică, pentru care ne stau la dispoziție descrierea și desenul original al lui Rochel. S'a dovedit că planta *P. banatica* a fost descrisă de pe nisipurile Deliblatului și nu este nici-

decum identică cu planta ce crește la Baziaș. Cunoaștem bine locul de creștere de la Baziaș, având material bogat de acolo, pe care studiindu-l, am obținut un rezultat surprinzător. Planta dela Baziaș este variabilă și crește cel puțin în două forme deosebite, dar niciuna nu este identică cu *P. banatica* cea veritabilă, deși în Herb. Univ. din Cluj se află un exemplar vechi, corespunzând plantei *P. banatica*, semnalată din Baziaș. În literatura din R.P.R. este amintită *P. banatica* dela Lugoj, Buziaș și Dumbrăvița (Reg. Bihor), pe care le-am amintit și noi, fără ca să fi putut cerceta plantele care au crescut acolo.

Pe calea măsurării foliolelor am putut stabili că atât foliolele dela *P. officinalis*, cât și cele dela *P. banatica* din locul clasic, în general sunt de 3 — 4 ori mai lungi decât late, pe când foliolele plantelor dela Baziaș sunt numai cu 1,4 — 2 (3) mai lungi decât late, din care cauză ele se pot deosebi la prima vedere. Prin urmare *P. banatica* corespunde mai mult cu *P. officinalis*.

Planta dela Baziaș coincide prin toate caracterele sale mai mult cu *P. corallina* din ținuturile ilirice, cu care are legătură și din punct de vedere geografic. *P. corallina* dela Baziaș este foarte variabilă și formele sale cu frunze oblong rotunde, de cca 1,4—2 ori mai lungi decât late, ne reamintesc mult pe *P. triternata*. A trebuit, deci, să o deosebim ca o formă aparte.

În trebuințări. Pentru florile mari, viu colorate, ca și pentru forma ei tufoasă, bogat frunzoasă, se cultivă mult ca plantă ornamentală. Este cunoscută în diferite forme horticole, cu flori de mărimi și culori diferite, precum și forme cu flori învoalte. Petalele uscate se folosesc pentru colorarea ceaiurilor, etc.

Răsp. gen.: Europa mediteraneeană, Balcani.

4. ***P. tenuifolia*** L. Syst. nat. ed. X (1759) 1079, Sp. pl. ed. II (1762) 748, ampl.; Schiŕcz. in Fl. U.R.S.S. VII (1937) 34. — **Exs.:** HN nr. 5001; FEAH nr. 2080; FRE nr. 249. — **Îc.:** Pl. 66, fig. 1, 1a; Hay. Pflzdecke. (1916) 525; Roch. Pl. Ban. (1828) tab. XII, fig. 26.

4. Tuberculi radicali mari, alungiți, scurt pedunculăți, de obicei goi la interior. Tulpină neramificată, de 10—50 cm înălțime, sulcată, glabră, unifloră (rar bifloră). Frunze ternat multipartite, cu segmente îngust liniare, late de 1—2 mm, sau mai rar îngust lanceolate, late de 3—8 (10) mm, de obicei glabre, pe dos glaucescente. Caliciu persistent, de obicei din 6 seale verzi roșietice. Petale 7—8 (10) lat ovate, lungi de cca 4—5 cm sau mai scurte, purpurii întunecate. Filamentele staminelor purpurii. Antere scurte, galbene. Folicule 2—4 (foarte rar 1 sau 5), erect slab îndoite, dens, catifelat păroase, surii sau purpurii sure. Semințe alungit ovoide, negre-brune, lucitoare. IV—V.

Planșa 67. — 1. *Trollius europaeus* L., 1a. fructul, 1b. var. *transsilvanicus* (Schur) Blocki, fructul. — 2. *Nigella arvensis* L., 2a. foliolă perianțială. — 3. *N. damascena* L. — 4. *N. sativa* L., 4a. foliolă perianțială.



D.

Stațiunea. Pe coline ierboase și locuri însorite, în zona de stepă, sporadică.

Răsp. în țară: *Reg. Cluj:* Zăul de Câmpie (r. Luduș). *Reg. Craiova:* Turnu Severin pe la Crihala spre Breșnița. *Reg. Galați:* Greci (r. Măcin). *Reg. Constanța:* Basarabi (r. Constanța).

variabilitatea speciei

- 1 a Tulpină scundă (— 20 cm). Flori mici, cu petale scurte (— 2 cm)
f. *parviflora* Huth in Engl. Jahrb. XIV (1871) 271. — Împreună cu tipul.
- 1 b Tulpină mai înaltă (20 — 50 cm). Flori mari, cu petale mai lungi de 2 cm. 2
- 2 a Lacinii liniare, late de 1 — 2 mm 3
- 2 b Lacinii lanceolate, numai câteva ± liniare, late de 3 — 6 (8) cm
f. *Biebersteiniana* (Rupr.) N. Busch Fl. cauc. crit. III. 3 (1901) 9. — *P. Biebersteiniana* Rupr. Fl. Cauc. (1869) 47, 288. — *Reg. Cluj:* Zăul de Câmpie pe Dl. Bota (r. Luduș). — Se află împreună cu tipul, dar înfloreste ceva mai târziu (cf. Neir. I. c. 70). — Exemplare din Herb. Univ. Cluj, dovedesc prezența acestei forme la « Fântâna Fetei » lângă Moldovița (Reg. Timișoara, r. Moldova Nouă).
- 3 a Majoritatea laciniilor liniare, late de 1 — 2 mm, de obicei lungi de 1,5 — 3 cm
f. *normalis* A. Nyár. f. nova. in Add. pag. 675. — *Reg. Cluj:* Zăul de Câmpie pe Dl. Bota (r. Luduș). *Reg. Craiova:* Tr. Severin la Crihala spre Breșnița. *Reg. Galați:* Greci (r. Măcin).
- 3 b Majoritatea laciniilor filiforme, late până la 1 mm, lungi numai cât jumătatea celor tipice
f. *brevifolia* (Prod. et Borza) Borza Consp. Fl. Rom. I (1947) 94. — *P. tenuifolia* var. *brevifolia* Prod. et Borza Consp. Fl. Dobr. in Bul. Acad. Stud. Agron. V, 1 (1935) 278, Sep. pag. 106. — Basarabi (r. Constanța).

Intrebuintări. În unele locuri se cultivă ca plantă ornamentală. Hibernează în toată țara fără să fie acoperită contra frigului.

Obs. Genul *Paeonia* cuprinde cca 15 specii, cu centrul de răspândire în Asia centrală și de E. Cele mai multe sunt plante ornamentale folosite în horticultură, cultivate în diferite forme, mai ales cele cu flori pline. Dintre speciile mai frecvent cultivate amintim *P. albiflora* Pall., cu flori albe, originară din Japonia, China, Siberia; *P. Wittmanniana* Hartw., cu flori galbene, originară din Persia, Crimeea; *P. arborea* Donn., originară din China și Japonia, cu flori roze, mari sau foarte mari (var. *Moutan* (Sims.)), cu tulpină lemnoasă, ramificată, înaltă de 1 — 1,5 m și frunze cu foliole ovate și lobate la vârf.

Răsp. gen.: Peninsula Balcanică, stepele Ucrainei, Crimeea, Caucaz.

Tribul 2. Helleboreae DC. Syst. I (1818) 130, 306.

Flori solitare sau așezate în inflorescențe racemoase sau cimoase. Fructe folicule multisperme, de obicei cu pereți subțiri, necărnoși, necatifelat păroase la exterior. Rar fructul o nuculă monospermă (*Callianthemum*), sau bacă multispermă (*Actaea*). Ovule cu integumente de obicei egal dezvoltate, sau cele interne cu puțin mai lungi.

Genul 106. **TROLLIUS*** L.

Sp. pl. ed. I (1753) 656, Gen. pl. ed. V (1754) 243, nr. 620. — Bulbuci.

Plante perene ierboase, cu tulpini de obicei glabre, simple sau \pm ramificate. Frunzele tulpinale de obicei sesile, cele bazale lung petiolate, de 5—7 ori palmat sectate, cu segmente alungit obovate sau obovate, trifide, cu margini \pm lobate și dințate. Flori actinomorfe, globuloase, 1 sau mai multe, mari, cu diametru până la 4—5 cm, solitare, pe un peduncul \pm lung. Foliiolele periantului 5—15, petaloide, galbene, rar verzui, concave, se acoperă, formând o floare globuloasă. Nectarii 5 sau mai multe, înguste, aproape liniare, numai în partea superioară \pm lățite, la bază înguste, cu gropițe nectarifere, mai scurte decât foliolele periantului, de culoare galbenă mai închisă. Stamine multe, de obicei cu antere mai scurte decât $1/2$ filamentelor. Folicule multe, glabre, de obicei cu cioc scurt, erect, sau mai lung și curbat. Folicula imbricată cu ciocul, cca de 1 cm lungime. Semințe globuloase, negre, lucitoare. VI—VII.

T. europaeus L. Sp. pl. ed. I (1753) 556; Schipez. in. Fl. U.R.S.S. VII (1937) 45. — Bulbuci. — Zergeboglár. — Trollblume. — Кипальница европейская. — Exs.: FRE nr. 1699. — Ic.: Pl. 67, fig. 1, 1a, b.

Descrierea speciei este identică cu a genului.

Stațiunea. Poieni de pădure, livezi, tufișuri, din etajul montan și subalpin.

Răsp. în țară: Răspândită aproape în toate regiunile montane și subalpine, în câteva forme.

Variabilitatea speciei

- 1 a Rostrul foliculelor scurt, \pm erect, cât $1/4$ din lungimea foliculei mature..... 2
1 b Rostrul foliculelor lung, \pm curbat, aproape cu $1/2$ mai scurt decât lungimea foliculei mature. Plantă înaltă numai până la 30 cm, unifloră, cu flori mari, cu 10—15 sepale, fin crenate pe margini. Frunze bazale subrotunde, cu 5 segmente lobate sau dințate pe margini.

var. **transsilvânicus** (Schur) Blocki in ÖBZ XXXI (1881) 149. — *T. transilvanicus* Schur Enum. pl. Transs. (1866) 26. — *T. europaeus* var. *Tatrae* Borb. Vasm. nov. és fl. (1889) 244. — Ic.: Pl. 67, fig. 1 b. — *Mții Bârsei*: Piatra Mare, Piatra Craiului. *Mții Bucegi*: Colții Tapului, V. Gaura, V. Cerbului. *Mții Făgărașului*: Negoii.

- 2 a Rostrul foliculelor mature foarte scurt (cca 0,5 mm). Frunze bazale și tulpinale inferioare cu segmente primare obovate, cele secundare alungit ovate, cu margini dințate, \pm lobate. Segmente divergente spre vârf. Flori mari, lung pedunculate. Plante înalte \pm ramificate sau neramificate.

var. **vulgáris** Roep. in Flora III (1820) 105. — *T. europaeus* α . *typicus* et f. *latisectus*

*) Derivat probabil din cuvântul german «Trellblume», latinizat în «trulleus», care înseamnă un vas rotund sau sferic, deoarece floarea acestei plante este globuloasă.

Beck Fl. NÖ I (1890) 395. — *T. europaeus* α . *genuinus* Huth. in Helios Abh. monatl. Mitteil. Naturw. IX (1892) 8. — In etajul montan și subalpin. — *Reg. Baia Mare*: Mții Tîbleșului; Vișeu de Sus, Mții Rodnei: Pietrosul Mare, Piatra Albă, Prislop, Muncel. *Reg. Cluj*: Mții Rodnei: Corongiș, Rabla, Saca, Crăciunel, Ineu, V. Anieșului; Bistrița; Buza (r. Beclean); Canciu (r. Dej); Mții Meseșului: Măgura Prie, V. Poicului, Dl. Cocîunului; Cluj (V. Plecica, V. Morii, Păd. Făget, Mt. Peana, Mănăstur, Fănațele Clujului), Feiurdeni, Gârbău, Someșul Rece, Boj; Aiton, Turda, Muntele Băișoarei, Rimetea, Runc, Poșaga pe Mt. Scărița (r. Turda); Vidra, Scărișoara la Gârda de Sus, Roșia Montană, Mții Bihorului (Mt. Mare), Abrud, Bucium pe Detunata (r. Câmpeni); Ocna Mureșului (r. Aiud). *Reg. Aut. M.*: Ceașul de Câmpie (r. Tg. Mureș); Reghin, Gurghiu, Ibănești, Lăpușna (r. Reghin); Mții Călimani (Mt. Voivodeasa), Bilbor, Borsec (r. Toplița); Remetea, Joseni, Suseni, Voșlăbeni, Izvorul Mureșului (r. Gheorghieni); Mții Giurgeului: Hăghimașul Mare, Mt. «Öcsém», Piatra Singuratică; Racul, Miercurea Ciuc, Tușnad; Sovata, Praid (r. Sângeorgiul de Pădure); Odorhei, Vlăhița, Merești, Ocland, Mții Harghita între Vlăhița și Pasul Tolvaioș (r. Odorhei); Vărghiș, Zagon (r. Sf. Gheorghe); Tg. Săcuesc, Covasna. *Reg. Stalin*: Vorumlac, Medias; Sighișoara; Bod, Hărman, V. Zizinului, Predeal pe Susai, Mții Bucegi (r. Stalin); Mții Făgărașului: Arpașul, V. Bălei, V. Doamnei, Suru, Cocoricu; Sibiu, Noul, Cisnădioara pe Mt. «Götzenberg», Mții Sibiului. *Reg. Hunedoara*: Alba Iulia pe Dl. Mamut; Mții Trascăului: Piatra Ceții, V. Feneșului; Mții Metalici între Mureș și Ampoi (Vf. Stănei, Vf. Mare); Mții Retezatului: Căldarea Zănoagei, Tăul Negru, Șesele; Mții Tarcu-Godeanu. *Reg. Oradea*: Stăna de Vale (r. Aleșd). *Reg. Pitești*: Mt. Ghițu, Mții Făgărașului: Negoiu. Lespezi, Paltina, Râiosul; Câmpulung, Rucăr. *Reg. Ploești*: Mții Bucegi: V. Izvorului Vf. cu Dor, Furnica, Piatra Arsă, Japi, Coștila, V. Cerbului, Schitul Peștera; Sinaia, Bușteni, Azuga. *Reg. Bacău*: Palanca, Pasul Ghimeș (r. Moinești); Piatra Neamț pe Mt. Dumeșnicu și Măgura, Bisericiani; Mt. Ceahlău, Cheile Bicazului, Mt. Ghilcoș, Prisăcani, Tulgheș la Pietrele Roșii, Borca, Broșteni pe V. Neagra (r. Ceahlău); Mrea Neamț. *Reg. Suceava*: Schitul Rarău, Pojorâta pe Mt. Eva (r. Câmpulung); Găureni la fânețele «Găvan», Calafindești la fânețele Horaieț (r. Rădăuți).

f. altissimus (Cr.). — *T. altissimus* Cr. Stirp. austr. II, ed. I (1763) 123. — *T. europaeus* d. *grandis* Schur Sert. (1853) 4 et Enum. (1866) 26. — Plantă înaltă de 50 — 70 cm, ramificată, multifloră, cu pedunculi floral și ramuri erecte. — *Reg. Aut. M.*: Mții Harghita.

f. humilis (Cr.). — *T. humilis* Cr. l. c. (1763) 123. — *T. minimus* Wender. in Flora I (1818) 579. — *T. europaeus* β . *humilior* Koch Syn. ed. I (1835) 19, ed. II (1843 — 45) 21. — Plantă înaltă numai de 8 — 15 cm. Flori 1 — 2, mici, cu sepal lungi de 10 — 13 mm, scurt pedunculate sau aproape sesile, înconjurte de frunze tulpinale superioare ce alcătuiesc un fel de involucriu. — Mții Făgărașului (Arpașul).

f. serotinus (Schur). — *T. eur. c. serotinus* Schur Enum. pl. Transs. (1866) 26. — Tulpină simplă, cu flori foarte mari. — Mții Bucegi.

f. denticulatus Zap. Conspect. Fl. Galic. crit. II (1908) 188. — *T. eur. c. lobatus* Zap. l. c. — Foliiolele periantului egale sau mai mari decât la forma precedentă, 2 — 3-lobate, dințate, la margini galbene-verzui. — Ici-colo împreună cu tipul. — Cluj, la Fănațe.

f. viridis (Mielichhof.). — *T. viridis* Mielichhof. in Flora XXII. II (1839) 492. — *T. eur. c. viridiflora alpina* Schur Sert. (1853) 4, n. nud. — *T. eur. b. viridiflorus* Schur Enum. pl. Transs. (1866) 26. — Tepale exterioare verzi. — Cluj în Păd. Făget; Mții Bucegi.

- 2 b Rostrul foliculelor mature mai lung (1 — 3 mm), erect sau \pm curbat. Frunze bazale și tulpinale inferioare cu segmente primare alungit obovate, cele secundare lanceolate sau lat lanceolate, cele terțiare lanceolate și \pm dințate. Toate segmentele spre vârf divergente. Plante înalte (— 70 cm), de obicei multiflore, cu pedunculi florali lungi. Flori cu diametru de 2 — 3 cm.

var. *médius* (Wender.) Rechb. Ic. Fl. germ. IV (1840) 25, tab. 102, fig. 4713 β . — *T. medius* Wender. in Flora I (1818) 578. — *Reg. Baia Mare*: Mții Țibleșului. *Reg. Cluj*: Mții Rodnei: Coama Prislop, Vf. Muncel, Mt. Crăciunel, Mt. Corongiș; Bucium pe Detunata (r. Câmpeni). *Reg. Aut. M.*: Sovata. *Reg. Hunedoara*: Mții Retezatului (Vf. Slăveiu). *Reg. Bacău*: Tulgheș la Pietrile Roșii.

Răsp. gen.: Europa, Caucaz, America de N. arctică.

Genul 107. *CÁLTHA* *) L.

Gen. pl. [ed. I (1737) 165, nr. 463], ed. V (1754) 244, nr. 623. — *Calcea calului*.


Plante ierbacee 2, din locuri umede, cu rădăcini bine dezvoltate, fibroase, \pm uniform îngroșate. Tulpină erectă sau ascendentă, până la 60—70 cm înălțime, de obicei fistuloasă, glabră, verde, spre bază albă sau roșcat nuanțată, în partea superioară de obicei ramificată, multifloră. Frunze bazale lung pețiolate, întregi, rotunde sau reniforme, cu margini crenate, dințate sau \pm întregi, numai rareori ușor lobate. Frunze tulpinale de obicei pețiolate, cu formațiuni mici, lameloase, stipeliforme, la baza pețiolilor. Frunze superioare mai mici, sesile, de obicei de forma celor inferioare sau bazale. Flori actinomorfe, mari, numai rar mai mici, de obicei solitare pe pedunculi \pm lungi. Invelișul floral un periant simplu petaloid, de obicei cu 5 (rar mai multe) foliole galbene-aurii. Nectariile lipsesc. Stamine multe. Gineceu apocarpic, din 5—8 (rar 2—12) carpele de obicei glabre. Fructe folicule multisperme, terminate într'un rostru de regulă scurt și drept. Sămânța de 2—2,5 mm.

Determinarea speciilor

- 1 a Folicule mature subțiate treptat spre vârf într'un rostru și aplecate aproape orizontal în afară 1. *C. cornuta*
1 b Folicule mature subțiate abrupt într'un rostru de obicei scurt, erecte sau mai rar numai cele exterioare \pm aplecate în afară 2

*) Numele unei plante galbene (probabil *Calendula officinalis* L.) la romani. Cuvântul « caltha » derivă din cuvântul grecesc « cálatos » și înseamnă vas în formă de caliciu. În latinește calathus înseamnă caliciul unei flori.

Planșa 68. — 1, 5. *Caltha laeta* S., N. et Ky. var. *alpina* (Schur) Graebn. exemplar florifer și foliculă, 1a idem, fructifer. — 2, 6, 7. *C. laeta* var. *rostrata* (Borb.). — 3, 4. *C. laeta* var. *alpestris* (S., N. et Ky.) Beck. — 8. *C. laeta* var. *pseudocornuta* Zap. — 9. *C. cornuta* S., N. et Ky.



- a Linia dorsală a foliculei mature dreaptă sau abia curbată .. 2. *C. laeta*
- b Linia dorsală a foliculei mature evident curbată *C. palustris*

1. *C. cornuta* Schott, Nym. et Ky. Analect. bot. (1854) 31. — *C. palustris* ssp. *cornuta* Hegi Fl. Mitt.-Eur. III (1912) 458. — *Ic.*: Pl. 68, fig. 9.

4. Tulpină viguroasă. Lobii frunzelor inciz dințați, la vârf subintegri. Lamina reniform triunghiulară, de cele mai multe ori mai lată decât lungă. Folicule mature arcuit indoite în afară, cele exterioare aproape orizontal patente, \pm în toată lungimea lor egal de late, spre vârf se subțiază într'un rostru ușor curbat. IV—VI.

Stațiunea. Prin bălți, mlaștini, pe marginea pâraielor și prin locuri umede.

Răsp. în țară: Puțin răspândită prin regiunile de dealuri și de munte.

Variabilitatea speciei

var. *typica* Beck in Verh. ZBG Wien XXXVI (1886) 348. — Folicule treptat și lung subțiate în rostru, curbate în formă de « S », svelte, toate aplecate în afară. Lamina \pm crenată, numai lobii mai adânc serați. — *Reg. Stalin*: Daia (r. Sibiu).

var. *latifolia* (S., N. et Ky.) Schur in Verh. NV Brunn XV (1876) 2, (1877) 57. — *C. latifolia* S., N. et Ky. Analect. bot. (1854) 32. — *C. grosseserrata* Pantocsek in Verh. VN Heilk. Pressb. II (1871 — 72) 86. — *C. cornuta* b. *denticulata* Beck Fl. NÖ I (1890) 394. — Foliculă matură curbată în formă de « S », cu un rostru lung de 2,5 mm. Lamina de jur împrejur dur sau adânc serată dentată, mare; marginile lobilor \pm paralele. Plantă viguroasă. — *Reg. Baia Mare*: Mții Rodnei pe Pietrosul Mare. *Reg. Aut. M.*: Borsec.

Răsp. gen: Europa Centrală și Balcani.

2. *C. laeta* S., N. et Ky. Analect. bot. (1854) 32. — *C. palustris* ssp. *laeta* (S., N. et Ky.) Hegi Fl. Mitt.-Eur. III (1912) 458. — *C. palustris* L. s.l. Auct. rom. et. hung. — *Exs.*: HN nr. 5207 sub *C. alpina*; FEAH nr. 3669 sub *C. alpina*; FRE nr. 409,; nr. 408 sub *C. cornuta*; nr. 410 sub *C. alpestris*; nr. 410 b. sub *C. laeta* f. *alpestris*. — *Ic.*: Pl. 68, fig. 1, 1a, 2—8.

4. Se aseamănă cu specia precedentă, de care se deosebește prin folicula matură pe partea dorsală (linia dorsală) dreaptă sau abia curbată, pe cea ventrală curbată, în formă de semicerc sau lat semieliptică, cu rostru \pm lung (1—5 mm), IV—VI.

Stațiunea. Prin bălți, mlaștini, pe marginea pâraielor și prin locuri umede.

Răsp. în țară: Frecventă din regiunea de câmpie până în cea subalpină, în câteva forme.

Variabilitatea speciei

- 1 a Folicule mature \pm erecte, cu linia dorsală \pm dreaptă, pe partea superioară puțin mai late, de unde se subțiază \pm brusc în rostru..... 2
- 1 b Folicule mature exterioare evident oblice sau aplecate în afară, cu linia dorsală \pm arcuit concavă, la mijloc sau spre bază ceva mai late, continuându-se apoi lent în rostru. Folicula împreună cu rostrul până la 1,5 cm lungime
var. **pseudocornuta** Zap. Consp. Fl. Galic. crit. II (1908) 186.—**Exs**: HN nr. 5207 sub *C. alpina*. — **Ic**: Pl. 68, fig. 8. — **Reg. Cluj**: Mții Rodnei pe Ineu; Cluj (Dl. Feleacului, Păd. Făget, Fânețele Clujului). **Reg. Stalin**: Mții Făgărașului (V. Bălei, V. Doamnei). **Reg. Aut. M.**: Lunca Bradului pe V. Sălardului (r. Toplița). Mții Călimani în V. Tihulețului; Suseni (r. Gheorghieni); Praid (r. Sângeorgiul de Pădure); Simionești (r. Miercurea Ciuc); Firtușu (r. Odorhei). **Reg. Hunedoara**: Petroșani; Mții Retezatului (deasupra Lacului Gemenea spre Poarta Bucurei, Lacul Bucura). **Reg. Oradea**: Oradea, Tărian, Cheresig. **Reg. Ploiești**: Mții Bucegi la Schitul Peștera. **Reg. București**: Ghimpați (r. Mihăilești).
- 2 a Rostrul foliculelor de 2—4 (5) mm lungime, drept; folicula lungă de 1 cm sau cu puțin mai lungă
var. **rostrata** (Borb.). — *C. rostrata* Borb. Vasm. Növ. es fl. (1887) 244. — *C. laeta* f. *longirostre* Nyár. Kv. fl. III (1842) 210 et in Bul. št. Acad. R.P.R. Sect. št. biol. tom. III, 1 (1951) 29. — **Ic**: Pl. 68, fig. 2, 6, 7. — Cluj pe V. Morii.
- 2 b Rostrul foliculelor de 1—1,5 (2) mm lungime; folicule erecte sau cele exterioare \pm aplecate în afară 3
- 3 a Folicule de 9 — 11 mm lungime; plante de obicei viguroase, cu multe flori, cu limb de obicei de jur împrejur serat dințat.
var. **alpina** (Schur) Graebn. in A. et G. Syn. V.2 (1926) 570.—*C. palustris* var. *alpina* Schur in Verh. SVN IV (1853) 30.—*C. laeta* var. *typica* Beck in Verh. ZBG Wien XXXVI (1886) 348. — *C. alpestris* Auct. rom. et hung., non S., N. et Ky. — **Ic**: Pl. 68, fig. 1, la, 5; Römer Pflzenwelt. (1898) tab. 16. — **Reg. Cluj**: Mții Țibleșului; Rodna, Mții Rodnei la Izvorul Roșu; Bistrița; Canciu, Ocna Dejului (r. Dej); Mții Meseș pe V. Ragului și Măgura Prie; Mții Bihorului pe Vlădeasa; Cluj (Făget, V. Plecica, Păd. Hoia, Fânețele Clujului, Păd. Lomb), Gilău, Baci, Florești, Someșeni, Boj (r. Cluj); Aiton, Turda, Cheia Turzii, Rimetea, Poșaga, Lunca (r. Turda); Poiana Aiudului, Aiud; Abrud pe Dl. Sturț, Bistra (r. Cămpeni). **Reg. Aut. M.**: între Toplița și Deda, Bilbor, Borsec (r. Toplița); Reghin, Mții Gurghiului pe V. Creanga Albă; Izvorul Mureșului, Joseni (r. Gheorghieni); Sovata pe Dl. «Bekecs» (r. Sângeorgiul de Pădure); Mții Harghita între V. Mădărașul Mic și Mădărașul Mare, Băile Harghita, Tușnad la turbăria Mohoș (r. Miercurea Ciuc); Bicsad, Turia, Comandău (r. Tg. Săcuesc). **Reg. Stalin**: Orașul Stalin, Predeal, Mt. Postăvarul, Mt. Piatra Craiului; Mții Făgărașului; Sibiu, Cristian pe Mt. Beșineu, Șura Mare, Mții Sibiului; Sighișoara; Mediaș, Proștea Mică, Proștea Mare, Vorumlac (r. Mediaș); Sebeș. **Reg. Hunedoara**: Mții Trascăului (Piatra Ceții, Piatra Caprei, V. Cricăului), Ighiel (r. Alba Iulia); Orăștie; Vărmaga, Hărdău, Zam (r. Deva); Ruși (r. Hunedoara); Covragi, Subcetate, Bretea Română (r. Hațeg). Mții Retezatului (V. Lăpușnicul Mare); Mții Parângului la Lacul Gâlcescu. **Reg. Oradea**: Stăna de Vale (r. Aleșd); Mții Bihorului (V. Iadului).

Reg. Arad: Mții Zarandului (V. Troiașului); Dezna, Moneasa, Chișindia (r. Gura-hont), Mții Codrului. *Reg. Timișoara:* Mții Semenicolui; Băile Herculane pe Mt. Domogled. *Reg. Craiova:* Mții Parângului pe Gruiu; Roșia pe malul Tismaniei, Tg. Jiu. *Reg. Pitești:* Râmnicul Vâlcea; Mții Făgărașului; Conțești (r. Pitești). *Reg. București:* Buftea pe malul Colentinei (r. Răcari); Periș (r. Căciulați); București (Băneasa, Herăstrău, Mogoșoaia, Pantelimon); Comana (r. Vidra). *Reg. Ploiești:* Brazi, Gara Prahova, Crivina (r. Ploiești); Câmpina; Sinaia, Bușteni, Azuga, Mții Bucegi; Mt. Penteleu (Bahna Bălescului, Izvor, Lacul Roșu, Viforâta). *Reg. Galați:* Măcin; Galați (Lacul Brates). *Reg. Bârlad:* Mândrești (r. Focșani). *Reg. Bacău:* Slănic (r. Tg. Ocna); Palanca, Moinești pe Pâr. Găzu; Bacău; Buhuși; Piatra Neamț, Tarcău; Mt. Ceahlău (Durău, V. lui Martin), Hangu, Broșteni, Borca (r. Ceahlău); Tg. Neamț, Topolița, Grumăzești, Blebea, Agapia, Timișești, Mrea Secu, Pipirig (r. Tg. Neamț), Culmea Stânișoarei pe Mt. Petru-Vodă. *Reg. Suceava:* Dorohoi în Păd. Pârâul Casei; Mt. Rarău; Coșna (r. Vatra Dornei).

f. ranunculoides (Schur) Graebn. in A. et G. l. c. (1926) 571. — *C. ranunculoides* Schur Enum. pl. Transs. (1866) 26. — Tulpină erectă, de 20—40 cm înălțime, în partea superioară ramificată, cu frunze tulpinale puține. Frunze bazale lung pețiolate, aproape rotunde, late de 5—7,5 cm, cele tulpinale mijlocii scurt pețiolate, cordat reniforme, subintegre sau ± fin crenate. Flori mici, până la 2,5 cm în diam. Pedunculul floral uneori cu 2 flori. — Orașul Stalin pe «Burzenwiese»; Sibiu pe «Lazarethwiese»; Ruși. (r. Hunedoara); Mții Făgărașului; Mt. Podeanu sub Negoiu.

f. pumila (Schur) Graebn. l.c. (1926) 571. — *C. pumila* Schur l. c. — Tulpină erectă, lungă de 30—35 cm, lipsită de frunze până la înflorire. Frunze bazale rotund reniforme, crenate, late de 4—6 cm, cele tulpinale inferioare sesile și reniforme, cele supreme involucriforme, întregi. Flori puține sau solitare. Folicule cu rostru ± curbat. — Ruși (r. Hunedoara).

f. rotundifolia (Schur) — *C. rotundifolia* Schur in Verh. NV Brünn XV, 2, (1877) 57, ampl. — Frunze rotunde, la vârf crenate sau ± subintegre; lobii dela baza laminei se acoperă; marginea limbului crenat dentată. — Rar împreună cu tipul.

f. subintegerrima (Regel). — *C. palustris* β. *sibirica* lus. b. *subintegerrima* Regel in Bull. Soc. Nat. Mosc. XXXIV. 2 (1861) 53. — *C. palustris* var. *integerrima* Beck in Verh. ZBG Wien XXXVI (1886) 349. — *C. palustris integrifolia* A. et G. Syn. V. 2 (1926) 563. — Frunze cu marginea întreagă sau subîntreagă, numai cele superioare tulpinale la bază ± crenate. — Ici-colo împreună cu tipul.

f. grossedentata (Tocl) Graebn. in A. et Gr. V. 2 (1926) 571. — *C. palustris* var. *loeta* f. *grosse-dentata* Tocl in Sitzb. Böhm. Ges. Wiss. Prag XXVII (1901) 15. — Frunze profund și grosolan dințate. — În regiunea muntoasă.

3 b Folicule mai mici, de 8—9 mm lungime, cu rostru de obicei scurt; frunze mici, până la 7 cm lățime, cu lamină crenat-dentată, la vârf crenate

var. **alpestris** (E., N. et Ky.) Beck in Verh. ZBG Wien XXXVI (1886) 349. — *C. alpestris* S., N. et Ky. l. c. (1854) 33. — Ic.: Pl. 68, fig. 3, 4. — Mții Rodnei: Pietrosul Mare, Vf. Rebri, Drăgușul, Repedea, Vf. Negreasa, sub Vf. Cormaia, Coasta Priporul Pietrei Albe, Pâr. Cobășel. Mții Călimani. Mții Gurghiuului: «Köröstoplica» la Sovata. Mții Giurgeului: Hăghimașul Mare. Mții Harghita: la «Ördögtó», Luci și «Füreszpatak». Mții Bistriței: Mt. Ceahlău pe Ocolașul Mare. Mții Oituzului: Mt. Nămira. Mții Ciucașului; V. Teleajenului. Mții Bucegi:

Colții lui Barbeș, Oboarele, Furnica, V. Jepilor, V. Ialomiței (Lacul Scropoasa, V. Horoabei, Cheile Peșterii). *Mții Făgărașului*: Capra Budei, Mt. Păpușa. *Mții Retezatului*: Zănoaga, Radeș, Căldarea Bucurii, Lacul Zănoaga. *Mții Bihorului*: Cucurbeta.

Intrebuintări. Planta crește de obicei abundent și în timpul înfloririi, dă un aspect galben caracteristic locurilor de creștere. Conține substanțe amare, din care cauză nu este păscută de animale. Proaspăt consumată ar fi dăunătoare animalelor. Bobocii murați în oțet, sunt folosiți ca surogat, în locul caperelor.

Răsp. gen.: Europa Centrală, Balcani.

? *C. palustris* L. Sp. pl. ed. I (1753) 558, s. str., Schiepcz. in Fl. U.R.S.S. VII (1937) 37. — *C. palustris* ssp. *genuina* Hegi Fl. Mitt. - Eur. III (1912) 458. — Calcea calului — Mocsári gölyahír. — Sumpf - Dotterblume. — Калужница болотная.

4. Asemănătoare cu *C. laeta* S., N., et Ky., de care se deosebește prin foliculele mature erecte sau \pm patente, atât pe partea dorsală cât și pe cea ventrală arcuit curbate, de formă \pm oblic eliptică, terminate în rostru scurt contractat. Plantă mai viguroasă. IV—VI.

Stațiunea. Prin bălți, mlaștini, pe marginea pâraielor și prin locuri umede.

Răsp. în țară: Prezența acestei specii — care după concepții mai noi este o specie apuseană sau nordică — n'a fost încă confirmată la noi în țară. Datele publicate de autorii noștri sub *C. palustris* și preluate uneori și de autori străini, se referă la *C. laeta* S., N. et Ky. var. *alpina* Schur, iar formele de *C. palustris*, publicate (mai ales cele ale lui Schur in Verh. NV Brünn XV (1876) 2, (1877) 57), trebuiesc regăsite și confirmate.

Variabilitatea speciei

f. *cuneata* Schur l.c. (1877) 57. — Frunzele ramificațiilor tulpinii cuneat atenuate. — Pe soluri calcaroase, rară.

f. *ranunculiflora* Schur l.c. — Flori mici, cu diam. de cca 2 cm; tepale alungite.

f. *intermedia* (S., N. et Ky.) Schur l.c. — *C. intermedia* S., N. et Ky. Analect. bot. (1854) 32. — Frunze inferioare reniforme sau cordat reniforme, crenat dințate. Folicule mature pe partea ventrală și pe dos arcuite. Rostru scurt.

f. *ficariiformis* Schur l.c. (1877) 58. — *C. palustris* d. *membranacea* Gürke in Richt.-Gürke Pl. eur. II (1903) 405, non Turcz. — Tulpină simplă sau foarte slab ramificată, înaltă până la 22 cm, adesea culcată. Flori cu diametru de 2,4 cm. Tepale alungit eliptice, se ating dar nu se acoperă cu marginile. Folicule mature 3—6, cu rostru scurt, slab recurbat.

Răsp. gen.: Eurasia, America de N.

Plansa 69. — 1. *Helleborus purpurascens* W. et K., 1 a. dosul segmentului cu nervuri păroase, 1 b. fruct. — 2. *H. purpurascens* W. et K. f. *Tuzsonii* Andreánszky, frunză. — 3. — *H. purpurascens* W. et K. f. *Baumgartenii* (Kov.) Nyár., frunză.



O b s. Speciile de *Caltha* tratate mai sus, sunt foarte polimorfe. Sistematizarea lor s'a făcut de autori pe baza formei foliculelor, frunzelor, a periantului, după culoarea florilor, înfățișarea plantei, etc. Dimensiunile organelor, forma, mărimea și dințatura frunzelor și mărimea florilor sunt aproape la fel de variabile la toate. Numai caracterele foliculelor mature par a fi mai constante. Pe baza aceasta, unii autori recunosc numai o singură specie generală (*Caltha palustris* L. s. l.) subordonând la ea 3 subspecii: ssp. *genuina* Hegi (= *C. palustris* L. s. s.), ssp. *cornuta* și ssp. *laeta*, iar alții consideră aceste subspecii drept specii.

Unitățile mai mici sistematice au fost descrise numai pe baza unora dintre caractere, fără să fi fost încadrate la specia, resp. subspecia corespunzătoare, pe baza caracterelor foliculelor, ceea ce după exemplarele înflorite nici nu se putea face. Prin urmare, prelucrarea precisă a tuturor formelor de *Caltha* din țară s'ar putea face numai pe baza unui material complet, colectat din același loc, atât cu flori cât și cu fructe mature.

Genul 108. **HELLÉBORUS** *) L.

Gen. pl. [ed. I (1737) 164, nr. 462] ed. V (1754) 244, nr. 622. — S p â n z.

Plante perene, ierboase, cu tulpină erectă, ramificată, frunzoasă, \pm glabră, înaltă de cca 15—50 cm. Frunze palmat pedat sectate, cu margini dințate, cele tulpinale mai mici, \pm sesile, alterne, de obicei asemănătoare celor bazale, care sunt mari și lung pețiolate. Flori mari, actinomorfe, apar primăvara, înainte sau odată cu desvoltarea frunzelor bazale. Periant din (4) 5, rar și mai multe foliole pielose, mari, lat ovate, verzi sau purpuriu-verzi, persistente la fructificație. Nectarii 5—15, în formă de cornete, mult mai mici decât foliolele periantului, albe sau albe-gălbui, caduce, scurt pedunculate. Stamine multe, libere sau \pm concrescute la bază, polisperme, comprimate lateral, cu pereți \pm sbârcoți, glabre, cu rostru de lungimi diferite. Seminte eliptice sau sferice, cu excrescențe sau carene. Plante otrăvitoare, de primăvară.

Determinarea speciilor

- | | | |
|-----|---|---------------------------|
| 1 a | Periant pe partea externă purpuriu sau purpuriu-verde-glauc | 1. H. purpurascens |
| 1 b | Periant verde sau verzui-galben | 2 |
| 2 a | Flori odorante, cu periant de 2—3,5 cm lungime. Frunze hibernante, pe dos la nervuri îndesuit păroase | 2. H. odoratus |
| 2 b | Flori neodorante, cu periant de 1—2,5 cm lungime. Frunze pe dos glabre, nu sunt hibernante | 3. H. dumetorum |

1. **H. purpurascens** W. et K. Pl. rar. Hung. II (1805) 105, tab. 101; H. Krasch in Fl. U.R.S.S. VII (1937) 58. — *H. niger* Baumg. Enum. stirp. Transs.

*) Helleborus — numele grecesc al plantelor otrăvitoare: *Helleborus* și *Veratrum*. Derivă din grecescul «helein» — nimicare, cotropire, și «borá» — nutreț, pășune, adică plante otrăvitoare din nutreț și pășuni.

II (1816) 136, non L. — *H. viridis* Baumg. l.c., non L. — *H. antiquorum* Lerch. ap. Schur in Verh. SVN IV (1853) 95. — *H. viridis* a. *pallidus* Schur et *H. atrorubens* Schur Enum. pl. Transs. (1866) 27, non W. et K. — Spânz. — Pírosló húnýor. — Purpure Nieswurz — Морозник красноватый. — Ic.: Pl. 69, fig. 1, 1a, b., 2, 3; Hay. Pflzdecke. (1916) 359; Römer Pflzwelt. (1898) tab. 4; W. et K. l. c.; Prod. Fl. II (1939) 132, fig. 2.

4. Tulpini erecte, \pm bifurcat ramificate, frunzoase, cu frunze alterne, scurt pețiolate sau sesile. Frunze radicale mari, de obicei 2, nehibernante, lung pețiolate, cu lamină lată de cca 30 cm, palmatisectat pedată, cu 5—7 segmente lanceolate, late de cca 1—3 cm și lungi până la cca 15—20 cm, întregi sau din nou sectate în 2—5 segmente, lat sau îngust lanceolate, cu margini \pm acuminat (de 2 ori) grosolan sau mai fin dințate, pe dos păroase sau \pm glabrescente, cu nervațiune proeminentă. Tulpină de obicei numai cu puțin mai scurtă decât frunzele bazale desvoltate, verde sau roșcat nuanțată spre bază, glabră, cu puține flori. Frunze tulpinale mijlocii pețiolate, de obicei numai cu 3 segmente sectate din nou în segmente secundare. Frunzele superioare adesea numai tripartite, sesile sau subsesile, \pm roșcat nuanțate pe dos. Flori neodorante, foarte slab nutante, mari, așezate pe un peduncul \pm lung, de obicei solitare. Periant din 5 (rar 4 sau 6) foliole romboidal ovate, ușor concave, la exterior purpuriu-verzi, glauce, persistente și în timpul fructificației, se acoperă numai cu marginile inferioare. Nectarii 15—20, în formă de cornete ușor bilabiate, mai scurte decât staminele, închise în partea lor superioară, cu labiul superior încovoiat, de culoare galbenă-verzuie. Stamine multe (peste 50). Folicule 4—6 (rar mai multe), \pm concrescute la bază, lungi de cca 8—10 mm și cu rostru \pm lung, colorat puțin în violet, comprimate lateral, pe dos evident carenate, pe laturi cu nervuri proeminente. II—IV.

Stațiunea. În păduri și tufișuri din regiunile deluroase și muntoase ale țării.

Răsp. în țară: *Reg. Baia Mare:* Sighet; Mții Tibleșului; Tg. Lăpușului; Mții Rodnei sub Pietrosul Mare. *Reg. Cluj:* Rodna, Năsăud; Bistrița; Olpret (r. Dej); Mții Meseșului (la Osoiul Ursului, Măgura Prie, Dl. Cociunului); Stâna (r. Huedin); Macău, Berind la obârșia Nădășelului (« Királyhágó »), Feiurdeni, Cluj și împrejurimi (Făget, V. Plecica, Păd. Hoia, Fânațe), Baci, Sucea, Popești, Corpadea; Cojocna, Căian (r. Cluj); Mintiul Gherlii, Iclod, Inău, Bontida, Sicu, Sântejude, Puini, Taș, Sucutard, Mureșeni de Câmpie (r. Gherla); Cămărașu, Silvașul de Câmpie, Berchieș (r. Sărmășel); Cheia Turzii, Vâlcele, Rediu, Mții Gilăului pe V. Lunca (r. Turda); Băgău (r. Aiud); Abrud pe Mt. Vulcan, Vidra (r. Câmpeni). *Reg. Aut. M.: Tg. Mureș; Sovata pe Dl. « Bekecs » (r. Sângeorgiul de Pădure); Gurghiu r. Reghin); Borsec (r. Toplița); Mții Giurgeului (Mt. « Öcsém », Mt. « Terkő »); Racul, Șumuleni, Jigodin (r. Miercurea Ciuc); Corund, Zetea, Odorhei. Cădișeni, Văleni, Merești, Lueta*

pe Dl. Popii, Mții Harghita (r. Odorhei); Covasna, Turia (r. Tg. Săcușe); Zagon (r. Sf. Gheorghe). *Reg. Stalin*: Tiur, Blaj, Herepea, Bazna (r. Târnăveni); Valea Lungă, Cenade (r. Mediaș); Cristur, Sighișoara; Racoșul de Jos pe Dl. «Töpehegy», Beia, Belin (r. Rupea); Timișul de Sus, Predeal (r. Stalin); Mții Făgărașului; Sibiu, Daia, Șura Mare, Cisnădioara pe Dl. «Götzenberg». *Reg. Hunedoara*: Orăștie; Băița (r. Deva); Ponorici, Grădiștea de Munte (r. Hațeg), Mții Retezatului în V. Râul Mare; Petroșani la Cetatea Bolii. *Reg. Oradea*: Vadul Crișului, Remetei pe V. Iadului (r. Aleșd); Băița, Șuncuiș (r. Beiuș), Mții Codrului (Huta pe V. Brusturi, V. Câmpiei, Vf. Curuș, Poiana Brătcoia). *Reg. Arad*: Moneasa (r. Gurahonț). *Reg. Craiova*: Mții Mehedinților: Piatra Cloșanilor, Mt. Oslea, Mt. Bulzu. *Reg. Pitești*: Mt. Cozia; Mt. Ghițu; Mții Făgărașului (Negoiu); Rucăr, Dâmbovicioara, Mții Iezer-Păpușa (r. Câmpulung). *Reg. Ploiești*: Comarnic, Sinaia (Piscul Căinelui), Bușteni, Azuga, Mții Bucegi (Vf. cu Dor, Furnica, Piatra Arsă, V. Cerbului). *Reg. Bârlad*: Panciu pe dealurile mari. *Reg. Bacău*: Moinești pe Mt. Mintianu; Piatra Neamț pe Dl. Cozla; Mt. Ceahlău (Schitul Durău). *Reg. Suceava*: Moldova Sulița pe Spânzac (r. Câmpulung).

Variabilitatea speciei

- 1 a Segmente lat lanceolate, de loc sau puțin segmentate
 - f. **typicus** Nyár. in BK XXXVIII (1941) 136. — **Ic.**: Pl. 69, fig. 1, 1 a. — Forma cea mai comună.
- 1 b Segmente îngust lanceolate, din nou segmentate..... 2
- 2 a Segmente primare pețiolulate; pețioluli lungi de 1—2 cm
 - f. **Tuzsonii** Andreánszky in Index Hort. Bot. Univ. Debr. (1940) 99. — **Ic.**: Pl. 69, fig. 2. — Cluj la Păd. Mănăstur.
- 2 b Segmente primare sesile sau subsesile, cu pețioluli aripați
 - f. **Baumgartenii** (Kov.) Nyár. l.c. — *H. purp.* var. *Baumgarteni* Kováts in Sternh. Uebers. Fl. Siebenb. (1846) 24. — *H. Bocconi* Schur Enum. pl. Transs. (1866) 27, non Ten. — *H. purp.* var. *subflagellatus* Schur Phytogr. in Verh. NV. Brünn XV (1876) 59. — **Exs.**: FEAH nr. 2544 II, nr. 2545; FRE nr. 406. — **Ic.**: Pl. 69, fig. 3. — *Reg. Cluj*: Olpret pe Dl. Ceriului (r. Dej); Nicula (r. Gherla); Mții Meseșului (Măgura Prie, Osioiul Ursului); Berind la Obârșia Nădășelului («Királyhágó»), Florești, Cluj (Păd. Făget, Păd. Mănăstur, V. Morii); Mții Trascăului (Colții Trascăului), Vâlcele (r. Turda); Poiana Aiudului (r. Aiud); *Reg. Aut. M.*: Tg. Mureș, Corunca; Gheorghieni, Bălan, Mții Giurgeului (Mt. «Öcsém», «Terkő», Piatra Singuratică); Sovata pe Dl. Bekecs (r. Sângeorgiul de Pădure); Odorhei, Lueta pe Dl. Popii; Sf. Gheorghe. *Reg. Stalin*: Valea Lungă (r. Mediaș); Sighișoara; Orașul Stalin (la Stejăriș), Mt. Postăvarul, Vâlcele; Gușterița, Cisnădioara, Șelimbăr, Șura Mare (r. Sibiu); Sebeș. *Reg. Hunedoara*: Orăștie; Băița (r. Deva); Petroșani. *Reg. Oradea*: Mții Bihorului pe V. Iadului. *Reg. Arad*: Radna pe Dl. Highiș, Ghioroc (r. Lipova). *Reg. Timișoara*: Căcova (r. Oravița); Băile Herculane pe Mt. Domogled. *Reg. Ploiești*: Sinaia. *Reg. Bacău*: Pasul Ghimeș (r. Moinești).
 - f. **glabrescens** Simk. in MTK XXIV (1885) 616. — Segmente cu nervuri glabre sau glabrescente.
 - f. **ásperus** Simk. l.c. — Segmente pe nervuri cu peri aspri.
 - f. **grossedentátus** A. Nyár. f. nova in Add. pag. 685. — Segmente cu dinți lungi de 5—10 mm.
 - f. **viridiflorus** (Schur). — *H. purpurescens* a. *viridiflorus* Schur Enum. pl. Transs. (1866) 27. — Flori mai verzi; frunze cu segmente mai late.

Întrebuințări. Plantă otrăvitoare. Rizomul conține glicozizii heleboreina care acționează ca digitalina și heleborina cu acțiune ca a saponinei. Ca drog este cunoscut sub numele de «Rhizoma Hellebori». Decoctul se întrebuința înainte în locul digitalei. Are o acțiune iritantă. Întrebuințarea sa drept tonic cardiac și diuretic este astăzi părăsită. Rizomii sunt adunați primăvara de timpuriu sau toamna târziu.

Răsp. gen.: Europa de E, Balcani, Asia Mică, partea europeană a U.R.S.S.

2. **H. odorus** W. et K. in Willd. Enum. hort. Berol. (1809) 592. — Cutcurig. — Illatos hűnyor. — Wohlriechende Nieswurz. — **Exs.:** FEAH nr. 2540; FHE nr. 160; FRE nr. 407, 407 b pro *H. odorus* ssp. *eu-odorus* f. *latifolius*. — **lc.:** Pl. 70, fig. 1, 1a; Roch. Pl. Ban. rar. (1828) tab. 10, fig. 24.

4. Tulpină cu ramuri erecte, înalte cca de lungimea frunzelor bazale, paucifloră. Frunza bazală de obicei 1 (—2), pieloasă, hibernantă, lung pețiolată, cu 7—16 segmente, lat sau mai îngust lanceolate, late de 1—6 cm și lungi de obicei de peste 10 cm, pe dos la nervuri des păroase. De obicei segmentele mijlocii libere și nedivizate, cele laterale \pm concrescute la bază și adesea din nou sectate, cu margini serate sau biserate, cu nervuri pe dos proeminente. Frunzele tulpinale asemănătoare cu cea bazală, dar cu segmentele mai scurte și mai înguste. Flori foarte odorante, mari, \pm nutante. Periant de obicei din 5 foliole verzi-galbene, lungi de 2—3,5 cm, lat ovate, la vârf obtuze sau \pm acute, se acoperă pe laturi cam până la mijlocul lor. Nectarii de regulă cca 10, în formă de cornete. Stamine multe, albe-gălbui, cu antere ovale. Folicule 3—6, cca de 2 ori mai lungi decât late, la bază \pm concrescute, cu rostru lung. Semințe negre-brune, de 4—5 mm lungime și de 2—3 mm în diametru. II—IV.

Stațiunea. Prin păduri, tufișuri și rărituri de păduri.

Răsp. în țară: Numai în regiunile sudice ale țării.

Variabilitatea speciei

ssp. **multifidus** (Vis.) Hay. Prodr. Fl. balc. I (1927) 299. — *H. multifidus* Vis. Pl. rar. Dalm. in Flora XII. I (1829) Ergänz. BZ nr. 18.

Frunze bazale cu 11—15 segmente înguste, cele mijlocii 3—6-fidate. Această subspecie este răspândită în mai multe forme, mai ales în Balcani.

f. **platyphyllus** Hay. l.c. — *H. multif.* var. *latifolius* Beck in Wiss. Bosn. Herzeg. XIII (1916) 190. — Frunze cu segmente late de 10—32 mm. — *Reg. București:* Naipu în Păd. Cernaia (r. Mihăilești).

f. **linearifolius** (Beck) Hay. l.c. — *H. multif.* var. *linearif.* Beck l.c. — Segmentele frunzelor late de 3—6 (—10) mm. — Ici-colo împreună cu alte forme ale subspeciei.

Planșa 70. — 1. *Helleborus odorus* W. et K., 1 a. idem, f. *platyphyllus* Hay. frunză bazală. — 2. *H. dumetorum* W. et K., 2 a. frunze bazale.



f. *serratifolius* (Beck). — *H. multifidus* var. *serratif.* Beck l.c. — Segmentele frunzelor profund și argut serate. — Rar între alte forme ale subspeciei.

ssp. *euodorus* Hay. l. c.

Frunze bazale cu (4) 7—11 segmente lanceolate sau \pm lat lanceolate, în majoritate nedivizate, pe dos păroase, cu margini biserate. — Mai frecventă.

Reg. Craiova: Cerneți (r. Tr. Severin); Craiova la Teiș, Bucovăț pe malul Jiului. *Reg. Pitești:* Ocnele Mari, Govora (r. Râmn. Vâlcea). *Reg. Plocești:* Râmnicul Sărat. *Reg. București:* Păd. Slăvești (r. Vârtoapele); Comana (r. Vidra); Naipu în Păd. Cernaia, între Ghimpați și Cămineasca în Păd. Slătioara (r. Mihăilești).

f. *laceratus* Maly in Glasn. XI (1899) 132. — Segmentele frunzelor inciz serate. — Împreună cu alte forme ale subspeciei. — *Reg. Craiova:* Coțofeni în V. Jiului, Bucovăț (r. Craiova).

f. *angustifolius* Beck l.c. (1916) 188. — Segmentele frunzelor \pm uniform serate, late până la 2,5 cm. — *Reg. Craiova:* livezi în V. Ursoaia, Păd. Radovan, Coțofeni în V. Jiului (r. Craiova).

f. *latifolius* Beck l.c. — **Exs.:** FEAH nr. 2540; FHE nr. 160; FRE nr. 407, 407 b. — **Ic.:** Pl. 70, fig. 1 a. — Segmentele frunzelor \pm uniform serate, late de 3—6 cm. — *Reg. Timișoara:* Baziaș (r. Moldova Nouă); Sasca pe V. Beilului, Maidan pe Tilva Mare (r. Oravița); Plavișevita, Orșova (r. Mehadia). *Reg. Craiova:* Craiova (între Popoveni și Lascăr Catargiu), Livezile pe Dl. Ursoaia, Bucovăț pe malul Jiului și în Păd. Bucovăț, între Leamna și Breasta pe malul Jiului, Păd. Radovan (r. Craiova).

Întrebuințări. Plantă otrăvitoare, întrebuințată ca și *H. purpurascens*.

Răsp. gen.: Europa de E și SE.

3. *H. dumetorum* W. et. K. in Willd. Enum. hort. Berol. (1809) 592. — *H. viridis* var. *dumetorum* Sadl. Fl. Pestiensis II (1826) 64. — Cutcurig. — Kisvirágú húnior. — Hecken-Niesswurz. — **Ic.:** Pl. 70, fig. 2, 2a.

4. Tulpină până la 40 cm, cu 2—3 frunze bazale, nehibernante, lung pețiolate, cu lamină lată de cca 20 cm, sectate în 10—13 segmente palmat pedate, îngust și alungit lanceolate, cu margini acuminat serate, pe dos glabre, cu nervațiune secundară abia proeminentă. Tulpină de obicei multifloră, mai înaltă decât frunzele bazale. Flori mici, neodorante, nutante, pe pedunculi lungi. Periant lung de 1—2,5 cm, cu foliole îngust ovoide, galbene-verzui. Nectarii 8—12, galbene-verzi, în formă de cornete, ușor bilabiate. Stamina multe. Folicule 3—4, lungi de 15—18 mm, \pm conerescute, cu rostru lung. II—IV.

Stațiunea. Prin păduri, rărituri de păduri, sporadic.

Răsp. în țară: *Reg. Craiova:* Craiova. *Reg. Pitești:* Râmnicul Vâlcea. *Reg. București:* Comana (r. Vidra). *Reg. Bacău:* Tg. Neamț, Blebea, Agapia, Văratec. *Reg. Iași:* Lipovățu (r. Vaslui).

Întrebuințări. Plantă otrăvitoare, întrebuințată ca și *H. purpurascens*.

Răsp. gen.: Europa centrală, Croația, Slovenia.

Obs. Această specie, publicată din țară de diferiți autori români și maghiari, lipsește din Transilvania, iar în alte regiuni ale țării (de unde avem date de literatură), trebuie regăsită și confirmată. Exemplare colectate din țară nu s'au găsit în herbarele studiate.

Genul *ERÁNTHIS*¹⁾ Salisb.

in Trans. Linn. Soc. VIII (1807) 303.

Descrierea genului este identică cu a speciei.

* *E. hiemális* (L.) Salisb. in Trans. Linn. Soc. VIII (1807) 303. — *Hel-leborus hyemalis* L. Sp. pl. ed. I (1753) 557.

4. Tulpină erectă, glabră, neramificată, înaltă de 5—15 cm, cu hipocotil tuberizat. Pe tulpină de obicei numai 3 frunze involucrale \pm palmatisectate, așezate în verticil, imediat sub floarea terminală, solitară, galbenă. Frunze bazale puține, lung pețiolate, de regulă se dezvoltă după înflorire sau în timpul înfloririi, cu lamină rotundă, sectată aproape până la bază în 5—7 segmente liniare \pm adânc lobate, la bază cordate. Flori mari, cu 6 (rar 5—8) foliole periantiale galbene, inegale, îngust ovate, alungite, lungi de 10—20 mm, uneori \pm lobate. Nectarii mult mai scurte decât periantul, în formă de cornete, la partea lor superioară ușor bilabiante, cu labiul superior foarte scurt, spre bază lung unguiculate. Stamine multe. Folicule 4—8, sesile, pe un peduncul comun, scurt, lungi de cca 15 mm, rostrate și curbate în afară, brune, multisperme. Semințe brune, \pm angulate, lungi de 2,5 mm. I—III.

Stațiunea. Locuri umbroase, păduri, tufișuri, vii, grădini.

Răsp. în țară: Ici-colo cultivată ca plantă ornamentală prevernală, de unde se sălbăticește. A fost indicată numai din Reg. Hunedoara (Lerchenfeld ap. Schur Enum. (1866) 27). — București, subspontană în Grăd. Botanică.

Răsp. gen.: Europa centrală și Sudică și America de N, sălbătit.

Genul 109. *NIGÉLLA*²⁾ L.

Gen. pl. [ed. I (1737) 160, nr. 451], ed. V (1754) 238, nr. 606. — *Negrușcă*.

Plante anuale ierboase, cu tulpini erecte, \pm ramificate și frunze sesile sau pețiolate, alterne, de 2—3 ori sectate, cu segmente liniare, înguste. Flori actinomorfe. Periant din 5 foliole petaloide, albăstrui sau albe, spatulate,

¹⁾ Dela grecescul « éar » și ér = primăvară și « ánthos » = floare, adică floare timpurie de primăvară, din cauza înfloririi sale timpurii.

²⁾ Dela latinescul « niger » = negru, dela care derivă « nigellus » = negricios, din cauza culorii semințelor.

mari. Nectarii 5—8, mult mai scurte decât periantul, la partea superioară bilabiate, cu labiu superior mai scurt decât cel inferior bilobat. Stamina multe. Folicule 2—10, uneori umflate, concrescute parțial sau total, cu sau fără frunze involucale multifidate. Folicule cu cioc \pm lung și cu semințe negricioase, colțuroase, așezate pe 2 rânduri.

Determinarea speciilor

- 1 a Flori și fructe inconjurate de un involucriu multifidat, cu segmente liniare. Folicule transversal septate și concrescute până la vârf
N. damascena
- 1 b Flori și fructe fără involucriu (numai rareori la florile încă incomplet dezvoltate, frunzele tulpinale superioare alcătuiesc un fel de involucriu). Folicule neseptate 2
- 2 a Tulpină glabră. Foliiolele periantului lat ovate, acuminate, lung unguiculate, albastre, la margini cu nervație reticulată, \pm verde albăstruie. Capsule obconice, cu folicule concrescute până la mijloc.. 1. **N. arvensis**
- 2 b Tulpină păroasă. Foliiolele periantului alungit ovate, obtuze, scurt unguiculate, albe-albăstrui. Capsule alungit globuloase, cu foliculele concrescute aproape până la vârf **N. sativa**

1. **N. arvensis** L. Sp. pl. ed. I (1753) 534; Krasch. in Fl. U.R.S.S. VII (1937) 68, tab. VI, fig. 6. — Negrușcă. — Mezei kandilla. — Wilder Schwarzkümmel. — Чернушка полевая. — Ic.: Pl. 67, fig. 2, 2a.

○. Tulpină erectă, \pm ramificată, de obicei glabră, \pm sulcată, înaltă de 7—40 (70) cm, verde sau cenușiu-verzuie. Frunze lungi de 2—3 cm, de 2—3 ori sectate, cu lacinii îngust liniare, uneori filiforme din cauza marginilor \pm revolute. Flori fără involucriu; numai uneori la florile incomplet dezvoltate, frunzele tulpinale superioare apar ca niște involucre. Foliiolele periantului cu limb lat ovat, lungi de 1,6—2 cm, acuminate, albastre, la vârf verzi, pe margini cu nervație reticulată, albăstruie-verde, proeminentă, la marginea lor superioară ușor concave, la bază \pm cordate și continuându-se brusc într-o unguiculă îngustă, lungă cca de lungimea limbului. Nectarii gălbui, verzi-albăstrui, cu unguiculă mai lată, cu dungi transversale albe și albastre, la vârful lobilor labiilor cu prelungiri cilindrice, îngroșate la vârf. Antere la vârf \pm mucronate, cu o prelungire (aristă) a conectivului de 2—3 ori mai scurtă decât antera. Folicule 3—5 (rar 2—8), pe spate cu 3 nervuri proeminente care se unesc și se continuă într'un cioc, lung aproape cât lungimea foliculelor. Folicule neumflate, concrescute dela bază numai până la cel mult 2/3 din lungime, formând o capsulă obconică, cu pereți laterali glabri sau aspru tuberculați. VII—IX.

Stațiunea. Prin semănături de cereale, arături, marginea semănăturilor și a drumurilor, pe soluri calde, uscate, argiloase sau nisipoase. Buruiiană calcofilă din regiunea de câmpie și de dealuri.

Răsp. în țară: Specie foarte frecventă în toate regiunile de câmpie și de dealuri, răspândită în toată țara.

Variabilitatea speciei

- 1 a Tulpină și frunze verzi sau palid verzi..... 2
 1 b Tulpină și frunze cenușii-verzi sau cenușii sure..... 3
 2 a Folicule pe laturi glabre, fără nodozități sau emergente tuberculiforme. — Frecventă în toată țara
 f. *typica* (Boiss.) Graebn. in A. et G. Syn. V. 2 (1926) 617. — *N. arvensis* α. *typica* Boiss. Fl. or. I (1867) 66. — *Reg. Cluj*: împrejurimile Clujului; Turda, Rimetea; Aiud. *Reg. Aut. M.*: Tg. Mureș. *Reg. Iași*: Ezăreni pe V. Ursului, Brătuleni pe Dl. Holmu (r. Iași). *Reg. Suceava*: Stânca-Ștefănești (r. Trușești).
 2 b Folicule pe laturi ± tuberculat scabre. Impreună cu forma tipică
 f. *trachycarpa* (Borb.) Nyár. Kv. fl. III (1942) 212. — *N. arvensis* var. *trachycarpus*. Borb. Vasm. növ. földr. és fl. (1887) 245, n. nud. ex Brand in Huth Abh. Vortr. Ges.-Geb. Naturw. IV, 14 (1895) 32. — *N. arvensis* β. *verruculosa* Beck Fl. NÖ I (1890) 398. — *Reg. Cluj*: Cluj (Dl. Lomb, Fânațe pe Dl. Mărgău); Rimetea (r. Turda); Aiud. *Reg. Aut. M.*: Căpâlnița (r. Odorhei). *Reg. Stalin*: Copșa Mică (r. Mediaș). *Reg. Oradea*: Mții Codrului pe Vf. Toaca. *Reg. Timișoara*: Timișoara. *Reg. Pitești*: Dumitrești (r. Pitești). *Reg. Suceava*: Stânca-Ștefănești (r. Trușești).
 3 a Tulpină scundă, foarte ramificată, cu ramuri aproape orizontal patente. Frunze cenușii sau cenușii verzi, cu lacinii scurte. Folicule pe laturi tuberculat scabre
 f. *divaricata* (Beauprê) Boiss. Fl. or. I (1867) 66. — *N. divaricata* Beauprê in DC. Syst. I (1818) 329. — *Reg. Constanța*: între Cernavodă și Medgidia. *Reg. Galați*: I. G. Duca (r. Tulcea).
 3 b Tulpină mai înaltă, cu ramuri ± erecte. Frunze cenușii sau cenușii verzi, cu lacinii mai lungi, liniare sau filiforme. Folicule pe laturi foarte aspru tuberculate
 f. *tuberculata* (Gris.) Simk. in MTK XVI (1881) 83. — *N. tuberculata* Gris. Spicil. Fl. rumel. I (1843) 310. — *Exs.*: FRE nr. 764. — *Reg. Cluj*: Cluj pe Dl. Lomb. *Reg. București*: Comana (r. Vidra). *Reg. Ploiești*: Sărata-Monteoru pe V. Sărății (r. Buzău). *Reg. Constanța*: Constanța, Mangalia; Zorile lângă Adamclisi (r. Băneasa).

Răsp. gen.: Europa Atlantică, centrală și de S, partea europeană a U.R.S.S., Caucaz, litoralul Mării Negre.

* *N. sativa* L. Sp. pl. ed. I (1753) 534; Krasch. in Fl. U.R.S.S. VII (1937) 69, tab. VI, fig. 5. — Negrilică, Chimen negru. — Szöröz kandilla, Feketekömény. — Behaarter Schwarzkümmel. — Чернушка посевная. — Pl. 67, fig. 4, 4a.

Planșa 71. — 1. *Anemone narcissiflora* L., 1 a. fructe. — 2. *Hepatica transsilvanica* Fuss. — 3. *Hepatica nobilis* Mill. — 4. *Isopyrum thalictroides* L., 4 a. fructe.



○. Tulpină erectă, simplă sau ramificată, înaltă până la 40 cm, de obicei păroasă. Frunze lungi de cca 2—3 cm, cu lacinii liniare sau îngust lanceolate. Flori fără frunze involucrale. Foliole periantiale alungit ovate, cu vârf obtuz, de obicei albe, numai la vârf albastrii-verzi, cu unguiculă îngustă și scurtă. Nectarii scurt unguiculate, bilabiate, cu labiu inferior bilobat; lobii terminați cu o prelungire obtuză la vârf; labiul superior mucronat. Antere fără prelungire setiformă a conectivului. Capsulă alungit globuloasă, din folicule concrescute până la vârf, pe spate rotunjite, cu muchii longitudinale, cu cioc lung, aproape cât foliculele. Semințe trimuchiante, negre, cu suprafețe sbârcite. V—VIII.

Stațiunea. Cultivată ici-colo prin grădini, de unde sălbăticiindu-se, apare ca buruiiană în semănături sau pe coline însoțite, mai ales în regiunile sudice, mai calde ale țării.

Intrebuințări. Semințele sunt întrebuințate drept condiment. În medicina populară au fost folosite sub numele de «Semina Nigellae seu Melanthii» ca diuretic, datorită conținutului în glicozizi saponinici (melantina).

Răsp. gen.: Reg. mediteraneeană, Balcani, Asia Mică, Crimeea, Caucaz, Asia Occidentală, India, Africa de N.

* *N. damascēna* L. Sp. pl. ed. I (1753) 534; Krasch. in Fl. U.R.S.S. VII (1937) 70, tab. VI, fig. 7. — *Chica* voinicului. — *Török kandilla*. — *Damaszener Schwarzkümmel*. — *Чернушка дамаскская* — Ic.: Pl. 67, fig. 3.

○. Tulpini erecte, ramificate, glabre, verzi sau uneori spre bază violet nuanțate, înalte de 20—50 cm. Frunze cu lacinii liniar setacee, prevăzute uneori la vârf cu sete scurte. Flori inconjurate de un involucriu uneori mai lung decât floarea. Foliole periantiale albastre deschise sau albe, cu unguiculă mai scurtă decât lamina sepalelor, ± alungit ovată și obtuză. Nectarii scurt unguiculate, cu unguicula de 4 ori mai scurtă decât lamina, bilabiate, cu labiul superior trunchiat și cca de 2 ori mai scurt decât cel inferior, cu margini întregi fără prelungiri. Stamine cu antere fără prelungire setiformă a conectivului. Fruct capsulă din 5 folicule ovate, umflate, biloculare, lungi de 1—1,5 cm, concrescute dela bază până la vârf, cu rostru ± egal de lung cât ele, adesea aproape orizontal indoite în afară. Semințe ± triedrice, negre, transversal sbârcite. V—VII.

Stațiunea. Ici colo se cultivă în grădini, de unde se sălbăticește.

Intrebuințări. Cultivată ca plantă ornamentală în diferite forme horticole. Sămânța se poate folosi drept condiment.

Răsp. gen.: Reg. mediteraneeană, Balcani, Asia Mică, părțile europene ale U.R.S.S., Crimeea, Caucaz, Africa de N, Insula Madeira, Insulele Canare.

Genul 110. **ISÓPYRUM** *) L.

Gen. pl. [ed. II (1742) 245, nr. 533], ed. V (1754) 244, nr. 624. — Găinuși.

Caracterele genului sunt identice cu ale speciei.

1. **thalictroides** L. Sp. pl. ed. I (1753) 557; Schipez. in Fl. U.R.S.S. VII (1937) 74. — Găinuși, Turiță albă. — Galambvirág. — Muschelblümchen. — Равноплодник василистниковый. — Exs.: FRE nr. 405. — Ic.: Pl. 71, fig. 4, 4a.

4. Rizom repent, cu rădăcini \pm uniform îngroșate. Tulpină erectă, de 10—30 cm, de obicei glabră sau mai ales spre bază păroasă, numai la partea superioară \pm ramificată, slab frunzoasă. Baza tulpinii cu scvame late, membranoase, brune sau albicioase. Frunze bazale glabre sau rar păroase, lung pețiolate, de 2—3 ori ternate, cu foliole obovate, cu 2—4 lobi, inegal obtuți la vârf. Frunzele tulpinale lipsesc sau sunt reprezentate prin frunze involucrale, asemănătoare cu frunzele bazale sau uneori mai simple. Flori actinomorfe, de obicei solitare, cu pedunculi lungi de 1—3 cm, în subțioara bracteiilor trilobate. Foliole periantiale 5 (6) petaloide, albe, ovate alungite. Nectarii 5 (6), transformate în cornete nectarifere, lungi de 1—1,5 mm. Stamine multe. Gineceu apocarpic, din (1) 2—3 carpele, de obicei glabre, cu ovule așezate pe 2 rânduri, din care se dezvoltă 1—3 folicule polisperme, scurt pedicelate, lat ovate, ușor turtite și recurbate, cu un rostru curbat, mult mai scurt decât folicula. Semințe globulos ovoide, lungi de cca 3 mm. IV—V.

Stațiunea. În păduri de foioase, tufișuri, locuri umbroase mai ales în regiunile muntoase.

Răsp. în țară: *Reg. Baia Mare*: Sighet; Vișeu de Sus, Borșa; Carei, Urziceni. *Reg. Cluj*: Rodna, Năsăud, Telciu, Valea Vinului, Mții Rodnei; Bistrița; Dej, Olpret, Canciu; Zalău, Mții Meseșului; Stâna (r. Huedin); Cluj și împrejurimi, Gilău, Florești, Feiurdeni, Cojocna, Mții Gilăului; Dăbâca, Bonțida, Inău, Iclod, Sicu, Mintiul Gherlii (r. Gherla); Vâlcele, Turda, Cheia Turzii, Mții Gilăului; Aiud; Abrud pe Mt. Vulcan. *Reg. Aut. M.*: Tg. Mureș; Reghin, Gurghiu; Borsec (r. Toplița); Șovata (r. Sângeorgiul de Pădure); Odorhei, Merești, Vârghiș; Tușnad (r. Miercurea Ciuc); Zagon (r. Sf. Gheorghe). *Reg. Stalin*: Blaj la Păd. Redea; Mănărade, Agârbiciu, Șeica Mare, Proștea Mare, Proștea Mică, Vorumlac, Mediaș; Sighișoara; Orașul Stalin, Mții Bucegi, Mt. Piatra Mare, Mt. Postăvarul, Mt. Piatra Craiului; Sibiu, Gușterița, Șura Mare, Cislădie, Cislădioara pe Mt. «Götzenberg», Mții Sibiului; V. Secășului (r. Sebeș). *Reg. Hunedoara*: Hunedoara, Batiz; Hațeg, Gântaga, Grădiștea de Munte, Mții Retezatului pe V. Clopotiva; Petroșani pe V. Jiefului; Zam (r. Deva). *Reg. Oradea*: Oradea; Stâna de Vale (r. Aleșd). *Reg. Arad*: Arad la Păd. Ciala; Arăneag (r.

*) Dela grecescul «isos» = asemănător și «pyr» = foc, din cauză că provoacă iritațiuni arzătoare, asemănătoare celor cauzate de foc.

Ineu); Lipova, Mții Zarandului; Nădălbști, Dezna, Moneasa (r. Gurahonț). *Reg. Timișoara*: Mehadia, Băile Herculane, Orșova. *Reg. Craiova*: Cerneți (r. Tr. Severin); Craiova, Leamna, Podari, Radovanu. *Reg. Pitești*: Govora (r. Râmn. Vâlcea); Curtea de Argeș pe Dl. Hodiei; Câmpulung; Conțești (r. Pitești). *Reg. București*: între Ghimpați și Cămineasca la Păd. Slătioara (r. Mihăilești); București (Păd. Băneasa); Ciolpani, Snagov (r. Căciulați); Pasărea (r. Brănești); Comana (r. Vidra). *Reg. Ploiești*: Tinosu în Păd. Tinoasa, Ploiești în Păd. Ghișiu; Sinaia, Bușteni, Azuga, Mții Bucegi; Mt. Penteleu. *Reg. Constanța*: Babadag. *Reg. Galați*: între Măcin și Greci; Nifon, Niculițel, Mrea Cocoș (r. Tulcea). *Reg. Bârlad*: Bârlad. *Reg. Bacău*: Mt. Ceahlău, Cheile Bicazului, Lacul Ghilcoș, Broșteni (r. Ceahlău); Mrea Neamț în Păd. Braniste. *Reg. Iași*: Iași (Copou), Slobozia, Repedea. *Reg. Suceava*: Botoșani; Campulung, Pojorâta; Vatra Dornei.

Variabilitatea speciei

f. *pubescens* (Wierzb.) Jáv. Magy. Fl. (1925) 355. — *I. thalictroides* var. *pubescens* Wierzb. in Rochel Bot. Reise (1838) 59, n. nud. ex Heuff. Enum. pl. Banat. in Verh. ZBG Wien VIII (1858) 46, Sep. pag. 11. — Dosul frunzelor și baza tulpinii ± păroase. — Foarte frecventă, împreună cu tipul.

Intrebuintări. Ici colo cultivată ca plantă ornamentală de primăvară. Conține alcaloidul iritant isopirona.

Răsp. gen.: Europa Atlantică, Centrală și de SE, Balcani, Asia Mică, dealungul graniței de V a părții europene a U.R.S.S.

Obs. Din pădurile munților înalți din Moldova a fost publicat de Guebh. (manuscris), *Isopyrum fumarioides* L. cu syn. *Leptopyrum fumarioides* Rehb., fiind citată de Brandza Prodr. Fl. Rom. (1879—1883) 6, 518 și de Prodan Fl. det. pl. Rom. I, ed. II (1939) 337. Această specie originară din Asia centrală, nu crește la noi și trebuie să fie ștearsă din flora țării.

Genul 111. ACTAEA *) L.

Gen. pl. [ed. I (1737) 151, nr. 427], ed. V (1754) 222, nr. 568. — Iarba Cristoforului, Orbalț.

Caracterele genului sunt identice cu ale speciei.

A. spicata L. Sp. pl. ed. I (1753) 504, excl. var. β ., Fl. suec. ed. II (1755) 181, nr. 464, ampl.; Schipez. in Fl. U.R.S.S. VII (1937) 80. — *A. spicata* B. *acuminata* Graebn. in A. et G. Syn. V. a (1926) 628. — Orbalț. — Békabogyó. — Christophskraut. — Воронеж колосовидная. — Ic.: Pl. 72, fig. 1, 1a.

4. Plantă ierbacee, înaltă de (20) 40—70 cm, cu rizom viguros și miros neplăcut. Tulpină erectă, ± glabră și ramificată, frunzoasă. Frunze mari, lung pețiolate, de 2—3 ori ternate, cu foliole de forme variate, de obicei mari, ovate sau ovat acuminate, ± 1—3-lobate sau sectate, cu margini neuniform

*) Dela grecescu «aktea» = soc, din cauza asemănării fructului acestei plante cu cel de soc (*Sambucus nigra*).

și \pm adânc acuminat biserate, pe nervuri \pm răzleț păroase. Flori mici, actinomorfe, în racem simplu, scurt, terminal sau de regulă, așezat în subțioara frunzelor. Inveliș floral caduc, format dintr'un periant cu 4—6 foliole petaloide, albe sau albe-gălbui, la care se mai adaugă, de obicei, încă un periant intern cu 4—6 foliole albe, cu unguicule lungi, fără gropițe nectarifere. Uneori periantul intern nu se dezvoltă. Stamine multe, cu filamente albe sau \pm violet, mai lungi decât învelișul floral. Gineceu apocarpic, format din 1 (2) carpele, cu multe ovule anatropice și stigmat sesil. Din carpelă se dezvoltă o bacă (rar 2) cărnoasă, uniloculară, multispermă, ovoidă, de cca 1 cm lungime, neagră, lucioasă. Semințe hemisferice, slab turtite, de cca 4 mm lungime, brune, așezate pe 2 șiruri. V—VII.

Stațiunea. Prin păduri umbroase, din regiunea de coline până în etajul subalpin.

Răsp. în țară: *Reg. Baia Mare:* Carei, Foeni; Mții Rodnei (Pietrosul Mare, Zănoaga). *Reg. Cluj:* Rodna, Valea Vinului, Năsăud, Mții Rodnei (Rotunda, Izvorul Roșu); Bistrița; Dej, Olpret, Canciu; Mții Meseșului, Zalău; Mții Bihorului (V. Sebeșului); Stâna r. Huedin); Cluj (Păd. Făget, V. Becașului, Păd. Chcoșeni), Călan; Nicula, Ferța. Inău, Iclod, Sicu, Sântejude, Sucutard, Mintiul Gherlii (r. Gherla); Silvașul de Câmpie (r. Sărmășel); Band (r. Luduș); Turda, Cheia Turzii, Mții Trăscăului; Abrud pe Mt. Vulcan, Scărișoara la Ghețar. *Reg. Aut. M.:* Tg. Mureș, Periș; Mții Călimani, Toplița, Borsec, Bilbor; Bălan pe Mt. «Öcsém» (r. Gheorghieni); Șumoleni, Sândemic, Harghita, Tușnad pe Mt. «Büdös» și Mt. Ciomad (r. Miercurea Ciuc); Odorhei, Băile Craiului, Merești; Zagon (r. Sf. Gheorghe); Comandău (r. Tg. Săcuesc). *Reg. Stalin:* Valea Lungă, Cenade, Micăsasa, Tapu, Șeica Mare, Vorumlac, Proștea Mică, Proștea Mare, Biertan (r. Mediaș); Sighișoara; Belini (r. Rupea); Orașul Stalin, Zizin, Predeal, Mții Bârsei (Piatra Mare, Postăvarul); Cârțișoara la Glăjărie (r. Făgăraș), Mții Făgărașului (V. Bălea, Vf. Trăsnita); Gușterița, Șura Mare, Tâlmăciu, Cislădioara pe Mt. «Götzenberg», Râul Sadului. *Reg. Hunedoara:* Ponorici (r. Hațeg), Mții Retezatului, Petroșeni pe V. Jieșului. *Reg. Oradea:* Oradea; Budoiu (r. Marghita); Poeni, Stâna de Vale (r. Aleșd); Mții Codrului. *Reg. Arad:* Dezna, Moneasa pe Dl. Puncoi, Nădălbăști (r. Gurahonț), Mții Codrului. *Reg. Craiova:* Tg. Jiu. *Reg. Pitești:* Mrea Horezu, Mrea Bistrița (r. Horezu); Govora pe V. Hîrtești (r. Râm. Vâlcea); Mt. Cozia Mții Lotrului; V. Argeșului la Cumpăna, Mții Făgărașului (Paltina, V. Caprei); Câmpulung, Dâmbovicioara. *Reg. Ploiești:* Sinaia, Bușteni, Azuga, Mții Bucegi; Mt. Penteleu. *Reg. București:* Păd. Pasărea (r. Brănești). *Reg. Bărlad:* Nereju (r. Năruja); Vaslui. *Reg. Iași:* Bârnova, Nițelea, Dl. Repedea (r. Iași). *Reg. Suceava:* Bogdănești, Slătioara (r. Fălticeni); Botoșani; Călinești (r. Rădăuți).

Variabilitatea speciei

f. biternăta A. Nyár. f. nova in Add. pag. 675. Frunze inferioare și mijlocii biternate, scurt pețiolate sau aproape subsesile, cele superioare ternate sau numai tripartite. Inflorescența se ridică evident deasupra frunzelor. — *Reg. Iași:* Păd. Repedea (r. Iași).

Planta 72. — 1. *Actaea spicata* L., 1 a. racem fructifer. — 2. *Cimicifuga europaea* N. Schipcz., 2 a. racem fructifer.



Intrebuintări. Plantă otrăvitoare, în special în stadiul de dezvoltare, cu miros neplăcut. Pentru frunzele ei mari, ici colo se cultivă ca plantă decorativă. Părțile subterane au proprietăți purgative violente; se folosește în medicina veterinară.

Răsp. gen.: aproape în toată Europa, Siberia.

Genul 112. **CIMICIFUGA** *) L

Mant. I (1767) 20, nr. 1282, Amoen. acad. VIII (1785) 196, tab. 4.

Caracterele genului identice cu ale speciei.

C. europaëa N. Schipez. in Fl. U.R.S.S. VII (1937) 85 et in Add. VI pag. 721. — *C. foetida* L. p. p. et Auct. eur. — *C. europaëa* f. *intermedia* Bujorean in Bul. Grăd. Bot. Cluj XXIV (1944) 42. — *Actaea Cimicifuga* Auct. Rom., *A. racemosa* Auct. Rom. — **Exs.:** FRE nr. 2529. — **Ic.:** Pl. 72, fig. 2, 2a.

4. Rizom gros, multicapitat. Tulpină simplă sau ramificată în partea superioară, \pm rotundă, abia sulcată, înaltă până la 1—2 m, glabră sau glabrescentă, numai cu axa, ramurile inflorescenței și florile scurt și \pm crispul păroase. Frunze tulpinale inferioare foarte mari, lung pețiolate, (pețiolul și baza lui dilatată) \pm păroase, de 2 ori ternate. Segmente imparipenate, cu foliole sesile, subsesile sau cele inferioare \pm mai lung pețiolulate, ovate sau lat lanceolate, acuminate, penat incize sau adesea cele terminale și cele inferioare \pm adânc lobate, cu margini profund dințate. Frunze superioare mai scurt pețiolate sau subsesile. Pețiol și foliole pe dos la nervuri cu peri drepți, răsfirați sau mai des crispul păroase. Inflorescența un racem simplu sau adesea ramificat, des păroasă. Bractei lanceolate, acute, \pm mai scurte decât pedicelii florilor. Inveliș floral neînsemnat, caduc, din 4—5 foliole petaloide, verzui deschise, ovoid alungite, mici și din 4—5 nectarii albe-verzui, la bază cu gropițe nectarifere. Stamine multe, cu filament mai lung decât învelișul floral. Gineceu cu 4—5 carpele scurt pedicelate, pubescente. Fructe 2—3 (5) folicule rostrate, lungi de 10—17 mm, glabrescente sau \pm păroase, scurt pedicelate. Semințe brune, lungi de 3,5—4 mm, acoperite cu solzi mici, membranoși. Plante cu miros neplăcut. VII—VIII.

Obs. Specia se apropie de *C. foetida* L., de care se deosebește prin tulpina glabră sau glabrescentă, pețiol rar păros (nu este des acoperit cu peri glanduloși), bractei lanceolat cuneate (nu subulate), mai scurte (și nu egale) decât pedunculul floral.

Stațiunea. În păduri de foioase din regiunea de munte, mai ales pe soluri calcaroase.

*) Dela latinescul «cimex» = ploșniță și fuga = fugă, scăpare, probabil din cauza mirosului neplăcut al plantei, de care fug ploșnițele.

Răsp. în țară: *Reg. Cluj*: Rodna; Cluj (V. Plecica, Păd. Făget, Păd. Mănăstur) Sucea; Cheia Turzii, Runc pe Mt. Scărița (r. Turda); Mții Trascăului (Colții Trascăului, Mt. Bedeleului); Sâlcia (r. Câmpeni); Cătina, Țagul Mare, Țăgșor (r. Sărmășel). *Reg. Aut. M.*: Bîlan pe Mt. «Ōsēm» și Mt. Hîghimîșul Mure (r. Gheorghieni); Săndomic, Tușnad (r. Miercurea Ciuc). *Rzg. Stalin*: Proștea Mare, Mediaș; Sibiu, Slimnic. *Reg. Hunedoara*: Mții Trascăului pe Piatra Ceții. *Rzg. Bacău*: Mt. Ceahlău (Durău spre Panaghia), Cheile Bicazului. *Rzg. Suceava*: Horodniceni, Pocoleni la fânețele Frâsinel (r. Fălticeni); Bosanci la Moara lui Carp (r. Suceava); Găureni la fânețele Găvan (r. Rădăuți); Mt. Rarău; Cărlibaba (r. Vatra Dornei).

Intrebuintări. Folosit câteodată în tratamentul bolilor ficatului și veziculei biliare.

Răsp. gen.: Europa centrală, Balcani, Asia Mică, părțile europene din U.R.S.S.

Genul 113. *AQUILEGIA* L.

Gen pl. [ed. I (1737) 160, nr. 450], ed. V (1754) 237, nr. 605. — Căldărușe.

Plante perene, ierbacei, cu rizom scurt și rădăcini viguroase. Tulpină erectă, înaltă, simplă sau ramificată, \pm păroasă, cu frunze alterne. Frunze de 2—3 ori ternate, cu foliole rotunjite la vârf, lobate, glabre sau \pm păroase, cele bazale petiolate, cele tulpinale uneori evident deosebite de cele bazale, fiind foarte reduse. Flori actinomorfe, solitare sau dispuse într'un racem cu flori puține. Inveliş floral dublu, albastru, sau violaceu-albastru, rareori alb, roz sau roșcat, caduc. Periant extern cu 5 foliole petaloide, mari; cel intern din 5 nectarii în formă de cornet, pintenat, de aceeași culoare. Stamina multe, așezate în mai multe cercuri, cele din cercurile interne adeseori transformate în staminodii late, membranoase, uneori petaloide. Folicule 4—5 (2—8), neconcescute lateral, erecte, multisperme, sbârcite și slab turtite lateral, cu cioc \pm lung sau mai scurt. Semințe \pm ovoide, negre, lucitoare, așezate pe 2 rânduri

Determinarea speciilor

1 a Partea nepintenată a nectariilor cu mult mai lungă decât cea pintenată; pinten de obicei mult recurbat. Foliole periantiale ovate oblongi, unguiculate, rotunjite la vârf. Plante de obicei scurde, cu tulpină neramificată, cu 1 (2) flori, de regulă cu 1—2 frunze tulpinale bracteiforme, foarte rar cea inferioară ternată sau biternată

1. *A. transsilvanica*

1 b Partea nepintenată a nectariilor cu mult mai scurtă decât cea pintenată, \pm curbă. Periant cu foliole ovate lanceolate, \pm acuminate.

Planșa 73. — 1. *Aquilegia vulgaris* L., 1 a. fructul. — 2. *A. vulgaris* ssp. *subscaposa* Borb.) Borza, 2 a. o nectarie. — 3. *A. transsilvanica* Schur, cu flori mari, 3 a. o floare mai mică, 3 b. o nectarie.



Plante de obicei mai înalte, cu tulpini ramificate, multiflore, cu frunze tulpinale dezvoltate sau numai bracteiforme . . 2. **A. vulgaris**

1. **A. transsilvânica** Schur in Verh. SVN III (1852) 84, n. nud., IV (1853) 31, descr. — *A. alpina* Baumg. Enum. stirp. Transs. II (1816) 104 et Auct. Transs., non L. — *A. sibirica* Schur l.c. I (1851) 177, non Lam. — *A. glandulosa* Janka in ÖBZ VIII (1858) 200. — *A. paraplesia* Schur Enum. pl. Transs. (1866) 28, sec. Simk. Enum. Fl. Transs. (1886) 58. — *A. Baumgartenii* Schur Phytogr. in Verh. NV Brünn XV (1876) 62, sec. Simk. l.c. — *A. Fussii* Zimmet. Verw. - Verh. Aquil. (1875) 41. — *A. Kitaibelii* Auct. Transs. non Schott. sec. Simk. l.c. — **Exs.**: FRE nr. 1230. — **Ic.**: Pl. 73, fig. 3, 3a, b.

4. Rizom aproape orizontal repent. Tulpină de 5–20 (40) cm înălțime, de obicei simplă sau mai rar în partea superioară slab ramificată, păroasă sau glabrescentă, de obicei unifloră, rar cu 2 flori. Frunze bazale cu petiol lung până la 10 cm, biternate. Segmente laterale și mijlocii bi- sau trifide, cu margini inciz crenate, pe ambele fețe \pm păroase, cu petioli și petioluli păroși. Tulpină cu 1–2 frunze bracteiforme, rar bine dezvoltate. Flori de regulă mari, albastre deschise sau albastre-liliachii, de obicei solitare și terminale, \pm nutante. Foliiolele periantului extern lungi de 2 (3–4) cm și late de 1,3–2 (5) cm, ovat oblongi, unguiculate, rotunjite la vârf, \pm emarginate. Corpul nectariilor mai lung decât pintenul de obicei mult recurbat, cu lungime totală de 2,8–3,5 cm. Inveliș floral \pm păros. Stamina multe, cca de 9 mm, mai scurte decât corpul nectariilor. Staminodii lungi numai cât jumătatea staminelor. Folicule 5–9, scurt rostrate, scurt păroase. Sămânță neagră, nelucitoare. VII–VIII.

Stațiunea. Prin locuri stâncoase, înierbate, în regiunile alpine și subalpine, pe stânci sistoase.

Răsp. în țară: *Mții Buzăului*. *Mții Bucegi*: Caraiman, Schitul Peștera. *Mții Iezer-Păpușa*. *Mții Făgărașului*: Capra Budei, Moldoveanu, Vf. Moșului, Colții Brezii, Ucea Mare, Căldarea Podragului, Arpașul, V. Bălea (Cascada Bălea, Lacul Bălea), V. Doamnei, V. Laiții, Paltina, Negoiu, Ciorteia, Surul, Vf. Dracului (Racovița). *Mții Parângului*: Slăveul Mare, Lacul Slăveului.

Variabilitatea speciei

f. **validior** A. Nyár. f. nova in Add. pag. 675. Tulpină cu 1–3 frunze, dintre care cea inferioară bine dezvoltată, ternată sau biternată, cu foliole sectate sau \pm adânc lobate, asemănătoare celor bazale; cele superioare mici, \pm întregi, bracteiforme. — *Mții Făgărașului*: Vf. Moșului (2150 m).

Răsp. gen.: Endemică în Carpații meridionali din R.P.R.

2. *A. vulgaris* L. Sp. pl. ed. I (1753) 533; Bul. in Fl. U.R.S.S. VII (1937) 94, tab. VII, fig. 10. — Căldărușă. — Kőzönséges harangláb. — Gemeine Akele — Водосбор обыкновенный — Ic.: Pl. 73, fig. 1, 1a, 2, 2a.

4. Tulpină de obicei frunzoasă, rar numai cu frunze tulpinale bracteiforme, înaltă de 10—80 cm, în partea superioară de regulă ramificată, rareori neramificată, păroasă, multifloră. Frunze bazale de obicei biternate, cu foliole late, \pm adânc lobate sau crenate, subrotund cuneiforme. Frunze tulpinale inferioare asemănătoare celor bazale, biternate, cele mijlocii și superioare bracteiforme sau ternate, cu foliole mai alungite. Flori multe, regulate (actinomorfe), albastre, liliachii, roze sau albe, de mărime variabilă. Foliole periantiale externe \pm ovate lanceolate, \pm acuminate. Nectarii pintenate; partea nepintenată cu mult mai scurtă decât cea pintenată, \pm curbată. Fruct din 5—8 (10) folicule, des și scurt păroase, cu rostru \pm lung, erect sau îndoit în afară. Semințe de obicei negre, lucioase. VI—VII.

Stațiunea. Pe coline ierboase și tufoase, pe marginea pădurilor, prin poieni, în regiunea montană și subalpină.

Răsp. în țară: Este răspândită în câteva forme și în general, destul de rară. A fost adusă în cultură ca plantă ornamentală, de unde s'a sălbăticit, mai ales pe lângă așezările omenești.

Variabilitatea speciei

ssp. *pratensis* (Kittel). — *A. vulgaris* a. *A. pratensis* Kittel Taschenb. Fl. Deutschl. ed. II (1853) 868. — *A. vulgaris* α . *typica* Beck Fl. NÖ I (1890) 400. — *A. vulgaris genuina* Rony et Fouc. Fl. Fr. I (1893) 124. — *A. vulgaris* ssp. *vulgaris* Schinz et Kell. Fl. Schw. ed. II, II. Krit. Fl. (1905) 75, s.s. — *A. vulgaris* ssp. *euvulgaris* Dom. Fl. Čehoslov. En. (1935) 80. — *A. vulgaris* Auct. Rom. et Hung.

Tulpină înaltă de 50—70 (80) cm, \pm groasă, foarte ramificată și frunzoasă. Frunze tulpinale 3—4, mari, lung pețiolate, biternate, asemănătoare cu cele bazale; cele superioare ternate sau simple, bracteiforme. Segmentele adânc sectate. Flori de obicei mai mici, cu foliolele externe ale periantului alungit ovate, lungi de cca 2—2,5 cm, acute, cu nectarii la vârf \pm trunchiate sau rotunjite, cu pinteni de obicei foarte curbați, de culoare violacee-albastră, albă sau roz. Întreaga plantă \pm păroasă sau glabrescentă, numai fructul și pedunculii floralii des și scurt păroși. — Cultivată prin grădini și sălbăticită. Proveniența spontană nu este dovedită.

f. *glabélla* (Schur). — *A. vulg.* a *glabella* Schur Enum. pl. Transs. (1866) 28. — Tulpina frunzele, pedunculii floralii și carpelele glabre. — Reg. *Stalin*: Cislădioara pe Mt. « Götzenberg » (r. Sibiu).

f. *pléna* Rechb. Fl. germ. exc. (1832) 748. — Flori învoalte. — Cultivată prin grădini uneori sălbăticită.

f. *nivea* (Baumg.) Borza Consp. Fl. Rom. I (1947) 96. — *A. nivea* Baumg. Enum. stirp. Transs. (1816) 104. — Flori albe. — Reg. *Cluj*: Domnești (r. Bistrița); Cluj la « Fân-

tâna Trandafirilor ». *Reg. Aut. M.*: Covasna. *Reg. Stalin*: Sighişoara; Sibiu, Bungard, Cîsnădioara pe Mt. « Götzenberg ». *Reg. Hunedoara*: Dobra (r. Deva).

ssp. **nigricans** (Baumg.) Jáv. Magy. Fl (1925) 356. — *A. nigricans* Baumg. Enum. stirp. Transs. II (1816) 104. — *A. alpina* Auct. Rom., non L. — *A. glandulosa* Janka in Linn. XXX (1857) 55. — *A. vulg.* a *alpestris*, *A. vulg.* e *stellata*, *A. vulg.* f. *sylvestris*, *A. Haenkeana* Auct. Trans. in Herb. et litt. — **Exs.**: FRE nr. 1231 a-c. — **Ic.**: Pl. 73, fig. 1, 1 a.

Tulpină până la 50 (70) cm înălţime, mai puţin ramificată, mai slab frunzoasă, cu 1—2 frunze inferioare biternate, mari, asemănătoare celor bazale; cele mijlocii şi superioare ternate sau simple, bracteiforme. Segmentele mai puţin adânc lobate. Flori de obicei puţine, mari, cu foliolele externe ale periantului alungit eliptice sau lat eliptice, acuminate, lungi de cca 3—3,5 cm. Nectarul cu pînteni de obicei abia curbaţi la vîrf. Flori albastre deschise sau albastre-violacee. Fruct şi peduncul floral des şi scurt păroşi; celelalte părţi ale plantei glabrescente sau păroase.

În etajul montan şi subalpin.

Mţii Rodnei: Pietrosul Mare, Ineu, Vf. Omului, Corongiş, Mihăiasa, Rabla. *Mţii Trascăului*: Colţii Trascăului. *Reg. Aut. M.*: Mţii Călimani în Păd. Rampa-Lomaş, Bilbor (r. Topliţa); Gheorghieni pe Dl. « Pongráctető », Lăzarea pe Dl. « Pilicske », Mţii Giurgeului: Mt. Licaş, Hăghimaşul Mare, Mt. « Őcsém », Piatra Singuratică; Tuşnad pe Mt. « Büdös », Săncrăieni la « Luci » (r. Miercurea Ciuc); Covasna (r. Tg. Săcuesc.) *Reg. Stalin*: Mt. Piatra Craiului (Crăpătura şi Vlăduşca); Mţii Făgăraşului. *Reg. Hunedoara*: Mţii Trascăului (Piatra Cetii). *Reg. Timişoara*: Băile Herculane pe Mt. Domogled şi Mt. Suşeu. *Reg. Piteşti*: Mţii Făgăraşului (Negoiul); Dâmbovicioara (r. Câmpulung). *Reg. Ploeşti*: Sinaia, Buşteni, Mţii Bucegi: Caraiman, V. Cerbului, V. Ialomişei, V. Horoabei. *Reg. Bacău*: Mt. Ceahlău, Cheile Bicazului, Mt. Suhard, Mt. Ghilcoş, Tulgheş la Pietrile Roşii (r. Ceahlău). *Reg. Suceava*: Mt. Rarău la Pietrele Doamnei, Pojorâta pe Mt. Eva (r. Câmpulung); Cărlibaba (r. Vatra Dornei).

f. **subscapiformis** A. Nyár. f. nova in Add. pag. 676. — Plantă cu 1—3 (4) flori. Tulpină pubescentă, ± groasă, erectă, înaltă de 10—30 cm, neramificată sau numai la partea superioară cu 2—3 ramuri scurte florifere. Frunze bazale ± lung petiolate, mici, abia ajung până la 1/3 din lungimea tulpinii. Tulpinile numai cu frunze bracteiforme alungite, întregi sau ternate (foarte rar biternate), se deosebesc evident de cele bazale, fiind foarte mici, şi având foliole mult mai înguste. — *Mţii Giurgeului*: Mt. Őcsém. *Mţii Bistriţei*: Mt. Ceahlău.

ssp. **subscapōsa** (Borb.) Borza Consp. Fl. Rom. (1947) 96. — *A. subscaposa* Borb. in Magy. Tud. Akad. Ért. XII. 6 (1882) 8, 11, 18. — **Exs.**: FEAH nr. 2081 sub *A. nigr.* — **Ic.**: Pl. 73, fig. 2, 2 a.

Tulpină gracilă, înaltă de 15—30 (40) cm, erectă, neramificată sau chiar dela mijlocul tulpinii ± bifurcat ramificată, cu ramuri lungi, virgat patente, glardulos pubescente. Flori mari, 1—3 (5), albastre deschise. Frunze bazale biternate, deosebite evident de cele tulpinale, care sunt de obicei bracteiforme.

Reg. Cluj: Poşaga de Sus la Şesul Craiului, Mt. Scăriţa, Mt. Vultureasa (r. Turda). Endemică.

f. *eusubscapōsa* A. Nyár. f. nova in Add. pag. 676. — Tulpină neramificată, 1 (2) floră, numai cu frunze bracteiforme, mici, lanceolate, întregi. — *Reg. Cluj*: Poșaga de Sus pe Mt. Vultureasa.

f. *virgatoramōsa* A. Nyár. f. nova in Add. pag. 676. — Tulpină \pm bifurcat ramificată, cu (2) 3—5 flori, cu ramuri lungi \pm patente, cele inferioare până la 15 cm lungime. Frunze tulpinale inferioare adeseori ternate (foarte rar biternate), cu foliole lat lanceolate, mult mai mici decât cele de pe frunzele bazale. — *Reg. Cluj*: Poșaga de Sus pe Mt. Vultureasa.

Întrebuințări. Cultivată ca plantă ornamentală în diferite forme.

Răsp. gen.: Scandinavia de S, Europa centrală, și de S. Cu areal secundar este răspândită și în alte părți ale Europei și în America.

Genul 114. **DELPHINIUM** *) L.

Gen. pl [ed. I (1737) 159, nr. 449], ed. V (1754) 236, nr. 602. — *N e m ț i ș o r*.

Plante anuale sau perene, cu tulpină înaltă, erectă, ramificată, frunzoasă. Frunze multifidate sau digitat sectate. Flori zigomorfe, așezate în racem. Periant cu 5 foliole petaloide, de obicei albastre, caduce. Foliola superioară pintenată. Nectarii 1—4, mai scurte decât periantul, de aceeași culoare, uneori concrescute și pintenate, alteori cele inferioare libere iar cele superioare unite și pintenate, cu pinteni înfiți în pintenul foliolei superioare a periantului. Stamine numeroase. Folicule 1—3 (9), cu semințe numeroase, mici, 3-muchiante, acoperite cu solzi circulari, \pm imbricați.

Determinarea speciilor

- | | | |
|-----|--|------------------|
| 1 a | Floare cu o singură carpelă | 2 |
| 1 b | Floare cu 3 sau mai multe carpele | 4 |
| 2 a | Ovar și foliculă glabre. Flori cu pinteni lungi de cca 2 cm | |
| 2 b | Ovar și foliculă păroase. Flori cu pinteni mai scurți | 3 |
| 3 a | Periant cu foliole lungi de 15—20 mm, albastre azurii sau liliachii, cele laterale lat ovoide, ascuțite. Nectarile unite, cu 3 lobi și un pinten. Pinten lung de cca 15 mm. Frunze inferioare cu foliole puțin mai late decât la frunzele superioare | D. <i>Ajaxis</i> |

Dela delphinion = delfin, numele speciilor genului la Dioscorides (sec. I, e.n.), referitor la pintenul florilor sugerând forma animalului.

Planșa 74. — 1. *Delphinium Consolida* L., 1a. o ramură fructiferă. — 2. *D. Ajaxis* L., 2a. o porțiune din racemul fructifer. — 3. *D. orientale* J. Gay. 3a., o porțiune din racemul fructifer.



- 3 b Periant cu foliole cel mult până la 17 mm lungime, violet, roșii sau albe, cele laterale \pm rotunde. Nectariile unite, cu 3 lobi și un pinten. Pinten cel mult de 1 cm lungime. Foliolele la toate frunzele \pm de aceeași lățime 2. **D. orientale**
- 4 a Frunze până la bază, sau aproape până la bază digitat sectate; segmentele din nou adânc divizate. Segmentul mijlociu mai îngust, de cca 1 cm 5
- 4 b Frunze până la mijloc, sau aproape până la bază palmatisectate. Segmentul mijlociu la bază mai lat de 1 cm . . . 4. **D. intermedium**
- 5 a Frunze până la bază digitat sectate; segmentele liniare, late de 1—3 (5) mm. Racem simplu, alungit, cu flori multe, \pm îndesuite
3. **D. fissum**
- 5 b Frunze aproape până la bază digitat sectate, cu segmente \pm cuneate, la bază late până la 1 cm (Pl. 75, fig. 1). Racem de obicei compus, \pm glabru, cu flori mai puțin îndesuite 5. **D. Simonkaianum**

Subgenul I. **CONSOLIDA** DC. Syst. I (1818) 341. — *Consolida* S.F. Gray Nat. arrang. brit. pl. II (1821) 711, pro gen. — *Consolida* Boiss. Fl. or. I (1867) 75, pro sect.

Plante anuale, cu frunze multifidate. Floarea cu 1 carpelă. Periant cu foliolele concrescute la bază. Nectarii 2, concrescute, cu 2 lobi laterali.

1. **D. Consolida** L. Sp. pl. ed. I (1753) 530; S. Nevski in Fl. U.R.S.S. VII (1937) 102, tab. VIII, fig. 6. — *Consolida regalis* S. F. Gray Nat. arrang. brit. pl. II (1821) 711. — *Ceratosanthus Consolida* Schur in Verh. SVN IV (1853) 46. — *Consolida segetum* Schur l.c. (1853) 47. — Nemțșori de câmp. — Mezei szarkaláb. — Acker-Rittersporn. — Живокость полевая. — Exs.: FRE nr. 2527 sub *Consol.* — Ic.: Pl. 74, fig. 1, 1 a.

○. Tulpină înaltă de 20—40 (50) cm, erectă, ramificată, păroasă sau aproape glabră, foliată. Frunze \pm pețiolate, dublu sau triplu fidate, cu lacinii îngust liniare, late de 1—2 mm, cele superioare simplu fidate, Bractei simple, filiforme, mai scurte decât pedunculii. Flori în racem rarit, simplu, rar compus, violet-albastre, rar roze sau albe, lungi de 2—3 cm. Periant cu foliole ovate, drepte, patule, fin pubescente, lungi de 15 mm, cu pintenul lung până la cca 2 cm, așezat orizontal sau oblic erect. Nectarii concrescute într'o lamină trilobată, cu un pinten înfipt în pintenul foliolelor periantului. Stamine de regulă 8—10, uneori mai multe. Carpelă 1, erectă, cilindrică, îngustată într'un stil scurt, glabru. Foliculă cu semințe lungi de 2 mm, brun-închise, cu suprafața aspră, datorită unor solzișori proeminenți. VI—VIII.

Stațiunea. Prin semănături, locuri cultivate și ruderaie.

Răsp. în țară: Foarte comună în întreaga țară, din regiunea de câmpie până în cea montană.

Variabilitatea speciei

ssp. **arvênsis** (Opiz) Graebn. et fil. in A. et G. Syn. V. 2 (1927) 672. — *Cons. arvensis* Opiz Sezn. (1852) 32. — *C. regalis* ssp. *arvensis* Soó in ÖBZ LXXI (1922) 242.

Periant cu foliole lungi de 12—16 mm, rar mai lungi, egale cu petalele. Pintenii până la 2 cm lungime, alipit păroși. Fruct glabru. — Are următoarele forme:

- 1 a Peduncul alipit pubescent, neglandulos 2
- 1 b Peduncul pubescent și glandulos
 - f. **glanduligerum** Peterm. Fl. Lips. (1838) 400. — *Cons. regalis* β *glanduligera* Soó l.c. (1922) 243. — *Reg. Cluj*: Cluj la Hoia și Techintău, Someșeni.
- 2 a Flori mijlocii cu periant lung de 12—16 mm
 - f. **ramosum** (Vis.). — *D. Consolida* β *ramosum* Vis. Fl. dalm. III (1852) 89. — *D. Cons. α minor* Beck Fl. NÖ I (1890) 401 p.p. — *D. Cons. α typicum* Posp. Fl. Ö. Küstenl. II (1898) 106. — Comună.
- 2 b Flori mari, cu periant lung de 16—20 mm
 - f. **măjor** Beck Fl. NÖ I (1890) 401. — *Reg. Cluj*: Cluj la Fănațe. *Reg. Oradea*: între Borz și Dumbrăvița (r. Beiuș).

ssp. **paniculatum** (Host) N. Busch Fl. cauc. crit. III, 3 (1903) 44. — *Ceratosanthus paniculatus* Schur in Verh. SVN IV (1853) 46. — *Cons. paniculata* Schur l.c. (1853) 47. — *Ceratos. divaricatus* Schur l.c., Enum. pl. Transs. (1866) 30. — *Delph. cons. α minor* Beck Fl. NÖ I (1890) 401. — *Cons. regalis* ssp. *paniculata* Soó l.c. (1922) 243.

Flori mai mici; petala superioară împreună cu pintenul de 22—26 mm lungime. Folicula de 2 ori mai lungă decât lată, de obicei glabră sau \pm spre bază pubescentă. Plantă \pm patul pubescentă. — Are următoarele forme:

- f. **typicum** A. Nyár. f. nova in Add. pag. 676. — Peduncul neglandulos. Fructe glabre. — *Reg. Cluj*: Cluj, Luna de Sus. *Reg. Aut. M.*: Vlăhița (r. Odorhei). *Reg. Constanța*: Constanța, Techirghiol, Mangalia; Medgidia, Cernavodă. *Reg. Galați*: Măcin. *Reg. Bârlad*: Tecuci.
- f. **pubérnum** Săv. ex Prod. Consp. Fl. Dobr. (1835) cum descr. — Fructe spre bază adpres pubescente. — *Reg. Constanța*: Adamclisi și Deleni (r. Băneasa).
- f. **adenopódum** (Borb.). — *Delph. Cons.* var. *adenopodum* Borb. in Ért. Term. tud. kör. XI (1881) 14. — *Delph. Cons.* subvar. *subviscidum* Borb. in MBL III (1904) 25. — Peduncul pubescent și \pm glandulos. — *Reg. Cluj*: Cluj; Turda.

ssp. **divaricatum** (L. b.). — *Delph. divaricatum* Ldb. in Eichw. Pl. Casp.-cauc. (1831) 16, tab. 16 et Fl. ross. I (1842) 59.

Ovar și folicule păroase.

Reg. Constanța: Între Mihai Bravul și Babadag; Cernavodă. *Reg. Galați*: Măcin pe Dl. Pricopan. *Reg. Bârlad*: Tecuci, Drăgănești.

Întrebuintări. Plantă otrăvitoare, conținând în frunze alcaloidul Calcatripina, care scoboară presiunea sângelui și în cantități mai mari provoacă paralizia centrului res-

pirator. Florile conțin diglicosidul Delphinina. Florile uscate, sub numele de « Flores Calcatrippae », și semințele sub numele de « Semen Calcatrippae », sunt folosite în medicină sub formă de ceai, tinctură alcoolică, etc. pentru combaterea gutei, astmei, bolilor bășicii udului, a rinichilor, etc. Se culeg în timpul înfloririi.

Răsp. gen.: Europa, Asia Mică, Armenia, Mții Urali

* **D. Ajacis** L. Sp.pl. ed. I (1753) 531; S. Newski in Fl. U.R.S.S. VII (1937) 104. — *Consolida Ajacis* Schur in Verh. SVN IV (1853) 47. — *Ceratanthus Ajacis* Schur Enum. pl. Transs. (1866) 30. — Surguci. — Kerti szarkaláb. — Garten-Rittersporn. — Живоко́сть аякова. — Ic.: Pl. 74, fig. 2, 2 a.

○. Tulpină erectă, de 30—90 cm, simplu sau bogat ramificată, fin pubescentă. Frunze tulpinale inferioare pețiolate, digitat sectate, cele superioare aproape sesile, toate cu lacinii îngust liniare, acuminate, pubescente. Bractei simple, liniare. Flori în racem simplu, ± dense, de cca 3 cm lungime, albăstrui-violete, cu petale mai deschise, rar roze sau albe. Periant cu foliole ovate, lungi de 15—17 mm, cu piteni lungi de 15 mm, adeseori slab curbate în sus. Nectarii unite, cu 3 lobi și un piten. Stamina cu filamente lățite, înconjurând ovarul. Folicule solitare, lungi de 15—25 mm, cu stil scurt, păros sau glabrescent. Semințe numeroase, lungi de 2,5 — 2,8 mm, cu suprafață aspră, din cauza proeminențelor transversale, paralele. VI—VIII.

Stațiunea. Cultivată și rar subspontană.

Răsp. în țară: *Reg. Cluj*: Cluj; *Dej. Reg. Aut. M.*: subspontană la Odorhei. *Reg. Hunedoara*: Almașul Mic de Munte (r. Orăștie). *Reg. Arad*: Arad. — *Reg. Timișoara*: Oravița, Staiendorf-Anina.

Variabilitatea speciei

f. **brévipes** (Rouy et Fouc.) — *Delph. Ajacis* β. *brevipes* Rouy et Fouc. Fl. Fr. I (1893) 131. — Înaltă peste 30 cm. Peduncul inferior adpres păros, cu mult mai scurt decât bracteea și fructul. — Cluj subspontan.

f. **subconsolida** (Borb.) — *Delph. Uechtritizianum* var. *subconsolida* Borb. in MBL III (1904) 24. — Plantă scundă, înaltă de 20—30 cm, dela partea inferioară ramificată; racem cu flori puține, laxe. Bractei mai scurte decât pedunculii, cele inferioare sectate, cele superioare întregi. Pețiol scurt, glandulos păros. Flori în diametru aproape ca acelea dela *D. Consolida*. — în jurul Clujului.

f. **leucosepalum** (Borb.) — *Delph. Ajacis* var. *leucosepalum* Borb. in Term. tud. Közl. potf. (1891) 23 et ap. Soó in ÖBZ LXXI (1922) 235. — Flori albe. — *Reg. Timișoara*: Oravița, Anina.

f. **rhodantum** (Borb.) — *Delph. Ajacis* var. *rhodantum* Borb. l.c. — Flori roze. — Imprenă cu precedentă.

f. **cyaneum** (Borb.) — *Delph. Ajacis* var. *cyaneum* Borb. l.c. — Flori albastre. — Imprenă cu precedentele.

f. *subcaerulescens* (Borb.) — *Delph. Ajacis* var. *subcoerulescens* Bobb. l.c. — Flori albe, cu încreștățune albastră. — Împreună cu precedentele.

Întrebuințări. Cultivată în forme horticole cu flori pline de diferite culori.

Răsp. gen.: Europa de Sud.

2. **D. orientale** J. Gay in Desmoulins Cat. Dordogne (1840) 12; S. Nevski in Fl. U.R.S.S. VII (1937) 105. — *Consolida orientalis* Schröding in Abh. ZBG Wien IV, 5 (1909) 8, 27. — Exs.: FRE nr. 1228 a, b, c. sub *Consolida*. — Ic.: Pl. 74, fig. 3, 3 a.

○. Tulpină erectă, ramificată, înaltă de 30–60 cm. Se aseamănă mult cu *D. Consolida*, de care se deosebește prin foliolele tuturor frunzelor \pm egal îngustate, și prin bracteele egale sau mai lungi decât pedunculul erect. Periant cu foliole violet, roz-roșii sau albe, cel mult până la 17 mm lungime, cele laterale \pm rotunde. Nectarile unite, cu 3 lobi și un pinten. Pintenul cel mult de 1 cm lungime. Fruct pubescent, la bază glandulos. VI–VII.

Stațiunea. In locuri cultivate, în semănături.

Răsp. în țară: *Reg. Cluj*: Petrești, Inău, Răscruci, Borșa (r. Gherla); Baci, Cluj în V. Pleșca și pe Dl. Sf. Gheorghe. *Reg. Arad*: Cenadul Mare (r. Sânnicolaul Mare); Arad, Pecica, Semlac. *Reg. Timișoara*: Timișoara, Becicherecul Mic; Deta, Foeni (r. Deta). *Reg. București*: Ghimpați (r. Mihăilești); București în Grădina Cișmigiu. *Reg. Constanța*: Basarabi, Cobadin, Techirghiol (r. Constanța); Baladag, Ceamurlia de Sus, Altântepe. *Reg. Galați*: Delta Dunărei în Păd. Letea; Brăila, Lacul Sărat. *Reg. Iași*: Iași la V. lui David, Cristești.

Variabilitatea speciei

f. **minor** (Morariu). — *Consolida orientalis* f. *minor* Morariu Mat. fl. Jud. Vlașca în Anal. Acad. Rom. Mem. Secț. șt. Seria III, tom, XXI, mem. 8 (1946) 237. — Plantă înaltă de 10–20 cm, cu 1–5 flori. In toate părțile sale mai mică și mai gracilă decât tipul. — *Reg. București*: Ghimpați (r. Mihăilești).

f. **rhodochroa** (Soó). — *Cons. orientalis* lus. *rhodochroa* Soó in ÖBZ LXXI (1922) 237. — Flori roze. — Ici-colo împreună cu specia tipică.

Răsp. gen.: Europa de SV, Asia.

Subgenul II. **EUDELPHINIUM** Huth in A. Engl. Bot. Jahrb. XX (1895) 365.

Floarea cu 3 sau mai multe carpele. Nectarii 4, cele inferioare hirsute. Periant cu foliole libere la bază. Plante de obicei perene, cu frunze digitat sectate sau fideate.

Plansa 75. — 1. *Delphinium Simonkaianum* Pawl., 1a. o foliolă periantială pintenată, în interior cu nectaria pintenată, 1b. o foliolă periant., 1c. o nectarie — 2. *D. intermedium* Soland., 2a. Foliolă periant. pintenată, în interior cu nectaria pintenată, 2b. o foliolă periant., 2c. o nectarie, 2d. partea inferioară a tulpinii cu frunză.



3. *D. fissum* W. et K. Pl. rar. Hung. I (1802) 83, tab. 81. — Exs.: FEAH nr. 2907; FHE nr. 42. — Ic.: Pl. 89, fig. 4.

4. Rizom brun, noduros. Tulpină erectă, neramificată, înaltă până la 1 m, scurt păroasă, uniform foliată. Frunze lung pețiolate, vaginante, rotunjate, digitat sectate, cu segmente din nou sectate și lacinii îngust liniare. Inflorescență erectă, cilindrică, densă, neramificată. Bractei subulat lanceolate, de lungimea pedunculului sau mai scurte. Axa inflorescenței, pedunculii și florile glabre sau păroase. Flori albastre-azurii, cu foliolele periantului erecte, lungi de 7—9 mm și piteni aproape drepți, \pm orizontali sau puțin îndreptați în jos. Nectarii 4, albe, mai lungi decât periantul, cele 2 superioare pintenate. Ovar 3 sau multiovulat, erect, păros sau glabru. Fruct cu rostru filiform. Seminte trimuchiate, negre, mărunț scvamate. VI—VIII.

Stațiunea. În păduri, la marginea pădurilor, în locuri stâncoase, pe substrat calcaros.

Răsp. în țară: *Reg. Cluj*: Cluj la Fânațe, între Corpadea și Cojocna, Boj; Poiana Aiudului; Cheia Turzii, Colții Trascăului. *Reg. Stalin*: Orașul Stalin pe Tâmpa. *Reg. Hunedoara*: Alba Iulia pe Dl. Bilac. *Reg. Timișoara*: Băile Herculane, Mt. Domogled, V. Cernei. *Reg. Craiova*: Robănești (r. Balș); Vădeni, Bumbești (r. Tg. Jiu). *Reg. Constanța*: Pădurile din jurul Babadagului, între Babadag și Căugăgia. *Reg. Galați*: Pechea (r. Galați).

Variabilitatea speciei

var. *dinâricum* (Beck et Szysz.) Hay. Prodr. Fl. balc. I (1927) 312. — *D. hybridum* var. *dinâricum* Beck et Szysz. Pl. Monten. in Rozpr. Akad. Umiej. Krakow XIX (1889) 71. — *D. leuocarpum* Huth in Bull. Herb. Boiss. I (1893) 334. — Tulpină glabrescentă sau glabră. Inflorescență și fructe glabre. — *Reg. Cluj*: Cheia Turzii. *Reg. Timișoara*: Defileul Dunărei la Cazane. *Reg. Galați*: Pechea (r. Galați); Roșcani (r. Bujoru). *Reg. Bârlad*: Barcea, Torcești, Blăjeriei de Sus (r. Tecuci).

f. *latifolium* Prod. et Tupa in Herb. ex A. Nyár. f. nova in Add. pag. 676. — Laciniile frunzelor late de 6—16 mm. — *Reg. Timișoara*: între Plavișevita și Ogradena la Cazane (r. Mehadia).

var. *pubescens* Heuff. Enum. pl. Banat. in Verh. ZBG Wien VIII (1858) 46, Sep. 11. — *Delph. fissum* var. *pilosum* Schur in ÖBZ X (1860) 181. — *D. fissum* a. *velutinum* Schur Enum. pl. Transs. (1866) 29. — Tulpină, inflorescență și fruct acoperite cu peri lungi, drepți, catifeiați. — *Reg. Cluj*: Cheia Turzii. *Reg. Stalin*: Orașul Stalin pe Tâmpa. *Reg. Timișoara*: Băile Herculane pe Mt. Domogled, Defileul Dunării la Cazane.

O b s. Această formă păroasă a speciei *D. fissum* e considerată de cei mai mulți autori ca fiind identică cu *D. velutinum* Bertol. Excerpt. (1820) 12. — După A. et G. Syn. V. 2. (1929) 693, deosebirea ar consta în aceea că bracteele inferioare dela *D. velutinum* sunt digitat sectate și de 3 ori mai lungi decât floarea pe când bracteele formelor speciei *D. fissum* sunt întregi, filiforme și mai scurte decât floarea.

Răsp. gen.: Europa de S, Asia Mică, Persia, Transcaspia, Turchestanul de V.

4. **D. intermedium** Soland. in Ait. Hort. Kew. II, ed. I (1789) 243.—*D. elatum* L. ssp. *intermedium* (Soland.) Fleis. et Lind. ap. Krylow Fl. Zap. Sib. (1931) 1142. — Exs.: FRE nr. 1229. — Ic.: Pl. 75, fig. 2, 2 a, b, c, d.

4. Rizom cilindric, noduros. Tulpină erectă, de 60—150 (200) cm înălțime, de obicei glabră, simplă sau cu ramuri scurte. Frunze tulpinale lung petiolate, cele inferioare subrotunde, la bază cordate, digitat 3—7-sectate, cu segmente din nou sectate. Inflorescență alungită, multifloră, cu bractei întregi, sau cele inferioare \pm 1—5-partite, cele supreme liniare; bracteele mici, lungi de 4—9 mm. Flori viu sau închis albastre, rar mai deschise. Periant cu foliole lat ovate, până la 15 mm lungime. Pintenii groși, neregulat onduțați; aproape de 2 ori mai lungi decât laminele lor. Nectarul 4, libere, cele 2 superioare pinate, cele inferioare emarginate, brun închis colorate și alb barbulate. Stamene cu filamente lățite. Ovare 3, rar mai multe, erecte. Folicule de 12—15 mm lungime, cu rostru lung, glabre sau subglabre, rar mai lung păroase. Sămânță trimuchiata, lungă de 3—4 mm, îngust aripată. VI—VII.

Stațiunea. În păduri luminoase, livezi subalpine, marginea pâraielor, cline stâncoase, în regiunea montană și subalpină.

Răsp. în țară: Mții Maramureșului; Mții Rodnei; Obcinele Bucovinei; Mții Bistriței; Mții Giurgeului; Mții Buzăului; Mții Bucegi; Mții Făgărașului; Mții Retezatului; Mții Banatului; Mții Apuseni.

Variabilitatea speciei

- 1 a Axa inflorescenței și pedunculii glabri 2
- 1 b Axa inflorescenței și pedunculii cel puțin în partea superioară păroși 3
- 2 a Vârful foliolelor periantului fără peri îndesuiți
var. **typicum** Pawlowski in Bull. Acad. Pol. Sc. et Lettr. 1933 (1934) 97. — *Delph. elatum* γ *orthotomum* Borb. in MBL III (1904) 25. — *D. intermedium* var. *durescens* Simk. in Magy. orv.-term. vizsg. munk. (1907) 246. et in MBL VII (1908) 252. — Mții Bistriței: Mt. Cernegura lângă Piatra Neamț. Mții Giurgeului: Hăghimașul Mare, Mt. «Öcsém». Mții Bucegi: V. Jepilor, V. Ialomiței, V. Mălăești. Mții Bârsei: Piatra Craiului: Crăpătura, V. Prăpăstiilor. Mții Făgărașului: Arpașul Mare, Vf. Trăsnita. Mții Bihorului: Piatra Galbenă, V. Gropii.
- 2 b Vârful foliolelor periantului pe ambele fețe cu peri scurți, deși
var. **bosniacum** Pawl. l.c. — Mții Făgărașului: V. Zârnei (bas. V. Râul Doamnei).
Obs. Planta publicată de aici nu reprezintă tipul acestei varietăți, ci este o formă asemănătoare cu var. *alpinum*.
- 3 a Tulpină glabră sau numai în parte. pubescentă, exceptând părțile bazale și inflorescența
var. **alpinum** (W. et. K.) DC. Prodr. I (1824) 55. — *D. alpinum* W. et. K. Pl. rar. Hung. III (1812) 273, tab. 246. — Mții Maramureșului: V. Țibăului (din V. Bistrița Aurie). Mții Rodnei: Pietrosul Mare, Corhele Pietrosului, Aria Zimbrului, Corongiș.

Crăciunel. *Mții Giurgeului*: Hăghimaşul Mare, Mt. «Öcsém». *Mții Bucegi*: Caraiman, Coştila, Schitul Peştera, V. Cerbului. *Mții Bârsei*: Piatra Craiului: Crăpătura, V. Prăpăstiilor. *Mții Făgăraşului*: Capra-Buda, Colţii Brezii, Vf. Trăsnita. *Mții Bihorului*: V. Ordencuşii (lângă Scărişoara, r. Câmpeni).

f. *longepedunculatum* A. Nyár. f. nova in Add. pag. 676. — Plantă înaltă, cu inflorescenţă foarte alungită, rarită, cu pedunculi inferiori foarte lungi, de 5—10 cm. — *Mții Bihorului*: V. Ordencuşii lângă Scărişoara (r. Câmpeni).

3 b Intreaga tulpină des păroasă. Fruct de obicei \pm păros

var. *pubiculae* (Borb.) — *Delph. elatum* ϵ . *pubiculae* Borb. in MBL III (1904) 26. — *D. nacladense* Zap. Consp. Fl. Galic. crit. II (1908) 202. f. *elegans* Zap. et var. *pietrosuanum* Zap. l.c. (1908) 203. — *Mții Maramureşului*: Podul Cearcanul. *Mții Rodnei*: Pietrosul Mare, Corongiș. *Obcinele Bucovinei*: V. Botoș lângă Ciocănești, V. Țibăului, V. Bistriței la Cărlibaba (r. Vatra Dornei). *Mții Bistriței*: Mt. Ceahlău la Polița cu Crini și Izvorul Muntelui. *Mții Bârsei*: Piatra Craiului (Cheile Vlădușca, V. Prăpăstiilor, Crăpătura). *Mții Retezatului*: V. Lăpușnicului Mare, sub Mt. Stănulete și Dl Piept. *Mții Țarcu-Godeanu*: Mt. Țarcu. *Mții Bihorului*: Vlădeasa, Mt. Pietrile Albe (lângă Vidra de Sus, r. Câmpeni).

f. *Jávorkae* Kárp. in BK XXXVII (1940) 19. — Diferă de tip prin statura înaltă de 100—160 cm, și prin inflorescența foarte ramificată, cu ramuri lungi. — *Mții Retezatului*: Mt. Borăscu deasupra Gurii Apii (1000 m).

f. *bucovinense* (Zap.) Pawl. l.c. (1934) 98. — *D. elatum* b. *bucovinense* Zap. l.c. (1908) 199. — Plantă înaltă, slab pubescentă, cu folicule glabre. — *Reg. Suceava*: Cărlibaba pe V. Stănei (r. Vatra Dornei).

Răsp. gen.: Pirinei, Alpi, Sudeți, Carpați, partea europeană a U.R.S.S., Siberia, Asia centrală.

5. *D. Simonkaianum* Pawl. in Bull. Acad. Pol. Sc. et Lettr. 1933 (1934) 149. — *D. pyramidatum* Auct. Hung. et Rom., non Alboff. — *D. alpinum* var. *Haynaldii* Huth ap. A. et G. Syn. V. 2 (1929) 685, p.p. — Exs.: FEAH nr. 2904 sub *D. elato*; FRE nr. 1943. — Ic.: Pl. 75, fig. 1, 1 a, b, c.

4. Tulpină erectă, înaltă de 60—150 cm, glabră, foarte rar cu inflorescență pubescentă, în partea superioară de obicei ramificată. Frunze pețiolate, rotunjite, toate palmat fidate aproape până la bază, cu segmente \pm cuneate, din nou sectate și lacinii înguste, acute, cu segmentul mediu \pm alungit, la bază late de 3—10 mm. Dosul frunzelor inferioare și marginile scurt adpres puberule, pe față \pm glabre. Frunzele supreme tripartite sau întregi, lanceolate sau liniare. Bractei și bracteole liniare sau filiforme, adesea \pm colorate. Racem de regulă compus, \pm glabru, cu flori puține, de un albastru viu sau închis. Foliiolele periantiale lungi de 14—18 mm, cele superioare ovate sau lat ovate, cele laterale suborbiculare sau foarte lat ovate, lungi cel mult de 15 mm. Marginea foliolelor cu peri foarte scurți, scabriusculi. Pinten mai lung decât foliolele periantului. Nectarii nigrescente, asemănătoare cu cele dela *D. intermedium*. Folicule glabre. VII—VIII.

Stațiunea. Pe dealuri stâncoase, calcaroase sau în poienile pădurilor dela câmpie.

Răsp. în țară: Vezi mai jos.

Variabilitatea speciei

var. **psilocarpum** (Simk.) Pawl. l.c. (1934) 150. — *D. cuneatum* var. *psilocarpum* Simk. in Magy. orv. term. - vizsg. munk. (1907) 246 et in MBL VII (1908) 253. — Reprezintă tipul. Axă inflorescenței, pedunculii, fața exterioară a foliolelor periantului și foliculele glabre. — *Reg. Cluj*: Mții Gilăului deasupra Com. Runc (r. Turda), Mții Trascăului (Colții Trascăului, Mt. «Ordaskő»). *Reg. Hunedoara*: Alba Iulia, Mții Trascăului: Piatra Ceții (800—1000 m), V. Gălzii, V. Feneșului. *Reg. Aut. M.*: între Băla și Ercea pe Dl. Copăcel (r. Tg. Mureș). *Reg. Bacău*: Tulgheș la Pietrile Roșii (r. Ceahlău).

var. **sericeocarpum** (Simk.) Pawl. l.c. — *D. cuneatum* var. *sericeocarpum* Simk. l.c. — Axă inflorescenței, pedunculii, fața exterioară a foliolelor periantului și foliculele, puberule. — *Reg. Pitești*: V. Dâmbovicioarei (r. Câmpulung).

Răsp. gen.: Endemică.

Genul 115. **ACONITUM** *) L. 1).

Gen. pl. ed. I (1737) 159, nr. 448, ed. V (1754) 236, nr. 603; Rehb. Mon. Gen. Aconit. (1820) 16, Illustr. spec. Aconit. (1823—27); Sēr. in DC. Prosr. I (1824) 56; Gay. Mon. europ. Aconit. — O m a g.

Plante perene ierboase. Rizom oblic, cilindric, ramificat, tuberos sau netuberos. Frunze alterne, de regulă palmat divizate, cu diviziuni ± înguste. Inflorescență racemoasă sau ramificată. Flori hermafrodite, bilaterale (zigomorfe). Periant cu 5 foliole petaloide, neregulate, caduce, rar persistente, cea superioară în formă de coif, cele 2 laterale rotund-ovate, cele inferioare eliptice. Nectariile superioare 2, în formă de pinteni, lung și îngust unguiculate, celelalte 3 foarte mici sau lipsesc. Stamine numeroase. Ovare libere, de regulă 3—5. Fructe folicule cu multe semințe muchiate, aripate sau transversal cutate.

Determinarea speciilor

- 1 a Rădăcina slab tuberoasă, în formă de rizom, ramificată. Frunze divizate până la 2/3 sau 3/4, cu lacinii late, dințate. Coif alungit în formă de sac, de 2—4 ori mai lung decât lat. Pintenii nectariilor încovoiați sau drepți. Semințe obtuze, ondulat muchiate, ± netede 2
- 1 b Rădăcina napiform tuberoasă, Frunze ± până la bază sectate, cu lacinii din nou adânc sectate. Coif lat, boltit, cel mult de 2 ori mai înalt decât lat. Pintenul nectariilor drept sau numai puțin încovoiat. Semințele dela capetele foliculelor neregulate, cele dela mijloc în

*) Numele unei plante otrăvitoare la Theophrastos și Nicandros.

1) Prelucrat de G. h. Grințescu.

- formă de felie de pepene, cu o muchie lat aripată, transparentă, celelalte 2 îngust aripate, cu fețele laterale netede sau foarte puțin încrețite 10
- 2 a Inflorescența acoperită cu peri reversi, crispuți (rar patenți), neglan-
duși 3
- 2 b Inflorescența moale patent-viloasă 7
- 3 a Flori albastre, violete sau purpurii 4
- 3 b Flori galbene 6
- 4 a Tulpina de 1—1,80 m, gracilă. Inflorescența de 50—60 cm lungime,
cu pedunculi de 6—7 cm. Flori albastre. Coif clavat . . 11. **A. excelsum**
var. **pseudoexcelsum**
- 4 b Tulpina până la 30 cm înălțime. Inflorescența de 5—10 cm lungime,
cu pedunculi de 1—3 cm. Flori violete. Coif drept 5
- 5 a Tulpină ramificată, cu frunze mari, numeroase. Inflorescența ramifi-
cată. Racem terminal cu flori laxe. Pedunculii inferiori lungi
9. **A. moldavicum**
- 5 b Tulpină simplă, scundă, cu frunze puține. Inflorescența un racem
simplu cu flori îndesuite 10. **A. Hosteanum**
- 6 a Frunze lat divizate, subțiri. Inflorescența \pm ramificată. Fructe
glabre 14. **A. Vulparia**
- 6 b Diviziunile frunzelor înguste, late de 1—1,5 mm. Inflorescența un
racem simplu, lung. Fructe acoperite cu peri rigizi, culcați
17. **A. dasytrichum**
- 7 a Tulpina glabrescentă. Frunze lucitoare, păroase, rar glabre. Inflores-
cența și foliolele periantului patent viloase. Flori albe-gălbui, spre
bază mai gălbui, la extremități pătate cu verde. Fructe negre, glabre
15. **A. puberulum**
- 7 b Tulpină păroasă. Frunze groase, nelucitoare, păroase. Inflorescența
 \pm ramificată, cu ramuri foarte păroase, cu peri deși, hirsuți . . . 8
- 8 a Ramuri și pedunculi de lungime inegală. Inflorescența, periantul și
fructele patent viloase 16. **A. lasianthum**
- 8 b Ramuri lipsă sau cel mult câte una la baza racemului 9
- 9 a Fructe setiform-viloase 13. **A. velutinum**
- 9 b Fructe sericeu alipit puberule 12. **A. lasiostomum**
- 10 a Flori galbene, persistente și după înflorire 1. **A. Anthora**
- 10 b Flori albastre închise, rar pestrițe cu alb sau chiar albe, după înflo-
rire căzătoare 11
- 11 a Fețele semințelor netede, cu muchii îngust aripate. Inflorescența
de obicei puțin ramificată; ramurile inferioare înfloresc mai târziu.
Laciniile frunzelor cu marginile paralele, aproape până la bază sec-
tate 12

- 11 b Fețele semințelor cu muchii unite sau separate, ondulate, nearipate. Inflorescența ramificată; ramurile bazale înfloresc odată cu racemul terminal. Laciniile frunzelor lățite spre bază 14
- 12 a Tulpină scundă. Inflorescența un racem simplu, scurt (de 5—8 cm), cu flori puține 2. **A. romanicum**
- 12 b Tulpina înaltă. Inflorescența ramificată, simplă sau multifloră, cu un racem terminal mare 13
- 13 a Coif tot atât de înalt cât lat sau puțin mai înalt, neîndepărtat de axa inflorescenței, cu cioc foarte scurt, brusc proeminent. Inflorescența puțin ramificată la bază 4. **A. callibotryon**
- 13 b Coif mai lat decât înalt, îndepărtat de axa inflorescenței, cu ciocul treptat alungit. Inflorescența simplă 3. **A. tauricum**
- 14 a Axa inflorescenței și pedunculii glabri, rar cu peri creți, culcați . . 15
- 14 b Axa inflorescenței sau cel puțin pedunculii cu peri drepți, patenți, simpli sau glanduloși 16
- 15 a Flori mijlocii sau mari. Coif evident deschis, aplecat înainte, la vârful umflat, la bază mult îngustat în unguiculă, foarte arcuit deasupra ciocului; ciocul patent sau îndreptat în sus 5. **A. variegatum**
- 15 b Flori ceva mai mici. Coif mai puțin deschis, puțin arcuit, cu boltitură aproape conic îngustată în partea de sus. Ciocul întins înainte sau aproape aplecat în jos 6. **A. gracile**
- 16 a Bracteele pedunculilor ovate sau ovat-oblongi. Coif evident mai înalt decât lat 8. **A. toxicum**
- 16 b Bracteele filiforme 17
- 17 a Coif încă odată mai înalt decât lat, cu cioc foarte proeminent. Fructe păroase 8. **A. toxicum** ssp. **lasiocarpum**
- 17 b Coif egal de lung și de lat. Fructe glabre 18
- 18 a Coif cu cioc lung, deasupra ciocului evident arcuit. Inflorescență lată, multifloră, cu pedunculii inferiori alungiți . . 7. **A. paniculatum**
- 18 b Coif cu cioc foarte scurt, deasupra ciocului și la marginea inferioară abia arcuit. Inflorescență scurtă, cu puține flori; racemul terminal simplu sau la bază cu 2—5 ramuri scurte. Pedunculi uniformi
7. **A. paniculatum** ssp. **Degeni**

Secția I. ANTHORA DC. Syst. nat. I (1818) 365. — *Anthoroidea* Rchb. Mon. gen. Aconit. (1820) 33.

Tuber napiform. Periant persistent. Coif boltit, aplecat pe cioc. Nectarul cu pinten ± refract și cap îndoit pe spate. Semințe pe partea dorsală ± în formă de felie de pepene.

1. **A. Anthóra** L. Sp. pl. ed. I (1753) 532. — Rchb. Monogr. gen. Aconit. (1820) 61, tab. 1; Illustr. spec. Aconit. (1823—27) nr. 1, tab. 59; Gáy. in MBL VIII (1909) 124; G. Grinț. Stud. gen. Aconit. Rom. (1934) 32; Steinberg in Fl. U.R.S.S. VII (1937) 190, tab. XII, fig. 1. — Omeag galben. — Mére-

gölő sisakvirág. — Giftheil Eisenhut. — Аконит противоядный. — Exs.: FEAH nr. 2537; FRE nr. 152. — Ic.: Pl. 76, fig. 3; G. Grinț. Gen. Acon. (1934) Pl. XII—XXVIII. (foto).

4. Tuber scurt, napiform. Tulpină de 15—100 cm sau și mai înaltă. Frunze în general îngrămădite mai ales sub inflorescență; cele inferioare lung pețiolate, glabre, orbiculare, de 4—5 cm în diam., adânc sectate până la pețiol, cu 5, rar 7 segmente, cu lacinii suprapuse, lanceolat obtuze; cele mijlocii mai scurt pețiolate, glabre, apropiate unele de altele, trapezoidale, de 6—8 cm în diam., cu lacinii de 1—2 mm lățime, ascuțite, arcuite și suprapuse, cele superioare scurt pețiolate (3—6), ciliate sau pubescente, cu lacinia terminală mai îngustă, foarte lung ascuțită. Inflorescență simplă sau ramificată, cu 1—8 ramuri cu 3—5 flori, pubescentă, vilos pubescentă sau hirsut viloaasă, cu peri cenușii sau galbeni-aurii. Bractei liniare, în general de lungimea pedunculilor. Pedunculii lungi de 1—1,5 cm, drepți, groși sau subțiri, alăturați sau îndepărtați de axă, sau lungi și strâmbi, egali cu florile. Bracteole mai mici, distanțate și divergente. Flori galbene deschise. Coif (cască), hemisferic, boltit sau hemisferic boltit, pubescent sau hirsut vilos, înalt până la 25 mm, cu fruntea dreaptă, \pm știrbită, sau adânc turtită pe cioc. Foliiolele periantiale laterale la maturitate recurbate în afară, la interior barbulate, una din cele inferioare glabă, cealaltă ciliată, neegale. Nectarii 2, mari, în formă de cornet, lung unguiculate, glabre sau rar ciliate. Limbul pintenului brăzdat în lung, cu 2 nervuri marginale ramificate, la vârf emarginat, puțin sectat, rar întreg sau dințat. Foliculele \pm hirsute, mai rar pubescente. Semințele de la capetele foliculelor turtite, cele mijlocii în formă de felie de pepene, trimuchi-ate, cu muchiile laterale îngust aripate, muchia interioară lat aripată și fețele netede sau foarte puțin încrețite. VII—IX.

Stațiunea. Prin fânețe, pășuni, pe brâne stâncoase, prin dărâmături de stânci expuse soarelui, în regiunea montană și subalpină. În Transilvania coboară la câmpie, în tufișuri, tăieturi de păduri.

Răsp. în țară: Reg. Baia Mare: Mții Tibleșului, Mții Maramureșului, Mții Rodnei. Reg. Cluj: Rodna, Romuli (r. Năsăud), Mții Rodnei, Beclean, Chiochiș, Buza; Cărnărașul (r. Sărmășel); Cluj la Fânețe, Cojocna; Ceanul Mare, Cheia Turzii, Moldovenești, Rimetea pe Colții Trascăului, Vidolm, Runc, Poșaga de Sus, Mt. Scărița, Luncani (r. Turda); Poiana Aiudului, Băgău (r. Aiud); Abrud pe Mt. Vulcan. Reg. Aut. M.: Mții Gurghiului; V. Mureșului între Sălard și Răstolița, Borsec; Mții Giurgeului, Reg. Stalin: Mănărade (r. Mediaș) Racoșul de Jos pe Dl. «Töpehegy» (r. Rupea); Orașul Stalin pe Tâmpa, Mții Bârsei, Mții Bucegi; Mții Făgărașului; Slimnic (r. Sibiu), Mții Sibiului. Reg. Hunedoara: Mții Trascăului, Intregalde, Alba Iulia, Mihalț; Deva pe dealurile din împrejurimi; Mții Parânzului; Mții Retezatului. Reg. Oradea: Mții Bihorului. Reg. Arad: Mții Zarandului. Reg. Timișoara: Oravița, Ciclova, Staierdorfanina; Mții Cernei. Reg. Craiova: Mții Mehedinților; Mții

2: Julia Ape = Vatra Doinei

Parângului. *Reg. Pitești*: Mții Căpățânei; Mt. Cozia; Mții Făgărașului; Mții Iezer-Păpușa. *Reg. Ploiești*: Mții Bucegi, Mții Ciucașului; Mții Buzăului. *Reg. Bacău*: Mții Bistriței. *Reg. Suceava*: Mții Bistriței; Mt. Rarău, Obcina Feredeului, Breaza pe V. Moldovei, Pojorâta (r. Câmpulung); Vatra Dornei pe Mt. Oușor, Mții Suhardului, Mții Călimani.

Variabilitatea speciei

- 1 a Flori pubescente 2
- 1 b Flori hirsut viloaase 6
- 2 a Flori galbene, înalte de 16—32 mm 3
- 2 b Flori variegat, galben-verzui, pătate cu albastru, la uscare devin galben-roșietice, înalte de 30—32 mm
- f. *Lucinae* G. Grinț. Stud. gen. Aconit. Rom. (1934) 61, Pl. XIV, fig. 121 a, c. *A. Anthora* α *typicum* Beck Fl. NÖ I (1890) 403, p.p. — *Reg. Baia Mare*: Mții Rodnei (Pietrosul Mare). *Reg. Aut. M.*: Mții Giurgeului (Hăghimașul Mare). *Reg. Stalin*: Mt. Piatra Craiului. *Reg. Bacău*: Tulgheș la Pietrile Roșii (r. Ceahlău). *Reg. Suceava*: Mt. Rarău. Obcina Feredeului pe Mt. Lucina; Vatra Dornei pe Mt. Oușor, Cărlibaba pe Mt. Țibău.
- 3 a Nectarii și stamine glabre 4
- 3 b Stamine ciliate sau amestecate, glabre și ciliate, nectarii cu cili rari sau glabre. ... 5
- 4 a Stamine uniforme
- f. *carpaticum* G. Grinț. l.c. (1934) 67—68. — *A. Anthora* α *typicum* Beck Fl. NÖ I (1890) 403, p.p. — *l.c.*: G. Grinț. l.c. Pl. XII, XIV, XV, XX—XXII. — *Reg. Baia Mare*: Mții Rodnei (Piatra Zimbrului). *Reg. Cluj*: Almașu (r. Huedin); Cluj la Fânațe; Cheia Turzii; Scărișoara, Gârda de Jos (r. Câmpeni). *Reg. Aut. M.*: Mții Giurgeului (Hăghimașul Mare, Mt. «Öcsém»). *Reg. Stalin*: Blaj, Petrișat, Mănărade, Mediaș; Racușul de Jos pe Dl. «Töpehegy» (r. Rupea); Mt. Piatra Mare, Predeal; Ludisor (r. Făgăraș). *Reg. Hunedoara*: Intregalde (r. Alba Iulia). *Reg. Timișoara*: Ciclova (r. Oravita). *Reg. Pitești*: Mții Căpățânei (Mt. Târnovu din bas. V. Lotrului); Mt. Cozia. *Reg. Ploiești*: Mții Bucegi; Caraiman, Bătrâna, Strunga, V. Ialomita (Cheile Tătarului, Schitul Peștera). *Reg. Bacău*: Mt. Ceahlău, Tulgheș pe Mt. Hăghieș.
- 4 b Stamine de forme diverse
- f. *monticolum* G. Grinț. l.c. — *A. Anthora* α *typicum* Beck l.c. p.p. — *l.c.*: G. Grinț. l.c. Pl. XII—XV, XXIII. — *Reg. Cluj*: Cheia Turzii; Băgău (r. Aiud); Scărișoara, Gârda de Jos (r. Câmpeni). *Reg. Aut. M.*: Mții Giurgeului (Hăghimașul Mare). *Reg. Stalin*: Blaj; Mt. Piatra Craiului. *Reg. Hunedoara*: Mții Trascăului (Păd. Bucerde, Piatra Ceții); Deva pe Dl. Cozia. *Reg. Bacău*: Mt. Ceahlău, Tulgheș pe Mt. Hăghieș.
- 5 a Stamine uniforme
- f. *montanum* G. Grinț l.c. — *A. Anthora* α *typicum* Beck l.c. p.p. — *l.c.*: G. Grinț. l.c. Pl. XXIII, XXV. — *Reg. Cluj*: Cheia Turzii; Gârda de Jos (r. Câmpeni). *Reg. Hunedoara*: Mții Trascăului pe Piatra Ceții; Deva pe Dl. Cozia. *Reg. Stalin*: Blaj la Păd. Cărbunari. *Reg. Pitești*: Mt. Cozia. *Reg. Ploiești*: Brânele Caraimanului.
- 5 b Stamine de forme diverse

Plansa 76. — 1. *Aconitum gracile* Rechb. — 2. *A. variegatum* L., 2a. sămânța mărită. — 3. *A. Anthora* L.



f. *dácicum* G. Grinț. l.c. — *A. Anthora* α. *typicum* Beck l.c. p.p. — **Ic.**: G. Grinț. Pl. XV—XVI, XVIII, XXV. — *Reg. Cluj*: Buza (r. Beclean); Cămărașul (r. Sărmășel); Cluj la Fânațe; Cheia Turzii; Gârda de Sus (r. Câmpeni). *Reg. Stalin*: Blaj la Păd. Cărbunari. *Reg. Hunedoara*: Mții Trascăului pe Piatra Ceții; Almașul Mic de Munte (r. Orăștie). *Reg. Pitești*: Mții Făgărașului (Mt. Râiosul). *Reg. Ploști*: Mții Bucegi. *Reg. Bacău*: Mt. Ceahlău, Tulgheș pe Mt. Hăghieș.

6 a Nectarii și stamine glabre 7

6 b Nectarii glabre, rar ciliate; stamine ciliate sau amestecate, glabre și ciliate 8

7 a Stamine uniforme

f. *alpêtre* G. Grinț. l.c. — *A. Anthora* β. *velutinum* Rchb. l.c. Fl. germ. IV (1840) 25, tab. 100, fig. 4711 β, non *A. lasiostomum* f. *velutina* Rchb. Illustr. spec. Aconit. (1823) 27 nr. 57, tab. 49. — *A. Anth.* a. *alpinum* et b. *collinum* Schur Enum. pl. Transs. (1866) 30, p.p. — *A. Anth.* *patulum* Rouy et Fouc. Fl. Fr. I (1893) 136. — **Ic.**: G. Grinț. l.c. Pl. XIII—XV, XXV. — *Reg. Cluj*: Mții Rodnei (Vf. Corongiș). *Reg. Stalin*: Blaj la Păd. Cărbunari; Mții Bucegi, Mt. Piatra Craiului; Ludișor (r. Făgăraș). *Reg. Ploști*: Mții Bucegi; Vf. cu Dor, Furnica, Piatra Arsă, Caraiman pe brâne, Vf. Omul Peștera Ialomiței; Mții Ciucașului (Mt. Zăganul). *Reg. Bacău*: Mt. Ceahlău. *Reg. Suceava*: Mt. Rarău.

7 b Stamine de forme diverse

f. *subalpinum* G. Grinț. l.c. — *A. Anth.* b. *collinum* Schur l.c. p.p. — **Ic.**: G. Grinț l.c. Pl. XIII—XIV, XVI, XVII, XXV, XXVI. — *Reg. Cluj*: Cluj. *Reg. Stalin*: Blaj la Păd. Cărbunari; Mănărade, Băile Bazna (r. Mediaș); Racoșul de Jos (r. Rupea); Orașul Stalin pe Tâmpa, Mții Ciucașului (Mt. Tesla). *Reg. Pitești*: Mții Făgărașului (Mt. Râiosul). *Reg. Ploști*: Mții Bucegi (V. Izvorul Dorului, Caraiman pe brâne); Mții Ciucașului (Zăganul, Bratocea). *Reg. Bacău*: Mt. Ceahlău, Mt. Măgura din V. Bistricioarei. *Reg. Suceava*: Mt. Rarău, Cărlibaba (r. Vatra Dornei).

8 a Stamine uniforme

f. *pinicolum* G. Grinț. l.c. — *A. Anth.* b. *collinum* Schur l.c. p.p. — **Ic.**: G. Grinț l.c. Pl. XIV. — Mții Bucegi; Mții Făgărașului (Vf. Râiosul).

8 b Stamine de forme diverse

f. *abieticolum* G. Grinț. l.c. — *A. Anth.* b. *collinum* Schur l.c. p.p. — **Ic.**: G. Grinț. l.c. Pl. XIV, XVII, XXVII. — *Reg. Cluj*: Băgău (r. Aiud). *Reg. Stalin*: Blaj la Păd. Cărbunari; Orașul Stalin pe Tâmpa, Mt. Piatra Craiului. *Reg. Pitești*: Mt. Cozia. *Reg. Prahova*: Mții Bucegi; Furnica, V. Urlătoarei, V. Jepilor, Caraiman pe brâne, V. Horoabei; Mții Ciucașului (Zăganul). *Reg. Bacău*: Mt. Ceahlău. *Reg. Suceava*: Mt. Rarău.

Întrebuințări. Plantă otrăvitoare. Se întrebuințează la pregătirea medicamentelor «Folia», «Tubera» et «Radix Aconiti» contra astmei, bolilor de piept, otitei, gingivitei, nevralgiilor, etc., sub formă de ceai, sirop sau praf.

Răsp. gen.: În regiunea muntoasă a Europei centrale și de S.

Secția II. *NAPELLUS* DC. Syst. nat. I (1819) 365, 371; G. Grinț. Stud. gen. Aconit. Rom. (1934) 19. — *Napelloidea* Rchb. Mon. gen. Aconit. (1820) 33.

Tuber alungit napiform. Periant căzător, Coif ± hemisferic, cu fruntea neadâncită și cioc scurt. Nectarii cu pinten arcuit, la vârf obtuz și dat pe spate. Seminte în 3 muchii, ± aripate, pe fețe netede.

2. **A. romanicum** Wol. Fl. pol. exs. nr. 905; Gáy. in MBL VIII (1909) 162. — **lc.**: Pl. 77, fig. 1.

4. Tulpină până la 45—60 cm înălțime, dreaptă, subțire, în partea de jos groasă de 2—3 mm, glabră. Frunze pedate, 3—5 - fide, pielose, cu segmente primare rombice, la bază lat cuneate, profund 3 - fide, cele secundare 2—3 - fide, terminale, lanceolate, ascuțite sau acuminate, late de 3—5 mm, glabre, cu sinusul larg deschis, aproape în linie dreaptă. Inflorescența racem simplu, scurt, lung de 5—8 cm, cu puține flori. Pedunculii mai scurți decât florile sau cei inferiori egali, dreپți, patenți, glabri. Bractei liniare, lanceolate, mai scurte decât pedunculii sau egale, cele inferioare foliacee, partite, mai lungi decât pedunculii; bracteolele fixate în partea superioară a pedunculilor, liniare, lungi de 2—5 mm, glabre. Flori închis violacee. Coif hemisferic sau puțin mai înalt decât lat, oblic sau orizontal, cu spatele și fruntea aproape dreaptă, înalt de 20 mm, glabru, deasupra lat rotunjit, cu rostru scurt ascuțit; linia bazală aproape dreaptă, lungă de 18—20 mm sau puțin arcuită. Foliiolele periantiale mijlocii la exterior glabre, la interior des ciliate, late de 15—18 mm, cele inferioare obtuze, lungi de 6—15 mm. Nectariile cu unguiculă alungită, ciliată și curbată și pinten capitat, dat pe spate, ciliat la interior; buza alungită, la vârf dilatat emarginată, ciliată. Stamine amestecate, păroase, glabre și slab ciliate, simple sau 1—2 - dentate. Folicule glabre, late de 5—6 mm și lungi de 14—15 mm, cu stil recurbat, de 4 mm. Semințe, împrejurul hilului membranos transparente, cu marginile ieșite mai în afară și părțile laterale unite într'o muchie lat aripată, pe spate ondulat muchiate.

VIII.

Stațiunea. Prin pajiști montane, marginea pădurilor.

Răsp. în țară: *Reg. Bacău*: Mt. Măgura din V. Bistricioara (Tulgheș, r. Ceahlău). *Reg. Suceava*: Pojorâta sub Mt. Eva (r. Câmpulung).

Variabilitatea speciei

1. **flexuosum** G. Grinț. f. nov. in Add. pag. 682. — Inflorescență neramificată \pm flexuoasă, cu pediceli lungi de 3—5 cm, nutanți sau curbați și strâmbi în toate părțile, \pm unilaterali. — *Reg. Suceava*: Pojorâta pe Mt. Eva și Mt. Muncelu (r. Câmpulung).

Răsp. gen.: Endemic în R.P.R.

Plansa 77. — 1. *Aconitum romanicum* Wol. — 2. *A. callibotryon* Rehb., 2 a. o sta-mină, 2b. coiful cu nectarii, 2c. fructul. — 3. *A. callib.* ssp. *bucovinense* (Zap.) G. Grinț. — 4. *A. collib.* ssp. *hunyadense* (Deg.) Soó.



3. **A. táuricum** Wulf. in Koelle Spicil. obs. Aconit. (1786) 15 et in Jacq. Collect. II (1788) 112. — **Exs.** : FRE nr. 1232 sub f. *taurérico*. — **Ic.** : Pl. 78, fig. 1.


4. Tulpină dreaptă, țeapănă, groasă, înaltă de 10—60 cm, rar mai mult, îngrămădit foliată. Inflorescență și pediceli glabri, sau cu peri rari în partea de sus și în special sub inserția pedicelilor, pe pedicel, pe frunzele superioare, sau pe bractei. Frunze cu pețoli scurți, 5—7 -divizate, pedate; diviziunile romboidal dilatate, îngust cuneate, în partea superioară repetat trifide, laciniat dentate, cu laciniile și dinții alungite, liniar acuminate, ascuțite, late de 1—4 mm, puțin divergente sau subparalele și glabre. Inflorescență racem cu flori dese, lung de 10—20 cm, cilindric; pediceli mai scurți decât florile. Bractei inferioare foliacee, întrecând florile, treptat descrescânde, cele de sus liniare, egal de lungi cu florile; bracteolele așezate în partea superioară a pedunculilor, liniare, lungi de 2—4 mm. Flori închis violete. Periant glabrula exterior. Coif hemisferic mai scurt decât lat, la vârf lat rotunjit, cu cioc (rostru) treptat ascuțit; linia bazală aproape dreaptă sau puțin sinuată, lungă de 12—20 mm. Filamente lat aripate, atenuate, glabre sau păroase. Nectarii cu unguiculă curbată, pinten capitat sau obtuz, lin dilatată, emarginat. Carpele glabre, de 18 mm lungime și 5—6 mm lățime. Stil lung de 3—4 mm. Semințe pe muchii aripate, pe fețe netede sau pe o față puțin transversal cutate. VIII—IX.

Stațiunea. În locuri ierboase, stâncoase din regiunea subalpină și alpină.

Răsp. în țară: *Mții Rodnei*: Pietrosul Mare. *Mții Bistriței*: Ceahlău. *Mții Giurgeului*: Hăghimașul Mare. *Mții Bucegi*: V. Horoabei din V. Ialomiței. *Mții Bârsei*: Postăvarul, Mt. Tâmpa (Orașul Stalin), Mt. Piatra Craiului. *Mții Iezer-Păpușa*: V. Dâmbovicioara. *Mții Făgărașului*: Vf. Moșului, Lacul Urlea, Arpașul, Lacul Capra, V. Doamnei, Negoitul, Căprăreasa, Surul. *Mții Sibiului*: Cindrelul, Beșineul, Păltiniș, Găușoara. *Mții Parângului*: Mândra, Cârja, Slăveiu. *Mții Retezatului*: Fața Retezatului, Vf. Custura, Vf. Peleaga, Stâna din Păpușa, V. Valerească, Gruicul Lung, V. Pietrile, Borăscu. *Mții Țarcu-Godeanu*: Mt. Baicu. *Mții Mehedinților*: V. Cernei, Piatra Cloșanilor.

Variabilitatea speciei

1 a	Inflorescență glabră	2
1 b	Inflorescență ± păroasă	5
2 a	Segmentele frunzelor apropiate, cel mijlociu nu este atenuat în pețiol. Toate staminele glabre	ssp. Koelleanum
2 b	Segmentele frunzelor foarte divergente, cel mijlociu atenuat în pețiol. Stamine glabre, ciliate și pubescente	ssp. remotisectum
3 a	Inflorescență neramificată	4
3 b	Inflorescență ramificată	6



ssp. **nanum** (Baumg.) Gáy. in MBL VIII (1909) 146. — *A. Napellus* var. *α nanum* Baumg. Enum. stirp. Transs. II (1816) 99. — *A. tauricum* Auct. Transs. — *A. Napellus* h. *czarnohorensis* Zap. Consp. fl. Galic. crit. II (1908) 227.

Plantă scundă, de 20—30 cm. Frunze cu lacinii îndreptate înainte, ciliate. Inflorescența deasă, cu peri rășiți, patenți. Coif boltit, de 12—16 mm, cu cioc lung, recurbat și linia bazală arcuită. Filamentele staminelor păroase.

Mții Maramureșului: Mt. Farcău. *Mții Rodnei*: Pietrosul Mare, Corongiș, Inău. *Mții Tibleșului*: Tibleșul, Arsul. *Mții Suhardului*; *Mții Rarăului*: Rarău la Pietrele Doamnei. *Mții Călimani*: Pietrosul, *Mții Bistriței*: Ceahlău. *Mții Bucegi*: *Mții Bârsei*; Mt. Postăvarul. *Mții Făgărașului*: Ucea Mare, Arpașul, Lacul Bălea. *Mții Parângului*; *Mții Retezatului*.

Forme

- 1 a Folicule păroase sau ciliate
f. **trichocarpum** (Rchb.) Gáy. in MBL X (1911) 195. — *A. trichocarpum* Rchb. Übers. Aconit. (1819) 29. — *Mții Bucegi*: V. Colței. *Mții Sibiului*: Păltiniș.
- 1 b Folicule glabre 2
- 2 a Laciniile frunzelor înguste, de 1,5—2 mm
f. **tenuisectum** (Zap.) — *A. napellus* L. h. *czarnohorensis* Zap. f. *tenuisectum* Zap. Consp. fl. Galic. crit. II (1908) 228. — *Mții Rodnei* (Pietrosul Mare); Pojorăta pe Mt. Eva (Reg. Suceava, r. Câmpulung).
- 2 b Laciniile frunzelor mai late (3—5 mm) 3
- 3 a Filamente glabre sau f. slab păroase
f. **glabratum** (Zap.) — *A. napellus* L. h. *czarnohorensis* Zap. f. *glabratum* Zap. l.c. — *A. napellus* L. h. *czarnohorensis* Zap. f. *rodnense* Zap. l.c. (1908) 229. — *Mții Rodnei*: Pietrosul Mare la Piatra Albă, Vf. Galați, Piatra Rea. *Mții Dornelor*; *Mții Bistriței*: Ceahlău,
- 3 b Filamente păroase
f. **amoenum** (Zap.). — *A. nap.* h. *czarnohor.* Zap. f. *amoenum* Zap. l.c. — *Mții Rodnei*: Piatra Rea.

ssp. **microstachyum** (Rchb.) Gáy. in MBL l.c. — *A. microstachyum* Rchb. Übers. Aconit. (1819) 36. — *A. nanus* Gáy. in MBL VIII (1909) 146, p.p.

Plantă robustă, des păroasă. Frunze cu sinuri larg deschise, la bază mai puțin divizate. Inflorescența scurtă, ± des alipit păroasă, cu flori puține. Filamentele staminelor foarte des ciliate.

Mții Bucegi: Strunga, Guțanu, Bătrâna, Doamnele, Vf. Omul. *Mții Bârsei*: Piatra Craiului. *Mții Făgărașului*: Ucea Mare, Arpașul, V. Bălii. *Mții Sibiului*: Iezerul Cibinului, *Mții Retezatului*: V. Lăpușnicului, Gura Zlata, Lacul Zănoaga, Tăul Negru, Lacul Bucura, Drăcșanul.

ssp. **Hayekianum** Gáy. in MBL X (1911) 195. — *A. dolomiticum* Hay. Die Sannthaller Alpen (1907) 96, non Kern.

Plantă înaltă de aproape 1 m, ramificată. Frunze cu lacinii de cca 5 mm. Inflorescența slab păroasă, cu peri patuli, fini, răzleți. Filamentele staminelor păroase. Pintenii nectariilor evident capitați.

Reg. Bacău: Cheile Bicazului, Lacul Roșu (Ghilcoș).

ssp. *Edmundi* Nagy et Nyár. in Erd. Muz. (1940) 156. — *A. taur.* ssp. *remotisectum* var *Edmundi* Nagy et Nyár. l.c. — **Ic.**: Pl. 78, fig. 2, 2 a.

Plantă ramificată, cu ramuri lungi, patent arcuite. Axa inflorescenței, pedunculii și florile abundent păroase. Linia bazală a coifului pronunțat arcuită.

Reg. Bacău: In jurul Lacului Roșu (Ghilcoș), 800—950 m alt. (r. Ceahlău).

Răsp. gen.: Europa de Mijloc.

4. *A. callibotryon* Rechb. Monogr. gen. Aconit. (1820) 98, tab. XVI. — *A. firmum* Auct., non Rechb. — **Ic.**: Pl. 77, fig. 2, 2 a-c.

4. Tulpină și pediceli în tinerețe \pm pubescenti, mai târziu glabrescenti sau glabri. Frunze pedate, 5-divizate, cu diviziunea mijlocie cuneat dilatată, dela mijloc în sus repetat divizată, 2—3-laciniată. Lacinii late de 2—5 mm, cu câte 1—2 dinți ascuțiți. Inflorescența un racem, la bază adesea ramificat, lung, cu flori \pm dese. Bracteele nu întrec florile; cele de jos sectate și dintate; pedunculi drept patenți, cei de jos mai lungi decât florile. Flori violet închise, la exterior glabre, până la 18 mm lungime și mai mult. Coif hemisferic, drept sau oblic, boltit, mai înalt decât lat, egal de lung și de lat sau mai scurt decât lat, cu spatele drept; linia bazală slab arcuită și prelungită într'un cioc scurt, ascuțit. Pintenul nectarilor capitat; buza păroasă pe dos. Folicule glabre. Seminte păroase. VII—IX.

Stațiunea. Prin pășuni, locuri ierboase și stâncoase din regiunea subalpină și alpină.

Răsp. în țară: *Mții Maramureșului*: Mt. Farcău, V. Repedea. *Mții Tibleșului*: Mt. Preluci (la Dragomirești, r. Vișeu). *Mții Rodnei*: Mihăiasa. *Mții Rarăului*: Mt. Rarău. *Mții Călimani*: *Mții Bistriței*: Ceahlău. *Mții Făgărașului*: Arpașul, Lacul Bălea. *Mții Sibiului*: Cindrelul, Beșineul, Păltiniș, Ighiabul Găușoara. *Mt. Cozia*; *Mții Lotrului*; *Mții Căpâțanei*; *Mții Parângului*: Mija Mare, Tigvele, Molidvișul. *Mții Retezatului*: Lacul Zănoaga. *Mții Bihorului*: Vlădeasa, Stâna de Vale, V. Iadului, V. Crișului Negru la Cristior (r. Beiuș), Piatra Arsă, V. Ordencușii (la Scărișoara, r. Câmpeni).

Variabilitatea speciei

1 a	Frunze îngust sectate cu lacinii de 1,5—2 mm lățime	ssp. <i>multifidum</i>
1 b	Frunze mai lat sectate, cu lacinii de 3—5 mm lățime	2
2 a	Flori albe sau ceruleu variegat	ssp. <i>hunyadense</i>
2 b	Flori violet închise sau albastre	3
3 a	Inflorescența glabră	4

Planșa 79. — 1. *Aconitum callibotryon* Rechb. ssp. *fissuræ* (Nyár.) Soó, 1a. un racem viguros în floare, 1b. părțile florii desfăcute, 1c. sămânța și secțiunea ei transversală. — 2. *A. callibotryon* Rechb. ssp. *scărișorensis* (Gáy.) G. Grinț.



- 3 b Inflorescența \pm păroasă 7
 4 a Flori mici, de 2 cm ssp. *fissurae*
 4 b Flori mai mari, de 2,5—4 cm 5
 5 a Axa inflorescenței șerpuită, nutantă. Pedicelii florilor superioare flexuoși. ssp. *Clusianum*
 5 b Axa inflorescenței dreaptă. Pedicelii drepți. 6
 6 a Flori de 2,5—3 cm. Inflorescența simplă sau cu 1—3 (5) ramuri ssp. *scărișorensis*
 6 b Flori de 3—3,5 cm. ssp. *corbense*
 7 a Flori de 25—28 mm. Inflorescența divaricat ramificată. ssp. *bucovinense*
 7 b Flori mai mari (—35 mm). Inflorescența simplă sau slab ramificată. 8
 8 a Tulpina rigidă. Inflorescența dens argintiu păroasă, cu peri glanduloși. ssp. *rigidum*
 8 b Tulpină gracilă. Inflorescența \pm păroasă ssp. *Baumgartenii*

ssp. *multifidum* (Rehb.). — *A. multifidum* Rehb. Illustr. spec. Aconit. (1823—27) nr. 17, tab. 70, fig. a et Fl. germ. exc. III (1832) 741 p.p. — *A. firmum* f. *A. rigidum* (Rehb.) Gáy. et *A. multifidum* Gáy. in MBL VIII (1909) 165.

Tulpină înaltă de 70—80 cm, subțire, simplă, netedă. Frunze cu 7 segmente romboidale, adânc sectate, atenuate la bază, cu lacinii liniare de 1,5 — 2 mm lățime. Racem lax, glabru. Pedunculi drepți, scurți. Flori relativ mari. Coiful închis, cu linia bazală sinuată și ciocul scurt. Stamine păroase. Nectarii capitate.

Mții Rodnei: Pietrosul Mare, Vf. Galați, Gemenea, Inău, Corongiș. *Mții Călimani*: Sălărd in V. Mureșului (r. Toplița). *Mții Giurgeului*: la Borsec (r. Toplița), Hăghimașul Mare. *Mții Bârsei*: Piatra Craiului. *Mții Bucegi*: V. Ialomiței la Schitul Peștera, V. Horoabei. *Mții Făgărașului*: Colții Brezii, Arpașul, Buteanul, Jipu, Paltina, Podeanu, Lespezi, Negoitul, Surul. *Mții Sebeșului*; *Mții Parângului*; *Mții Retezatului*.

ssp. *hunyadense* (Deg.) Soó in Acta Geobot. Hung. V, 2 (1943) 211. — *A. hunyadense* Deg. in MBL V (1906) 196. — **Ic.:** Pl. 77, fig. 4.

Inflorescența un racem lung de 15—20 cm, foarte îngust, simplu sau la bază cu ramuri scurte, cu flori dese. Pediceli mai scurți decât florile, subțiri, drepți. Coif albicios, mic, glabru, drept, deschis, fără cioc, în partea superioară puțin arcuit, cu linia bazală aproape dreaptă. Foliiolele laterale ale periantului ovate (14×11 mm), albe, cu marginea ceruleu pătată, pe dinafară glabre, pe dinăuntru și pe margini barbulate.

Mții Bistriței: Mt. Ceahlău pe Ocolașul Mare. *Mții Retezatului*: V. Lăpușnicului la Stâna Păpușa.

ssp. *fissurae* (Nyár.) Soó in Acta Geobot. Hung. V. 2 (1943) 211. — *A. fissurae* Nyár. seu *A. firmum* Rehb. ssp. *fissurae* Nyár. Enum. pl. vasc. Cheia Turzii (1939) 132. — **Ic.:** Pl. 79, fig. 1, 1 a-c.

Tulpină glabră, noduroasă, cu internodii scurte. Frunze îngrămădite sub inflorescență, cele supreme bracteiforme, inegal 1—2- sau 3- divizate; dinții segmentelor obtuz mucronați; marginile frunzelor \pm revolute. Inflo-

rescenență scurtă (6—20 cm), simplă sau la bază cu 2—3 ramuri, laxă, cu 4—7 flori (rar mai multe). Flori mici, de cca 2 cm; pedunculii aproape egali cu florile sau cei inferiori mai lungi. Stamine păroase (uneori amestecate cu glabre). Nectariile glabre, una capitată și una necapitată, glabre. Folicule 2—3, glabre, de 19—20 mm, cu stilul recurbat.

Reg. Cluj: Cheia Turzii. *Reg. Hunedoara*: Feneș (r. Alba Iulia).

ssp. *Clusianum* (Rchb.). — *A. Clusianum* Rchb. Monogr. gen. Aconit. (1820) 91, tab. XIII, fig. 1.

Tuber mare, napiform, lung de 8—12 cm. Tulpină glabră, înaltă până la 80 cm, cu internodii lungi de 8—12 cm. Frunze regulat distribuite, de 12 cm diam., 3-sectate, cu segmentele rombic cuneate, din nou fidate; lacinii segmentului mijlociu drepte, cele ale segmentelor laterale \pm arcuite. Inflorescență glabră, cu axa șerpuită, nutantă, cu 1—5 ramuri foliate, arcuite. Flori violet-albastre, de 3—4 cm, cu pete mari negre la bază, pe mijlocul foliolelor periantului și pe cioc galbene. Coiful înalt de 2 cm, cu linia bazală arcuită. Pedicelii florilor inferioare dreți și lungi, cei ai florilor superioare neregulat flexuoși. Nectarii mari, cu unguicula dreaptă și ciliată și capul îndreptat în sus. Stamine lat aripate, simple sau dințate, păroase sau amestecate cu glabre. Folicule lungi de cca 2,5 cm, cu stilul recurbat. Semințe triunghiulare, lat aripate, pe spate \pm ondulat muchiate.

Reg. Bacău: V. Bicazului, Mt. Măgura din V. Bistricioarei. *Reg. Suceava*: Pojorâta pe Mt. Muncel (r. Câmpulung).

ssp. *scărișorensis* (Gáy.). — *A. Skerisorae* Gáy. in MBL VIII (1909) 365. — *Ic.*: Pl. 79, fig. 2.

Tulpina înaltă de 90—100 cm, glabră, groasă de cca 8 mm. Frunze 3—5-divizate, cu diviziunile puțin unite la bază, cea mijlocie de 7—9 cm lungime. Inflorescență lungă de 20—35 cm, simplă sau cu 1—3 (5) ramuri. Flori de 2,5—3 cm, albastre, glabre. Coiful boltit. Pintenii capitați, ciliați la interior. Stamine păroase. Semințe triunghiulare, netede, lucioase.

Reg. Cluj: Scărișoara (r. Câmpeni); Mții Bihorului: V. Drăganului sub Mt. Vlădeasa, Fața Călinesei.

f. *bicolor* G. Grinț. f. nova in Add. pag. 682. — Flori albastre-violete; foliolele laterale și inferioare ale periantului precum și baza coifului, cu câte o pată mare, albă, lunguiată, lungă de 3—4 mm și lată de 2—2,5 mm. — Mții Bihorului: V. Drăganului și sub Mt. Vlădeasa la Podeț.

f. *flexuosum* G. Grinț. f. nova in Add. pag. 682. — Inflorescență foarte șerpuită, lungă de 45 cm, cu pediceli arcuiți, cei de jos lungi de 3 cm. Folicule mari de 2—2,5 cm, dela jumătate divergente, cu stilul \pm recurbat pe spate. — Mții Bihorului: V. Drăganului și sub Mt. Vlădeasa la Podeț.

ssp. *corbense* G. Grinț. ssp. nova in Add. pag. 682.

Tulpină înaltă de peste 1 m, rărit foliată. Frunze 5-divizate, cu segmentul mijlociu \pm pețiolulat, repetat 3-sectat, cu lacinii divergente,

intregi, lanceolate, ascuțite, de 3—6 mm lățime. Inflorescența glabră, cu 5—10 ramuri subțiri, arcuit ascendente. Pediceli mai lungi decât florile. Flori mari, de 3—3,5 cm, glabre. Coif cu ciocul obtuz, îndreptat în jos, puțin proeminent și linia bazală \pm arcuită. Foliiolele laterale ale periantului închise spre interior, cele inferioare eliptic lanceolate, arcuite în jos. Nectarii arcuite, capitate; capul violet-galben, unguicula ciliată. Stamine aripate, lung și des păroase, în amestec cu glabre și rărit ciliate. Foliculele mature de 2—2,5 cm lungime, cu stil arcuit. Semințe 3-muchiante, cu cele două fețe laterale unite într-o muchie aripată, pe spate ușor ondulat muchiate; hilul cu suprafața dimprejur netedă.

Reg. Bacău: V. Biczului la Piatra Corbului. *Reg. Suceava:* Pojorâta pe Mt. Adam și Mt. Muncel (r. Câmpulung).

f. *acéphalum* G. Grinț. f. nova in Add. pag. 683. — Flori cu nectarii necapitate. — V. Biczului la Piatra Corbului.

f. *microcassis* G. Grinț. f. nova in Add. pag. 683. — Coiful mic, de 14 mm înălțime și 9 mm lățime. — Pojorâta spre carieră și Mt. Muncel.

f. *elegans* G. Grinț. f. nova in Add. pag. 683. — Inflorescența neramificată; pedicelii unilaterali sau neregulat curbați. — V. Biczului la Piatra Corbului; Pojorâta pe Mt. Eva și Mt. Muncel.

ssp. *bucovinense* (Zap.). — *A. napellus* \times *paniculatum* *A. bucovinense* Zap. Consp. Fl. Galic. crit. II (1908) 230. — Exs.: FRE nr. 1233 pr. sp. — Ic.: Pl. 77, fig. 3.

Tulpina înaltă până la 1 m, ramificată. Frunze mari, cu segmente și lacinii divergente; laciniiile acut dințate. Inflorescența piramidală, divaricat ramificată, păroasă, cu peri scurți, creți, în amestec cu peri glanduloși. Ramurile inferioare ale inflorescenței perpendicular patente, cu 3—6 flori. Racemul terminal lax, de 15 cm lungime. Pediceli drepți, patenți, puțin mai lungi decât florile. Bractei 3-divizate, de aceeași lungime cu pedicelii. Bracteole liniare, păroase, de 3—4 mm lungime. Flori violet-albastre de 25—28 mm înălțime, păroase. Coiful subhemisferic, de 15—18 mm înălțime, 11—15 mm lățime, pubescent, spre bază îngustat, în partea superioară puțin lătit, cu laturile concave, pe spate \pm boltit; fruntea cu ciocul ascuțit, retras puțin spre interior; linia bazală foarte arcuită. Nectarii capitate, glabre sau păroase. Stamine glabre sau păroase, cu peri drepți, patenți. Folicule glabre, de 16 mm lungime, la maturitate marmorate, cu nervuri întunecate. Semințe triunghiulare, cu muchie aripată, lată, pe spate ondulat muchiate; hilul cu suprafața dimprejur netedă, cu marginea foarte sinuată.

Reg. Bacău: Mt. Ceahlău, Cârnău, Potoci, Călugăreni, Farcașa, Mădei, Broșteni pe V. Neagra (r. Ceahlău). *Reg. Suceava:* Păltiniș. Poiana Negri, Dorna Cândrenilor la Pripor, Argheșu, Mt. Oșor pe V. Haiului și V. Izvorul Alb, Dornășoara pe Mt. Măieruș (r. Vatra Dornei).

Variabilitatea speciei

1 a	Ovar \pm păros sau ciliat	2
1 b	Ovar glabru	5

- 2 a Filamentele staminelor păroase 3
 2 b Filamentele staminelor glabre 4
 3 a Pintenii capitați. Nectarii păroase la interior
 f. **pilosum** G. Grinț. f. nova in Add. pag. 684. — Mt. Oușor. pe V. Izvorul Alb, Mt. Suhardel (r. Vatra Dornei)
 3 b Pintenii capitați. Nectarii glabre la interior
 f. **glaberrimum** G. Grinț. f. nova in Add. pag. 684. — Argestru, Dornișoara pe Mt. Măieruș, Mt. Suhardel (r. Vatra Dornei); Mt. Lucina (r. Câmpulung).
 4 a Antere ciliate. Flori înalte de 23 mm. Linia bazală a coifului de 12 mm lungime
 f. **laxum** G. Grinț. f. nova in Add. pag. 685. — Mt. Oușor pe V. Haiului și V. Izvorul Alb (r. Vatra Dornei).
 4 b Antere glabre. Flori înalte de 35 mm. Linia bazală a coifului de 16 mm lungime
 f. **densum** G. Grinț. f. nova in Add. pag. 685. — Potoci (r. Ceahlău); Mt. Suhardel (r. Vatra Dornei).
 5 a Filamentele staminelor amestecate, glabre și ciliate
 f. **pyramidatum** G. Grinț. f. nova in Add. pag. 685. — Argestru (r. Vatra Dornei)
 5 b Filamentele staminelor foarte păroase (lânoase)
 f. **altum** G. Grinț. f. nova in Add. pag. 685. — Impreună cu f. *laxum*.

ssp. **rigidum** (Rehb.). — *A. commutatum* Rehb. Monogr. gen. Aconit. (1820) tab. 18, fig. 3. — *A. laetum* Rehb. β *rigidum* Rehb. Ic. Fl. germ. IV (1840) 25, tab. 97, fig. 4708 b. — *A. Bernhardianum* Rehb. Illustr. spec. Aconit. (1823–27) tab. 68, non Wallr. — *A. firmum* Rehb. 2. f. *A. rigidum* Gáy. in MBL VIII (1909) 165.

Tulpina înaltă de cea 80 cm, rigidă, glabră, ramificată sau neramificată. Frunze bazale (dispar de timpuriu) cu limbul lat de 5–10 cm, 5-divizate; diviziunea mijlocie de 4–8 cm lungime și 3,5–4 cm lățime. Inflorescența dreaptă sau arcuită, păroasă, cu peri orizontali, în parte glanduloși. Racem de 25–40 cm lungime, ramificat sau neramificat; pedicelii inferiori mai lungi sau de aceeași lungime cu florile. Flori deschise de 3–3,5 cm înălțime, păroase. Coiful boltit, înalt de 13–23 mm, lat de 10–20 mm, cu fruntea \pm sinuată și ciocul \pm proeminent. Filamentele staminelor păroase sau rărit ciliate. Pintenii \pm capitați. Semințe triunghiulare, cu muchie aripată, pe fața dorsală evident ondulat muchiată; suprafața din jurul hilului netedă, pe margini crenată.

Reg. Suceava: Mt. Oușor în V. Haiu și V. Izvorul Alb, Poiana Negri pe V. Neagra (r. Vatra Dornei).

f. **glabrum** G. Grinț. f. nova in Add. pag. 683. — Folicule și capsule glabre. — Mt. Oușor, Poiana Negri (r. Vatra Dornei).

f. **pubescens** G. Grinț. f. nova in Add. pag. 684. — Folicule și capsule păroase. — Poiana Negri pe V. Neagra, Dorna Cândrenilor pe Mt. Pripor, Mt. Suhardelul (r. Vatra Dornei).

ssp. **Baumgarteni** (Schur). Gáy. in MBL VIII (1909) 165. — *A. Napellus* Auct. d. *Baumgarteni* Schur Sert. (1853) 4, n. nud.

Tulpină subțire, gracilă, de 60–70 cm înălțime. Frunze des și îngust laciniate. Inflorescența un racem simplu sau slab ramificat, împreună cu

pedicelii și periantul \pm păroase, cu peri arcuiți, patenți. Coif ultra hemisferic.

Mții Bistriței: Mt. Ceahlău pe Izvorul Alb, V. Bistriței la Gura Tarcăului. *Mții Bârsei*: Postăvarul, Piatra Craiului. *Mții Făgărașului*: Mt. Jepii. *Mții Sibiului*: Frumoasa, Cindrehul, Păltiniș.

Intrebuintări. Dela speciile și unitățile lor subordonate din Secția *Napellus* se extrage din tuberi, prin diferite metode, alcaloidul Aconitina și alte principii, ca: Aconellina, Napellina, Acolyctina, Isoaconitina. Aconitina este eficace în tratamentul nevralgiilor. Se mai întrebuințează în combaterea tusei nervoase și mai ales în cea convulsivă, astm nervos, în reumatism muscular și poliarticular acut, unde dă rezultate bune. Din tuberi se mai prepară o tinctură alcoolică sau eterică, mai rar sub formă de extract. Planta cu rădăcini și frunze se întrebuințează în popor pentru a ucide insectele de pe animale și a spăla chiar rănilor de pe ele; fiertura concentrată din plantă, fiind o otrăvă puternică, se dă la câinii hoinari și animalelor sălbatice stricătoare, spre a le ucide. Oile și miei, primăvara, dacă mănâncă frunzele, se otrăvesc.

Aconitina este foarte toxică. Când se întrebuințează la prepararea medicamentelor, trebuie să se umble cu multă precauțiune. În soluție se poate lua cel mult 1 mgr pe zi. În cazuri de otrăvire, om sau animale, vom provoca imediat celui otrăvit, vărsături, după care îi vom da să bea ceaiuri taninoase, ceai de coaje de stejar sau de plante taninoase, excitante și băuturi calde cu alcool, rom, etc.

Răsp. gen.: Sudeți și Carpații din R.P.R.

Secția III. CAMMARUM DC. Syst. nat. I (1818) 365, 374, excl. n. 15; G. Grinț. l.c. 19 — *Cammaroidea* Rchb. Mon. gen. Aconit. (1820) 35, Illustr. spec. Acon. (1823—27) et *Toxicoidea* Rchb. l.c. 34 pro sect.

Tuber alungit napiform, turtit, circular sau globulos cu gât. Periant căzător. Coif hemisferic-conic, înalt boltit, cu fruntea dreaptă sau \pm adâncită. Nectarii cu pinten recurbat sau drept, la vârf indoit, obtuz și dat pe spate. Semințe nearipate, pe partea dorsală cu membrane unite sau separate, ondulate. Inflorescența un racem ramificat, în care florile înfloresc simultan.

5. **A. variegatum** L. Sp. pl. ed. I (1753) 352; Steinberg in Fl. U.R.S.S. VII (1937) 210. — *A. rostratum* Bernh. α *Bernhardianum* Beck Fl. NÖ I I (1890) 403, non Wallr. — Ic.: Pl. 76, fig. 2, 2a.

4. Tulpină adeseori în zig-zag, glabră sau mai rar slab păroasă, bogat ramificată, cu ramuri patente, din care cauză inflorescența pare foarte rărită. Racem terminal și raceme laterale sărace în flori. Pedicel mai lung decât florile, patent ascendent. Flori mijlocii, violet intunecate, mari sau foarte mari. Coif aproape de 2 ori mai lung decât lat, boltit, de 2,5 — 4 cm lungime, deschis, aplecat înainte, la vârf umflat, lat rotunjit, în partea mijlocie rostrat, cu ciocul îngust, alungit, patent sau îndreptat în sus, deasupra ciocului evident sinuat, la bază mult îngustat în unguiculă (aproape pedunculat).

Linia bazală foarte sinuată. Nectarii drepte, glabre, cu pinten recurbat. VIII — IX.

Stațiunea. În livezi, tufișuri, mai ales prin locuri umede.

Răsp. în țară: *Reg. Baia Mare*: Virișmort (r. Sighet). *Reg. Cluj*: Cluj la Făget, Gilău; Cheia Turzii (dubioasă). *Reg. Stalin*: Șura Mare (r. Sibiu). *Reg. Oradea*: Stâna de Vale (r. Beiuș). *Reg. Craiova*: Lainici (r. Tg. Jiu). *Reg. Pitești*: Horezu.

Variabilitatea speciei

f. trichócharis (Borb.). — *A. variegatum* L. var. *trichocharis* Borb. in Herb. ex Gáy. in MBL VIII (1909) 201. — Tulpina, în primăvară, în partea inferioară păroasă, cu peri erect patenți. — *Reg. Cluj*: Cluj la Făget, Gilău. *Reg. Hunedoara*: Sarmisegetuza la Cetate (r. Hateg). *Reg. Ploesti*: Sinaia spre Izvor. *Reg. Bacău*: Mt. Ceahlău. *Reg. Suceava*: V. Bistriței la Ciocănești, Botoș, V. Stănei, Cârlibaba, Țibău, pe V. Tatarca (r. Vatra Dornei).

Răsp. gen.: Europa centrală, U.R.S.S.

6. **A. grăcile** Rehb. Übers. Aconit. (1819) 55, n. nud. — *A. Cammarum* Jacq. var. *gracile* Rehb. Illustr. spec. Aconit. (1823 — 27) nr. 44, tab. 7. — Exs.: FRE nr. 1235 a, b. — Ic.: Pl. 76, fig. 1.

4. Asemănătoare cu *A. variegatum*. Racemul terminal foarte dezvoltat, cele laterale mai puțin patente, de regulă erect divergente. Florile puțin mai mici. Coif boltit (boltitura aproape conică), de 4 cm lungime, destul de drept, ± indoit înainte, deschis, cu creștetul îngust, scurt rotunjit, la mijloc sau puțin mai jos cu un cioc lung, drept sau aplecat în jos. Deasupra ciocului fruntea nu este sinuată sau numai slab sinuată, spre bază îngustată, cu linia bazală oblică, nu atât de sinuată ca la *A. variegatum*. VIII — IX.

Stațiunea. Prin livezi, tufișuri, în locurile mai umede.

Răsp. în țară: *Reg. Baia Mare*: Repedeia pe Obcina și Venderel (r. Vișeu). *Reg. Cluj*: Rodna, Năsăud, Mții Rodnei (Inău); Cluj la Făget și la Fânețe, Dl. Feleacului; Sălcea. Ciurila, Cheia Turzii (r. Turda); Aiud; Vidra pe V. Arieșului Mic, Scărișoara (r. Câmpeni). *Reg. Aut. M.*: Gurghiu (r. *Reghin*); Borsec (r. Toplița); Mții Giurgeului (Mt. «Öcsém»); Tușnad pe Mt. «Büdös»); Băile Homorod (r. Odorhei); Praid (r. Sângeorgiul de Pădure). *Reg. Stalin*: Mănărade (r. Mediaș); Orașul Stalin sub Mt. Postăvarul; Mții Făgărașului (sub Mt. Arpașul); Marpod (r. Agnita). *Reg. Hunedoara*: Feneș (r. Alba Iulia). *Reg. Bacău*: Tulgheș pe Mt. Hăghieș (r. Ceahlău).

Variabilitatea speciei

ssp. refráctum (Schur.). — *A. Cammarum* Jacq. b. *refractum* Schur Enum. pl. Transs. (1866) 32.

Inflorescența cu pediceli recurbați și flori nutante.

Reg. Sibiu: Slimnic (r. Sibiu).

ssp. **grosseserrátum** Gáy. in MBL X (1911) 202.

Plante înalte, cu frunze late. Inflorescența un racem terminal puternic dezvoltat, cu flori mari.

Reg. Cluj: Mții Rodnei sub Corongiș; Cluj pe V. Plecica și la Fănațe; Bercul Mare la Turda, Aiton. *Reg. Stalin*: Gușterița, Slimnic (r. Sibiu).

f. **beskidense** (Zap.) — *A. Cammarum* Jacq. a. *beskidense* Zap. Fl. Galic. crit. II (1908) 215. — *A. gracile* 5. *A. beskidense* Gáy. in MBL X (1911) 201. — Plantă înaltă, ramificată, cu ramurile bazale lungi, glabre și pedicelii \pm păroși. Flori păroase, cu peri culcați. Folicule pubescente. — Transilvania (în Herb. Cluj fără localitate).

ssp. **diffusum** (Rehb.) Gáy. in MBL X (1911) 201. — *A. variegatum* f. *diffusum* Rehb. Illustr. Spec. Aconit. (1823 — 27) nr. 51, tab. 34, fig. k.

Tulpină sveltă. Inflorescență foarte ramificată; racemul terminal puțin mai mare decât racemele laterale. Flori mici, cu coiful mai adesea puțin aplecat înainte. Frunze rărite, în partea superioară larg inciz dentate.

Reg. Cluj: pe pereții gării ghețarului dela Scărișoara (r. Câmpeni).

ssp. **rostrátum** Bernh. in Ind. sem. hort. Erfurt (1815) n. nud. ex Rehb. Übers. Aconit. (1819) 56. — *A. variegatum* *A. rostratum* Koch Syn. ed. II (1843) 26.

Tulpină subțire, înaltă de 50 — 60 cm, rigidă. Segmentele frunzelor și dinții îngust lanceolate, până la liniare. Inflorescența cu puține flori, simplă sau ramificată. Racemul terminal adesea cu 7 — 8, rar 15 flori. Pediceli aproape drepți, puțin mai lungi decât florile. Flori mici sau mijlocii. Coif înalt, boltit, de 8 — 10 mm lățime, cu creștetul rotunjit, cu un cioc lung, îndoit în jos și linia bazală foarte arcuită.

Reg. Cluj: Sălicea (r. Turda). *Reg. Stalin*: Mănărade (r. Mediaș); Poplaca pe Dl. Obrejii, Cacova Sibiului (r. Sibiu).

f. **pilosiusculum** (Ser.) — *A. rostratum* var. *pilosiusculum* Ser. Mus. Helv. I (1822) 142. — *A. rostratum* l. *A. pilosiusculum* Gáy. in MBL X (1911) 200. — Se deosebește cu puțin față de specia tipică prin inflorescența, pețiolii și foliculele acoperite cu peri creți sau pe folicule și pedicelii din partea superioară, \pm drepți. Periant cu peri foarte rari. — *Reg. Bacău*: Ml. Ceahlău. *Reg. Suceava*: Cheile Bistriței la Toance.

ssp. **judenbergense** (Rehb.). — *A. Cammarum* Jacq. β . *judenbergense* Rehb. Illustr. Spec. Aconit. (1823 — 27) nr. 45, tab. VIII, fig. 1; Fl. germ. exc. III (1832) 738. — *A. Cammarum* Jacq. Fl. austr. V (1778) tab. 224.

Tulpină dreaptă, robustă. Frunze cu lacinii lanceolate, serate. Inflorescență ramificată, multifloră. Ramurile laterale drepte, patente, cu puține flori. Pedunculi drepți, patenți, mai scurți decât florile. Flori mari sau mijlocii, cu coif înalt și lat, bombat sau aproape conic, sub mijloc brusc rostrat, deasupra ciocului ușor sinuat. Linia bazală ușor sinuată, contractată în unguicula coifului.

Reg. Cluj: Monor (r. Bistrița) *Reg. Aut. M.*: Odorhei. *Reg. Stalin*: Vâlcele (r. Stalin). f. *pilipes* (Rchb.). — *A. Camarum* β . *judenbergense* var. *pilipes* Rchb. Illustr. Spec. Aconit. (1823—27) nr. 45, tab. VIII, fig. 2; Fl. germ. exc. III (1832) 738. — Inflorescența, axa, pedunculii și ovarul păroși, cu peri drepți și deși. — *Reg. Bacău*: Mt. Ceahlău.

Răsp. gen.: Europa de Mijloc, Alpii de E.

7. *A. paniculatum* Lam. Fl. fr. III, ed. I (1778) 646. — *A. variegatum* Wulf. in Koelle Spicil. Aconit. (1786) 19, non L. — Exs.: FRE nr. 1944. — Ic.: Pl. 80, fig. 2.

Tulpină înaltă, de 60 — 150 cm. Inflorescența lată, rărită, răsfirată, cu flori numeroase, bogat ramificată, păroasă cu peri simpli și glanduloși. Flori violet, lung pedicelate, cu bractei filiforme. Pediceli divergenți sau patenți. Coif \pm hemisferic, egal de lung și de lat, deschis, lung unguiculat, în partea superioară lung rostrat, cu linia bazală sinuată. Nectarii \pm aplecate înainte, cu pinten capitat sau îndoit pe spate. Folicule glabre. VII — VIII.

Stațiunea. În păduri, pe marginea pădurilor din regiunea montană și subalpină.

Răsp. în țară: *Reg. Baia Mare*: Dragomirești la Preluci, Borșa, V. Vișeuului, Mții Rodnei pe Piatra Rea (r. Vișeu); Mții Tibleșului. *Reg. Cluj*: Rodna, Anieș, Mții Rodnei (Corongiș); Abrud pe Mt. Vulcan, Vidra, Neagra, Scărișoara (r. Câmpeni). *Reg. Aut. M.*: Sălard (r. Toplița); Lueta (r. Odorhei). *Reg. Stalin*: Orașul Stalin pe Mt. Postăvarul, Zărnești pe Măgura, Mt. Piatra Craiului; Mții Făgărașului: Colții Brezii, V. Bălea, Negoitul, Surul; Avrig, Râul Vadului pe V. Lotrioara, Cislădie, Poplaca, Orlat, Șura Mare, Mții Sibiului: Gheile Cibinului, Frumoasa, Iezerul Cibinului, Păltiniș (r. Sibiu); Dumbrăveni (r. Sighișoara). *Reg. Hunedoara*: Feneș (r. Alba Iulia); Mții Parângului; Mții Retezatului: Gura Apei, Râul Mare, Fața Retezatului, V. Lăpușnicului. *Reg. Oradea*: Stâna de Vale (r. Beiuș); Mții Bihorului: Vlădeasa, V. Drăganului. *Reg. Pitești*: V. Lotrului la Jidoaia; Mții Făgărașului (Surul). *Reg. Ploiești*: Sinaia, Bușteni, Mții Bucegi: Piatra Arsă, Jepi, Caraiman în V. Seacă, Schitul Peștera. *Reg. Bacău*: Mt. Ceahlău; Mrea Agapia (r. Tg. Neamț). *Reg. Suceava*: Mții Dornelor (Gura Haitii); Obcina Feredeului (Mt. Lucina), Fundul Moldovei pe Pâr. Lefilor (r. Câmpulung)

Variabilitatea speciei

f. *Matthioli* (Rchb.). — *A. Matthioli* Rchb. Übers. Aconit. (1819) tab. h; Illustr. spec. Aconit. (1823—27) nr. 38, tab. XXXIII, sec. Gay. in MBL VIII (1909) 204. — *A. cernuum* Host Fl. austr. II (1931) 72 non Wulf. — *A. paniculatum* Lam. f. *angustisecta* (Gy) Lc. et A

Planșa 80. — 1. *Aconitum toxicum* Rchb., 1a. 1b. f. *Schurii* (Beck) G. Grinț. (Retezat), 1c. f. *crispulum* (Nyár.), G. Grinț., 1d. f. *bucegiense* (Nyár.) G. Grinț., 1e. f. *typicum* Beck (Mții Huned. Hb. Baumg.), 1f. f. *typicum* Beck (Lueta, Hb. Baumg.), 1g. f. *diabolicum* (Gáy.) G. Grinț. — 2. *A. paniculatum* Lam. — 3. *A. panic.* ssp. *Degeni* (Gáy.) G. Grinț. — 4a. *A. toxicum* Rchb. ssp. *lasiocarpum* (Rchb.) G. Grinț. (Retezat), 4. idem ex Jáv. - Csapody M. Fl. Kép.



Matthioli Gáy l.c. — Diviziunile frunzelor îngust rombice; lacinii serate, înguste și distanțate. — *Reg. Cluj*: Rodna, *Reg. Stalin*: Mții Sibiului (Frumoasa). *Reg. Oradea*: Valea Drăganului (r. Aleșd); Stâna de Vale, Mții Bihorului la Cetățile Ponorului (r. Beiuș). *Reg. Bacău*: Cheile Bicazului.

f. *czeremossicum* (Zap.) — *A. paniculatum* Lam. b. *czeremossicum* Zap. Consp. Fl. Galic. crit. II (1908) 220. — Înaltă de 90—150 cm. Frunze late de 12 cm, cu lacinii penatífide. Inflorescență lungă de 60 cm, lax ramificată. Tulpina în partea superioară și pedicelii păroși, cu peri subglanduloși, ± ridicați. Flori rare, păroase. Coif mic, aproape semirotund, de 14—16 mm înălțime; cioc lung de 2,5—3 mm ușor sinuat; pinten ± reflex. Filamente păroase cu peri lungi, rari. Ovary glabre. Folicule lungi de 11—14 mm. — *Reg. Baia Mare*: Repedea pe Venderel, Vișeu de Sus pe Mt. Prislopaș și V. Greabănuului. Mții Rodnei (Vf. Inău). *Reg. Cluj*: Valea Vinului (r. Năsăud). *Reg. Suceava*: Mții Călimani pe Pietrosul.

f. *prutense* (Zap.) *A. paniculatum* Lam. c. *prutense* Zap. l. c. (1908) 221. — Înaltă de 70—160 cm. Flori mari, împreună cu pedicelii slab păroase, glabre sau aproape glabre. Coif lung de 29—31 mm, semirotund. Cioc lung de 5—6 mm, aproape drept sau distinct sinuat. Pinten reflex, cu limbul scurt, bilobat. — *Reg. Cluj*: Rodna (r. Năsăud.).

ssp. *Degeni* (Gáy.). — *A. Degeni* Gáy. in MBL V (1906) 123. — *A. paniculatum* var. *subalpinum* Rapaics Syst. Aconit. gen. (1097) 19. — *Ic.*: Pl. 80, fig. 3.

Tulpină de 50—80 cm, gracilă. Inflorescență simplă sau ramificată, cu 2—5 ramuri scurte, compactă, cu puține flori (4—12); ramurile laterale drepte sau drept patente, cu 2—5 flori aplecate. Segmentele frunzelor îngust laciniat dentate. Pedunculi aproape drepți sau drept patente. Coif deschis, spre vârf puțin proeminent; linia bazală ușor sinuată; unguicula scurtă. Folicule glabre.

Reg. Cluj: Rodna, Valea Vinului, Mții Rodnei (Crăciunel, Piatra Arsă, Galați); Rogojel sub Mt. Vlădeasa (r. Huedin). *Reg. Aut. M.*: Mții Giurgeului (Mt. «Ocsēm»). *Reg. Oradea*: Mții Bihorului: V. Cepilor (sub. Vf. Cucurbeta). *Reg. Bacău*: Mt. Ceahlău. *Reg. Suceava*: Mt. Rarău (la Schitul Rarău și Pietrele Doamnei).

f. *crăciunelense* Gay. in MBL V (1906) 126. — Coif scund, în formă de luntre, deschis, de 2 ori mai îngust decât înalt (10 mm.). Linia bazală lungă de 20 mm, patent dreaptă. — *Mții Rodnei*: Mt. Crăciunel.

Răsp. gen.: Europa centrală.

8. *A. toxicum* Rchb. Illustr. Spec. Aconit. (1823—27) nr. 37, tab. XXXVII; Fl. germ. exc. III (1832) 739; *Ic.* Fl. Germ. IV (1840) 22, tab. 84, fig. 4688. — *A. neomontanum* Baumg. Enum. stirp. Transs. II (1816) 100, nr. 1057, sec. Rchb. l. c. (1823—27) nr. 37, non Wulf. — *A. toxicum* α. *typicum* Beck Fl. Bosn. - Herzeg. 224 in Wiss. Mitt. Bosn. - Herzeg. XIII (1916) 178. — *Exs.*: FRE nr. 1234 a. b. — *Ic.*: Pl. 80, fig. 1, 1e, 1f.

4. Tulpină până la 2 m, des foliată, cu inflorescență foarte ramificată. Frunze superioare înguste, trecând în bractei. Axa inflorescenței sau cel puțin pedunculii păroși, cu peri drepți, deși, patente, amestecați cu glanduloși.

Bracteele pedunculilor de formă ovată sau ovat oblongă. Flori mari, violet. Coif mult mai înalt decât lat, în formă de căciulă umflată și aplecată în față, înalt de 2,5 — 4 cm. Folicule păroase. VII — VIII.

Stațiunea. În păduri și tufișuri din regiunea montană și subalpină.

Răsp. în țară: *Reg. Cluj:* Prundul Bărgăului (r. Bistrița). *Reg. Aut. M.:* Mții Giurgeului; Hăghimașul Mare, Mt. «Öcsém»; Mții Harghita; Lueta (r. Odorhei). *Reg. Stalin:* Predeal, Zărnești pe Măgura, Mt. Piatra Craiului în V. Prăpăștiilor și la Crăpătură, Râșnov pe V. Topliței; Mții Făgărașului (pe V. Șerbota sub Negoiu, V. Doamnei, Lacul Bălea). *Reg. Hunedoara:* Homorod (r. Orăștie); Mții Retezatului. *Reg. Pitești:* Mții Făgărașului (Surul); Dâmbovicioara (r. Câmpulung). *Reg. Ploiești:* Sinaia, Bușteni, Mții Bucegi (V. Vânturîșului, V. Ialomiței). *Reg. Bacău:* Cheile Bicazului, Lacul Roșu.

Variabilitatea speciei

f. diabolicum (Gáy.) — *A. diabolicum* Gáy. în MBL V (1906) 127; VIII (1909) 225. — **lc.:** Pl. 80, fig. 1 g. — Tulpină ramificată, patent păroasă, cu peri simpli și glanduloși. Frunze 5-sectate; segmentul mijlociu cuneat rombic, lung acuminat, până la mijloc sau sub mijloc fidat; lăciniile dințate, cu dinții mari. Pedunculi uniformi. Bracteele mari, ovate sau ovat lanceolate, verzi, ierbacee. Inflorescență piramidală, mare, împreună cu frunzele, bracteele, pedunculii și florile abundant patent păroase, cu peri simpli și glanduloși. Coif înalt, boltit, drept, lung acuminat, înalt de 22 mm, lat de 13 mm; linia bazală puternic sinuată. Foliiolele laterale ale periantului neregulat orbiculate, cele inferioare oblongi, aproape ascuțite. Filamente bidințate, glabre. Nectariile capitate, recurbate, cu limb mare, bidințat. Folicule glabre. — *Reg. Hunedoara:* Mții Retezatului (Gura Zlata, Râul Mare). *Reg. Bacău:* Mt. Ceahlău.

f. bucegiense (Nyár.) — *A. toxicum* Rehb. var. *bucegiense* Nyár. în Bul. Grăd. Bot. Cluj XXVI (1946) 179. — **lc.:** Pl. 80, fig. 1 d. — Tulpină flexuoasă, mult ramificată, cu ramuri lungi, patente. Inflorescență dela început foarte mare și laxă. Axa inflorescenței pedunculii și coiful glabre. Bractei și bracteele lat eliptice sau lat ovate. — *Reg. Stalin:* Râșnov pe V. Toplița (r. Stalin)

f. crispulum (Nyár.) — *A. toxicum* Rehb. var. *crispulum* Nyár. **lc.:** Pl. 80, fig. 1 c. — Tulpină dreaptă, mult ramificată, cu ramuri lungi, drept patente. Axa inflorescenței și pedunculii păroși, cu peri creți, ± deși, neglanduloși. Pedicelii sub flori puțin păroși, cu peri glanduloși. — *Reg. Aut. M.:* Mții Giurgeului sub Mt. «Öcsém». *Reg. Stalin:* Râșnov pe V. Topliței, Mt. Piatra Craiului la Crăpătură (r. Stalin).

ssp. Schurii (Beck). — *A. Schurii* Beck Fl. Südbosn. in Ann. Hofmus. Wien VI (1891) 343. — *A. toxicum* β . *Schurii* Beck Fl. Bosn. - Herzeg. 224 in Wiss. Mitt. Bosn. - Herzeg. XIII (1916) 198. — **lc.:** Pl. 80, fig. 1a, 1b.

Frunze profund 5 — 7 - divizate, cu segmentele adânc fidate și lăciniile lung acuminate. Lăciniile inferioare pe laturile externe 3 — 5 - serate. Bracteele ovate oblongi. Coif ± arcuit aplecat, înalt de 25 mm și lat de 15 — 18 mm, mai sus de mijloc lung rostrat, cu cioc arcuit și linia bazală sinuată. Filamentele staminelor adesea păroase.

Reg. Cluj: Mții Rodnei; Vidra pe Piatra Struțului (r. Câmpeni). *Reg. Aut. M.:* Borsec; Mții Giurgeului sub Hăghimașul Mare. *Reg. Stalin:* Mții Bucegi (V. Mălăești); Mții Sibiului (Frumoasa, Șteflești, Cheile Cibinului). *Reg. Hunedoara:* Zlatna (r. Alba Iulia). Mții Reteza-

tului: Gura Apei, Valereasca, Mt. Buta. *Reg. Timișoara*: Rusca (r. Caransebeș). *Reg. Bacău*: Cheile Bicazului, Lacul Roșu.

f. *retyezatense* (Gáy.) — *A. Schurii* Beck f. *retyezatense* Gáy. in MBL V (1906) 131; V III (1909) 205. — Frunze lat laciniate; lacinii cu dinți scurți și lați. — Mții Retezatului.

ssp. *lasiocarpum* (Rchb.). — *A. nasutum* Fisch. var. *lasiocarpum* Rchb. Illustr. spec. Aconit. (1823 — 27) nr. 47, tab. IX. — *A. toxicum* Rchb. a. *dasycarpum* Schur Enum. pl. Transs. (1886) 33. — Ic.: Pl. 80, fig. 4a.

Tulpină înaltă, rigidă. Inflorescență cu ramuri laxe, foarte lungi. Coif înalt, boltit, de 2 ori mai înalt decât lat. Frunze îngust și neregulat sectate, cu lacinii liniare până la lanceolate și dinții scurți. De *A. Schurii* se deosebește prin bracteele liniare și prin foliculele păroase.

Reg. Baia Mare: Sighet. *Reg. Cluj*: Rodna, Valea Vinului (r. Năsăud), Mții Rodnei (Crăciunel); Tihuța (r. Bistrița). *Reg. Aut. M.*: Mții Giurgeului (Hăghimașul Mare, Mt. «Öcsém».) *Reg. Stalin*: Mții Bârsei; Mții Făgărașului. *Reg. Bacău*: Mt. Ceahlău. *Reg. Suceava*: Mt. Giumalău.

* *A. Stoerckianum* Rchb. in Flora I (1818) 202, n. nud.; Illustr. spec. Aconit. (1823 — 27) nr. 18, tab. 71; Ic. Fl. germ. IV (1840) 23, tab. 76. III et 86, fig. 4692; Steinberg in Fl. U.R.S.S. VII (1937) 210. — *A. Cammarum* L. Sp. pl. ed. II (1762) 751, excl. syn. et loc. nat. — *A. Napellus* L. Herb., non L. Sp. pl. ed. I (1753) 532. — *A. neomontanum* Willd. Sp. pl. II. 2 (1800) 1236, non Wulf., nec alior. — *A. intermedium* DC. Syst. nat. I (1818) 374, non Gaud., nec Hoppe. — *A. variegatum* × *neomontanum* A. et G. Syn. V. 2 (1929) 797. — Trei cumnate supărate.

4. Rizomi puternic legați între ei. Tulpină rigidă, până la 1 m înălțime, destul de subțire, glabră. Frunze glabre, 5 — 7 - divizate. Diviziunea mijlocie îngust cuneiform rombică, la vârf adânc partită, cu lobii din nou 2 — 3 - fidați și dințați; vârfurile și dinții lanceolați, de 3 — 5 mm lățime. Inflorescența piramidală, glabră, ramificată, cu ramuri patente cu 4 — 6 flori, cele inferioare mai rărite, multiflore. Pedicelii florilor inferioare ceva mai lungi decât florile. Bractee divizate, mai scurte decât florile, asemănătoare frunzelor. Bracteele liniar lanceolate. Flori mari, glabre, de un albastru, închis. Coif drept, puțin aplecat în față, înalt de 2,5 — 3 cm. pe margini ciliat, cu ciocul scurt. Foliiolele laterale ale periantului ovat orbiculate, la exterior glabre, la interior și pe margini ciliate, de 15 — 18 mm lungime, cele inferioare eliptice, desemeni ciliate, de aceeași lungime. Nectarii cu pinten alungit capitat și limb recurbat în sus. Filamente lanceolate, simple sau bidințate, păroase. Folicule 3 — 5, glabre. VII — VIII.

Stațiunea. Numai în cultură, prin grădini de flori, ca plantă ornamentală.

Răsp. în țară: Cultivată prin grădinile țărănești din regiunea montană. Mult răspândită în Moldova, ceva mai rar în Transilvania și în restul țării.

Obs. Gayer in MBL VIII (1909) 192, arată că *A. Stoerckianum* Rehb. ar fi un hibrid între *A. Napellus* și *A. paniculatum*, iar A. et G. Syn. V. 2 (1929) 797 indică formula *A. variegatum* × *A. neomontanum*.

Această specie se aseamănă cu *A. callibotryon* ssp. *scărișorenses*, prin coif, frunzele pedate, îngust sectate și filamentele glabre.

* **A. maximum** Pall. Herb. ex DC. Syst. nat. I (1818) 380; Rehb. Illustr. spec. Aconit. (1823 — 27) nr. 29, tab. 17.

4. Tulpină până la 2 m înălțime, solidă, rotundă, cu vagina petiolului decurentă, puțin angulată, la bază glabră, netedă, în partea superioară revers pubescentă. Frunze mari, la bază cuneate, 5-partite, deasupra glabre, dedesubt pe nervuri puberule. Diviziunile lat ternat trifide, cu lăcniile acute sau acuminate, cele superioare cuneat tripartit trifide, pe ambele fețe puberule. Inflorescența un racem terminal de 10 cm lungime, cu puține flori (5 — 6). Pedunculii inferiori și ramurile axilare foarte lungi, cei superiori mai scurți decât floarea, adesea pubescenti, drepți. Bractei și bracteole subapiculate, lanceolate, fin pubescente. Flori mari, rigid membranoase, pubescente, palid cerulee, subviolacee. Coif scund, conic-hemisferic, obtuz, închis. Foliiolele periantiale laterale mari, subrotunde, spre bază puțin îngustate, cele inferioare ovate oblongi, obtuze. Nectarii erect oblice, cu capetele mari și pinten capitat, aplecat. Stamine cu filamente lanceolate, cu dinții ascuțiți și începând dela dinți, liniar filiforme, glabre, cu antere subrotunde, negre. Folicule 3, glabre.

var. asiaticum G. Grinț, var. nova in Add. pag. 686.

Plantă puternică, cu tulpină cilindrică, glabră, înaltă de 1,5—3 m. Frunze mari, distribuite regulat, 3- rar 5-divizate, cu diviziuni ± confluențe la bază, nesimetrice, amestecate cu simetrice, cu diviziunea mijlocie lungă de 17 cm, lată de 9 cm, repetat 2—3-sectată și lobii cu 1—2 dinți ± arcuiți, pe dos puțin pubescente, mai mult pe nervuri cu peri arcuiți mici, reversi. Inflorescență lungă până la 120 cm, ramificată, pubescentă, cu 3—4 ramuri axilare lungi de 35 cm, în partea inferioară nude, în cea superioară cu bractei foliacee, spicifere, cu 7—8 flori, altele numai cu 2 flori umbeliforme, ± pubescente; axa pubescentă lungă de 55 cm, cu multe flori rărite, întrece cu mult ramurile. Pediceli lungi de 5—10 (17) cm, cei inferiori drepți, cei superiori arcuiți, uniflori; bractele pedicelilor florali, mai scurte;

Plansa 81. — 1. *Aconitum moldavicum* Hacq. var. *Hacquetianum* G. Grinț. — 2. *A. moldavicum* var. *australe* (Rehb.) G. Grinț, fruct. — 3. *A. Simonkaianum* Schur. — 3a. Idem, racem fructifer.



bracteolele mari, așezate mai sus de mijlocul pedicelului, întregi sau sectate. Flori până la 4,5 cm lungime, pubescente. Coif înalt de 2,5 cm, lat de 1,5 cm, cu linia bazală de 2,5 cm, \pm dreaptă, fruntea oblic dreaptă până în vârful ciocului sau \pm arcuită, spate \pm arcuit și fundul ciocului rotund boltit, la maturitate aplecat pe spate în formă de căciulă. Stamine glabre, bidentate. Nectarii drepte \pm sigmoidee (arcuite), cu capul dat pe spate, în față gheboase, glabre. Folicule 3, negre, alb serial pubescente.— În cultură, ca plantă de ornament la Dărmănești. (Reg. Bacău).

Secția IV. LYCOCTONUM DC. Syst. nat. I (1818) 365, 367. — *Lycotonoidea* Rehb. Mon. gen. Aconit. (1820) 35.

Rădăcină slab tuberoasă, în formă de rizom. Periant căzător. Coif conic-cilindric, alungit în formă de sac. Nectarii cu pinten arcuat sau drept, cu vârful puțin îndoit sau spiralat. Semințe pe partea dorsală ușor ondulat muchiate, pe fețe \pm netede.

9. **A. moldavicum** Hacq. Reise Karp. I (1790) 169, tab. VII. — *A. septentrionale* Baumg. Enum. stirp. Transs. II (1816) 98, non Koelle. — *A. septentrionale* β . *carpathicum* DC. Syst. nat. I (1818) 370 et *carpathicum* DC. l. c., p. p. — *A. Jacquinianum* Host Fl. austr. II (1831) 68, quoad pl. carp. — *A. transsilvanicum* Lerchenf. ex Schur in Verh. SVN X (1850) 165. — *A. moldavicum* var. *rubicundum* Borb. in Kárp. Etyl. Évk. V (1886) 247; ÖBZ XXXVI (1886) 318. — *A. phallacinum* Blocki in ABZ I (1895) 117. — *A. moldav. f. stenanthum* Gáy. in MBL VI (1907) 297. — Omag. — Moldvai sisakvirág. — Moldavischer Eisenhut. — Exs.: FEAH nr. 2539 I, II; FRE nr. 2756 a, b, nr. 2757 a, b. — Ic.: Pl. 81, fig. 1, 1a, 2.

4. Rizom cărnos, ramificat sau simplu. Tulpini erecte, ramificate, glabrescente sau pubescente, cu 1 — 5 frunze bazale foarte mari, de formă reniformă, circulare sau pentagonale, lung pețiolate, cu pețiolii păroși, sectate sau unele nesectate, numai dințate. Frunze tulpinale pe față glabre, mate, numai dealungul nervurilor arcuit păroase, pe margini ciliate, palmat 3 — 5 - sectate; segmentele din nou \pm adânc fidate și serate, cu dinți ovați sau \pm acuți. Inflorescența racem lung, simplu sau ramificat, cu 1 — 5 rămurele arcuit ascendente, împreună cu pedicelii păroase. Bractei 3 - sectate; bracteole lanceolate, pubescente. Flori purpurii-violete, lungi de cca 30 mm, glabrescente sau pubescente, cu peri mici, arcuiți, reversi sau cu sete rărite și drepte. Coif cilindro-conic cu vârf boltit, adesea mai umflat, la mijloc îngustat, fruntea dreaptă sau puțin arcuită, cioc proeminent, drept sau puțin aplecat și linia bazală \pm dreaptă, lungă de 15—20 mm. Foliiolele periantiale laterale și inferioare la exterior bombate, cu marginile glabre și mijlocul păros, cu peri mici, alipiți, drekți sau arcuiți. Nectarii cu pedicel drept, cu cap spiralat, semispiralat, sau numai îndoit. Filamente glabre. Carpele și folicule pubescente sau glabre, sau jumătate

glabre și jumătate pubescente. Seminte triunghiulare, negre, prevăzute cu valuri muchiate. Hilulașezat deasupra și înconjurat de încrețituri. VI—VIII.

Stațiunea. Prin fânețe, coaste de munți, marginea apelor, prin păduri, dela 300 m până la 1800 m altitudine, în regiunea subalpină.

Răsp. în țară: *Reg. Baia Mare:* Mții Maramureșului (Farcău, Ciarcanul), Repedea pe Mt. Pietriceaua, Vișeu de Sus, Suliguli; Mții Țibleșului: Mții Rodnei (Pietrosul Mare). *Reg. Cluj:* Mții Rodnei (V. Vinului, Inău, Crăciunel, Corongiș, Galați, Rabla), Rodna; Beclean, Chiochiș; Canciu (r. Dej); Sucutard (r. Gherla); Berchieșu, Cămărașu (r. Sărmășel); Cluj pe Dl. Feleacului, Cojocna, Mociu; Moldovenești, Rimetea pe Colții Trascăului, Lunca, Poșaga pe Mt. Scărița, Vidolm (r. Turda); Poiana Aiudului; Abrud pe Mt. Vulcan, Scărișoara pe V. Ordencușii (r. Cămpeni). *Reg. Aut. M.: Făncelul de Sus* (r. Reghin); Sălard (r. Toplița); Izvorul Mureșului, Mții Giurgeului (Hăghimașul Mare, Mt. «Öcsém» Odorhei, Merești (r. Odorhei), Mții Harghita; Tușnad pe Dl. Ciomad. *Reg. Stalin:* Cetatea de Baltă, Căpâlnița, Lueta, Bachnea (r. Târnăveni); Mediaș; Sighișoara; Orașul Stalin, Mt. Piatra Craiului; Arpaș, Cârțișoara, Porumbacul (r. Făgăraș), Mții Făgărașului (Colții Brezii, Ucea Mare, V. Bălea, Negoiu); Avrig, Tâlmăciu, Cislădie, Turnu Roșu pe V. Lotrioarei, Slimnic, Șura Mare (r. Sibiu), Mții Sibiului (Cheile Cibinului, Mt. Preajbă). *Reg. Hunedoara:* Mții Trascăului (V. Ighielului, Piatra Ceții), Intregalde (r. Alba Iulia); Hermezeu-Văleni (r. Orăștie); Mții Retezatului (V. Lăpușnicul Mare, Peleaga, Bucura, Valereasca, Stănulete); Mții Parângului. *Reg. Arad:* Tăgădău (r. Ineu). *Reg. Timișoara:* Oravița, Ștaierdorfanina, Ciclova; Mții Cernei, Mții Mehedinților. *Reg. Craiova:* Mții Mehedinților (Piatra Cloșanilor). *Reg. Pitești:* V. Dâmbovicioarei (r. Cămpulung). *Reg. Ploiești:* Lăculețe, Băile Vulcana la Mrea Bunea (r. Pucioasa); Cămpina, Breaza; Sinaia; Mții Ciucașului (V. Telejenelului sub Mt. Zăganul). *Reg. Bacău:* Băile Slănic; Comănești (r. Moinești); Piatra Neamț pe Dl. Cozla; Mădei, Broșteni pe V. Neagra, Tulgheș la Pietrile Roșii (r. Ceahlău), Mții Bistriței (Ceahlău, V. Bicazului, Mt. Măgura din V. Bistricioarei, Barnarul, Bărnărelul); Mrea Neamț, Mrea Agapia (r. Tg. Neamț). *Reg. Suceava:* Mt. Rarău, Pojorâta pe Mt. Adam și Mt. Muncelu (r. Cămpulung); Mții Suhardului, V. Bistriței, Iacobenii, Botoș, Cărlibaba (r. Vatra Dornei).

Variabilitatea speciei

- 1 a Folicule pubescente var. **australe**
 1 b Folicule complet glabre sau numai în parte glabre..... 2
 2 a Folicule glabre var. **Hacquetianum**
 2 b Folicule în parte glabre, în parte pubescente..... var. **confusum**

var. **australe** (Rechb.).— *A. australe* Rechb. Uebers. Aconit. (1819) 71, n. nud. ex Baumg. Mant. (1846) 51. — **lc.**: Pl. 81, fig. 2. — Folicule pubescente. Se află în următoarele forme:

- 1 a Flori albe
 f. **album** Zap. in Kosmos (1912). — *A. mold.* Hacq. f. *albidulum* Dom. in Acta geobot. hung. II (1938—39) 17. — *Reg. Baia Mare:* Vișeu de Sus pe Piatra Arsă. *Reg. Aut. M.: Mt. Hăghimașul Mare. Reg. Ploiești:* Pietroșița pe Dl. Patrana.
 1 b Flori purpuriu-violacee 2
 2 a Tulpină și inflorescență rigidă, cu ramuri foarte fragile
 f. **fragile** G. Grinț. f. nova in Add. pag. 676. — *Reg. Suceava:* Pojorâta pe Mt. Adam

- și Eva (r. Câmpulung); Dorna Cândrenilor pe Pâr. Secu, Iacobeni pe Pâr Ferului (r. Vatra Dornei).
- 2 b Tulpina și inflorescența nerigide. Ramurile nu sunt fragile..... 3
- 3 a Coif foarte lung (25—30 mm)
 f. *grandiflorum* (Schur). — *A. mold. c. grandiflorum* Schur Enum. pl. Transs. (1866)
 32. — *A. mold. Hacq. b. grandicassum* Zap. Consp. Fl. Galic. crit. II (1908) 212. —
 Reg. Suceava: Pojorâta (r. Câmpulung); Păltinișu pe Dl. Vânăț, Iacobeni (loc clasic)
 (r. Vatra Dornei).
- 3 b Coif scund (20—22 mm) 4
- 4 a Frunze cu diviziuni adânc sectate; lăciunile paralele, înguste, de 2,5 mm lățime, drepte
 f. *dissectifolium* (Zap.) — *A. mold. a) dissectifolium* Zap. l.c. — *Mții Lotrului*;
 V. Păscoaia la Zaroștea Mare pe Mt. Băgău.
- 4 b Frunze cu diviziuni nesectate, numai dințate, cu dinți scurți, inegali..... 5
- 5 a Dinți mari, groși, obtuz serați (ca dinții dela *A. gracile*)
 f. *obtusidentatum* Simk. Herb. ex Gáy. in MBL VIII (1909) 315. — *Reg. Baia Mare*:
 Sighet; Vișeu de Sus pe Prislopașu și Piatra Rea, Borșa la Fața Meselor. *Reg. Cluj*:
 Abrud pe Mt. Vulcan. *Reg. Aut. M.*: Borsec; Tușnad. *Reg. Hunedoara*: Hunedoara.
 Reg. Timișoara: Ciclova, Oravița la Marila.
- 5 b Dinți mici, scurți, nu sunt obtuz serați 6
- 6 a Coif la mijloc îngustat (de 3,5—4,5 mm). Filamente bidințate sau brusc contractate
 f. *leopoliense* Zap. l.c. — In *Mții Maramureșului* (?)
- 6 b Coif la mijloc netngustat (de 5—5,5 mm). Filamente nedințate, necontractate. Flor
 cerulee.
 f. *thyraicum* (Blocki). — *A. thyraicum* Blocki in ABZ I (1895) 59. — *Mții Maramu-*
 reșului: Mt. Pop Ivan, Mt. Farcău.

var. *Hacquetianum* G. Grinț. in Cat. sem. Grăd. Bot. Buc. (1945) 6. n. nud. pro ssp. et in Add. pag. 677. — *Ic.*: Pl. 81, fig. 1. — Plantă mai glabrescentă decât *A. mold. ssp. australe*, cu flori mai puțin păroase, în rest având toate caracterele de *A. moldavicum*, dar se deosebește mai cu seamă prin foliculele complect glabre. — *Reg. Baia Mare*: Sighet; Repe-dea, Vișeu de Sus, Borșa, Suliguli, *Mții Maramureșului* (Cearcanul), *Mții Rodnei* (Pietrosul Mare). *Reg. Cluj*: *Mții Rodnei* (Corongiș, Inău), Rodna, Valea Vinului (r. Năsăud); Beclean; Dej; Sucutard (r. Gherla); Berchieșu, Cămărașul (r. Sărmășel); Cluj, Someșul Rece, Mociu; Rimetea pe Colții Trascăului, Poșaga pe Mt. Scărița (r. Turda); Poiana Aiudului; Abrud pe Mt. Vulcan, Scărișoara pe V. Ordencușii (r. Câmpeni). *Reg. Aut. M.*: *Mții Gurghiului*; Sălard, Borsec (r. Toplița); Izvorul Mureșului; Sovata, Praid (r. Sângeorgiul de Pădure); *Mții Giurgeului* (Hăghimașul Mare, Mt. «Öcsém»). *Reg. Stalin*: Bačnea (r. Tărnăveni); Mt. Piatra Craiului; *Mții Făgărașului* (Lacul Bălea); Sebeșul de Jos, Tâlmăciu, Turnu Roșu, pe V. Lotrioarei, Slimnic, Șura Mare (r. Sibiu), *Mții Sibiului* (Cheile Cibinului, Mt. Preajbă). *Reg. Hunedoara*: *Mții Trascăului* (Piatra Ceții, Piatra Caprei), Intregalde (r. Alba Iulia); *Mții Retezatului* (Mt. Stănulete). *Reg. Timișoara*: *Mții Semenicolui*, Ștaierdorfanina. *Reg. Pitești*: Dâmbovicioara (r. Câmpulung). *Reg. Ploiești*: Lăculețe (r. Pucioasa); Talea (r. Sinaia); *Mții Ciucașului* (V. Telejenelului sub Mt. Zăganul); *Mții Buzăului* (V. Bâsca Mare, V. Bâsca Mică). *Reg. Bacău*: Cheile Bicazului. *Reg. Suceava*: Mt. Rarău; Mt. Pietrosul Bistriței, Dorna Cândrenilor pe Pâr. Secu (r. Vatra Dornei).

f. flexuosum G. Grinț. f. nova in Add. pag. 677. — Inflorescență și ramuri foarte șerpuitoare. Flori înalte de 25—30 mm. — *Reg. Suceava*: Pojorâta între Mt. Adam și Eva (r. Câmpulung); Dorna Cândrenilor pe Pâr. Secu, Iacobeni pe Pâr. Ferului (r. Vatra Dornei).

f. macrocassis G. Grinț. f. nova in Add. pag. 677. — Inflorescență și ramuri drepte. Flori mari cu coiful de cca 35 mm. — *Reg. Pitești*: Căineni pe Mt. Cățunul (r. Brezoiu).

f. piliferum G. Grinț. f. nova in Add. pag. 677. — **Exs.**: FRE nr. 2756 sub f. *stenanthum*. — Coif cu ciocul pârșos la interior. — *Reg. Cluj*: Colibița (r. Bistrița). *Reg. Aut. M.*: Gurghiu, Lăpușna (r. Reghin); Deda, Răstolița, Sălard (r. Toplița); Mții Giurgeului (Hăghimașul Mare, Mt. «Öcsém»). *Reg. Craiova*: Mrea Polovragi în Cheile Oltețului (r. Horezu). *Reg. Pitești*: Călimănești, Căineni pe Mt. Cățunul, Malaia pe V. Latoriței (r. Brezoiu); Sălătrucu (r. Curtea de Argeș); Rucăr, Dragoslavele (r. Câmpulung). *Reg. Ploiești*: Lăculețe (r. Pucioasa); Comarnic, Talea în Păd. Secătura, Sinaia; Măneciu, Izvoarele pe Pâr. Drajna, V. Telejenelului (r. Văleni). *Reg. Suceava*: Dorna Cândrenilor pe Pâr. Secu (r. Vatra Dornei).

var. confusum G. Grinț. var. nova in Add. pag. 677. — Plante mai rigide, mai des pubescente, se deosebesc de celelalte varietăți prin foliculele jumătate glabre, jumătate păroase. — *Reg. Cluj*: Rodna Veche (r. Năsăud), Mții Rodnei (Corongiș, V. Anieșul Mic); Canciu (r. Dej); Turda. *Reg. Aut. M.*: Lăpușna pe V. Gurghiuului, Glăjăria (r. Reghin); Deda pe V. Bistra, V. Mureșului între Sălard și Răstolița (r. Toplița); Mții Giurgeului (Hăghimașul Mare); Sovata. *Reg. Stalin*: Mții Făgărașului la Lacul Bălea. *Reg. Hunedoara*: Mții Retezatului (V. Lăpușnicului); Petroșani. *Reg. Timișoara*: Sasca pe V. Beiu Sec la Dosul Mare (r. Orașuț). *Reg. Craiova*: Prejna pe Mt. Înălțățul (r. Baia de Aramă); Balta pe Dl. Pleșa, Suseni pe Pâr. Frățești, Văləri pe Pâr. Cioclovina, Schela pe Pâr. Hărăboia (r. Tg. Jiu); Baia de Fier (r. Novaci). *Reg. Pitești*: Mții Lotrului (V. Păscoaia la Zaroștea Mare), Malaia pe Dl. Cărpeneasa (r. Brezoiu); Sălătrucul de Sus pe V. Topologului (r. Curtea de Argeș). *Reg. Ploiești*: Ochiuri (r. Târgoviște); Lăculețe la carieră, Vulcana, Pietroșița pe Dl. Pătrana (r. Pucioasa); Talea pe Pâr. Secătura, Teșila pe V. Doftanei (r. Sinaia); Măneciu-Ungureni (r. Văleni), Mții Ciucașului (V. Telejenelului sub Mt. Zăganul); Nehoiaș (r. Cislău); Lopătari pe V. Slănicului (r. Beceni). *Reg. Bacău*: Cârnu (r. Piatra Neamț); Potoci, Galu, Sabașu, Mădei, Broșteni la Gura Văii Neagra, Tulgheș pe Mt. Hăghies (r. Ceahlău), Mt. Ceahlău, Cheile Bicazului pe Mt. Suhard; Pipirig pe Mt. Petru Vodă (r. Tg. Neamț). *Reg. Suceava*: Păltiniș pe Dl. Vânăț, V. Bistriței între Broșteni și Crucea și între Cojoci și Chiril, Mt. Rarău, Dorna Cândrenilor pe Pâr. Secu, Poiana Stampei, Argestru (r. Vatra Dornei); Pojorâta pe Mt. Adam (r. Câmpulung).

f. variegatum G. Grinț. f. nova in Add. pag. 677. — Flori violet, pătate sau marmorate cu alb și albastru. — *Mții Lotrului*: Pâr. Zaroștea Mare, la Păscoaia sub Mtele Băgău. *Mții Ciucașului*: Pâr. Telejenelului, sub Mt. Zăganul, în aninișuri.

f. pilosum G. Grinț. f. nova in Add. pag. 677. — Cioc pârșos la interior. — Impreună cu tipul.

f. glaberrimum G. Grinț. f. nova in Add. pag. 677. — Cioc glabru la interior — Impreună cu tipul.

Intrebuintări. *A. moldavicum* nu se întrebuințează în medicină. Rădăcina și frunzele sunt otrăvitoare și adesea periculoase pentru oi. Ciobanii feresc oile de această plantă. Cu fiertura din rădăcină și chiar din frunzele mai bătrâne, populația dela munte spală rănile, animalele cu păduchi sau rănile cu viermi ale acestora. Cu rădăcina pisată și amestecată cu mămăligă se otrăvesc câinii hoinari, vulpile, bursucii și alte animale stricătoare.

Răsp. gen.: Carpați, Galiția până la Lwow și SV Poloniei.

10. **A. Hosteanum** Schur. in Verh. SVN II (1851) 77 n. nud.; ibid. IV (1853) 49, descr.; Enum. pl. Transs. (1866) 31. — **Ic.**: Pl. 81, 3a; Pax Grundz. II (1908) 81, fig. 8.

4. Rizom gros, ramificat. Tulpină simplă, cu frunze puține, înaltă de 30 — 65 cm. Frunze bazale suborbiculare, profund palmatisectate, cu segmente incize, sau inciz dințate, cele mijlocii scurt pețiolate, cele superioare mici, sesile, reniform cordate, pe fețe \pm aspre, cu marginile ciliate, pe dos mai palide. Inflorescența un racem simplu sau cu 1 — 2 rămurele, pubescentă, cu peri mici reverși, arcuiți, cu flori dese, scurt pedicelate, de culoare purpurie-violacee. Coif conic, la mijloc puțin strâns, cu cioc ascuțit și răsfrânt în sus, \pm ghebos, păros la interior, cu sete galbene. Pinten spiralat, cu labela evident bilobată. Folicule păroase, cu peri mici, drepți, culcați, galbeni, cele tinere paralele, mai târziu la mijloc îndepărtate, cu un rostru curbat. VII—VIII.

Stațiunea. Prin pășuni, în regiunea subalpină și alpină.

Răsp. în țară: *Mții Maramureșului*: Mt. Petricea (Com. Repedea, r. Vișeu). *Mții Rodnei*: Pietrosul Mare deasupra Prelucilor. *Mții Făgărașului*: Vârtopul, Râiosul pe Lespezi, Lacul Bălea, Laița, Negoiul la Strunga Dracului, Ciortea, Scara. *Mții Sibiului*: Mt. Preajba. *Mții Lotrului*: V. Latoriței la Ciunget. *Mții Retezatului*: Butea, Paltinul. *Mții Bihorului*: Stâna de Vale.

Variabilitatea speciei

f. **Borbásii** Gáy. in MBL VIII (1909) 316. — Diferă prin frunze puțin incize, îndepărtat dințate, cu dinții lați, obtuzi și puțini la număr. — *Mții Tarcu-Godeanu* (Mt. Tarcu).

var. **geraniifolium** G. Grinț. var. nova in Add. pag. 678. — Rizom napiform 1—3-ramificat. Tulpină păroasă la bază, cu peri orizontal setiformi, înaltă de 40 cm, cu 4, rar 5 frunze. Frunze bazale mari, reniform rotunde, late de 9 cm și lungi de 6 cm, cu sinusul larg deschis, 5—7-sectate, pubescente, cu dinți lați, obtuz mucronați; cele superioare cu vârful segmentelor lung triunghiular. Inflorescența simplă, pubescentă, cu peri arcuiți, reverși. Flori câte 10—15, îngrămădite, glabrescente, drepte. Coif înalt de 2 cm, boltit, puțin strâns la mijloc, cu linia bazală lungă de 12 mm. Carpele și folicule glabre. — *Mții Sibiului*: Mt. Preajba. *Mții Lotrului*: V. Latoriței la Ciunget.

Răsp. gen.: Endemică în Carpații Sudici.

11. **A. excelsum** Rehb. var. **pseudoexcelsum** G. Grinț. var. nova in Add. pag. 678. — **A. lasiostomum** Rehb. b. **excelsius** Zap. Consp. Fl. Galic. crit. II (1908) 210.

4. Plantă asemănătoare cu **A. excelsum** Rehb. prin tulpina înaltă de 1 — 1,8 m, împreună cu pețiolii bazali și limbul, pe dos păroase, cu perii răriți, setiformi, orizontali sau aplecați în jos. Frunze de forma celor dela **A. moldavicum**, cu sinusurile larg deschise, pe față glabre. Inflorescența un racem lung de 50—60 cm (**A. excelsum**), pubescentă, cu peri mici, reverși, arcuiți, rar

cu puține ramuri, cu flori distanțate, mari, de culoare predominantă albastră-violacee (*A. excelsum*). Pedunculii florilor lungi de 4 — 7 cm, declinat ascendenți spre baza racemului (*A. excelsum*). Bracteele și bracteolele mai mult întregi, liniar lanceolate, cele dela baza pețiolilor lanceolat incize. Coiful alungit, cu vârful clavat. VII.

Stațiunea. Pe sol turbos, în păduri de molid.

Răsp. în țară: *Mții Bistriței*: Mt. Măgura din V. Bistricioarei, în dosul țăncurilor din vârf.

Obs. Specia *A. excelsum* Rehb. tipică nu crește la noi.

12. *A. lasiostomum* Rehb. Illustr. spec. Aconit. (1823—27) nr. 57 tab. 49; Steinberg in Fl. U.R.S.S. VII (1937) 205.

4. Tulpină dreaptă, înaltă de 1 — 1,5 m, puternică, la bază ușor costată, acoperită cu perișori foarte mărunți, moi, creți, rareori mai lungi și drepti, aplecați. Frunze bazale lung pețiolate, glabre sau pubescente, de 7—10 cm lungime și 14—20 cm lățime, puțin pieleose, pe fața superioară acoperite de perișori rari sau aproape glabră, pe cea inferioară mai des păroase, palmat 3—5-partite, cu lobii lați, cunești, foarte divergenți, cu inciziuni rare și puțin adânci și dinți scurți și lați. Frunze tulpinale de aceeași formă, cu pețoli mai scurți sau sesile. Inflorescența un racem des, de 20—30 cm lungime, neramificat sau numai la bază slab ramificat. Pedunculi scurți (3—5 mm), adpres pubescenti, cu 2 bracteole mici, situate în jumătatea superioară sau la mijlocul pedunculului, rareori în partea inferioară. Flori destul de mari, gălbui. Coif de formă conică, la vârf îndoit, înalt de 15—20 mm, lat de 3—5 mm, crispul pubescent, prelungindu-se într'un cioc arcuit, cu gura lungă de 7—10 mm. Foliiolele periantale laterale rotunjite, pubescente pe fața externă, ciliate pe margini, cele inferioare neegale, lungi de 7 mm și late de 2—4 mm, pubescente, la interior barbulate. Nectariile cu unguiculă dreaptă, pinten subțire, îndoit în jumătate de spirală și limb emarginat. Filamentele staminelor glabre, simple sau cu 2 dințișori. Carpele 3, des alipit pubescente. VII.

Stațiunea. Pe dealuri înalte, la marginea pădurilor, până în regiunea montană.

Răsp. în țară: *Reg. Cluj*: Mții Rodnei pe Văile de sub Vf. Inău. *Reg. Bacău*: Mrea Horaița (r. Piatra Neamț). *Reg. Suceava*: Rădășeni pe Dl. Pocoleni (r. Fălticeni); Drăgoiești pe Dl. Cordon (r. Gura Humorului); Calafindești la Căsoaia (r. Rădăuți).

Răsp. gen.: Partea europeană a U.R.S.S., Bulgaria, Iugoslavia.

Plansa 82. — 1. *Aconitum vulparia* Rehb., 1a. folicule — 2. *A. lasianthum* (Rehb.). Simk., 2a. folicule.



13. *A. velutinum* (Rehb.) — *A. lasiostomum* Rehb. f. *velutina* Rehb. Illustr. spec. Aconit. (1823 — 27) nr. 57; Ic. Fl. germ. IV (1840) 25, tab. 100, fig. 4711 β . *velutina*.

4. Tulpină înaltă de 75 — 150 cm, des și moale viloasă. Frunze 3 — 5-palmatipartite, pe dos și pe nervuri ca și pețiolul vilos setiforme, cu diviziuni late, inciz dentate. Inflorescența un racem alungit. Pedunculii floriali patuli, de 2 ori mai scurți decât florile, împreună cu axa racemului setiform velutini. Flori măricele, de 27 mm, galbene. Coif oblic pe axă, conic, cu fund obtuz și fruntea preungită în cioc. Foliiolele periantiale laterale subrotunde, la mijloc ca și cele de jos, setiform viloase, pe dos barbulate. Nectarii mult mai scurte decât coiful, cu pinten arcuit. Filamentele subbidentate. Folicule setiform viloase. VII.

Stațiunea. Prin fânețe, coaste, și în văile din regiunea muntoasă.

Răsp. în țară: *Reg. Cluj*: Mții Rodnei (pe văile de sub Vf. Inău). *Reg. Bacău*: Tarcău la Gura Tarcăului (r. Piatra Neamț), V. Bicăzului; Hangu pe Măgura Hangului, Mt. Ceahlău (Jghiabul lui Vodă), Broșteni pe V. Neagra (r. Ceahlău); Mrea Văratec (r. Tg. Neamț). *Reg. Suceava*: Horodniceni (r. Fălticeni); Bosanci (r. Suceava); Calafindești (r. Rădăuți).

14. *A. vulpăria* Rehb. Übers. Aconit. (1818) 70, n. nud., Illustr. Spec. Aconit. (1823 — 27) nr. 67, tab. 58, excl. *A. moldavicum* et *A. triste*, p. p. — Omeag. — Farkasölő sisakvirág. — Wolfs-Eisenhut. — Аконит высокий. — Exs.: FRE nr. 2759 sub f. *galact*. — Ic.: Pl. 82, fig. 1, 1a.

4. Tulpină înaltă. Frunze circulare sau reniforme, lat palmat divizate, cu diviziunile în partea superioară trifide, grosolan dințate, pe nervurile dorsale și margini aproape întotdeauna păroase, între nervuri glabre sau slab păroase. Inflorescența ramificată, acoperită cu peri scurți, creți, cu ramuri arcuit ascendente sau drept patente. Racem terminal ramificat lățit, cu pedunculi drepți, îndepărtați sau puțin curbați. Flori galbene, creț păroase. Coif cuneiform-cilindric, înalt de 1,5 — 5 cm, lat de 5 — 8 mm, cu fundul larg cilindric, la bază adesea lărgit și prelungit în cioc; linia bazală de 1 — 1,5 cm lungime. Nectarii cu unguicule drepte și pinten în formă de semicerc spiralat. Stamina, ovar și folicule glabre. VI — VII.

Stațiunea. Pe marginea pădurilor, în locuri umede și umbroase din etajul montan.

Răsp. în țară: *Reg. Cluj*: Cluj (Mănăstur, V. Plecica), Vlahă, Mții Gilăului [(V. Someșului Rece, V. Someșului Cald); Răchițele (r. Huedin); Băișoara Runc, Poșaga pe Mt. Scărița, Râmeți (r. Turda); Scărișoara pe V. Ordencușii, Abrud pe Mt. Vulcan (r. Câmpeni); Mții Bihorului (Mt. Mare, Vlădeasa). *Reg. Stalin*: Racoșul de Jos pe Dl. «Töpehegy»

(r. Rupea); Râșnov (r. Stalin); Mții Făgărașului. *Reg. Hunedoara*: Intregalde (r. Alba Iulia), Mții Trascăului (Piatra Caprei, Piatra Ceții); Sarmisegetuza (r. Hațeg). *Reg. Oradea*: Valea Drăganului (r. Alșed); Aleuș (r. Șimleul Silvaniei).

Variabilitatea speciei

- 1 a Flori albicioase
 f. *umbraticolum* (Schur). — *A. Vulparia* Rchb. var. *umbraticola* Gáy. in MBL VII (1909) 321. — *A. umbraticola* Schur in Verh. NV Brünn XV (1877) 65.
- 1 b Flori galbene 2
- 2 a Fructe păroase
 f. *galactonum* (Rchb.) Gáy. l.c. — *A. galectonum* Rchb. Übers. Aconit. (1819) 67. n. nud. — *A. Vulparia* β. *Cynoctonum* var. *galectonum* Rchb. Illustr. spec. Aconit. (1823—1827) nr. 66, tab. 57, fig. dextra; Fl. germ. exc. III (1832) 737, sub *galactonum*. — Exs.: FRE nr. 2759. — *Reg. Cluj*: Cluj pe V. Plecica; Colții Trascăului. *Reg. Bihor*: Mții Bihorului (Cetățile Ponorului, Stâna de Vale, Mt. Vlădeasa).
- 2 b Fructe glabre 3
- 3 a Inflorescență normală, simplă sau ramificată 4
- 3 b Inflorescență anormal dezvoltată, piramidală sau foarte bogată 5
- 4 a Inflorescență ramificată ± desfăcută
 f. *normale* Nyár. Kv. fl. III (1942) 215, c. diagn. hung. et in Bul. șt. Acad. R.P.R. Sect. Șt. biol. tom. III, nr. 1 (1951) 30. — Cluj pe V. Plecica; Mții Trascăului (Piatra Ceții).
- 4 b Inflorescența un racem scurt, îngust
 f. *Richteri* Gáy. in MBL V (1906) 233, VI (1907) 290. — Ic.: Muz. Füz. Cluj I (1906) tab. VI. — *Reg. Cluj*: Cluj pe V. Plecica, Vlaha; Vidra la Coasta Pietroasă (r. Câmpeni).
- 5 a Inflorescență piramidal racemoasă
 f. *tragactonum* (Rchb.). — *A. Vulparia* var. γ. *Tragoctonum* Rchb. Illustr. spec. Aconit. (1823—27) nr. 67, tab. 58. — Mții Bihorului.
- 5 b Inflorescență luxuriantă
 f. *luparia* (Rchb.) Gáy. in MBL VIII (1909) 321. — *A. Luparia* Rchb. Übers. Aconit. (1818) 74, n. nud. — Mții Bihorului.

Răsp. gen.: Europa centrală.

15. *A. puberulum* (Ser.). — *A. Lycoctonum* var. ε. *puberulum* Ser. Mus. Helv. I (1822) 134. — *A. Vulparia* γ. *typicum* Beck Fl. NÖ (1890) 402, sec. Gáy. in MBL VI (1907) 291.

4. Tulpină ± pubescentă la bază, în rest cu peri lungi, drepți, setiformi, ca și pe frunze. Frunze inferioare mari, până la 25 cm lungime și 35 cm lățime, larg deschise la bază, verzi închise, slab păroase sau glabre, la uscare se inegresc. Inflorescența un racem lung (20—30 cm), simplu sau puțin ramificat, în întregime patent viloasă. Bractei lanceolate, lungi, ascuțite, puțin sectate sau întregi. Flori galbene-albicioase, la gură verzi. Folicule glabre. VII.

Stațiunea. Pe maluri de ape, prin aninișuri, la altit. de 700—800 m.

Răsp. în țară: *Reg. Ploesti:* Mții Ciucașului: pe V. Telejenelului, între Triunghi și Poiana Greceanu, sub Mt. Zăganul.

Variabilitatea speciei

- 1 a Flori divers colorate și în special galbene-rubicunde. Folicule glabre
f. *versicolor* G. Grinț. f. nova in Add. pag. 678.— *Reg. Ploesti:* Mții Ciucașului: fânețe pe malul Telejenelului, locuri însorite, spre Vărărie sub Mt. Zăgan.
- 1 b Flori galbene 2
- 2 a Bractei lungi, întrec odată lungimea bobocilor, mai lungi decât pedicelii
f. *bracteatum* G. Grinț. f. nova in Add. pag. 678.— *Reg. Ploesti:* Slonu prin fânețe (r. Văleni).
- 2 b Bractei mici, nu se văd printre boboci, mai scurți decât pedicelii 3
- 3 a Frunze glabre sau glabrescente, lucioase pe față
f. *ghilcosense* Nagy et Nyár. in Erd. Muz. (1949) 153. — *Reg. Ploesti:* Mții Ciucașului: malul Telejenelului între Poiana Stănei și Vărărie, sub Mt. Zăganul. *Reg. Bacău:* Cheile Bicazului.
- 3 b Frunze nelucioase, ± dens păroase, mari, lungi până la 25 cm și late până la 35 cm. Tulpină presărată ici colo cu peri drepți, lungi, setiformi. Racem lung de 20—30 cm, păros
f. *typicum* G. Grinț. f. nova in Add. pag. 678.— *Reg. Ploesti:* Mții Ciucașului: pe malul Telejenelului în Poiana Greceanu sub Mt. Zăganul.

Răsp. gen.: Alpi, Tatra.

16. **A. lasianthum** (Rehb.) Simk. Enum. Fl. Transs. (1886) 61, Gáy. in MBL VI (1907) 292, VIII (1909) 323. — *A. Vulparia* Rehb. α. *Phtora* var. *lasiantha* Rehb. Ic. Fl. germ. IV (1840) 21, tab. 79, fig. 4679 media. — *Omag galben*. — Szörösvirágú sisakvirág. — Behaarter-Eisenhut. — Ic.: Pl. 82, fig. 2.

4. Tulpină înaltă de 40—120 cm, păroasă, spre bază cu frunze mai dese, cele bazale foarte lung pețiolate, de 15—25 cm în diam., 5—7-palmatipartite. Segmentele cuneat trapezoidale, cele laterale bifide, cel mijlociu trifid, cu lacinii drepte, inciz acut dințate. Internodiile foarte lungi, cele mijlocii până la 30 cm. Partea inferioară a tulpinii, pețiolii și frunzele pe nervuri, ± acoperite cu peri setiformi, lungi, patenți, ± deși, galben mătăsoși, care treptat descresc spre vârful tulpinii, devenind mici, arcuiți și reversi. Vârful ramurilor, florile și fructele, cu peri patent viloși. Flori în raceme laxe, cu pedunculi scurți și bracteole liniare. Coif înalt, cilindric, la gură ± brusc dilatat. Fruct oblong. Semințe pe spate ondulat muchiate, pe fețe netede. VII — VIII.

Stațiunea. În păduri, pe coaste stâncoase și ierboase din regiunea montană și subalpină.

Răsp. în țară: *Reg. Stalin*: Orașul Stalin (Tâmpa, Stejăriș), V. Timișului, Predeal, Mt. Piatra Mare pe V. Gârcinului, Săcele, Zizin, Mții Ciucașului (M. Tesla, Izvoarele Buzăului), Râșnov, Mții Bucegi (V. Mălăești), Zărnești pe Măgura, Mt. Piatra Craiului; Mții Sibiului (Frumoasa). *Reg. Hunedoara*: Mții Trascăului (Piatra Caprei). *Reg. Pitești*: Voineasa pe V. Lotrului (r. Brezoiu); Rucăr (r. Câmpulung). *Reg. Prahova*: Posada, Sinaia, Bușteni pe Mt. Zamora, Mții Bucegi: Piatra Arsă, Jepi, Caraiman, Coștila, V. Ialomiței; Mții Ciucașului (V. Telejenelului sub Mt. Zăganul); Ciolanu (r. Buzău); Mt. Penteleu pe Viforâta.

Variabilitatea speciei

- 1 a Bracteele întrec lungimea bobocilor și a florilor
f. *bracteosum* G. Grinț. f. nova. in Add. pag. 678. — Mții Ciucașului: V. Telejenelului în Poiana Triunghiu sub Mt. Zăganul.
- 1 b Bractei mici, nu sunt vizibile între boboci 2
- 2 a Inflorescență ramificată sub racem, cu 1—2 ramuri drepte, celelalte arcuite ascendente sau arcuite spre interior
f. *arcuatum* G. Grinț. f. nova in Add. pag. 679. — Mții Ciucașului: V. Telejenelului sub Mt. Zăganul în Poiana Greceanu.
- 2 b Inflorescență sub racem cu 1—5 ramuri, toate drepte 3
- 3 a Tulpină, inflorescență, flori și folicule patent vilooase
f. *typicum* G. Grinț. f. nova in Add. pag. 679. — Orașul Stalin; Mții Ciucașului pe V. Telejenelului sub Mt. Zăganul în Poiana Greceanu; Mt. Penteleu.
- 3 b Tulpina la bază cu peri ± deși, hirsutiformi, orizontali; restul tulpinii, inflorescența, pediceli și axa, cu peri reversi, arcuiți și mici, sau pubescent vilooși; bracteele și florile cu peri setiform vilooși 4
- 4 a Axa și fructele cu peri pubescenti, mici, culcați și drepti
f. *púbens* G. Grinț. f. nova in Add. pag. 679. — Impreună cu f. *arcuatum*.
- 4 b Axa cu peri pubescent vilooși; fructe setiform patent păroase
f. *mixtum* G. Grinț. f. nova in Add. pag. 679. — Orașul Stalin, pe Mt. Tâmpa, Predeal pe V. Râșnoavei la Pârâul Rece; Bușteni (r. Sinaia).

Răsp. gen.: Endemic în Carpații din R.P.R.

17. *A. dasytrichum* (Deg. et Gáy.) G. Grinț. comb. nova — *A. platanifolium* Deg. et Gáy. b. *dasytrichum* Deg. et Gáy. in MBL VI (1907) 119. — *A. ranunculifolium* Rehb. f. *A. dasytrichum* Gáy. in MBL VIII (1909) 318.

24. Tulpină înaltă până la 1 m, setiform păroasă, cu peri deși, reversi. Frunze bazale circulare, ca și cele tulpinale, sectate până aproape de bază, cu segmente înguste, de 1 — 1,5 mm lățime, la vârf arcuite, sau în formă de seceră, cele superioare cu vârful lobilor mijlocii lung și drept. Pețioali lungi până la 25 cm, hirsutiformi, moi păroși. Limbul gros, discolor, pe față rărit pubescent, cu peri mici, pe dos cu nervurile proeminente, păroase, cu peri ± setiformi, pe margini ciliat, cu peri arcuiți. Inflorescența mătăsoasă pubescentă, cu peri creți, reversi, la bază cu sau fără ramuri; racemul simplu, lung, până

la 40 cm, des pubescent, cu peri mici mărunți, spre mijlocul racemului devenind pubescent vilôși sau revers setiformi. Pedicelii de 20—30 mm sau foarte lungi (5 — 7 cm), curbați sau patenți. Bractei liniare, lung lanceolate, întregi sau cele de jos 3-divizat dentate; bracteole liniare, întregi, nu mult mai scurte decât pedicelul. Racemul drept, flexuos. Periant setiform păros, în partea superioară albicios (coiful), în partea inferioară galben. Coif pe spate drept, lung de 25 mm, în față de 32 mm, boltit conic, cu fruntea dreaptă, prelungită într'un cioc drept. La maturitate coiful devine arcuit, aplecat mult spre cioc, cu gura largă de 12 — 13 mm, aproape dreaptă. Nectarii spiralate, cu pinten lung până la $\frac{3}{4}$ din lungimea coifului și limbul dentat. Stamine cu filament subțire și lat la bază. Folicule cu peri rigizi, culcați. Vârful stilului până la jumătate sau $\frac{1}{3}$ acoperit cu peri răriți, setiformi. VII.

Stațiunea. Prin fânețe cu substrat calcaros.

Răsp. în țară: *Reg. Pitești:* Nămăești pe Mt. Mateiașu și sub poalele muntelui Sturu în Poiana dela izvorul Sturu (r. Câmpulung). *Reg. Ploiești:* Mții Bucegi (Jepii Mici pe V. Urlătorilor); Slon în fânețe (r. Văleni).

Variabilitatea speciei

- 1 a Pediceli de 15—25 mm. Bractei scurte 2
- 1 b Pediceli de 30—35 mm, rar mai lungi. Bractei lungi 3
- 2 a Inflorescență dreaptă, simplă sau ramificată, cu 1—2 rămurele la bază, cu axă scurtă de 10—20 cm. Coiful conic, la mijloc strâns, la vârf măciucat, drept
f. *typicum* G. Grinț. f. nova in Add. pag. 679. — *Reg. Pitești:* Mt. Sturu și Mt. Mateiașu.
- 2 b Inflorescență dreaptă, simplă sau ramificată, cu 1—4 ramuri la bază, cu axă lungă de peste 20 cm. Coif lung până la 30—35 mm, arcuit în față sau aplecat mult spre cioc
f. *ranunculiforme* G. Grinț. f. nova in Add. pag. 680. — Impreună cu f. *typicum*.
- 3 a Inflorescență lungă până la 40 cm, simplă sau ± ramificată, flexuoasă. Coif măciucat sau conic, lung de 30—35 mm, ± arcuit în față
f. *flexuosum* G. Grinț. f. nova in Add. pag. 680. — Impreună cu f. *typicum*.
- 3 b Inflorescență foarte lungă, până peste 70 cm, dreaptă, simplă sau ramificată, cu 1—4 ramuri lungi de 20 cm; coif lung de 30 mm 4
- 4 a Coif inclinat în față, ± mai lung decât nectariile
f. *pedunculatum* G. Grinț. f. nova in Add. pag. 680. — Impreună cu f. *typicum*
- 4 b Coif de altă formă 5
- 5 a Flori dese; coiful drept, cilindric, cu vârf boltit, rotund.
f. *cylindricum* G. Grinț. f. nova in Add. pag. 680. — Impreună cu precedentă.
- 5 b Flori laxe, îndepărtate, în față ± arcuite; vârful coifului dat pe spate
f. *laxum* G. Grinț. f. nova in Add. pag. 680. — Impreună cu precedentă.

Răsp. gen.: Alpi, Bosnia, R. P. Română.

Hibrizi

× **A. Zenoniae** Wol. in MBL VII (1907) 279, VIII (1909) 124 = *Anthora* × *romanicum*.

Tulpină înaltă până la 70 cm, cu frunze aproape complet glabre; segmentele primare ale frunzelor la bază cuneat îngustate, cu lacinii liniare, ascuțite, mai largi în partea mediană decât în partea bazală; laciniiile laterale bazale formează un unghi mai puțin deschis decât la *A. Napellus*. Inflorescență ramificată, cu pediceli foarte slab împrăștiat păroși. Periant numai pe margini ceruleu colorat, la mijloc trecând în sulfuriu. Coif abia rostrat, la mijloc cât și pe margine slab păros. Unghiul nectarilor arcuit. Antere cerulee, cu filamente în parte păroase. Folicule 3 (în cultură 5), în parte păroase. VIII.

Reg. Suceava: Cărlibaba pe V. Țibăului la Stânca Țibău (r. Vatra Dornei).

× **A. abnorme** G. Grinț. sp. hybr. in Add. pag. 685 = *callibotryon* ssp. *bucovinense* × *romanicum*.

4. Plantă glabră, ramificată, înaltă de 45 — 60 cm, cu tulpină noduroasă. Frunze îngrămădite sub inflorescență, 5-divizate; segmentele cu lacinii și dinți ± scurți, arcuiți sau în formă de seceră, negri, coriacei. Racem ± lung, cu flori puține, hemisferice, cu pediceli mai scurți sau egali cu florile. Foliiolele periantiale glabre, de 15—18 mm în diam., ne amintesc pe *A. romanicum*. Coif ± deschis. Stamine ± amestecate, glabre și ciliate, simple sau 1 — 2-dentate. Nectarii cu cap ciliat. Seminte triunghiulare, cu hilul așezat pe o suprafață netedă, cele 2 fețe dorsale unite într-o muchie aripată, lată, pe spate ± ondulat muchiate; aceste din urmă caractere ne amintesc pe *A. bucovinense*.

Reg. Suceava: Pojorâta pe jghiab între Mt. Adam și Eva, prin fânețe la cariera de piatră, lângă râul Moldova, sub Mt. Muncel (r. Câmpulung).

× **A. Baumgartenianum** Simk. in Term. füz. (1886) 79 = *lasianthum* × *moldavicum* s. l. — *A. lasianthum* ssp. *Baumgartenianum* Simk. Enum. Fl. Transs. (1886) 61.

Prin indumentul creț și revers pubescent al tulpinii și inflorescenței, se deosebește de *A. lasianthum* iar prin carpelele și coiful cu peri destul de lungi, erect patenți, se deosebește de *A. moldavicum* și *A. Vulparia*. Florile albastrii sau murdar gălbui. Fructe păroase sau glabre.

Reg. Stalin: Mt. Piatra Craiului (Crăpătura, V. Prăpăstiilor, Stâna Martoi). *Reg. Pitești:* Sălătrucu la Păd. Boșoara (r. Curtea de Argeș). *Reg. Ploiești:* Gura Ocnii în Păd. Ochiuri (r. Târgoviște); Lăculețe la Carieră (r. Pucioasa); Mții Ciucașului: V. Telejenelului în Poiana Triunghiului sub Mt. Zăganu.

× **A. aberratum** G. Grinț. sp. hybr. nova în Add. pag. 681 = *moldavicum* var. *australe* × *puberulum*.

Plantă cu frunze discolore, pe dos cenușii, pe față verzi negricioase, glabrescente. Tulpina și petiolii frunzelor bazale parțial glabrescente, cu peri

setiformi, albicioși. Foliiolele laterale ale periantului și coiful pe cioc, setiform alb păroase. Marginea inferioară a periantului galbenă-verde. Prin aceste caractere se aseamănă cu *A. puberulum*, de care se deosebește prin inflorescența pubescentă, cu peri reversi, florile \pm intens violet și foliculele parțial pubescente, cu peri culcați, drepți; caractere prin care se aseamănă cu *A. mold.* var. *australe*.

Reg. Ploști: Mții Ciucașului: V. Telejenelului între Poiana Triunghiu și Greceanu sub Mt. Zăganul.

\times **A. setiferum** G. Grinț sp. hybr. nova in Add. pag. 681 = *moldavicum* \times *velutinum*.

Prin port, culoarea violetă a florilor, părozitatea pubescentă a inflorescenței, cu peri reversi, arcuiți și mici, bracteele 3-divizate și bacteolele întregi, liniare, lungi și pubescente, cât și prin carpelele pubescente, cu peri mici, culcați, se aseamănă cu *A. moldavicum* var. *australe*. Prin carpelele pe spinare pubescente, cu peri rari, setiformi, coiful cilindro-conic, prelungit într'un cioc evident arcuit, părozitatea întregului periant, alcătuită din sete amestecate cu peri mici, arcuiți, reversi, ca și prin pedicelii pubescenti viloiși, se aseamănă cu *A. velutinum*.

Reg. Cluj: Mții Rodnei (văile umbroase de sub Inău, Mt. Galați). *Reg. Aut. M.:* Mții Giurgeului (Mt. Hăghimașul Mare). *Reg. Bacău:* Broșteni pe Bistrița, Bistricioara pe Mt. Măgura (r. Ceahlău). *Reg. Suceava:* Mții Bistriței în Cheile Barnarului, Mt. Suhardul, Dorna Cândrenilor pe Pâr. Secu, Păltiniș pe Dl. Vânăț, Iacobeni pe Pâr. Ferului (r. Vatra Dornei).

\times **A. patentipilum** (Gáy.) = *Hosteanum* ssp. *geraniifolium* \times *lasianthum*. *A. Hosteanum* f. *patentipilum* Gáy. in MBL V (1906) 233.

Rizom fasciculat. Tulpină glabră sau glabrescentă, înaltă de cca 40 cm, arcuită la bază, cu 2 — 5 frunze ce întrec $1/2$ tulpinii. Frunze cu limbul mic. Inflorescență, pețiole, frunze superioare, bractei, bracteole, pediceli și flori, păroase cu peri patenți, hirsutiformi, ca la *A. lasianthum*. Flori violacee. Folicule \pm pubescente, asemănătoare celor dela *A. Hosteanum* ssp. *geraniifolium*.

Reg. Stalin: Mții Făgărașului: Lacul Bălea, Mt. Arpașul Mare, Strunga Dracului, Mt. Surul. *Reg. Hunedoara:* Mții Retezatului pe Paltina.

\times **A. Simonkaianum** (Gáy.) = *Hosteanum* \times *velutinum*. — *A. Simonkaianum* Gáy. in MBL VI (1907) 297 — *A. moldavicum* e. *Hosteanum* 2^a for. *rod-nense* Zap. Conspr. Fl. Galic. crit. II (1908) 213.

Inflorescență patent viloașă, coif cu peri setiformi, răzleți și folicule cu peri galbeni, viloiși, asemănătoare celor dela *A. velutinum*. Portul, forma frunzelor și culoarea florilor (violet-închise), asemănătoare celor dela *A. Hosteanum*.

Reg. Baia Mare: Repedea, Borșa: la Fața Meselor (r. Vișeu); Mții Rodnei (Pietroșul Mare). *Reg. Cluj:* Rodna, Mții Rodnei: Crăciunel, Inău, Galați. *Reg. Aut. M.:* Tușnad pe Dl. Ciomad. *Reg. Suceava:* Cheile Dornei, Iacobeni pe Mt. Suhardul (r. Vatra Dornei).

× *A. triste* (Fisch.) Gáy. in MBL VI (1907) 300 = *moldavicum* × *vulparia*. — *A. triste* Fisch. in Rehb. Fl. germ. exc. (1832) 737; Rehb. Illu. tr. spec. Aconit. (1823 — 27) tab. 57, fig. e. anonyma.

Inflorescența alipit păroasă, bobocii palid galbeni, florile la început clar galbene, sunt asemănătoare celor dela *A. vulparia*. Mai târziu, florile devin treptat violet, iar la maturitate albastre-liliachii. Coif cu peri moi. Folicule glabre.

Reg. Cluj: Cluj în V. Plecica și la Fănațe; Lunca (r. Turda); Roșia Montană, Vidra pe Piatra Struțului și Mt. Găina, Bucium pe Detunata (r. Câmpeni). *Reg. Hunedoara:* Mții Trascăului pe Piatra Ceții.

× *A. erroneum* G. Grinț. sp. hybr. nova in Add. pag. 681. = *lasianthum* × *vulparia*. — *A. vulparia* Rehb. f. *barbatum* Nyár. in BK (1941) 137, Kv. fl. III (1942) 215, c. diagn. hung. et in Bul. șt. Acad. R.P.R. Sect. Șt. biol. tom. III, nr. 1 (1951) 29.

Se aseamănă cu *A. lasianthum* prin tulpina cu peri lungi, setiformi și patenți, florile rărit păroase, cu peri setiformi, patenți și ciocul la interior barbulat sau pubescent. Prin foliculele glabre și frunzele lat sectate, se aseamănă cu *A. vulparia*.

Cluj în V. Plecica.

× *A. setosum* G. Grinț. sp. hybr. nova in Add. pag. 681. = *lasianthum* × *puberulum*.

Prin frunzele glabrescente și lucioase, foliculele negre, unele glabre sau parțial glabre, se aseamănă cu *A. puberulum*, de care se deosebește prin foliculele acoperite parțial cu peri pubescenti, amestecați cu peri setiformi (rar pe aceeași inflorescență se află folicule complet glabre sau în întregime pubescente).

Reg. Ploesti: Mții Ciucașului; pe V. Telejenelului spre cuptoarele de var de sub Mt. Zăganul.

× *A. sturiense* G. Grinț. sp. hybr. nova in Add. pag. 681. = *mold.* var. *australe* × *dasytrichum*.

Rizom fasciculat, neregulat ca formă, bont, gros, fără ochiuri. Tulpină de 60 cm înălțime sau mai mult, păroasă, cu peri reversi, ± deși și patenți. Frunze groase, adânc sectate până aproape de petiol, cu segmente înguste, cu vârf lung și ascuțit. Inflorescență lungă de 45 cm, ramificată dela 1/3 sub mijlocul tulpinii, cu axă lungă de 20 cm. Bractei 3-divizate, cele superioare lanceolate, mai scurte decât pedunculii. Pediceli curbați, lungi de 1,5—5,5 cm. Flori drepte, de 4 cm, violet, puțin verzi la gură, setiform păroase. Coif de 40 mm înălțime, la mijloc de 8 mm lățime, în față ± arcuit, cu spatele drept, la vârf aplecat în față, cu cioc mare, prelung arcuit. Nectarii

spiralate. Stigmate glabre, cu lama lată. Folicule alb păroase, cu peri drepți, \pm patenți, viloși. VII.

Reg. Pitești: Căineni pe Mt. Cuțui (r. Brezoiu); Nămăești pe valea dintre Mt. Mateiașu și Mt. Sturu (r. Câmpulung).

Genul 116. **A N E M Ó N E *** L.

Gen. pl. [ed. I (1737) 163, nr. 459], ed. V (1754) 241, nr. 614, p. p. — **F l o a r e a P a ș t e l u i , O i țe.**

Plante ierbacee, perene, cu rizomi cilindrici, adesea cărnoși. Tulpină erectă, de obicei neramificată. Frunze bazale 1 sau mai multe, uneori lipsesc sau se desvoltă după înflorire, cu pețiole de lungimi diferite și lamină palmatisectată sau palmatipartită. Involucru trifoliat, cu frunze involucrale așezate în verticil, de obicei având forma frunzelor bazale, sesile sau \pm pețiolate. Flori distribuite regulat, cu pedunculi de obicei lungi, solitare sau mai multe, adunate în inflorescență umbeliformă. Periant petaloid, caduc, cu 5 — 8 (rar mai multe) foliole galbene sau albe, de formă și mărime variată. Nectariile prezente sau lipsesc. Stamine multe. Carpele numeroase, cu câte un ovul suspendat, cu 1 tegument, păroase sau glabre, cu stigmat scurt, drept sau \pm recurbat. Fructe apocarpice, nucule numeroase, \pm comprimate lateral, păroase sau glabre, cu rostru scurt, întotdeauna lipsite de prelungire lungă, păroasă.

D e t e r m i n a r e a s p e c i i l o r

- 1 a Nucule glabre. Frunze involucrale sesile, la bază uneori \pm conrescute. Flori 3 — 8 (rar 1 — 2), lung pedunculate, albe, adurate în umbelă 5. **A. narcissiflora**
- 1 b Nucule rărit și scurt păroase sau alb lănoase. Frunze involucrale foarte scurt sau mai lung pețiolate, dar niciodată sesile 2
- 2 a Nucule rărit și scurt păroase. Frunze involucrale de obicei tot atât de lungi, sau ceva mai scurte decât pedunculul floral. Frunzele bazale de obicei se desvoltă după înflorire 3
- 2 b Nucule alb lănoase. Frunze involucrale de obicei evident (uneori de mai multe ori) mai scurte decât pedunculul floral. Infloresc după desvoltarea frunzelor bazale 4
- 3 a Periant galben auriu, de obicei din 5 foliole lungi până la 1,5 cm. Frunze involucrale foarte scurt (— 5 mm) pețiolate 1. **A. ranunculoides**
- 3 b Periant alb sau la exterior slab roz-liliachiu, de obicei din 6 (rar 5 — 8) foliole lungi de cca 2 cm. Frunze involucrale mai lung (1 — 3 cm) pețiolate 2. **A. nemorosa**

*) Dela «anemos» = vânt, dela care devină «anemone», nume de plantă la Theophrastos (372—287 i.e.n.), cu referire la fructele dela *Pulsatilla* (cu stile lungi, păroase, răspândite cu ajutorul vântului), reunită deseori cu genul *Anemone*.

- 4 a Frunze bazale digitat 3—5-sectate, cu segmente alungit obovate sau rombice, inegal adânc lobate și dințate. Floarea cu diametru de 3 — 5 (7) cm, cu 5 (6) foliole periantiale albe sau la exterior albe violacee. Plante înalte de 20 — 50 cm 4. **A. silvestris**
- 4 b Frunze bazale trisectate, cu segmente pețiolulate și fiecare segment din nou dublu trisectat, cu lacinii scurt ovate lanceolate, la vârf dințate. Floarea de 2,5 — 4 cm în diametru, cu (6) 7 — 9 foliole albe. Plantă mai scundă din regiunile subalpine. 3. **A. baldensis**

1. **A. ranunculoides** L. Sp. pl. ed. I (1753) 541; Juz. in Fl. U.R.S.S. VII (1937) 242, tab. XV, fig. 1a-c. — Păștiță, Floarea Paștilor. — Bogláros szellőrózsa. — Gelbes Windröschen. — Ветренница лютичная. — Exs.: FRE nr. 1702 b., pro parte f. *biflora* Peterm. — Ic.: Pl. 83, fig. 1, 1a.

4. Plantă ierbacee, înaltă de 7 — 30 cm, cu rizom orizontal, brun. Tulpină erectă, ± glabră sau răzleț păroasă. Frunzele bazale lipsesc sau după înflorire se află numai 1, cu pețiol lung și lamină trisectată. Segmentele ± scurt pețiolulate, din nou bi- trisectate. Involucru trifoliat, cu frunze așezate în verticil, cu pețiooli scurți (— 5 mm). Frunzele involucrului palmat trisectate, cu segmente alungit lanceolate, la mijloc sau sub mijloc mai late, la bază atenuate în formă de pană, în întregime sau numai spre vârf foarte variat lobate, adânc dințate sau crenate, de obicei ± glabre. Flori solitare sau câte 2, rareori mai multe (3 — 5), lung pedunculate. Pedunculi florali de lungimea frunzelor involucrale sau cu puțin mai lungi decât acestea, pubescenti. Floarea de 1,5 — 3 cm diametru, de obicei cu 5 foliole periantiale, lat ovate, galbene aurii, la exterior fin pubescente. Stamine multe, mai scurte decât periantul. Fructe nucule lungi de 4 — 6 mm, scurt păroase și alungit rostrate, nutante. III — V.

Stațiu ne a. Prin păduri, livezi, tufișuri, poieni, din regiunea de câmpie până în cea montană.

Răsp. în țară: Comună din regiunea de câmpie până în cea montană.

Variabilitatea speciei

Variază foarte mult mai ales în ceea ce privește dezvoltarea florilor. Adesea găsim exemplare cu periant verde, sau cu staminele transformate în foliole periantiale. Uneori pedunculul floral este foarte scurt, astfel că floarea apare sesilă sau aproape sesilă.

f. *biflora* Peterm. Fl. Lips. (1838) 407. — Plantă cu 2 (rar 3—5) flori. Adesea florile cu pețiooli inegali. — Frecventă.

f. *latifolia* Ulbr. in Engl. Bot. Jahrb. XXXVII (1905) 215. — Frunze involucrale 3—5, adânc fidate, cu segmente ovate care se ating sau se acoperă cu marginile, pe margini cu dinți obtuziusculi.

f. *latisecta* (Schur). — *A. ranunc. b. latisecta* Schur Enum. pl. Transs. (1866) 4. — Segmente involucrale cu margini întregi sau numai spre vârf dințate.

f. *subumbellata* (Schur). — *A. ranunc. a. subumbellata* Schur l.c. — Flori 6—12, adunate în umbelă, slab gălbui.

f. pleniflora J. Schmidt ex Junge in Festschr. Bot. Ver. Hamburg (1916) 23. — Flori învalte. — Rară.

Intrebuintări. Plantă otrăvitoare, narcotică. Uneori se cultivă și în grădini, ca plantă ornamentală timpurie.

Răsp. gen.: Europa, Asia.

2. *A. nemorosa* L. Sp. pl. ed. I (1753) 541; Juz. in Fl. U.R.S.S. VII (1937) 247, tab. XV, fig. 2, a, b. — *A. nemorosa* c. *hirsuta* Schur Enum. pl. Transs. (1866) 3. — Floarea Paștilor. — Berki szellőrózsa. — Büsch-Windröschchen. — Ветреница белая. — **Exs.:** FRE nr. 1701 a, b. — **lc.:** Pl. 83, fig. 2, 2a, b.

4. Rizom orizontal. Tulpină erectă, de 6 — 30 cm înălțime, glabră sau glabrescentă. Frunze radicale de obicei solitare, se desvoltă după înflorire, cu pețiole lungi și lamină trisectată, cu segmente scurt pețiolulate. Involucru trifoliat și frunze alungit ovate sau lanceolate, cu pețiol lung de 1 — 3 cm, trifoliate, cu foliole adânc bi- trisectate, cu segmente adânc serate. Flori de obicei solitare, \pm nutante, de 2,5 — 4 cm diametru, cu periant alb sau la exterior slab roz-liliachiu, cu (5) 6 (8) foliole alungit ovate, pe ambele fețe glabre, de cca 2 cm lungime. Peduncul floral \pm egal de lung sau mai lung decât involucrul. Stamine numeroase, mult mai scurte decât periantul, cu antere galbene. Fructe nucule multe, ovate, lungi de 4 — 4,5 mm, pubescente, cu rostru alungit, puțin curbat. III — V.

Stațiunea. Păduri, livezi, tufișuri, tăieturi de pădure, grădini, parcuri umbroase, din regiunea de câmpie până în cea montană.

Răsp. în țară: Comună în toată țara.

Variabilitatea speciei

f. micrantha Peterm. Fl. Lips. (1838) 407. — Plantă înaltă de cca 10 cm. Flori de 17 — 22 mm în diametru.

f. bosniaca Beck in Ann. Hofmus. Wien II (1887) 67. — Segmentele foliolelor înguste, la bază lung cuneate, profund partite, toate pețiolulate. — Sporadică.

f. purpurea (DC.) Graebn. fil. in A. et G. Syn. V. 3 (1935) 21. — *A. nemorosa* β . *Purpurea* DC. in Lam. et DC. Fl. fr. IV. 2, ed. III (1805) 884. — *A. nemorosa* α . *rubra* Pritzel in Linn. XV (1841) 652. — *A. nemorosa* b. *variegata* Schur l.c. (1866) 3. — Foliolele periantului pe dos mai mult, la interior mai puțin roze, uneori purpuriu variegat.

f. tenuifolia (Rouy et Fouc.) Borza Consp. Fl. Rom. I (1947) 100. — *A. nemorosa* L. δ *tenuifolia* Rouy et Fouc. Fl. Fr. I (1893) 44. — Plantă debilă. Frunze cu lobi foarte înguști, adânc laciniați. Flori mici

Intrebuintări. Conține o substanță astringentă, vezicantă și corosivă, anemonolul, care se descompune ușor și dă substanța otrăvitoare numită anemonina. A fost folosită în unele

jocuri în medicina populară contra paraliziei. Se cultivă ca plantă ornamentală timpurie de primăvară, mai ales în parcuri.

Răsp. gen.: Specie circumpolară cu caracter eurasiatic.

3. *A. baldensis* L. Mant. I (1767) 78. — *Pulsatilla baldensis* Delarb. Fl. Auv. ed. II (1800) 55. — **Ic.:** Pl. 83, fig. 4.

4. Rizomi verticali sau oblici, cu muguri apertivi care dau naștere la ramuri subterane. Tulpină erectă, de 5 — 20 cm, unifloră, părcasă. Frunze radicale lung pețiolate, cu pețiole la început pubescente, mai târziu glabrescente sau glabre. Lamină trisectată compusă, cu segmente pețiolulate; fiecare segment încă de 2 ori trisectat, cu lacinii scurte ovate lanceolate, la vârf dințate sau rotunjite. Frunze involucrale trifoliate, verticilate, asemănătoare cu cele radicale, cu pețiol care la bază formează o vagină \pm membranoasă. Floare lung pedunculată, cu peduncul de obicei mult mai lung decât frunzele involucrale, solitară, puțin campanulată, de 2,5 — 4 cm în diametru. Periant din (6) 8 — 10 foliole, lat ovate, cu vârf rotunjit sau obtuziuscul, pe dos alipit păroase, albe. Antere galbene. Peduncul floral erect, se alungește foarte mult după înflorire, purtând un apocarp globulos, lat de cca 1 cm, nutant, compus din nucule mici, albe, lănoase. VI — VIII.

Stațiunea. În locuri stâncoase și ierboase din regiunea subalpină și alpină.

Răsp. în țară: *Mții Rodnei*: Corongiș, Gemenea, Știol, Vf. Galați, Vf. Ineu, *Mții Călimani*.


Obs. Această specie cu toate că a fost colectată și publicată de mai mulți botaniști vechi, ca Baumgarten (Enum. II, p. 107), Fuss (Fl. p. 16), Schur (în VSVN X p. 19), Recker (în VSVN VI, p. 19), etc. din *Mții Rodnei* și deși există exemplarele colectate de ei în Herb. Cluj, totuși prezența ei n'a mai fost confirmată nici de Porcius (cf. En. p. 1 și Fl. Năs. p. 148), nici de alții care au cercetat acești munți.

Răsp. gen.: Europa centrală, Pirinei, Alpi, Balcanii vestici, America de N.

4. *A. silvestris* L. Sp. pl. ed. I (1753) 540; Juz. in Fl. U.R.S.S. VII (1937) 266, tab. XVI, fig. 7. — *A. ochotensis* Schur Enum. pl. Transs. (1866) 3, non Fisch. — Oită. — Erdei szellőrózsa. — Wald-Wirldöschchen. — Берпеница лесная. — **Exs.:** FRE nr. 1237. — **Ic.:** Pl. 83, fig. 3, 3 a, b.

4. Rizom viguros, vertical sau oblic, brun, cu rădăcini \pm fibroase și muguri adventivi. Tulpină erectă, de 15 — 30 (45) cm, simplă, numai foarte

Plansa 83. — 1. *Anemone ranunculoides* L., 1 a. apocarp puțin mărit. — 2. *A. nemorosa* L., 2 a. apocarp mărit, 2 b. o floare după polenizare. — 3. *A. silvestris* L., 3 a. apocarp mărit, 3 b. nuculă. — 4. *A. baldensis* L.



rar ramificată, abundent argintiu și lung patent păroasă. Frunze radicale mai multe, lung pețiolate, păroase ca și tulpina, cu lamină digitat 3—5-sectată, cu segmente alungit obovate sau rombice, inegal adânc lobate și dințate, adpres păroase. Involucru trifoliat, \pm păros. Frunze involucrale cu pețioali lungi de 1 — 2 cm și cu lamină adânc trisectată; segmentele adânc lobat dințate, cu dinții acuți sau obtuziusculi. Floarea de obicei solitară, cu peduncul lung și argintiu, alipit des păros, adeseori mai lung decât tulpina. Flori mari, cu diametru de 3 — 5 (— 7) cm. Periant de obicei cu 5 foliole eliptice sau lat obovate, albe sau la exterior roșcat nuanțate, pe dos pubescente. Fructe nucule multe, mici (— 3 mm lungime), turtite și dens alb lănoase, cu rostru scurt, grupate într'un apocarp globulos. V — VI.

Stațiunea. Prin rariști și la margini de păduri, tufișuri, livezi și fânețe de stepă, mai ales pe soluri calcaroase sau nisipoase.

Răsp. în țară: *Reg. Cluj:* Bistrița; Gherla pe Dl. Corobei, Borșa; Cluj (Păd. Hoia, Fânațele Clujului), Cojocna, Suat, Boj; Valea Florilor, Cheia Turzii, Băile Turda, Colții Trascăului; Aiud. *Reg. Au. M.:* Reghin; Odorhei. *Reg. Stalin:* Bazna, Mediaș; Dumbrăveni, Sighișoara, Cristur; Orașul Stalin, Mt. Piatra Mare (sub *A. ochotensis* Schur l.c.); Gușterița, Șura Mare, Slimnic, Noul, Roșia, Porcești (r. Sibiu); Sebeș. *Reg. Hunedoara:* Alba Iulia; Orăștie; Deva. *Reg. Oradea:* Carei: între Valea lui Mihai și Curtuișeni (r. Săcuieni). *Reg. Timișoara:* Carașova (r. Reșița). *Reg. Pitești:* Băcănești (r. Gura Boului); Pitești la Păd. Trivalea. *Reg. București:* Lehliu. *Reg. Ploști:* Băcănești-Speteni (r. Urziceni). *Reg. Constanța:* Basarabi (r. Constanța); Babadag, Ciucurova. *Reg. Galați:* Niculițel (r. Tulcea); *Reg. Bârlad:* Focșani, Dălhăuți; Panciu; Munteni (r. Tecuci). *Reg. Bacău:* Piatra Neamț, Dragomirești pe Dl. Podișu. *Reg. Iași:* Iași, Aroneanu, Ciurea, Breazu. *Reg. Suceava:* Botoșani.

Variabilitatea speciei

f. măjor (Janczewski). — *A. silvestris* var. *maior* Janczewski in Hegi Fl. Mitt.-Eur. III (1912) 526. — Flori mari, cu diametru de cca 6—7 cm, solitare. — Cluj la Fânațe; Iași la Niștelea, Păd. Miroslova, Păd. Ciurea.

f. biflora Grütter in DBM X (1892) 67. — Cu 2 flori albe sau pe dos roșietic nuanțate. — Cluj la Fânațe; Iași în Păd. Repedea.

f. macrantha (Schur). — *A. sylvestris* a. *macrantha* Schur Enum. pl. Transs. (1866) 3. — Flori foarte mari. Periant cu multe foliole (— 15). Lăciniile frunzelor mai late. Adeseori cu flori învoalte. — *Reg. Stalin:* Orașul Stalin; Gușterița, Slimnic (r. Sibiu).

f. acúlis Schur in Verh. NV Brünn XV 1866, 2 (1877) 25. — Numai cu frunze radicale. Peduncul floral scurt. Flori mai mici. — *Reg. Stalin:* Orașul Stalin; Gușterița (r. Sibiu).

m. Uechtritziana Seem. in Verh. BV Brand. XXIV 1882 Sitzb. (1883) 73. — Carpele și adesea și stamine \pm foliacee, verzi. Frunze, peduncul floral și foliolele periantului cu nuanță roșietică. — Sporadică.

Intrebuințări. Plantă otrăvitoare. Ici-colo se folosește ca plantă decorativă pentru locuri umbroase.

Răsp. gen.: Eurasia.

5. *A. narcissiflora* L. Sp. pl. ed. I (1753) 542. — *Homalocarpus narcissiflorus* Schur Enum. pl. Transs. (1866) 3. — Oite. — Nárciszvirágú szel-lőrózsa. — Narzissen-Wirtdöschen. — Ветреница длиниоволосая. — **Exs.**: FRE nr. 1938. — **Ic.**: Pl. 71, fig. 1, 1a.

4. Rizomi scurți, cu rădăcini dese, la partea superioară brun fibroși din cauza rămășițelor pețiolilor uscați. Tulpină erectă, de 10 — 70 cm, lung și ± patent păroasă. Frunze bazale de obicei multe, cu pețoli lungi și divaricat lănos păroși. Lamina orbiculară, digitat (palmat) 3—5-compusă, cu segmente de 1 — 2 ori adânc trifidate și lacinii îngust lanceolate sau lanceolate, la vârf obtuziuscule; marginea și dosul frunzelor lănos lung păroase. Involucru trifoliat, cu frunze sesile sau la bază ± concrescute, de 1 — 2 ori adânc trifidate, cu lacinii îngust lanceolate, păroase ca și frunzele bazale. Flori adunate în umbelă, cu 3 — 8 (rareori 1 — 2) flori. Pedunculi florali lungi de 1 — 12 cm, patent păroși. Flori cu diametru de 2 — 4 cm, glabre, cu periant din 5 — 6 foliole eliptice sau obovate, albe sau pe dos cu nuanță roșietică. Fructe nucule mari de 5 — 6 mm, puține la număr, obovate, glabre, turtite, cu rostru scurt. V — VII.

Stațiunea. Pășunile și stâncile ierboase din regiunea subalpină și alpină; coboară în regiunile montane superioare.

Răsp. în țară: *Mții Rodnei*: Corongiș, Gemenea, Inău, Crăciunel, Vf. Puzdrelor, Vf. Rebri, Piatra Albă, Piatra Rea, Mt. Cailor. *Mții Călimani*. *Mții Rarăului*: Rarău la Pietrele Doamnei. *Mții Bistriții*: Ceahlău. *Mții Harghita* (?). *Mții Oituzului*: Nămira, Țiganca. *Mții Buzăului*: Penteleu. *Mții Ciucașului*: Ciucaș, Tesla, Piroșca. *Mții Bârsei*: Piatra Măre, Postăvarul, Piatra Craiului. *Mții Bucegi*: Piatra Arsă, Jepi, Caraiman, Coștila, V. Cerbului, Bătrâna, Gaura. *Mții Făgărașului*: Capra Budei, Prislopul, Colții Brezii, Arpașul, V. Bălei, Negoiu, Ciortea, Budislavul, Surul. *Mții Parângului*: Mirul Mare. *Mții Retezatului*: Borăscu. *Mții Mehedinților*: Gaura Mohorului. *Mții Țarcu-Godeanu*: Groapa Țarcului. *Mții Bihorului*: Stâna de Vale, Vf. Bohodei.

Variabilitatea speciei

f. dubia (Bellardi) Graebn. fil. in A. et G. Syn. V. 3 (1935) 16. — *A. dubia* Bellardi App. Fl. pedem. in Act. Taur. V (1792) 232, tab. VII. — *A. narcissiflora* β. *monantha* DC. Syst. I (1818) 213. — *Homalocarpus narcissiflorus* a. *uniflorus* Schur Enum. pl. Transs. (1866) 3. — *A. narcissiflora* var. *oligantha* Huter in Herb. n. nud. ex A. Kern. Sched. ad FEAH III (1884) 83. — *A. narcissiflora* β. *uniflora* Grec. Consp. Fl. Rom. (1898) 27. — Plantă de obicei numai de 10 (15) cm înălțime, cu flori mici (de 2—2,5 cm diametru) și puține (1—2). — **Reg. Cluj**: Cluj (citată de Schur l.c. dar nu s'a mai regăsit). **Reg. Stalin**: Orașul Stalin; *Mții Făgărașului*: Arpașul, deasupra Lacului Bălea spre Vânătoarea lui Buteanu, Negoiu. **Reg. Ploști**: *Mții Bucegi*: Jepi (V. Urlătorilor), Caraiman, Coștila, V. Obârșiei Ialomiței, Doamnele.

f. fasciculată (L.). — *A. fasciculata* L. Sp. pl. ed. I (1753) 542, non Vahl. — *Homalocarpus narcissiflorus* b. *umbellatus* Schur l.c. (1866) 3. — Pedunculii florilor foarte scurți;

inflorescența apare astfel capituliformă. Toată planta foarte păroasă. Segmentele frunzelor obtuze. — *Mții Rădnei*: Corongișul Mare. *Mții Oituzului*: Șandru, Nămira, Țiganca. *Mții Făgărașului*: Arpașul.

Răsp. gen.: Europa de E și S, Asia, America de N.

✱ **A. japōnica** Sieb. et Zucc. Fl. jap. (1835) 15.

4. Plantă înaltă de 50 — 100 cm, păroasă, cu tulpină multifloră. Flori mari, cu pedunculi lungi, în dichazii umbeliforme, la bază tripartite, albe sau roze, cu periant din numeroase foliole păroase la exterior. — Inflorește toamna.

Cultivată prin parcuri și grădini.

Răsp. gen.: Japonia și China.

✱ **A. coronária** L. Sp. pl. ed. I (1753) 539.

4. Plantă înaltă de cca 30 cm, cu rizomi tuberizați. Frunze îngust și profund palmat sectate. Flori mari (3 — 6 cm diametru) cu periant din 6 — 8 foliole sau cu flori învoalte. — Inflorește primăvara, în culori foarte variate.

Cultivată prin parcuri și grădini.

Răsp. gen.: Regiunea Mediteranei și Asia Mică.

Genul 117. **HEPÁTICA** *) Mill.

[L. Gen. pl. ed. I(1737)162, nr. 457], Mill. Gard. Dict. ed. VIII(1768), Mnch. Meth.(1784)216. — **Popâlnic**.

Plante ierboase, perene, cu rizomi de obicei scurți, bruni negricioși, cu multe rădăcini adventive. Frunze bazale lung petiolate, cu lamină de obicei 3-(5-) lobată, cu lobi întregi sau crenat lobați pe margini. Tulpină neramificată, scapiformă, unifloră, erectă, cu involueru verticilat, trifoliat, foarte apropiat de floare, având aspectul unui caliciu 3-sepal. Flori terminale, regulate, cu înveliș floral simplu, format de obicei din 7 foliole petaloide, de regulă albastre. Stamine multe, așezate în spirală. Cărpele multe, păroase, cu stil scurt, drept. Fructe nucule mici, numeroase. Plante de primăvară.

Determinarea speciilor

- 1 a Frunze trilobate, cu lobi întregi, rar (la unele forme) 1 — 2 dințați. Frunze involucrale de obicei întregi 1. **H. nobilis**
- 1 b Frunze trilobate, cu lobi din nou de 3—5 ori scurt lobați. Frunze involucrale la vârf uneori cu 2—3 dinți 2. **H. transsilvanica**

*) După grecescul « Hēpar » = ficat, deoarece în trecut planta era folosită contra bolilor de ficat.

1. *H. nobiles* Mill. Gard. Dict. ed. VIII (1768); Juz. in Fl. U.R.S.S. VII (1937) 283, tab. XVII, fig. 6. — *Anemone Hepatica* L. Sp. pl. ed. I (1753) 538. — *H. triloba* Gilib. Fl. lithuan. II (1782) 273. — *A. triloba* Stokes Bot. Mat. med. III (1812) 243. — *H. Hepatica* Karst. Fl. Deutschl. (1883) 559. — Popilnic iepuresc. — Erdei májvirág. — Wald-Leberblümchen. — Печеночница обыкновенная. — Exs.: FRE nr. 1703 a, b, sub *A. hepat.* — Ic.: Pl. 71, fig. 3.

4. Tulpină înaltă de 5 — 25 cm. Rizom vertical, oblic sau orizontal, brun întunecat, cu rădăcini abundente. Frunze radicale numeroase, lung pețiolate, pieloase, de obicei hibernante, se dezvoltă primăvara de regulă în timpul înfloririi sau după înflorire, în stare tânără des alb ± patent păroase, la maturitate ± glabrescente. La baza tulpinii și a frunzelor, se găsesc scvame late, membranoase, brune. Lamina frunzelor 3-lobată, cu lobi lat ovați, obtuși sau puțin acumiți, cu margini de obicei întregi, numai rareori cu 1 — 2 dinți, pe partea superioară verzi, pe partea inferioară mai palid verzi sau cu dungi violet. Tulpină scapiformă, neramificată, cu 1 floare, lungă cca de lungimea frunzelor sau adeseori și mai lungă, cu peri subțiri, alșiți sau patenți, roșietică sau brună, crește în subțioara frunzelor bazale din anul trecut. Involuclu trifoliat, verticilat, cu foliole lat ovate, cu margini întregi, foarte apropiate de floare, având aspectul unui caliciu trisepal. Flori solitare, terminale, de cca 2,5 cm diametru, cu foliole petaloide în număr de 6 — 7 (— 10), îngust eliptice sau eliptice, cu vârf rotunjit, nepăroase, albastre deschise sau albe-albăstrui, rar roze sau albe, caduce. Stamina numeroase, cu filamente albe și conectiv roșietic. Polenul cu câte 3 pori (microscop !). Stigmate capitate. Nucule numeroase, alungite, pubescente, cu cioc scurt, așezate pe un receptacul convex, îngroșat. IV — V.

Stațiunea. Prin păduri de foioase, tăieturi de pădure, tufișuri, locuri umbroase, în regiunea de câmpie și muntoasă.

Răsp. în țară: Reg. Baia Mare: Vișeu de Sus, Borșa. Reg. Cluj: Rodna, Rodna Veche pe Dl. Tăulin, Valea Vinului; Bistrița; Canciu, Olpret, Ocna Dejului (r. Dej); Sânti-oana, Inău, Iclod, Bonțida, Sicu, Sântejude, Sucutard, Țaga, Mureșenii de Câmp, Dăbâca, Nicula, Mintiul Gherlii, Țop (r. Gherla); Felindia (r. Zalău), Mții Meseșului la Osoiul Ursului și pe V. Ragului; Stâna (r. Huedin); Cluj, Feiurdeni, Gheorgheni, Căian, Sucea, Corpadea, Cojocna (r. Cluj); Cămărașul în Păd. Cioarele, Silvașul de Câmpie (r. Sărmășel); Copăceni, Turda, Cheia Turzii, Lunca, Rimetea pe Colții Trascăului, Poșaga pe Mt. Scărița (r. Turda); Zăul de Câmpie (r. Luduș); Aiud; Bucium pe Detunata flocoasă, Vidra, Abrud pe Mt. Vulcan (r. Câmpeni). Reg. Aut. M.: Târgul Mureș, Glodeni; Sovata; Brâncovenști, Idicel, Deleni, Gurghiu, Beica de Jos (r. Reghin); Sălard, Răstolița, Borsec (r. Toplița); Târgul Săcuiesc. Reg. Stalin: Blaj; Mănărade, Valea Lungă, Cenade, Mediaș, Bazna, Șeica Mare (r. Mediaș); Sighișoara; Hoghiz (r. Rupea); Orașul Stalin; Cislădie, Cislădioara pe Mt. «Götzenberg», Sibiu, Bradu, Cristian; Hosman, Nochrich, Alțina (r. Agnita). Reg. Hunedoara: Alba Iulia

pe Dl. Mamut, Mții Trascăului (Vf. Stănei, Vf. Nierii, Piatra Ceții); Săcărâmb (r. Orăștie); Baia de Criș (r. Brad); Deva, Zam; Hunedoara; Mții Retezatului (V. Râul Mare, V. Râșorului). *Reg. Oradea*: Mții Bihorului (Cetățile Ponorului, platoul Bătrâna, Piatra Bochi), Pietroasa pe V. Seacă, Vașcău, Băița (r. Beiuș). *Reg. Arad*: Cladova, Șoimuș, Bărzava (r. Lipova); Dezna, Moneasa, Hălmagiu, Mții Codrului (r. Gurahonț). *Reg. Timișoara*: Băile Herculane pe Mt. Domogled. *Reg. Craiova*: Tg. Jiu. *Reg. Pitești*: Govora pe V. Hîncei, Râmnicul Vâlcea, Olănești, Mții Căpățanei (Mt. Foarfeca), Mt. Cozia; Pitești; Curtea de Argeș. *Reg. Ploiești*: Râmnicul Sărat pe Dl. Suțu. *Reg. Bacău*: Caracul în Păd. Veverița (r. Tg. Ocna); Bacău; Buhuși; Piatra Neamț pe Dl. Pietricica și Dl. Măgura; Mt. Ceahlău; Târgul Neamț, Agapia. *Reg. Iași*: Iași, Bârnova spre Dobrovăț; Țibana (r. Negrești). *Reg. Suceava*: Botoșani în Păd. Rediu, Agafton; Dorohoi; comună în pădurile din raioanele Fălticeni, Suceava, Gura Humorului, Rădăuți.

Variabilitatea speciei

- 1 a Flori învoalte, cu foliole periantiale petaloide foarte multe, de obicei albastre
f. **plena** (Mill.) Borza Cons. Fl. Rom. I (1947) 100. — *Hepatica plena* Mill. Gard. Dict. ed. VIII (1768). — Cultivată ca plantă ornamentală în grădini și cimitire.
- 1 b Flori cu puține (6—10) foliole periantiale..... 2
- 2 a Toate frunzele trilobate, fără dinți sau lobi laterali..... 3
- 2 b Unele frunze trilobate, cu lobi 1—2 dințați sau cu câțiva lobi laterali, din care cauză frunzele apar 4—5 (6) lobate
f. **multiloba** (G. Hartm.) Borza l.c. — *Anemone hepatica* var. *multiloba* G. Hartm. Handb. Skand. Fl. ed. VII (1858). — *Anemone rhaetica* Brügger Fl. Cur. (1874) 86. — *A hepatica* var. *asarifolia* Blytt Norges Fl. (1876) 925. — Rară, împreună cu tipul. — *Reg. Cluj*: Cluj (Păd. Făget, Hajongard), Corpadea; Cheia Turzii. *Reg. Aut. M.*: Borsec. *Reg. Stalin*: Cislădioara pe Mt. «Götzenberg» (r. Sibiu). *Reg. Suceava*: Slătioara Obcina Feredeului (r. Câmpulung).
- 3 a Fiecare lob cu câte 2 pete alburii, evidente.
f. **marmorata** (T. Moore). — *Anemone hepatica* var. *marmorata* T. Moore in Gard. Chron. (1873) 645. — *Hepatica triloba* f. *maculata* Val de Lièvre in ÖBZ XXIV (1874) 180. — Cultivată uneori ca plantă ornamentală.
- 3 b Lobii frunzelor fără pete alburii sau neînsemnat pătate..... 4
- 4 a Lobii frunzelor cu vârf rotunjit
f. **rotundata** (Schur). — *Hepatica triloba* a. *rotundata* Schur Enum. pl. Transs. (1866) 2. — *Reg. Stalin*: Orașul Stalin; Rășinari, Sibiu. *Reg. Oradea*: Aleșd.
- 4 b Lobii frunzelor cu vârf scurt acuminat, obtuz
f. **typica** (Beck). — *Hepatica triloba* α *typica* Beck Fl. NÖ I (1890) 407. — Frecventă.

După culoarea florii se deosebesc:

f. **alba** (Mill.) A. et G. Syn. V. 3, pag. 4. — *Hep. alba* Mill. Gard. Dict. ed. VIII (1868). — Floare albă. — Rară, împreună cu tipul. — Cluj (în Păd. Făget și Păd. Hoia).

f. **rosea** (Neumann) Borza Cons. Fl. Rom. I (1947) 100. — *Anem. hepatica* var. *rosea* Neumann in Bot. Not. (1885) 145. — Floare de culoare roză. — Cluj (în Păd. Mănăstur, V. Plecica, Păd. Făget, Păd. Hoia); Turda, Cheia Turzii.

Intrebuintări. Cultivată ca plantă ornamentală prevernală, în diferite forme horticole, în grădini, cimitire, parcuri. Mai demult a fost folosită și ca drog («Herba Hepaticae nobilis»), având efect astringent. Conține anemonină.

Răsp. gen.: Europa, Orientul îndepărtat.

2. H. transsilvânica Fuss in Arch. Ver. siebenbürg. Landesk. Alte Folge III (1848) 262. n. nud. et in Verh. SVN I (1850) 83, descr. — *H. multiloba* Schur ib.d. (1850) 116. — *H. angulosa* Schott et Kotschy in Flora XXXIV (1851) 194. — *Anem. transsylvanica* Heuff. Enum. pl. Banat. in Verh. ZBG Wien VIII (1858) 41, Sep. pag. 6. — Crucea voinicului. — Erdélyi májvirág. — Transsilvanisches Leberblümchen. — **Exs.:** FEAH nr. 1731; FHE nr. 37 I. II sub *Anem. transs*; FRE nr. 1236, a, b, sub *Anem. transs*. — **lc.:** Pl. 71, fig. 2.

4. Plantă de 10—20 cm, cu rizom lung, oblic sau orizontal, la vârf cu grupe de frunze și flori. Infățișarea ca și la *Hepatica nobilis*, de care se deosebește în primul rând prin frunzele cu lobii încăodată 3-lobulați, cu lobuli obtuși, ± acuti sau rotunjiți. Flori mai mari, de 2,5—4 cm în diametru. Foliolenle involucrale uneori 2—3-dințate la vârf. Polenul cu 5 pori. IV—V.

Stațiunea. În păduri, tufișuri umbroase, în regiunea montană.

Răsp. în țară: *Reg. Aut. M.:* Beica de Jos (r. Reghin); Sălard, Răstolița, Lunca Bradului, Toplița, Borsec (r. Toplița); Lăzarea, Izvorul Mureșului, Bălan (r. Gheorghieni), Mții Giurgeului: Hăghimașul Mare, Hăghimașul Negru, Mt. «Öcsém», Piatra Singuratică; Șumoleni, Racul, Tușnad la Lacul Sf. Ana (r. Miercurea Ciuc); Odorhei, Merești, Zetea, Băile Homorod, Mții Hurghita; Sf. Gheorghe, Biborțeni. *Reg. Stalin:* Bogata Olteană, Racoșul de Jos pe Dl. «Töpehegy», Mții Perșani (r. Rupea); Vâlcele, Zizin (V. Zizinului), Săcele (V. Târlungului, V. Gârcinului), Mt. Piatra Mare, Orașul Stalin (Tâmpa, Poiana Stalin), Mții Bucegi, Mt. Piatra Craiului; Mții Făgărașului. *Reg. Hunedoara:* Deva (Dl. Cozia, Dl. Decebal, Dl. Roci); Hunedoara pe Dl. Căpruța, Lunca Cernii, Runcu; Mții Retezatului (V. Râșorului, Piatra Măceștilor). *Reg. Pitești:* Mții Făgărașului (Surul, Prislopul, Paltina); Pitești în Păd. Trivalea, Bascov, Conțești; Câmpulung, Dâmbovicioara. *Reg. Ploiești:* Ploiești în Păd. Ghighiu; Câmpina, Poiana; Comarnic, Bușteni pe V. Urlătorilor; V. Nișcovului și dealurile din împrejurimi (r. Buzău); Mt. Penteleu. *Reg. Bacău:* între Tazlău și Borzești, Câmpeni, Comănești, Palanca (r. Moinești); Verșești (r. Piatra Neamț); Mt. Ceahlău (la Sea, Schitul Durău), Cheile Bicazului, Mt. Ghilcoș, Tulgheș la Pietrele Roșii (r. Ceahlău); Tg. Neamț.

Variabilitatea speciei

f. typica (Kárp.). — *Anemone transs. f. typica* Kárp. in BK XXXVII (1940) 23. — Lobul mijlociu cu 5 lobi, cei laterali superiori cu 3 lobuli, cei inferiori cu 2—3 lobuli; lobulii mai lați decât lungi, obtuși, ± mucronați. — Cea mai răspândită formă.

f. obtusata (Kárp.). — *Anemone transs. f. obtusata* Kárp. lc. (1940) 24. — Lobii frunzelor rotunjiți. — **lc.:** Kárp. in BK (1940) 21, fig. M; Pl. 71, fig. 2. — *Reg. Stalin:* Orașul Stalin pe Tâmpa. *Reg. Aut. M.:* Mt. Hăghimașul Mare. *Reg. Ploiești:* Bușteni pe V. Urlătoarei.

f. *acerifolia* (Kárp.). — *Anemone transs. f. acerifolia* Kárp. l.c. (1940) 24. — Lobii frunzelor acuti, puțin mai lungi decât lați. — **Ic.**: Kárp. in BK (1940) 21, fig. N. — *Reg. Stalin*: Biborțeni, Sf. Gheorghe.

f. *pseudomedia* (Kárp.). — *Anemone transs. f. pseudomedia* Kárp. l.c. (1940) 24. — Asemănătoare cu *H. media*, însă lobul mijlociu trilobat, cei laterali 2—3 lobați. — **Ic.**: Kárp. in BK (1940) 21, fig. L. — *Reg. Aut. M.*: Gheorghieni; Mții Giurgeului; Hăghimașul Mare, Hăghimașul Negru, Tușnad; Peștera dela Merești, Băile Homorod pe Dl. Negru (r. Odorhei). *Reg. Stalin*: Racoșul de Jos pe « Urmöstöpe » (r. Rupea); Orașul Stalin pe Tâmpa.

f. *rhodantha* (Kárp.). — *Anem. transs. lus. rodantha* Kárp. l.c. (1940) 24. — Flori roze. — Orașul Stalin pe Tâmpa.

f. *leucantha* (Kárp.). — *Anem. transs. lus. leucantha* Kárp. l.c. (1940) 24. — Flori albe. — *Reg. Stalin*: Orașul Stalin pe Tâmpa; Sf. Gheorghe.

Răsp. gen.: Endemism în R.P.R.

× **H. media** Simk. Enum. Fl. Transs. (1886) 38 = *transsilvanica* × *nobilis*. — *H. media* (*transsilvanica* × *triloba*) Simk. l.c. — **Ic.**: Kárp. l.c. (1940) 21, fig. H-J.

Lobul mijlociu al frunzelor cu 3 lobi acuti, cei laterali neuniform acut bilobați. Se deosebește de *H. transsilvanica* prin lobii laterali mai înguști, cel puțin în parte nedivizați. Polenul steril, de 20—22 microni în diametru.

Reg. Hunedoara: Deva pe coama ce duce la Dl. « Szárhegy »; Mții Retezatului în V. Râul Mare.

Genul 118. **PULSATILLA** *) Adans.

Fam. pl. II (1763) 460. — *Anemone* L., p.p. — *Dediței*, *Sisinei*.

Plante ierbacei, perene, cu rizom puternic. Frunze bazale lung pețiolate, penat sau palmat compuse. Tulpină unifloră, cu bractei involucale sectate, concrescute la bază, îndepărtate de floare. Periant mare, petaloid. Stamine și carpele numeroase. Fructele nucule, cu câte o prelungire setacee, dens păroasă (stilul persistent), grupate într'un apocarp de diferite forme.

Determinarea speciilor

- 1 a Involucru triplu penat, asemănător cu frunzele bazale. Periant alb, cu 6 foliole 1. **P. alba**
- 1 b Involucru compus din lacinii liniare. Periant albastru (excepțional gălbui sau alb murdar), cu 5 foliole. Intreaga plantă des hirsută . . 2
- 2 a Foliolele periantului pe ambele fețe închis sau deschis violet . . . 3
- 2 b Foliolele periantului gălbui, verzui sau la exterior violet și la interior gălbui **P. pratensis** ssp. **hungarica**

*) Dela cuvântul latin pulsare = a bate, a se agita, deoarece stilele nuculelor se mișcă la cea mai mică adiere a vântului.

- 3 a Floare (mai ales în boboc) nutantă. Flori negre violetate sau închise purpurii. Sub aripa terminală a frunzei se află 3—4 perechi de aripi \pm pețiolate. Lacinii aripilor late de 1—2 mm 4
- 3 b Floare erectă, albastră-violetă sau violetă. Sub aripa terminală a frunzei se află numai 1—2 perechi de aripi sesile sau frunza este trisectată. Lacinii mai late de 2 mm 6
- 4 a Periant la început \pm cilindric, cel mult cu jumătate mai lung decât staminele, de 2—3 cm lungime, negru-violet, la exterior des alb păros, cu vârful foliolelor recurbat **P. nigricans**
- 4 b Periant campanulat, sau mai târziu \pm radiar întins, cel puțin cu jumătate mai lung decât staminele, violet, cu vârful foliolelor plan, întins . . . 5
- 5 a Floare puțin nutantă, cu periant violet închis 2. **P. montana**
- 5 b Floare accentuat nutantă, cu periant violet. . . **P. montana** ssp. **australis**
- 6 a Frunze bazale ternat divizate; lacinii late de 5—10 mm . . . 3. **P. patens**
- 6 b Frunze bazale aripate **P. grandis**


1. **P. alba** Rehb. Fl. germ. exc. III (1832) 739. — *Anemone alpina* L. Sp. pl. ed. I (1753) 539, excl. α . — Sisinei de munte. — Havasi kökörçsin. — Alpen Kühschelle. — Exs.: FRE nr. 1704. — Ic.: Pl. 84, fig. 1, 1a; Prod. Fl. II (1939) 125, fig. 2 sub *Anemone*.

4. Rizom viguros, brun negricios. Tulpină erectă, de 6—30 (40) cm înălțime, lung moale păroasă, mai târziu glabrescentă, cu 1—3 frunze bazale. Frunze lung pețiolate, cu limb ovat triunghiular, ternat 2—3-penatisectate, cu lacinii lanceolate, inciz dentate, la început slab lung păroase, apoi glabre. Frunze involucrale 3, cu vagine lățite și puțin concrescute, biternate, asemănătoare cu frunzele bazale. Peduncul lung, în timpul fructificației se prelungește mult, cu o singură floare, până la 6 cm în diam., albă, la exterior albastru nuanțată și \pm abundent păroasă. Periant cu 6 foliole petaloide lungi de 15—30 mm, îngust eliptice sau eliptice, spre ambele capete atenuate, subacute, fără nectarii. Nucule numeroase, de 4—5 mm lungime, cu câte o prelungire setacee, lungă de 4—5 cm, des păroasă. V—VIII.

Stațiunea. Pajiști, locuri stâncoase, în regiunea subalpină și alpină.

Răsp. în țară: *Mții Rodnei*: Pietrosul Mare, Vf. Puzdrelor, Fața Meselor, Știol, Piatra Rea, Obârșia Rebrii, Bucuiescu, Vf. Laptelui, Gemenea, Galați, Corongiș, Cișa. Înău Vf. Roșu. *Mții Călimani*: Retățel-Drăguș, Pietrosul Ruschii. *Mții Dornelor*: Lucaciu. *Mții Vrancei*: Mt. Cetățuia lui Ștefan cel Mare la Mrea Mera (r. Focșani). *Mții Baiului*: Cumpătul

Planșa 84. — 1. *Pulsatilla alba* Rehb., 1 a. apocarp. — 2. *P. grandis* Wender., 2 a. imbul frunzei. — 3. *P. montana* (Hoppe) Rehb., 3 a. frunză bazală, 3 b. nuculă cu prelungire păroasă, 3 c. idem, f. *Jankae* (F. Schultz) Simk. — 4. *P. patens* (L.) Mill., 4 a. limbul frunzei. — 5. *P. nigricans* Störck. — 6. *P. montana* ssp. *australis* (Heuff.) Nyár.



(la Sinaia). *Mții Bucegi*: Vf. cu Dor, Furnica, Piatra Arsă, Jepi, Caraiman, Coștila, Omul, Doamnele, Bătrâna, Strunga, Deleanu, Obârșia, Babele, Cocora, Lăptici, Blana, Nucet. *Mții Bârsei*: Piatra Mare, Postăvarul, Piatra Craiului. *Mții Iezer-Păpușa*: Păpușa, Găinașu Mare. *Mții Făgărașului*: Râiosul, Capra Budei, Coama Zârnei, Colții Brezii, Lacul Urlea Arpașul, Lacul Bălea, V. Doamnei, Negoiu, Bârcaciu, Budislavu, Suru. *Mții Sibiului*: Frumoasa, Beșineu, Stârp. *Mții Parângului*: Mândra, Parâng. *Mții Retezatului*: Radeș, Zănoaga, Căldarea Zănoagei, Tăul Negru, Peleaga, Custura Bucurei, V. Stânișoara. *Mții Țarcu-Godeanu*. *Mții Bihorului*: Vf. Bihorului, Bohodei, Cornul Muntelui.

Variabilitatea speciei

f. *czarnohorénsis* (Zap.). — *P. alpina* Delarbr. 3. f. *czarnohorensis* Zap. Consp. Fl. Galic. crit. II (1908) 329. — Plantă viguroasă, cu foliolele periantului până la 16 mm lățime (la forma normală cel mult 13 mm). — *Mții Rodnei*.

Răsp. gen.: Europa, cu excepția zonei boreale, Caucaz.

? *P. nigricans* Störck Libell. (1777) 7, c. tab.; Juz. in Fl. U.R.S.S. VII (1937) 302. — *Anemone nigricans* Strasser in A. Kern. Sched. ad FEAH VII (1897) 47. — *Anemone pratensis* Auct., non. L. — Ic.: Pl. 84, fig. 5.

4. Rizom vertical, negru, ramificat la cap și acoperit cu resturile petiolelor vechi. Tulpină unifloră, înaltă de 7—30 cm (la fructificație ajunge până la 45 cm), abundent lung păroasă. Frunze bazale la înflorire puțin dezvoltate, alungit ovate, tripenatisectate (-partite), cu lacinii liniare, late de 1—2 mm. Involucru penatisectat, cu numeroase lacinii lungi, paralele, egale, des vilos păroase. Flori lung pedunculate, evident nutante, campanulat cilindrice, vilos păroase, negru-violete. Periant cu foliole alungit eliptice, de 20—25 (30) mm lungime și 8—10 mm lățime, la vârf recurbate, cel mult cu jumătate mai lungi decât staminele. Nucule numeroase, cu câte o prelungire setiformă păroasă, lungă de 3,5 cm. III—V.

Stațiunea. Pe câmpuri nisipoase, dealuri ierboase, uscate sau pietroase.

Răsp. în țară: Existența acestei specii în țară este nesigură. Grecescu o citează din numeroase locuri, iar Baumgarten, Fuss, Simonkai din Transilvania. Simonkai mai târziu declară (MBL V (1906) 171) că a făcut o mare greșală când în Enum. Fl. Transs. a reunit *Anemone pratensis* a botaniștilor mai vechi cu *A. montana* a celor mai noi, sub numele de *Pulsatilla nigricans*. Răspândirea acesteia începe — după Simonkai — în Austria inferioară și se sfârșește în regiunea Tisei. Ceeace el a publicat în Enum. Fl. Transs. sub *P. nigricans* nu e altceva decât *P. montana* (Hoppe) Rehb. cu răspândirea: Oradea, Șiria, Măsca, Câmpia Ardealului și de aici până la Deva și Ciopea, și *P. montana* ssp. *australis* (Heuff.) A. Nyár. cu răspândirea: V. Trascăului, în jurul Or. Stalin până la Piatra Mare și Bucegi, regiunea Sibiului, apoi dela Orșova până la Baziaș.

Dacă afirmația lui Simonkai — neverificată până acum — este justă, înseamnă că *P. nigricans* nu se găsește în Moldova, Muntenia, Oltenia. Flora U.R.S.S. amintește

această specie (VII (1937) 302) numai dintr'un singur loc (Dnipru), cu observația că prezența plantei în granițele U.R.S.S. urmează să fie confirmată.

Soó, în BK XXIX (1932) 127, afirmă deasemenea că *P. nigricans* ajunge spre răsărit numai până la Tisa. Este deci inexactă afirmația că f. *transsilvanica* (Schur), f. *Jankae* (F. Schultz) Simk. și f. *alba* Tausch aparțin speciei *P. nigricans*.

Răsp. gen.: Europa centrală.

? *P. pratensis* (L.) Mill. Gard. Dict. ed. VIII (1768) nr. 2; — Juz. in Fl. U.R.S.S. VII (1937) 301, tab. XIX, fig. 4a, b. — *Anemone pratensis* L. Sp. pl. ed. I (1753) 539.

Se aseamănă foarte mult cu *P. nigricans*, de care se deosebește prin frunzele cu lacinii lat liniare, mai late de 2 mm, flori închise sau deschise violet, dar nu negru-violete, (numai aberațiile sunt cu alte culori) și stamine mai curte decât periantul. III—V.

Stațiunea. In locuri similare, ca la specia precedentă.

Răsp. în țară: Această specie a fost publicată dela noi de D. Brandza, Grecescu, Fuss, Schur, Heuffel și alții, însă planta în forma sa tipică crește în Europa nordică. Datele care au fost publicate la noi sub *P. pratensis* se referă la *P. montana*, respectiv la *P. montana* ssp. *australis*. La noi se găsește numai ca subspecia următoare.

ssp. *hungarica* Soó in BK XXIX (1932) 124. — *P. australis* ssp. *hungarica* Soó in Journ. of Ecol. (1929) 337. — *Anemone pratensis* var. *flavescens* Hazsl. in Magyarhon ed. năv. (1872) 163. — *P. nigricans* seu *pratensis* var. *Zichyi* Auct., non Schur. — Ic.: Jáv. Magy. Fl. Kép. (1925) tab. XIII, fig. 1296 b.

Diferă de tipul din Europa de N prin statura mai înaltă, flori mai mari, bicolore, la exterior violet, înăuntru gălbui, stamine numai cu puțin mai scurte decât perigonul și lacinile frunzelor mai lungi și mai late. — Prin poienile nisipoase din stejărete.

Reg. Baia Mare: Foeni la « Ligeterdö » și « Lókert » (r. Carei). Reg. Oradea: între Valea lui Mihai și Curtiușeni (r. Săcuieni).

Răsp. gen.: Tipul în Europa de N, iar subspecia în Europa centrală.

2. *P. montana* (Hoppe) Rchb. Fl. germ. exc. III (1832) 733; Juz. in Fl. U.R.S.S. VII (1937) 302, tab. XIX, 5a, b. — *Anemone montana* Hoppe in Sturm Deutschl. Fl. Heft. 46 (1826) tab. 4. — *Pulsatilla* seu *Anemone nigricans*, *pratensis*, *vulgaris*, *grandis* et *australis* Auct. mult., p. p. — Dediței. — Hegyi kökörcsin. — Berg-Kühschelle. — Простред горный. — Exs.: FRE nr. 1238, a-e sub *P. australe*; Jáv. Magy. Fl. Kép. tab. 164, fig. 1297. — Ic.: Pl. 84, fig. 3, 3a, b.

24. Rizom pivotant, negricios brun, lung până la 25 cm, la cap cu resturi de frunze vechi, cu scvame și cu frunze nedesvoltate, acoperite cu peri deși, alb sericei. Tulpină la înflorire înaltă de 5—15 (20) cm, iar în timpul fructificației până la 37 cm, peste tot moale și lung păroasă. Frunzele bazale la începutul înfloririi lipsesc, sau abia ieșite, cele bine desvoltate de 15—22 cm lungime, din care jumătate sau mai mult aparține petiolului. Limb ovat sau lat ovăt, 3-penatisectat, cu lacinii late de 1,5—4 mm, alungit sau liniar lanceolate, întregi sau cu 1—2 dinți, pubescente. Frunze involucrale trifoliolate, concrescute la bază, penatipartite, cu lacinii liniare, \pm egal de lungi. Flori solitare, \pm erecte sau subnutante, de culoare închis violetă. Periant cu foliole de 2—3,5 cm lungime și late până la 1 cm, îngust eliptice, la început campanulate, apoi stelat deschise, cu vârfurile plan întinse. Stamine cât jumătatea lungimii periantului sau puțin mai scurte. După înflorire pedunculul se prelungește foarte mult. Nucule cu prelungiri setiforme, alb sericeu păroase. III—V.

Stațiunea. Prin locuri ierboase, în regiunea dealurilor și a câmpiei.

Răsp. în țară: *Reg. Cluj:* Olpret (r. Dej); Poieni, Stâna (r. Huedin); Bontida, Iclod, Sic, Tașaga, Sucutard (r. Gherla); Cluj (Dl. Hoia, Fânațe), Gârbău, Boj; Valea Florilor, Aiton, Turda, Cheia Turzii, Rimetea pe Colții Trascăului, Poșaga; Aiud. *Reg. Aut. M.:* Tg. Mureș, Acățari, Săbed, Bozed; Reghin, Jăbenița; Odorhei, Geoagiu. *Reg. Stalin:* Tiur (r. Târnăveni); Valea Lungă, Cenade, Șeica Mare, Șeica Mică, Proștea Mare, Mediaș, Bazna, Biertan (r. Mediaș); Dumbrăveni, Sighișoara; Mții Făgărașului; Sibiu, Gușterița, Ocna Sibiului, Șura Mare, Daia, Roșia, Tâlmăciu, Porcești, Boița, Slimnic (r. Sibiu); Nochrich, Vurpăr (r. Agnita). *Reg. Hunedoara:* Mții Trascăului (Piatra Caprei), Bărbant pe Dl. Bilac, Totoiu, Hăpria, Ciugud, Oarda de Sus, Oarda de Jos, Vințul de Jos (r. Alba Iulia); Deva, Hărău, Șoimuș; Hunedoara, Batiz, Govășdia. *Reg. Oradea:* Oradea, Săldăbagiu, Betfia (Dl. Șimleului) și de aci până la Peștera (r. Aleșd). *Reg. Arad:* Păuliș, Ghioroc, Cuvin (r. Lipova); Șiria, Măsca (r. Arad); Măderat, Mocrea (r. Ineu). *Reg. Craiova:* Tr. Severin, Cerneți; Tg. Jiu; Craiova; Robănești (r. Balș). *Reg. Pitești:* Drăgășani. *Reg. București:* Șaelele (r. Tr. Măgurele); Ghimpați (r. Mihăilești); Comana (r. Vidra); Ulmeni (r. Oltenița); Mănăstirea (r. Călărași); Lehliu. *Reg. Ploști:* Ploști; Comarnic; Râmnicul Sărat pe Dl. Suțu. *Reg. Constanța:* Cernavoda, Medgidia, Poarta Albă; Basarabi, Constanța; Bălăgești pe Dl. Alah-Bair (r. Hârșova); Babadag. *Reg. Galați:* Nifon, Cataloi, Caraorman (r. Tulcea); Brăila spre Ianca. *Reg. Bârlad:* Podu Turcului (r. Răchitoasa); Crângu (r. Bârlad). *Reg. Iași:* Iași la Copou. *Reg. Suceava:* Botoșani (Păd. Gaflău), Agafon (Păd. Rediu), Mănăstirea Doamnei; Stâncă-Ștefănești, Sulița, Drășani (r. Trușești).

Variabilitatea speciei

f. Jankae (F. Schultz-Bip.) Simk. in MBL V (1906) 170. — *Anemone Jankae* F. Schultz in Flora XXXIX (1856) 205. — *Pulsatilla Jankae* Schur Enum. pl. Transs. (1866) 4. — **lc.**: Pl. 84, fig. 3 c. — Frunze mai puțin sectate, cel mult bipenate, cu lacinii mai late. — *Reg. Cluj:* Cluj la Fânațe; Sucutard (r. Gherla).

f. transsilvanica (Schur). — *P. transsilvanica* Schur l.c. (1866) 5. — Flori destul de mari, până la 5 cm diametru. — *Reg. Cluj:* Cluj. *Reg. Stalin:* Mediaș, Sibiu; Făgăraș.

f. **parviflora** (Schur). — *P. vulgaris* Mill. b. *parviflora* Schur l.c. (1866) 5. — Floare violetă închis, foarte mică. — Impreună cu formă tipică.

f. **alpigena** (Schur). — *P. vulgaris* Mill. d. *alpigena* Schur l.c. (1866) 5. — Tulpină floriferă, în timpul înfloririi egal de lungă cu frunzele, mai târziu de 2 ori mai lungă. Involucru apropiat de floare. Infloreste vara. — În pășuni alpine. — Reg. Cluj: Mții Rodnei. Reg. Stălin: Mții Făgărașului.

f. **fuscoflavens** Simk. in MBL V (1906) 182. — Flori de un violet întunecat. — Cluj la Fănațe.

f. **Borbasi** Soó in BK XXIX (1932) 127. — *P. vulgaris* Mill. a *pallidiflora* Schur l.c. p.p. — *P. nigricans* Störck var. *sulfurea* Borb. in TTK XXV (1893) 332, non Tausch. — Flori gălbui. — Cluj pe Dl. Hoia.

ssp. **australis** (Heuff). — *Anemone Pulsatilla* L. var. *australis* Heuff. Enum. Pl. Banat. in Verh. ZBG Wien VIII (1858) 44, Sep. pag. 6. — *P. vulgaris* et *grandis* Simk. Enum. Fl. Transs. (1886) 40. — *P. balcana* Vel. Fl. bulg. (1891) 637. — Ic.: Pl. 84, fig. 6; Jáv. Magy. Fl. Kep. tab. 164, fig. 1798.

Laciniile frunzelor mai înguste. Flori accentuat nutante, de culoare pur violetă.

Reg. Timișoara: Dealungul Dunării, dela Baziaș la Orșova (locul clasic).

Obs. Din cauza datelor de literatură incerte și a lipsei materialului de herbar, nu se poate stabili îndeajuns răspândirea acestei subspecii. După Simonkai, *P. australis* ar fi o plantă specific balcanică, din regiunea dealurilor, răspândirea ei începând din ținutul orașului Zagreb până în Banat și Transilvania, de unde, autorul o mai semnalează de pe stâncile calcaroase ale Văii Trascăului, de pe Mții Piatra Mare, Bucegi și dela Sibiu.

Intrebuințări. Se folosește ca plantă medicinală. În comerț se cunoaște sub numele de «Herba Pulsatillae». Drogul constă din întreaga plantă, cu excepția părților subterane. Plântele se adună în Aprilie — Mai. Ca drog se adună aproape toate speciile de *Pulsatilla* din regiunea de șes și din regiunile muntoase. Conține anemonol, o substanță iritantă, numită și Camfor de Pulsatilla. Mai conține anemonină și substanțe amare. Probabil că acțiunea medicală aparține anemonolului. Drogul are efect anafrodiziac (Schapter). Sucul proaspăt al plantei provoacă iritarea pielii.

Răsp. gen.: Croația, Transilvania.

3. **P. patens** (L.) Mill. Gard. Dict. ed. VIII (1768) nr. 4; Juz. in Fl. U.R.S.S. VII (1937) 295, tab. XVIII, fig. 6a, b. — *Anemone patens* L. Sp. pl. ed. I (1753) 538. — Exs.: FRE nr. 1239. — Ic.: Pl. 84, fig. 4, 4a; Hay. Pflzdecke. (1916) 229.

4. Rizom vertical, adeseori multicapitat. Tulpina înaltă de 5—30 cm, în tinerețe sericeu și lung păroasă. Frunzele bazale lipsesc la înflorire, adeseori cele din anul trecut persistă. Frunzele desvoltate, lung pețiolate, cu limb palmat tripartit; foliolele din nou tri- sau bisectate, cu lacinii late de 5—10 mm, întregi, sau la vârf cu un dinte mare, verde, ± glabrescent. Frunze involucrale adânc divizate, cu lacinii liniare, alb sericeu păroase. Flori soli-

tare, erecte, violet, \pm stelat întinse, late de 5—8 cm, cu foliolele periantului îngust eliptice, atenuate spre ambele extremități, la vârf acute, de 20—40 mm lungime și 10—18 mm lățime, pe dos răzleț păroase. Stamine cât jumătatea periantului sau mai scurte. Pedunculul se prelungește după înflorire. Nucule ca la *P. montana*. III—IV.

Stațiunea. Fânețe, coaste ierboase, însorite.

Răsp. în țară: *Reg. Cluj*: Bontida, Iclod, Sic, Țaga (r. Gherla); împrejurimile Clujului (Feleac, Făget, Păd. Mănăstur, Fânațe, Coama Techintău și Mărgău), între Mihăiești și Berindu, Căian; între Turda și Luduș, Cheia Turzii, Dl. « Kövesbér »; *Reg. Aut. M.*: Bozed, Săbed (r. Tg. Mureș). *Reg. Suceava*: Sf. Ilie, Zăhărești, Bosanci pe Dl. Frumoasa și Dl. Strâmbu (r. Suceava); Calafindești (r. Rădăuți).

Variabilitatea speciei

f. *pseudopátens* (Schur). — *P. pseudopatens* Schur Enum. pl. Transs. (1866) 4. — Flori mari de 7—10 cm în diametru. — Cluj la Fânațe.

f. *obtusiloba* (Schur) Borza Cons. Fl. Rom. I (1947) 100. — *P. patens* var. *obtusiloba* Schur in ÖBZ X (1860) 253. — Înflorște spre toamnă. Flori și frunze se găsesc împreună. Frunze mici, scurt pețiolate, puțin sectate, cu lacinii late, obtuziuscule. — *Reg. Cluj*: Cluj la Fânațe. *Reg. Aut. M.*: Reci pe coline nisipoase (r. Sf. Gheorghe).

f. *geminiflora* Gáy. in MBL V (1906) 178. — Tulpină cu 2 flori. — Cluj la Fânațe.

Obs. Și această specie poate să aibe florile de diferite culori: ochroleucă, neagră-violacee, roză sau purpurie.

Răsp. gen.: Europa centrală, Scandinavia, U.R.S.S.

? *P. grândis* Wender. in Schrift. Ges. Marburg II (1831) 257; Juz. in Fl. U.R.S.S. VII (1937) 293, tab. XVIII, fig. 5 a, b, c. — *Anemone Pulsatilla* Auct., non L. — *Pulsatilla vulgaris* Auct., non Mill. — Ic.: Pl. 84, fig. 2, 2a.

4. Rizom vertical, gros, multicapitat, la înflorire cu resturi ale frunzelor vechi și fără frunze proaspete, cu muguri de frunze, acoperiți cu sevă albă sericee. Tulpină de 10—35 cm, lung și alb păroasă (5 mm). Frunze, bazale aripate. Frunze involucrale adânc sectate, cu lacinii îngust liniare, foarte lung alb sericeu păroase (—10 mm). Flori solitare, erecte, foarte mari deschise până la 7 cm diametru, cu foliolele periantului eliptice, de 3—3,5 cm lungime, violet, la exterior sericeu păroase. Stamine cât $1/4$ — $1/3$ din lungimea periantului. Nucule cu prelungire lungă, setiformă, alb păroasă, grupate într'un apocarp de 8—9 cm în diametru. III—IV.

Stațiunea. Pe coaste ierboase, însorite.

Răsp. în țară: A fost citată de Brandza, Grecescu, Schur, Fuss, Simk. și alții, date care se referă mai ales la *P. montana*.

Răsp. gen.: Europa centrală, Bosnia, în U.R.S.S. în regiunea de mijloc a Niprului.

× *P. Gayeri* Simk. in MBL V (1906) 173 = *montana* × *patens*. —
× *P. Hackelii* Auct., non Pohl.

Frunze ± rotunde, în aparență digitat sectate, asemănătoare intrucâtva cu cele dela *A. patens*. Se deosebesc însă de acestea prin prezența unei perechi de aripi adânc sectate, ce se află sub partea terminală și trisectată a frunzei. Lacinii late de 4—5 mm. — Intre părinți.

Reg. Cluj: Cluj (la Fânațe și Dl. Hoia); Cheia Turzii (« Kövesbérc »). *Reg. Stalin*: Reci (r. Sf. Gheorghe).

Obs. *Pulsatilla vernalis* Mill. Gard. Dict. (1759) nr. 3 este indicată de Baumgarten din Mții Bucegi. Ulterior n'a mai fost găsită.

Genul 119. *ATRAGÉNE* *) L.

[Nova pl. gen. resp. Dassow in Amoen. acad. I (1747) 405, Fl. zeyl. in App. (1747) 11, 12], Gen. pl. ed. V (1754) 241, nr. 615. — *Curpen de munte*.

Descrierea genului este identică cu cea a speciei.

A. alpina L. Sp. pl. ed. I (1753) 542. — *Clematis alpina* Mill. Gard. Dict. ed. VIII (1768) nr. 9. — *Curpen de munte*. — Havasi bercse. — Alpenrebe. — Княжик. — *Exs.*: FRE nr. 2211 sub *Clematis alp.* — *Ic.*: Pl. 85, fig. 1, 1a.

4. Plantă scandentă sau volubilă, Tulpina lungă de 1—2 m, glabră, slab sulcată, brună, se lignifică. Frunze opuse, cu pețioali lungi, biternate, cu foliole ovate lanceolate, ± acuminate, inciz serate. Pețiolii de pe ramurile sterile se transformă în cărcei. Flori actinomorfe, de obicei solitare, cu pedunculii lungi, la subțioara frunzelor. Periant extern din 4 (rar 5) foliole petaloide, lanceolate, de cca 2—3 (5) cm lungime, la exterior slab păroase, cu margine îngustă, alb tomentoasă, albastre-violete sau albastre deschis, rareori albe sau roz. Periant intern redus, din 10—12 foliole mai scurte, numai pe 1/2 de lungi cât acelea ale periantului extern, foarte înguste, spatulate, albe gălbui, tomentoase, uneori poate lipsi sau poate fi parțial transformat în stamine. Stamine numeroase, galbene, ± mai lungi decât foliolele periantului intern. Partea bazală a filamentelor staminelor îngroșată în formă de inel, excretă un suc dulce (nectar). Receptacul glabru. Fructe nucule mici, ovoide, scurt pubescente, cu câte o prelungire lungă de 3—4 cm, patul păroasă. VI—VII.

*) Dela «athragene», numele unor curpeni (*Clematis*) la Theophrastos (372—287 i.e.n.).

Planșa 85. — 1. *Atragene alpina* L., 1 a. fructe (grup de nucule). — 2. *Clematis integrifolia* L. — 3. *C. Vitalba* L., 3 a. grupe de nucule, 3 b. o nuculă.



Stațiunea. În etajul montan superior și etajul subalpin, în special pe stâncile umbrite din apropierea pâraielor, în vâlcele umbroase, păduri.

Răsp. în țară: *Reg. Baia Mare*: Vișeu de Jos, Vișeu de Sus, Mții Rodnei: Pietrosul Mare, Piciorul Moșului, Gemenea, Piatra Rea, *Reg. Cluj*: Mții Țibleșului; Mții Rodnei (Corongiș, Crăciunel), Valea Vinului (r. Năsăud); Cluj în Păd. Făget (pe cale de dispariție), între Căpușul Mic (r. Cluj) și Bedeciu (r. Huedin), Păniceni (r. Huedin); Rimetea pe Colții Trascăului, Poșaga pe Mt. Scărița (r. Turda); Ponir (r. Aiud); Abrud pe Mt. Vulcan, Bucium pe Detunata, Isbita, Vidra, Scărișoara la Ghețar și pe V. Ordencușii (r. Câmpeni). *Reg. Aut. M.*: Lunca Bradului, Stânceni, Borsec, Bilbor pe Obcina (r. Toplița). Mții Călimani: Rătăcel, Drăguș, V. Borzontul Mare, V. Borzontul Mic; Ciumani pe Dl. « Délhegy » (r. Gheorghieni); Săndominic, Tomești, Mădăraș (Mții Harghita), Racul, Ciceu (r. Miercurea Ciuc), Mții Giurgeului (Highimașul Mare, Mt. « Öcsém », Piatra Singuratică); Merești, Căpâlnița (r. Odohei); Brăduț (r. Sf. Gheorghe). *Reg. Stalin*: Mții Ciucașului (Tesla), Mții Bârsei: Piatra Mare, Postăvarul, Piatra Craiului; Mții Făgărașului: Colții Brezei, V. Viștea Mare, Arpașul. *Reg. Hunedoara*: Galda de Sus, Intregalde (r. Alba-Iulia), Mții Trascăului (Piatra Ceții, Piatra Caprei); Mții Retezatului (Stănulete, Piciorul Colțului, Scocul Mare); Mții Parângului. *Reg. Oradea*: Ciucea (r. Aleșd); Mții Bihorului: Bătrâna, Stânca Onceasa, Piatra Bochii, Stirbina; Pietroasa pe V. Seacă (r. Beiuș). *Reg. Timișoara*: citată de Heuffel din « Banat » fără localitate. *Reg. Pitești*: Mții Lotrului (V. Voinești din V. Lotrului); Mții Făgărașului: V. Capra, Capra Budei, Negoiu. *Reg. Ploiești*: Mții Bucegi: V. Izvorul Dorului, Vf. cu Dor, Furnica, Piatra Arsă, Jepi, Caraiman, Coștila, V. Cerbului, V. Ialomiței, V. Horoabei; Mt. Penteleu (Colțul Zănoagei, Viforâta). *Reg. Bacău*: Mt. Ceahlău (la Șea, Panaghia, Fântâna Rece), Cheile Bicazului, Mt. Suhard, Lacul Roșu, Tulgheș la Pietrele Doamnei. *Reg. Suceava*: Mții Bistriței (Cheile Barnarului, V. Bărnărelului) Mt. Rarău; Brodina pe V. Sadăului (r. Rădăuți).

Variabilitatea speciei

f. montana (Schur).—*Athragene alpina* a. *montana* Schur Enum. pl. Transs. (1866) 2.—Segmentele frunzelor lat ovate, pe margini grosolan serate. Flori mari. — *Reg. Stalin*: Mt. Piatra Craiului.

f. lactea (Beck).—*Clematis alp.* f. *lactea* Beck Fl. NÖ I (1890) 411. — Flori albe. — *Mții Giurgeului*: Mt. Licaș.

f. aemulans A. Nyár. f. nova in Add. pag. 686. — Majoritatea foliolelor periantului intern late, albastre, rotunjite la vârf, asemănătoare foliolelor periantului extern, mai mici decât acestea. — Mții Bucegi la Peștera Ialomiței.

Intrebuintări. Se cultivă în unele locuri prin grădini ca plantă ornamentală.

Răsp. gen.: Europa.

Genul 120. CLEMATIS *) L.

Gen. pl. [ed. I (1737) 163, nr. 460 et Hort. cliff. in Obs. (1737) 226, nr. 6] ed. V (1754) 242, nr. 616. — **Curpen.**

*) Clematis, numele unei plante volubile la Dioscorides (sec. I, e.n.), cuvânt derivat dela grecescul « cleva » = stolon, curpen.

Plante perene, cu tulpini erecte sau volubile, ierboase sau lemnoase. Frunze opuse, simple sau compuse, sesile sau pețiolate. Pețiol nu rareori scar dent. Flori actinomorfe, solitare, grupate în inflorescențe cimoase. Periant caduc sau persistent, format din foliole albe, albastre sau liliachii, în număr de 4 (rar 5 sau și mai multe). Stamina multe, mai scurte decât periantul. Fructe nucule viloase sau mai rar glabre, terminate cu o coadă lungă și păroasă sau un rostru glabru, bine dezvoltat.

Genul cuprinde cca 165 specii răspândite aproape pe tot globul, cu excepția regiunilor arctice.

Determinarea speciilor

- 1 a Frunze simple, sesile, cu margini întregi, ovate sau ovate lanceolate, ascuțite sau acuminate. Flori mari, solitare (rar mai multe), de culoare albastră-violacee. Tulpină erectă 1. **C. integrifolia**
- 1 b Frunze teratate sau 1—2-penate 2
- 2 a Flori liliachii, mari, solitare, lung pedunculate. Fruct glabru, cu cioc bine dezvoltat, deasemenea glabru. Tulpină volubilă \pm lignificată . . 3
- 2 b Flori albe, mai mici, adunate în inflorescențe. Fruct cu o coadă bine dezvoltată, păroasă 4
- 3 a Periant cu foliole lungi de 2—3 cm, romboid ovate, obtuze . . . **C. Viticella**
- 3 b Periant cu foliole lungi de 5—7 cm, eliptic romboidale, acute
C. Jackmannii
- 4 a Foliolele periantului pe ambele fețe evident tomentoase. Antere mult mai scurte decât filamentele. Frunze imparipenate, cu foliole ovate sau cordiforme, acuminate, adesea inciz dințate. Plantă lemnoasă, agățătoare 2. **C. Vitalba**
- 4 b Foliolele periantului numai la exterior evident tomentoase. Antere \pm egal de lungi cu filamentele 5
- 5 a Plantă erectă, înaltă până la 1,5 m. Frunze imparipenate, cu foliole de obicei până la 7 3. **C. recta**
- 5 b Plantă agățătoare. Frunze bipenate, cu cel puțin 11 foliole, cu pețoli transformați în cârcei. Tulpină lemnoasă sau slab lignificată
C. Flammula

1. **C. integrifolia** L. Sp. pl. ed. I (1753) 544; H. Krasch. in Fl. U.R.S.S. VII (1937) 312, tab. XX, fig. 9, 10. — Clocoței. — Reti bercse. — Ganzblättrige Waldrebe. — Ломонос цельнолистный — Exs.: FEAH nr. 2562; FRE nr. 2212. — Ic.: Pl. 85, fig. 2.

4. Plantă ierbacee, de 15—70 cm înălțime, cu rizom viguros, cilindric, noduros. Tulpină erectă, simplă sau rareori ramificată, muchiată, de culoare brună închisă, spre bază \pm glabră, în partea superioară scurt pubescentă. Frunze simple, sesile, opuse, \pm pielose, lungi până la 9 cm și late până la

5 cm, ovate sau ovat lanceolate, cu margini întregi, la vârf ascuțite sau acuminate, cu 3—5 nervuri principale proeminente și arcuite, pe față glabre, pe dos scurt păroase sau tomentoase, mai ales pe margini și pe nervuri. Flori mari, campanulate, de obicei solitare (rar mai multe), cu peduncul lung. Periant cu 4 foliole lanceolate, albastre-violete, până la 5 cm lungime, glabre, numai pe margini alb tomentoase. Stamine multe, lănos păroase, mult mai scurte decât periantul, cu filamente lățite. Fructe nucule aproape rotunde, brune, de cca 5 mm în diametru, ușor pubescente, cu o prelungire lungă de 4—5 cm, patul păroasă. V—VI.

Stațiunea. În regiunea de stepă, în tufișuri, poieni și la margini de pădure.

Răsp. în țară: *Reg. Cluj:* Olpret (r. Dej); Bonțida, Sic (r. Gherla); Cluj la Fânațe, Apahida, Cojocna, Boj; V. Florilor, Turda, Cheia Turzii, Vișoara, Lunca; Ciugudu (r. Aiud); Hărdăreni (r. Luduș). *Reg. Aut. M.:* Săbed (r. Tg. Mureș); Odorhei, Bădeni; Șumuleni, Simionuștii (r. Miercurea Ciuc); Vârghiș la « Felsömál » (r. Sf. Gheorghe). *Reg. Stalin:* Tiur, Bachnea (r. Târnăveni); Mănărade, Șeica Mare (r. Mediaș); Rupea, Ormeniș; Merghindeal (r. Agnita); Sibiu. *Reg. Hunedoara:* Bărbant pe Dl. Bilac, Oarda de Sus, Oarda de Jos, Hăpria, Totoi, Bucerdea Vinoasă, Ghirbom (r. Alba Iulia); Cut, Daia Română, Berghin (r. Sebeș); Mții Retezatului (V. Baltei). *Reg. Oradea:* Oradea, Tărian, Borș. *Reg. Arad:* Arad (Păd. Ciala), Aradul Nou, Pecica, Cruceni; Zărand, Sf. Ana (r. Chișineu-Criș); între Buteni și Dezna (r. Gurahonț). *Reg. Craiova:* Craiova; Bistrețu în Păd. Braniștea Bistrețului (r. Băilești). *Reg. București:* Tg. Măgurele în lunca Oltului; Giurgiu, Slobozia spre Malu. *Reg. Constanța:* Babadag, Caugagia. *Reg. Galați:* Brăila.

Variabilitatea speciei

f. typica Beck Fl. NÖ I (1890) 411. — *C. integrifolia* f. *biflora* Soó in BK XXV (1928) 144. — Flori 1—3. Foliiolele periantului lungi de 3—5 cm. — *Reg. Cluj:* Cluj (V. Becaș și la Fânațe). *Reg. Iași:* Mărzești, V. lui David (r. Iași). *Reg. Suceava:* Stânca-Ștefănești (r. Trușești).

f. humilis Zap. Consp. Fl. Galic. crit. II (1908) 246. — *C. integrifolia* f. *pumila* Priszter in Acta Geobot. Hung. VI (1947) 91. — Planta matură înaltă numai de 15—25 cm. — Cluj la Fânațe împreună cu tipul.

f. Paczoskii (Zap.) Borza Consp. Fl. Rom. I (1947) 99. — *C. integrifolia* b. *Paczoskii* Zap. l.c. (1908) 247. — Foliiolele periantului la vârf brusc acuminate, ± trunchiate, mucronate. — Moldova (ex. Borza l.c.).

f. bekasiensis Soó in BK XXV (1928) 144. — Flori mici, cu foliiolele periantului de cel mult 1,5 cm lungime. — Cluj pe V. Becaș și la Fânațe.

f. dumosa (Neilr.). — *C. integr.* β *dumosa* Neilr. Fl. NÖ (1859) 668. — Tulpină ramificată, cu mai multe flori. — *Reg. Cluj:* Hărdăreni pe Dl. cu Brâu (r. Luduș). *Reg. Craiova:* Păd. Braniștea Bistrețului (Bistrețu, r. Băilești).

f. collina (Schur). — *C. integr.* a. *collina* Schur Enum. pl. Transs. (1866) 1. — Frunzele inferioare mai lung pețiolate, cele mijlocii mai scurt pețiolate, cele superioare sesile. Flori mai mici decât la f. *typica*. — Câmpia Transilvaniei.

Răsp. gen.: Eurasia.

2. **C. Vitálba** L. Sp. pl. ed. I (1753) 544; H. Krasch. in Fl. U.R.S.S. VII (1937) 320, tab. XX, fig. 4. — Viță albă, Curpen de pădure. — Iszalag bérce. Gemeine Waldrebe. — Ломонос виноградолистный. — Exs.: FRE nr. 2213 a-c. — Ic.: Pl. 85, fig. 3, 3a, b.

4. Plantă lemnoasă volubilă, cu rizom puternic. Tulpină înaltă de 6—10 m, până la 5 cm grosime, cu muchii longitudinale, \pm proeminente spre noduri, ramificată; ramurile tinere la noduri \pm pubescente. Scoarța externă se exfoliază în fibre lungi. Frunze opuse, lung pețiolate, impariperate, cu câte 3—9 foliole pețiolulate, ovate sau aproape cordate, adesea alungit acuminate, întregi, \pm neregulat crenat lobate, sau mai adânc sectate. Pețiol de obicei transformat în cârcel, de regulă persistent și lignificat, fixând planta pe suport. Flori numeroase, adunate în inflorescențe cimoase, terminale sau axilare. Flori slab odorante, lung pedunculate, cu periant din 4 (rar 5) foliole albe sau verzui-albe, îngust alungite, de 10—12 mm lungime, la vârf obtuze și pe ambele fețe des, alb și scurt păroase. Stamine multe, numai cu puțin mai scurte decât foliolele periantului, cele externe uneori transformate în foliole periantiale. Nectarile lipsesc. Receptacul păros. Carpele multe, \pm glabre, alungite, slab turtite, lungi până la 4 mm, suriu-brune, cu o prelungire păroasă lungă de cca 3 cm și un rostru \pm îndoit. VI—IX.

Stațiunea. Prin păduri, tufișuri, zăvoaie, vii, pe garduri, în regiunea dealurilor și a câmpiilor.

Răsp. în țară: Comună și răspândită în toată țara.

Variabilitatea speciei

f. integráta (DC.). — *C. Vitalba* β . *integrata* DC. Syst. I (1818) 139; Prodr. I (1824) 4. — *C. Vitalba* β . *banatica* Wierzb. in Rchb. Ic. Fl. germ. IV (1840) 19, tab. 64, fig. 4667 β . — *C. Vitalba* δ . *normalis* O. Ktze. in Verh. BV Brand. XXVI (1885) 101. — *C. vitalba* α . *typica* Beck Fl. NÖ I (1890) 411. — Frunze cu 2 perechi de foliole ovate sau cordate, cu margini întregi sau cel mult cu câte 2 dinți. — *Reg. Cluj:* Mții Rodnei; Cluj în pād. Hoia și Făget; Baia de Arieș (r. Câmpeni). *Reg. Aut. M.:* Odorhei. *Reg. Timișoara;* Mt. Domogled. *Reg. Iași:* Vlădiceni (r. Iași).

f. táurica (Bess.). — *C. taurica* Bess. in Nym. Consp. I (1878) 1. — *C. vitalba* η . *taurica* O. Ktze. in Verh. BV Brand. XXVI (1885) 100. — *C. Vitalba* γ . *dentata* Grec. Consp. Fl. Rom. (1898) 22. — Marginea foliolelor frunzelor în toată lungimea lor grosolan și neegal dințată; dinții acuți. — *Reg. Cluj:* Olpret (r. Dej). *Reg. Hunedoara:* Bobâlna (r. Orăștie). *Reg. Constanța:* Medgidia; Basarabi în pădure; Babadag. *Reg. Galați:* Telița, Mrea Cilic (r. Tulcea).

Intrebuințări. Lujerii tineri în unele locuri se folosesc drept condiment, conținând un suc cu gust pipărat. Ramurile puțin lignificate se pot folosi la împletirea coșurilor și pentru legat. Primăvara, lujerii tineri sunt păcuți de capre. Se folosește și ca plantă ornamentală pentru acoperirea gardurilor, pereților, etc. Sucul proaspăt al frun-

zelor are efect vezicant. Conține un alcaloid (clematina) și alte substanțe toxice, din care cauză consumată în cantitate mai mare este otrăvitoare. Florile, datorită mirosului plăcut se folosesc în unele locuri ca surogat de ceai.

Răsp. gen.: Europa, Asia Mică, Africa de N., America de N.

3. **C. recta** L. Sp. pl. ed. I (1753) 544 et ed. II (1762) 767 ampl; H. Krasch. in Fl. U. R. S. S. VII (1937) 318. — Luminoasă. — Kaszanyűg bercse. — Aufrechte Waldrebe. — Ломонос прямой. — Exs.: FRE nr. 2427. — Ic.: Pl. 86, fig. 1, 1a.

4. Plantă ierbacee de obicei înaltă până la 1,5 m, cu rizom noduros, cilindric. Tulpină erectă, muchiată, fistuloasă, în partea superioară scurt păroasă. Frunze opuse, împaripenate, cu petioli brăzdați, glabre sau slab păroase, cu 3—7 foliole petiolate, \pm îndepărtate pe rachisul comun, lungi până la 9 cm, ovoide, la vârf acuminate, la bază \pm cordate, de obicei întregi, pe partea inferioară verzi glauce, slab păroase, cu 3—5 nervuri proeminente, pe partea superioară glabre, de culoare verde mai întunecată. Flori multe, grupate în panicule numeroase și unite într-o cimă mare, terminală. Periant cu foliole îngust ovoide, sau în formă de pană alungită, obtuze, lungi de 8—15 mm, de culoare alb lăptoasă, \pm glabre, cu excepția unei margini păroase pe partea externă. Stamine numeroase, cu antere galbene, aproape tot atât de lungi ca și filamentul lor. Fructe nucule aproape glabre, brune negre, comprimate, cu o coadă penat păroasă, lungă de cca 2 cm. VI—VII.

Stațiunea. La marginea pădurilor, prin poieni de păduri, tufișuri, zăvoaie, fânețe, în regiunea dealurilor.

Răsp. în țară: *Reg. Baia Mare*: Foeni (r. Carei). *Reg. Cluj*: Rodna; Bistrița; Olpret (r. Dej); Zalău; Stăna (r. Huedin); Nicula (r. Gherla); Cluj, Gârbău, Cojocna, Boj; Valea Florilor, Turda, Cheia Turzii, V. Arieșului, Rimetea pe Colții Trascăului; Aiud. *Reg. Aut. M.*: Tg. Mureș, Cocoși, între Băla și Ercea; Reghin pe Dl. Ciungi, Gurghiu; Odorhei, Văleni, V. Homorodului; Racul (r. Miercurea Ciuc); Reci, Vârghiș (r. Sf. Gheorghe). *Reg. Stalin*: Mănărade, Valea Lungă, Șeica Mare, Frăua, Proștea Mare, Proștea Mică, Vorumlac, Mediaș, Bazna (r. Mediaș); Sighișoara; Orașul Stalin; Sibiu, Șura Mare, Poplaca, Bradu, Tălmăciu, Cîsnădioara, Boița. *Reg. Hunedoara*: Alba Iulia, Bărbant pe Dl. Bilac, Oarda de Sus, Oarda de Jos, Hăpria, Totoiu, Bucerdea Vînoasă (r. Alba Iulia); Orăștie; Daia Română, Berghin, Cunța, V. Secașului (r. Sebeș); Govăjdia, Ruși (r. Hunedoara). *Reg. Oradea*: Oradea; Băile Episcopoști; Valea lui Mihai, Curtiușeni (r. Săcuieni); Băița (r. Beiuș). *Reg. Arad*: Arad (Păd. Ciala), Pecica; Cladova (r. Lipova); Arăneag, Ineu, Mocrea (r. Ineu); Adea (r. Chișineu-Criș). *Reg. Timișoara*: Băile Herculane. *Reg. Craiova*: Cerneti (r. Tr. Severin). *Reg. Pitești*: Drăgășani; Vultureanca (r. Găești). *Reg. Ploiești*: Valea Călugărească pe Dl. Mare; Câmpina; Slănic (r. Văleni). *Reg. Galați*: Măcin (introdusă în grădini); Hanu Conachi (r. Măicânești). *Reg. Bârlad*: Blăjarii de Sus, Diecheni, Tecuci. *Reg. Bacău*: Piatra Neamț. *Reg. Iași*: Iași, Cucuteni, Bârnova. *Reg. Suceava*: Botoșani.

Variabilitatea speciei

var. **Mágócsyana** Soó in BK XXII (1925) 72. — Tulpină urcătoare, lungă de mai mulți metri, cu pețioți transformați în cârcei. — Cluj în Păd. Făget.

Intrebuințări. Se cultivă ca plantă ornamentală în mai multe forme horticoale, ca de ex. cea cu flori pline (f. *flore-pleno* Hort.), sau cea cu frunze întunecat brune-roșii (f. *foliis-purpureis* Hort.).

Răsp. gen.: Europa centrală și de S, Crimeea, Caucaz, Asia temperată.

* **C. Flammula** L. Sp. pl. ed. I (1753) 544; H. Krasch. in Fl. U.R.S.S. VII (1937) 319. — Ic.: Pl. 86, fig. 4.

4. Plantă ierbacee, cu tulpină scandentă, cel mult numai la bază ± lignificată. Frunze opuse, de 1—2 ori imparipenate, de obicei cu foliole lung pețiolulate, ovate, rotunde sau liniare, întregi sau cu 2—3 lobi, de obicei mai mult de 11 la fiecare frunză. Flori odorante (cu miros de migdale), adunate în cime unite în paniculă mare, terminală sau axilară. Periant cu 4 (rar 5) foliole lungi de 4—10 mm, albe, înguste, obtuze la vârf, pe partea externă cu margini îngust păroase, în rest glabre. Stamine numeroase, mai scurte decât învelișul floral, cu antere galbene, ± tot atât de lungi cât filamentul lor. Nucule brune, îngust ovoide, fin păroase sau glabre, cu coadă păroasă de cca 2 cm lungime. Plantă cu un gust foarte arzător, de unde vine și numele ei. VI—VIII.

Stațiunea: Numai în culturi, ca plantă ornamentală.

Intrebuințări. În unele locuri frunzele uscate se folosesc ca nutreț, la uscare pierzând gustul lor arzător. Ca plantă scandentă, adeseori este folosită în grădini ca plantă ornamentală. Are mai multe forme horticoale.

Răsp. gen.: Europa mediteraneeană, Asia occidentală, Africa de N.

* **C. Viticella** L. Sp. pl. ed. I (1753) 543; H. Krasch. in Fl. U.R.S.S. VII (1937) 316. — Ic.: Pl. 86, fig. 2.

4. Tulpină lemnoasă, urcătoare, subțire, pronunțat muchiată, ramificată, lungă până la 6 m. Frunze opuse, imparipenate, lung pețiolate, la baza pețiolilor dens păroase, cu foliole întregi, ovate sau rotunde, cu pețioluli scurți. Uneori frunzele pot fi și bipenate, cu foliole trilobate până la trisectate, cu pețioluli mai lungi. Foliolele pieloase, cu nervuri proeminente, pe fața inferioară des păroase. Floare solitară, nutantă, terminală sau axilară, lung pedunculată, la ramificații cu câte 2 foliole (bractei) sesile, întregi sau lobate.

Plansa 86. — 1. *Clematis recta* L., 1 a. fructe. — 2. *C. Viticella* L. — 3. *C. Jackmannii* Jackm. — 4. *C. Flammula* L.



Foliolele periantului lungi până la 3 cm și late până la 2,8 cm, rombic-ovate, obtuze, cu margini larg ondulat dințate, întunecat violete sau roșii. Stamina multe, scurte, cu antere galbene. Nucule rotunde, turtite, cu diametru de cca 1 cm, \pm glabre, cu rostru puțin curbat. VI—VIII.

Stațiunea. In cultură ca plantă decorativă, uneori sălbătăcită.

Răsp. gen.: Regiunea mediteraneeană de V, Balcani, Asia Mică, Caucaz, Iran.

* \times C. **Jackmannii** Jackm. in Gard. Chron. (1864) 26, n. seminud. ex Th. Moore in Flor.a. Pomol. (1864) c.ic. = *Hendersoni* (*integriolia* \times *Viticella*) \times *lanuginosa*. — Ic.: Pl. 86, fig. 3.

Plantă lemnoasă, volubilă. Frunze tulpinale biternate, simplu ternate sau simple, cu foliole ovate, acuminate sau alungit ovate, cu margini întregi, glabre sau pubescente. Flori solitare sau câte 2—5 pe ramuri scurte. Periant cu 4 foliole sau mai multe, obovate sau rombic eliptice, atenuate spre bază, lungi de 5—7 cm, închis violet.

Specie horticolă, provenită probabil prin hibridizarea speciilor *C. Viticella* cu *C. lanuginosa* Moore, sau chiar din *C. Viticella* cu *lanuginosa* și *integriolia*. Pentru frumusețea sa este o plantă des folosită pentru decorarea parcurilor și a grădinilor.

Genul 121. MYOSŪRUS*) L.

Gen. pl. [ed. I (1737) 90, nr. 257], ed. V (1754), 137, nr. 355. — Codituca.

Descrierea genului este identică cu cea a speciei.

M. minimus L. sp. pl. ed. I (1753) 284; H. Krasch. in Fl. U.R.S.S. VII (1937) 323. — Codituca. — Egerfarkfü. — Mäuseschwänzchen. — Мышехвостник маленький. — Exs.: FRE nr. 1935 a. — Ic.: Pl. 66, fig. 3, 3a.

○. Plantă ierbacee scundă, până la 10 cm înălțime. Frunze radicale numeroase, îngust liniare, obtuze, spre bază treptat îngustate în pețiole, cu margini întregi, glabre. Tulpini scapiforme, numeroase, glabre, de obicei mai lungi decât frunzele radicale, cu câte o floare actinomorfa, terminală. Inveliş floral dublu. Periantul extern formează un caliciu cu 5 sepale lungi de 3—4 mm, albe verzui, alungit eliptice, cu câte o prelungire membranoasă (pinten) îndreptată în jos, atingând pedunculul floral. Periant intern cu 5 petale alburii galbene, spatulate, \pm tubuloase, la mijloc cu câte o gropiță nectariferă. Stamina 5—10 (rar mai multe). Gineceu format din numeroase carpele așezate pe un receptacol cilindric care se alungește mult (adesea până la

*) Nume la Lobelius (Matthias de l'Obel, 1538—1616), dela cuvintele grecești « mus » = șoarece și « oura » = coadă, referitor la forma alungită a apocarpului.

5—6 cm) după înflorire. Fructe nucule numeroase, mici (1—1,5 mm), \pm trimuchiate, cu cioc scurt și drept, grupate într'un apocarp alungit. IV—V.

Stațiunea. Pe ogoare, semănături, câmpuri, dealungul drumurilor, în deosebi prin locuri \pm sărate și inundate primăvara sau cu apă stagnantă, mai ales în regiunea de stepă și silvostepă. Pe alocuri se desvoltă în masă.

Răsp. în țară: *Reg. Baia Mare:* Carei, Foeni, Ghilvaci. *Reg. Cluj:* Bistrița, V. Șieului; Apahida (r. Cluj); Băile Turda. *Reg. Aut. M.:* Tg. Mureș, Cocoși; Vlahița, Căpâlnița (r. Odorhei); Reci (r. Sf. Gheorghe). *Reg. Stalin:* Copșa Mică (r. Mediaș); Sighișoara, Saschiz; Rupea, Racoșul de Jos; Orașul Stalin; Sebeș. *Reg. Hunedoara:* Zam. *Reg. Oradea:* Oradea. *Reg. Arad:* Arad, Măscă; Cermeiu (r. Ineu); Șimand, Chișineu-Criș, Sânmartin, Adea; Nădălbăști (r. Gurahonț). *Reg. Timișoara:* Timișoara; Ciacova (r. Deta). *Reg. Craiova:* Popoveni, Păd. Zăvalu (r. Craiova). *Reg. București:* Ciocănești, Tărtășești, Bufta (r. Răcari); București (Pantelimon, Păd. Andronache); Brănești; Comana spre Grădiștea (r. Vidra). *Reg. Constanța:* între Tuzla și Mangalia (r. Constanța). *Reg. Galați:* Tulcea; Brăila spre Lacul Sărat. *Reg. Iași:* Cărlig, Aroneanu, Mârzești, V. Bahluiului (r. Iași).

Răsp. gen.: Eurasia — cu excepția părților arctice — Africa de N, America de N, Australia.

Genul 122. **CERATOCÉPHALUS** *) Mneh.

Meth. (1794) 218. — *Ceratocephalus* Prantl in Engl. Bot. Jahrb. IX (1887) 265, pro Sect. *Ranunculi*. — **Ploșnicar.**


Plante anuale ierbacee, mici, păroase, Tulpina scurdă, se continuă cu pedunculul floral erect. Frunzele bazale numeroase, dublu bi-sau trisectate cuneat atenuate în pețiol, așezate în rozetă. La vârful tulpinii o singură floare actinomorfa. Caliciu cu 5 sepale verzi, păroase. Corola cu 5 petale galbene, \pm mai lungi decât sepalele, pe unguiculă cu câte o gropiță nectariferă, acoperită cu o scvamă. Apocarp format din nucule foarte lung rostrate (cu rostru mult mai lung decât nucula), așezate pe un receptacul foarte alungit. Fiecare nukulă cu 3 loje, dintre care numai cea din mijloc cu o sămânță.

Determinarea speciilor

- | | | |
|-----|---|-------------------------|
| 1 a | Niculă lungă de 5—6 mm, cu rostru drept sau slab îndoit, puțin comprimată | 1. C. orthoceras |
| 1 b | Niculă lungă de 7—10 mm, cu rostru evident falcat, mai evident comprimată | 2. C. falcatus |

*) Dela grecescul «ceras» = corn și «cephale» = cap, referitor la prelungirile înformă de coarne ale fructelor.

Planșa 87. — 1. *Ceratocephalus falcatus* (L.) Pers., 1a apocarp (1/1), 1 b. un fruct mărit. — 2. *C. orthoceras* DC. — 2 a. apocarp (1/1); 2 b. un fruct mărit. — 3. *Ranunculus crenatus* W. et K. — 4. *Callianthemum coriandrifolium* Rehb. — 5., 5 a., 5 b. *Ranunculus alpestris* L., 5 c. idem, fructe mărite. — 6. *R. glacialis* L.



M

1. *C. orthoceras* DC. Syst. I (1818) 231.; Ovcz. in Fl. U.R.S.S. VII (1937) 324. — *Ran. testiculatus* Cr. Stirp. austr. II, ed. I (1763) 97. — *C. falcatus* Baumg., Auct. Transs. et alior., non Pers. — *C. testiculatus* (Cr.) Pernhoffer et Krasse in A. Kern. in Sched. ad FEAH V (1888) 35. — *Plöşnicar*. — Kőzönséges sarlóboglárka. — Geradfrüchtiges Hornköpfchen. — Рогоглавник пряморогий. — Exs.: FRE nr. 1011, a, b, sub *C. test.* — Ic.: Pl. 87, fig. 2, 2a-b.

○. Plantă ierbacee, înaltă de 3–6 (–10) cm, suriu lanuginos păroasă, rareori glabrescentă sau glabră. Tulpină scurtă, cu multe frunze bazale și un peduncul floral. Frunze bazale cuneat pețiolate, de 2–5 cm lungime, 2–3-sectate, cu segmente liniare, din nou bi-sau trisectate. Peduncul floral mai lung sau tot atât de lung ca și frunzele, cu o singură floare terminală. Floarea de 5–7 (10) mm în diametru, cu înveliș floral dublu. Caliciu din 5 sepale verzi, păroase pe dos, mai scurte decât petalele. Petale galbene, îngust lanceolate, pe unguiculă cu câte o foveolă nectariferă acoperită cu o scvamă. Stamine 5–15. Nucule lungi de 5–6 mm, numeroase, așezate pe un receptacul cilindric alungit, păroase sau mai rar glabre, cu rostru lung, subțire, subulat, aproape drept sau abia curbat. III–V.

Stațiunea. In regiunea de stepă, pe coaste uscate, pe locuri cu pietriș și sărături, uneori ca buruiună de câmp.

Răsp. în țară: *Reg. Cluj*: Cluj, Cojocna la Tunel; Turda, Vișoara. *Reg. Aut. M.*: Tg. Mureș. *Reg. Stalin*: între Cașolț și Bungard, între Tâlmăciu și Veștem (r. Sibiu). *Reg. Hunedoara*: Alba Iulia; Deva, Mintia. *Reg. Craiova*: Padea (r. Bechet); Segarcea în Păd. Radovan. *Reg. București*: Tr. Măgurele, Flămânda; Ciocănești (r. Răcari); Periș (r. Căciulați); București (Chitila, Herăstrău), Comana (r. Vidra); Pasărea (r. Brănești); Lehliu; Slobozia spre Bora (r. Slobozia). *Reg. Ploști*: Dl. Istrița (r. Mizil); Ulmeni, Monteoru, V. Nișcovului (r. Buzău). *Reg. Constanța*: Cernavoda; Constanța, Techirghiol, Mangalia. *Reg. Galați*: Nifon, Mrea Cocos, Niculițel (r. Tulcea); între Greci și Măcin, Cerna, Luncavița; Galați. *Reg. Bârlad*: Focșani; Mărășești; Cosmești (r. Tecuci), Bârlad. *Reg. Bacău*: Piatra Neamț. *Reg. Iași*: Iași (Copou, Galata, Cetățuia, V. Bahluiului), Nițelea, Cristești, Breazu, Schitul Bârnova. *Reg. Suceava*: Stâncă-Ștefănești (r. Trușești).

Răsp. gen.: Europa — exclusiv părțile arctice — Asia Mică și centrală, Iran.

2. *C. falcatus* (L.) Pers. Syn. I (1805) 341; Ovcz. in Fl. U.R.S.S. VII (1937) 324. — *Ranunculus falcatus* L. Sp. pl. ed. I (1753) 556 et ed. II (1762) 781. em. — Ic.: Pl. 87, fig. 1, 1a-b.

○. Asemănătoare speciei precedente, de care diferă prin următoarele caractere: Floare cu diametru de 10–15 mm. Nucule foarte comprimate, lungi de 7–10 mm, scvaroase, cu rostru lung, la mijloc lățit, la vârf ascuțit și pronunțat curbat (falcat), de forma secerii. III–V.

Stațiunea. Pe câmpuri și arături.

Răsp. în țară: Indicată de Heuffel din « Banat » fără localitate. Deasemeni este citată de Edel din « câmpiile Moldovei », dată neconfirmată.

Răsp. gen.: Eurasia, cu excepția părților arctice.

Genul 123. *CALLIANTHEMUM*¹⁾ C.A. Mey

in Ldb. Fl. alt. II (1830) 336.

Descrierea genului este identică cu cea a speciei.

C. coriandrifolium Rehb. Fl. germ. exc. III (1832) 727. — *Ranunculus rutaefolius* L. Sp. pl. ed. I (1753) 552, p. p. — *Ran. rutaefolius*, *Callianth. rutaefolius*, *Callianth. anemonoides* Auct. Transs. — Ic.: Pl. 87, fig. 4.

4. Plantă ierbacee, înaltă de 5—20 (30) cm, cu tulpină erectă, de obicei neramificată, glabră, verde sau puțin roșietică, cu 1—2 flori lung pedunculate, de obicei cu 1—2 frunze tulpinale sesile sau subsesile, mai mici decât frunzele bazale cu care de altfel se aseamănă. Frunze bazale, de regulă dezvoltate în timpul înfloririi, cu pețiol lung și lamina de 2—3 ori ternat penată; aripile de 2—3 ori sectate, cu lacinii \pm lanceolate, glabre, cenușii verzi. Flori actinomorfe (regulate), albe, cu diametru până la cca 2 cm. Sepale 5, verzi sau albicioase. Petale 5—16, lat oblongi sau obovate, aproape de 2 ori mai lungi decât sepalele, albe, la bază cu pată galbenă aurie și gropițe nectarifere. Stamina multe. Fructul un apocarp, format din mai multe nucule lungi de 3 mm și late de 2,—2,5 mm cu pereți fin sbârciți și un rostru scurt. VI-VII.

Stațiunea. In pajiști stâncoase, în regiunea alpină.

Răsp. în țară: *Mții Rodnei*: Pietrosul Mare, Vf. Păltiniș, Vf. Puzdrelor, Inău, Corongiș, Gemenea. *Mții Bârsei*: Piatra Craiului. *Mții Făgărașului*: deasupra Lacului Bălea spre Vânătoarea lui Buteanu.

Răsp. gen.: Alpi, Carpați, Iugoslavia.

Genul 124. *BATRACHIUM*²⁾ (DC.) S.F. Gray

Nat. arrang. brit. pl. (1821) 720. — *Batrachium* DC. Syst. I (1818) 233 et Prodr. I (1824) 26, pro sect. *Ranunculi*. — *Ranunculus* Sect. III.

¹⁾ Dela grecescul « kállos » = frumusețe și « ánthemon » = floare, plantă, adică floare sau plantă frumoasă.

²⁾ Dela « batráchion » = broască, nume la Hippocrates (460—372 î.e.n.), Dioscorides și Plinius (sec. I e.n.), dat unor specii acvatice considerate de unii autori ca aparținând la *Ranunculus*, nume cu etimologie analoagă, cu referire indirectă la mediul apos, unde trăesc și broaștele și aceste plante.

Marsypadenium Prantl. subsect. a. *Batrachium* (DC.) Prantl in Engl. et Prantl Nat. Pflzfam. III. 2 (1891) 64.

Plante acvatice, perene, cu frunze plutitoare, lobate și cu frunze submerse multipartite, cu segmente foarte înguste, pețiolate sau sesile. Flori solitare, albe, cu unguiculă galbenă. Gropițe nectarifere la baza petalelor, fără solzi. Peduncul floral lung, opus frunzelor. Carpele transversal sbâncite.

Determinarea speciilor

- 1 a Frunze de 2 feluri: plutitoare, rotunde, lat sectate și altele submerse, cu lacinii filiforme 2
- 1 b Frunzele numai submerse, cu lacinii filiforme 4
- 2 a Plante ± păroase, cu frunze plutitoare de 1,5—2 cm în diametru, până la bază 3—5-sectate cu segmente triunghiulare și ± fidate ascuțite 1. **B. Giliberti**
- 2 b Plante de obicei glabre 3
- 3 a Frunze plutitoare pe dos glabre. Petale lungi de 5—7 mm. Stamine de lungimea carpelelor. Peduncul fructifer foarte curbat. 2. **B. triphyllum**
- 3 b Frunze plutitoare pe dos păroase, 3—5-lobate, mai rar sectate. Petale lungi de 9—13 mm. Stamine mai lungi decât carpelele. Peduncul fructifer curbat 3. **B. aquatile**
- 4 a Frunze lungi de 7—16 cm, cu lacinii lungi, așezate paralel . . 9. **B. fluitans**
- 4 b Frunze cel mult de 5 cm lungime, cu lacinii răsfirate 5
- 5 a Frunze inferioare lung pețiolate, cele superioare ± sesile 7. **B. trichophyllum**
- 5 b Toate frunzele sesile sau scurt pețiolate 6
- 6 a Nucule 50—80. Petale de 4—5 mm lungime. Receptacul alungit cilindric 8. **B. Rionii**
- 6 b Apocarpul compus numai din 15—30 (50) nucule 7
- 7 a Frunze orbiculare, sesile, de 3 ori trisectate, lungi de 8—20 mm, rămânând răsfirate și după scoaterea din apă. Flori cu diam. de 15—18 mm, cu peduncul mult mai lung decât frunza . . 4. **B. foeniculaceum**
- 7 b Frunze semiorbiculare, sesile sau pețiolate, de 3—4 ori trisectate, lungi și late de 3—7 cm 8
- 8 a Tulpini subțiri. Frunze pețiolate, lungi de 3—4 cm, triplu trisectate, cu segmentul mijlociu ± egal cu cele laterale. Flori cu diametru de 8—10 (12) mm 5. **B. divaricatum**
- 8 b Tulpină mai groasă, glabră, puțin aspră. Frunze ± sesile, de 5—6 ori trisectate, în formă de evantai, lungi de 4—7 cm, cu segmentul mijlociu puțin mai scurt decât cele laterale. Flori de 15—18 (20) mm în diametru 6. **B. carinatum**

1. **B. Giliberti** V. Krecz. in Fl. U.R.S.S. VII (1937) 345, tab. XXII, fig. 1, 11. — *B. radians* Revel in Act. Soc. Linn. Bord. XIX (1853) 120, non Dumort. —

Ran. paucistamineus var. *heterophylla* Freyn in A. Kern. Sched. ad FEAH V (1888) 37. — **Ic.**: Pl. 88, fig. 8; Fl. U.R.S.S. l.c. tab. 22, fig. 1, 11.

4. Plantă păroasă, cu frunze plutitoare și submerse. Cele plutitoare rotunde, late de 1,5–2 cm, până la bază 3–5-sectate, cu segmente triunghiulare, ± lobat fidate, cu lobi obtuși sau acutiusculi. Frunzele ce urmează în jos, mai îngust sectate, cele submerse cu segmente filiforme. Flori cca de 10 mm în diametru. Nucule cca 25–30. V–VIII.

Stațiunea. In bălți, lacuri și ape lin curgătoare.

Răsp. în țară: *Reg. Baia Mare*: Carei. *Reg. Cluj*: Cluj; Mții Meseș în V. Poicului.

Răsp. gen.: Europa centrală, U.R.S.S.

2. *B. triphyllum* (Wallr.) Dumort. in Bull. Soc. Bot. Belg. II (1863) 214; V. Krecz. in Fl. U.R.S.S. VII (1937) 343. — *Ranunculus triphyllus* Wallr. in Linn. XXV (1840) 584. — *Ran. hederaceus* Baumg. Enum. stirp. Transs. II (1816) 132, non L. — *Ran. Petiveri* Koch Syn. ed. II (1843) 13, non Coss. et Germ. (1864). — *Batrachium Petiveri* Bossche Prodr. Fl. Bat. I (1851) 7. — *Batr. tripartitum* (Nolte) Schur Enum. pl. Transs. (1866) 12. — **Exs.**: FRE nr. 765, — **Ic.**: Pl. 88, fig. 9.

4. Tulpină lungă de 10–30 (-50) cm, adeseori cu internodii scurte, glabră împreună cu pedunculii. Frunze plutitoare lung pedunculate, semirotunde, late de 1,5–2,5 cm, aproape până la bază tripartite, la margini dantelat lobate, cu lobi obtuși. Frunze submerse mai scurte decât internodiile, cu teci mici, slab păroase. Peduncul floral de 1,5–3 cm lungime, cel fructifer de 3–4 ori mai lung decât frunza de care aparține. Flori de 8–15 mm în diametru. Nucule puține, glabre, numai pe dos setoase. V–VIII.

Stațiunea. In ape stătătoare și lin curgătoare.

Răsp. în țară: *Reg. Cluj*: Năsăud; *Reg. Cluj*: Mihai Viteazu (r. Turda); Hășmaș (r. Dej). *Reg. Stalin*: Sibiu după Dl. «Altenberg». *Reg. Hunedoara*: Alba Iulia; Bretea Română, Plopi (r. Hațeg); Cut, V. Secașului (r. Sebeș). *Reg. Oradea*: Oradea lângă Păd. «Wolff», Sânmărtin spre Băile Felix, între Oșorhei (r. Oradea) și Tileagd (r. Aleșd); Sâmbăta, Dușești, Poieni, Pietroasa (r. Beiuș).

Răsp. gen.: Europa centrală și de N.

Planșa 88. — 1. *Batrachium fluitans* (Lam.) Wimm. — 2. *B. foeniculaceum* (Gilib.) V. Krecz. — 3. *B. aquatile* (L.) Dumort. — 4. *B. trichophyllum* (Chaix) Bossche, tipul, 4 a. grupă de carpele mărită, 4 b. secțiune longitudinală în floare. — 5. *B. divaricatum* (Schrank) Schur. — 6. *B. trichophyllum* (Chaix) Bossche var. *hirtum* (Nyár.) A. Nyár. — 7. *B. Rionii* (Lagg.) Nym., 7 a. grupă de carpele mărită, 7 b. secțiunea longitudinală a florii. — 8. *B. Gilibertii* V. Krecz. — 9. *B. triphyllum* (Wallr.) Dum. — 10. *B. carinatum* Schur. — 11. *B. divaricatum* var. *penicillatum* Glück.



3. **B. aquatile** (L.) Dumort. Prodr. Fl. Belg. (1827) 127. — *Ran aquatilis*. L. Sp. pl. ed. I (1753) 556, α et γ . — *R. heterophyllum* Web. in Wigg. Prim. Fl. Holsat. (1780) 42. — *R. peltatus* Schrank Baier. Fl. I (1789) 103. — *Batr. aquatile* e. *heterophyllum* Schur Enum. pl. Transs. (1866) 12. — *Ran. aquatilis* α *typicus* Beck Fl. NÖ I (1890) 415. — Exs.: FRE nr. 412 sub. *R. aquat.* — Ic.: Pl. 88. fig. 3.

4. Tulpină lungă peste 1 m, compactă, ramificată, glabră sau aproape glabră, ca și întreaga plantă. Frunze plutitoare rotunde sau reniforme, 3–5-lobate, mai rar sectate, cu margini obtuz dantelate, pe dos scabru păroase. Frunze submerse pețiolate, repetat trifidate, foarte fin capilar sectate, moi, scoase din apă se lipesc ca o pensulă. Pedunculi fructiferi lungi, curbați. Flori mari, late de 20–25 mm. Petale de 9–13 mm lungime. Receptacul sferic, păros. Stamine până la 30, mai lungi decât carpelele. Nucule transversal rugoase. VI–VIII.

Stațiunea. In ape stătătoare sau lin curgătoare, lacuri, mocirle, în regiunea de câmpie.

Răsp. în țară: Reg. Baia Mare: Carei. Reg. Cluj: Năsăud. Reg. Stalin: Sighișoara; Sibiu. Reg. Oradea: între Ciheiu și Chișirid, Tărian (r. Oradea), pe afluenții Crișului Repede și pe V. Bereteului. Reg. Timișoara: Timișoara, Freidorf. Reg. Ploști: între Comișani și Gara Văcărești (r. Târgoviște). Reg. Iași: Iași la Nicolina (citată de autori mai vechi din toată Moldova).

Răsp. gen.: In toate continentele, afară de Australia.

4. **B. foeniculaceum** (Gilib.) V. Krecz. in Fl. U.R.S.S. VII (1937) 338, tab. XXI, fig. 1. — *Ran. foeniculaceus* Gilib. Fl. lithuan. V. (1782) 261. — *R. circinatus* Sibth. Fl. Oxon. (1794) 174. — *Batr. divaricatum* Wimm. Fl. Schles. ed. I (1840) 10, non Schur. — Ic.: Pl. 88, fig. 2.

4. Tulpină glabră, gălbuie, cu internodii lungi. Frunze rotunde, lungi de 8–20 mm, cu mult mai scurte decât internodiile, sesile, amplexicaule, triternate, apoi repetat bifurcat divizate, rigide, scoase din apă rămân întinse. Peduncul floral cu mult mai lung decât frunza. Flori de 15–18 mm în diametru. Stamine 15–21. Receptacul sferic, păros. Apocarp cu 25–30 nucule. Nucule de 1,5 mm lungime. VI–VIII.

Stațiunea. Ape lin curgătoare, iazuri.

Răsp. în țară: Reg. Galați: în Delta Dunărei la Litcov (r. Tulcea).

Răsp. gen.: Eurasia.

5. **B. divaricatum** (Schränk) Schur Enum. pl. Transs. (1866) 12, non Wimm.; V. Krecz. in Fl. U.R.S.S. VII (1937) 340, tab. XXI, fig. 3. — *Ranunculus divaricatus* Schrank Baier. Fl. II (1789) 104, non Koch, nec Ldb.,

nec alior. — *R. rigidus* Pers. in Hoffm. Deutschl. Fl. ed. I (1791) 257. — *Batr. rigidum* Dumort. Prodr. Fl. Belg. (1827) 127. — *Ran. paucistamineus* Tausch in Flora XVII (1834) 525, non Freyn. — *Batr. paucistamineus* F. Schultz Arch. Fl. et All. I (1844) 71. — Exs.: FRE nr. 2755. — Ic.: Pl. 88, fig. 5.

4. Tulpina lungă de 10–50 cm, ramificată, glabră, deschis verde, cu tulpini subțiri. Frunze pețiolate, în formă de evantai, lungi de 3–4 cm, triplu trisectate, cu lacinii filiforme. Segmentul mijlociu \pm egal cu cele laterale. Peduncul floral cca de lungimea frunzei. Flori late de 8–10 (12) mm, cu petale îngust obovate, cca de 2 ori mai lungi decât sepalele. Stamine (5) 9–13. Nucule 15–20, surii, ușor setoase. VI–VIII.

Stațiunea. In ape stătătoare sau lin curgătoare.

Răsp. în țară: *Reg. Cluj*: Rodna, Năsăud; Bistrița, V. Șieului. *Reg. Cluj*: V. Chintenilor, Someșeni, Apahida; Aiud; Abrud (r. Câmpeni). *Reg. Aut. M.*: Praid (r. Sângeorgiul de Pădure); Căpâlnița (r. Odorhei), Mții Harghita; Miercurea Ciucului; Tg. Săcuesc. *Reg. Stalin*: Rupea; Orașul Stalin; Sibiu, Brad, Tâlmăciu. *Reg. Hunedoara*: Alba Iulia, Vințul de Jos, Ighiel; Cuntă (r. Sebeș); Zam (r. Deva); Ohaba de sub Piatră (r. Hațeg). *Reg. Oradea*: Oradea; Valea lui Mihai (r. Săcuieni). *Reg. Timișoara*: Freidorf (r. Timișoara); Caransebeș. *Reg. București*: București (Chitila, Mogoșoaia); Comana (r. Vidra); pe Râul Călniștea (r. Mihăilești). *Reg. Ploști*: V. Nișcovului (r. Buzău). *Reg. Galați*: Tulcea; Măcin la Turcoaia; Galați. *Reg. Bacău*: Săvinești (r. Ceahlău). *Reg. Iași*: Cristești, V. Jijiei (r. Iași).

Variabilitatea speciei

- 1 a Segment mijlociu \pm egal cu cele laterale..... 2
- 1 b Segment mijlociu cu mult mai mic decât cele laterale. Nucule cca 60
 var. *Grintzescui* (Nyár.). — *Rancunculus trichophyllus* Chaix ssp. *Rionii* Lagg.
 var. *Grintzescui* Nyár. in Sched. ad FRE nr. 766 in Bul. Grăd. Bot. Cluj VIII (1928) 111. — *Reg. Ploști*: lângă Gara Armășești (r. Urziceni).
- 2 a Peduncul fructifer cel mult de lungimea frunzelor. Flori late de 6,5 – 10 mm, cu 7 – 10 stamine. Lacinii rigide, la frunzele scoase din apă nu se lipesc
 var. *genuinum* (Rikli). — *Ran. flaccidus* Pers. var. *genuinus* Rikli ap. Hegi Fl. Mitt.-Eur. III (1912) 584. — *Reg. Baia Mare*: Berveni, Urziceni (r. Carei). *Reg. Cluj*: Cluj, Feleac, Someșeni, Apahida. *Reg. Arad*: Arad, Turnu, Șiria; Pâncota, Ineu, Chier, Cermeiu, Bocsig (r. Ineu); Adea (r. Cășineu-Criș). *Reg. Bacău*: între Tg. Neamț și Vânători.
- 2 b Peduncul fructifer cel puțin de lungimea frunzelor sau cu mult mai lung, nerecurbat 3
- 3 a Teaca frunzei păroasă. Lacinii rigide, divergente, lungi de 2–6 cm. Peduncul drept, de 2 – 2,5 ori mai lung decât frunzele
 var. *pedicellatum* Glück Biol. Unters. Wass. u. Sumpfgew. IV (1924) 197. — *Reg. Baia Mare*: Carei, Cămin. *Reg. Cluj*: Cluj. *Reg. Aut. M.*: Tg. Săcuesc.
- 3 b Teaca frunzei glabră. Lacinii moi; la frunzele scoase din apă se lipesc.
 var. *penicellatum* Glück l.c. — *Reg. Cluj*: Apahida (r. Cluj).

Răsp. gen.: Europa, Siberia, America de N.

6. **B. carinatum** Schur Phytogr. in Verh. NV Brünn XV (1877) 28; V. Krecz. in Fl. U. R. S. S. VII (1937) 344. — *Ran. carinatus* Simk. Enum. pl. Transs. (1886) 43. — **Exs.**: FEAH nr. 99 ex Bohemia. — **Ic.**: Pl. 88, fig. 10.

4. Plante cu tulpini groase, glabre, puțin aspre. Frunze \pm aspre, semiro-tunde, în formă de evantai, lungi de 4—7 cm, cu lacinii erecte, scoase din apă rămân întinse, de 5—6 ori trisectate. Segmentul mijlociu puțin mai scurt decât cele laterale. Peduncul floral de 2 ori mai lung decât frunza. Flori mari, de 15—18 (20) mm în diametru, cu petale obovate, de 2 ori mai lungi decât sepalele. Stamine 14—18. Nucule 30—50, lateral turtite în formă de luntre, de jur împrejur muchiate. VI—VIII.

Stațiunea. În râuri din regiunea montană, formând colonii pe fundul apei.

Răsp. în țară: *Reg. Stalin*: Sibiu pe Râul Rusciori și pe Râul de după Dl. « Altenberg », între Ocna Sibiului și Mândra; Mții Făgărașului pe V. Laița.

Răsp. gen.: Europa centrală, U.R.S.S. în partea europeană.

7. **B. trichophyllum** (Chaix) Bossche Prodr. Fl. Bat. (1850) 7; Krecz. in Fl. U.R.S.S. VI (1937) 344, tab. XXI, fig. 4. — *Ran. trichophyllus* Chaix in Vill. Hist. pl. Dauph. I (1786) 355. — *Ran. homophyllus* Hazsl. in MTK X (1873) 17. — *R. paucistamineus* Freyn in A. Kern. Sched. ad FEAH I (1881) 20, non Tausch. — **Ic.**: Pl. 88, fig. 4, 4a, 4b; Fl. U.R.S.S. VII (1937), tab. XXI, fig. 4.

4. Plantă de un verde închis, în partea superioară păroasă. Frunzele inferioare lung petiolate, următoarele din ce în ce mai scurt petiolate, aspre, semirotonde, lungi de 3—5 cm, de obicei de 3 ori trisectate, cu lacinii rigide, scoase din apă rămân întinse, la bază cu teci largi, păroase. Segmentul mijlociu mai mic decât cele laterale. Peduncul cca de lungimea frunzei. Flori de cca 12—15 mm în diametru. Petale invers ovate, de 1,5—2 ori mai lungi decât sepalele. Stamine 8—15. Nucule 25—30, de obicei foarte păroase. VI—VIII.

Stațiunea. În râuri.

Răsp. în țară: *Reg. Arad*: Săvârșin (r. Lipova). *Reg. Craiova*: Craiova. *Reg. Pitești*: Cluceresa (r. Pitești). *Reg. București*: București (Herăstrău, Fundeni); Comana (r. Vidra).

var. hirtum (Nyár.). — *Ran. trichophyllus* Chaix var. *hirtus* Nyár. in Sched. ad FRE nr. 767 in Bul. Grăd. Bot. Cluj VIII (1928) 111. — **Ic.**: Pl. 88, fig. 6. — Tulpina și frunzele \pm des păroase; nucule glabre. — *Reg. Ploiești*: în ape stagnante lângă gara Prahova (r. Ploiești).

Răsp. gen.: Europa.

8. **B. Rionii** (Lagg.) Nym. in Nya bot. not. (1852) 908; Syll. (1854—55) 174; V. Krecz. in Fl. U.R.S.S. VII (1937) 346. — *Ran. Rionii* Lagg. in Flora XXXI (1848) 49. — *R. divaricatus* Baumg. Enum. stirp. Transs. II (1816) 153, non alior. — *Batr. circinatum* Fuss Fl. Transs. exc. (1866) 19. — *Ic.*: Pl. 88, fig. 7.

4. Plante gracile, cu frunze sesile, cele inferioare uneori scurt pețiolate, împreună cu teaca glabre, larg semirotunde, de 2—3 ori trisectate, scoase din apă nu se lipesc. Segment mijlociu cu mult mai mic și mai slab decât cele laterale. Peduncul floral până la 1,5 ori mai lung decât frunza. Flori de cca 8 mm în diametru. Petale de 4—5 mm lungime. Stamine 6—16, mai scurte sau de aceeași lungime cu carpelele. Nucule 50—80, de 1 mm lungime, glabre, cu receptacul cilindric, păros. V—VIII.

Stațiunea. In ape stagnante.

Răsp. în țară: *Reg. Cluj*: Dej; Cluj la Fănațe, Someșul Rece; Miheșul de Câmpia (r. Sărmașel); Băile Sărata Turda; Aiud. *Reg. Aut. M.*: Rușii Munți (r. Toplița); Odorhei. *Reg. Stalin*: Blaj; Valea Lungă, Frâua, Proștea Mare, Mediaș; Sighișoara; Sibiu, Șura Mare. Noul, Bradu. *Reg. Hunedoara*: Orăștie.

Răsp. gen.: Europa centrală, Asia Mică, Iran.

9. **B. fluitans** (Lam.) Wimm. Fl. Schles. ed. I (1840) 9. — *Ran. fluitans* Lam. Fl. fr. III, ed. I (1778) 184. — *Ic.*: Pl. 88, fig. 1.

4. Plantă plutitoare, de 1—6 m. Tulpina la bază fistuloasă, spre vârf solidă, ramificată, cu frunze submerse uniforme, cele inferioare pețiolate, cele superioare sesile, lungi de 7—16 cm, dublu triternate; segmentele repetat bifurcate, cu lacinii setacee, paralele, încălecate. Frunze plutitoare lipsesc, foarte rar apar unele mici, reniforme. Flori lung pedunculate, de 15—20 mm în diametru. Stamine puține, de lungimea carpelei. Receptacul glabru, rar păros, Nucule ovate, cu rostru scurt. VI—VIII.

Stațiunea. Pe fundul râurilor.

Răsp. în țară: *Reg. Aut. M.*: Sâncrăieni în Râul Olt (r. Miercurea Ciuc); Comolău la «Nyir» (r. Sf. Gheorghe). *Reg. Galați*: Galați în Lacul Brateș. — Aceste stațiuni trebuiesc confirmate.

Răsp. gen.: Europa centrală și de S, Africa de N, America de N.

Planșa 89. — *Adonis vernalis* L., 1 a. o frunză, 1 b. nucule reunite în apocarp, 1 c. nukulă. — 2. *A. volgensis* Stev., o frunză. — *A. hybrida* Wolff, o frunză. — 4. Idem, f. *Walziana* (Simk.) A. Nyár., o frunză. — 5. *Ficaria verna* Huds. — 6. Idem, ssp. *calthifolia* (Rehb.) Velen.



Genul 125. **FICĂRIA** *) Adans.

Fam. II (1763) 509. — *Ficaria* Boiss. Fl. or. I (1867) 20, pro sect. *Ranunculi*. — **Untișor**.

Plante ierbacei, perene, cu rădăcini cărnoase, îngroșate în formă de tuberculi. Tulpinile adesea scurte, acoperite abundant în partea lor bazală cu tecile pielose ale frunzelor. Frunze întregi, puțin cărnoase, lucitoare. Flori actinomorfe (regulate), cu înveliș floral dublu. Caliciu din 3 sepale gălbui-albe sau gălbui-verzi, subțiri, pielose, glabre. Petale 8—12, invers ovate, cu mult mai lungi decât sepalele, galbene, la bază cu gropițe nectarifere acoperite cu solzi. Stamine multe. Gineceu cu multe carpele cu stigmat sesil. Fructe nucule monosperme, ± rotunjite, umflate, cu cioc tuberculiform. Embriion cu un singur cotiledon¹⁾.

F. verna Huds. Fl. angl. ed. I (1762) 214; Ovez. in Fl. U.R.S.S. VII (1937) 333. — *Ranunculus Ficaria* L. Sp. pl. ed. I (1753) 550. — *Fic. ranunculoides* Mnh. Meth. (1794) 215. — *R. calthaefolius* Jord. Obs. VI (1847) 2. — **Untișor**. — Salátaboglárka. — Scharbockskraut. — Чистяк весенний. — **Exs.**: FRE nr. 2666 a, b. — **Ic.**: Pl. 89, fig. 5, 6.

24. Plantă glabră, de 15—30 cm înălțime, cu tulpină desvoltată, cu frunze până aproape de floare, ascendentă sau ramificată, cu fibre radicale tuberizate; tuberculii de formă ovoidă sau ± alungită, brun deschiși. Frunze cărnoase, lucioase, rotund sau triunghiular cordate, cele inferioare lung pețiolate, cele superioare scurt pețiolate și unghiular cordate. Lobii bazali ai laminei îndepărtați sau se ating. La subțioara frunzelor se desvoltă adesea muguri mici, ovoizi (bulbili) prin care planta se înmulțește vegetativ. Florile de 2,5—3,5 cm în diametru. Sepale 3, subțiri, gălbui-albe sau gălbui-verzi, pielose, glabre. Petale 8—12, galbene, lucioase, alungit eliptice, lungi de 10—18 mm și late de 4—7 mm, la bază cu gropițe nectarifere acoperite cu solzi. Nucule ± rotund invers ovate, spre bază îngust alungite, la partea superioară umflate, cu cioc foarte scurt, puțin ascuțit sau obtuz. IV—V.

Stațiunea. În păduri, tufișuri, livezi, parcuri și grădini, pe sol umed, în regiunea de câmpie și cea montană.

Răsp. în țară: Comună în toate provinciile țării.

Variabilitatea speciei

ssp. **euvérna** Hay. Prodr. Fl. balc. I (1927) 327. — *Ran. ficaria* ssp. *eu-ficaria* Nyár. in BK XXXVIII (1941) 137. — **Ic.**: Pl. fig. 5.

*) După latinescul «ficus» = smochin, deoarece rădăcinile tuberizate ale plantei sunt asemănătoare cu fructele tinere ale smochinului.

¹⁾ După **Sterch**, acest cotiledon unic s'a format din contopirea celor 2 cotiledoane, după cum se observă și la alte genuri cu tuberculi (*Corydalis*, *Cyclamen*).

Tulpina dela bază până la vârf cu frunze \pm egal distribuite, adeseori decumbentă și radicanță.

In următoarele forme:

f. *typica* (Nyár.). — *Ran. ficaria* L. ssp. *eu-ficaria* Nyár. f. *typicus* Nyár. in BK XXXVIII (1941) 137, cum diagn. hung., Kv. fl. III (1942) 221 et in Bul. șt. Acad. R.P.R. Secț. Șt. biol. tom. III, nr. 1 (1951) 30. — Cu bulbili în subțioara frunzelor. — Cea mai comună formă.

f. *incumbens* (F. Schultz). — *Ran. ficaria* f. *incumbens* F. Schultz Arch. Fl. Fr. et All. II (1855) 122. — *R. fic.* var. *peltiformis* Neilr. Fl. NÖ (1859) 685. — Lobii frunzelor cu margini paralele, care se ating sau \pm se acoperă. — Ici colo împreună cu tipul.

f. *divergens* (F. Schultz). — *R. fic.* f. *divergens* F. Schultz l.c. — *Ficaria aperta* Schur in Verh. NV Brünn XV (1877) 31. — Lobii divergenți. — Comună, împreună cu tipul.

f. *ebulbillosa* (Nyár.). — *R. fic.* ssp. *eu-ficaria* Nyár. f. *ebulbillosus* Nyár. l.c. (1941) 138, cum diagn. hung., Kv. fl. III (1942) 221 et in Bul. șt. Acad. R.P.R. l.c. — Fără bulbili în subțioara frunzelor. Destul de răspândită.

f. *dentata* (Beck). — *Ran. ficaria* f. *dentatus* Beck Fl. NÖ I (1890) 416. — *Fic. ranunculoides* var. *sinuato-dentata* Schur l.c. (1877) 29. — *Fic. ranunculoides* var. *sinuata* Schur ex Csató Alsófehér vm. fl. (1896) 18. — Marginea frunzelor dantelată.

f. *nigromaculata* (Schur). — *Fic. ranunculoides* var. *nigromaculata* Schur l.c. — Frunze pătate cu negru. — Mai ales în zăvoaie.

f. *micraster* (Beck). — *Ran. fic.* f. *micraster* Beck l.c. — Flori foarte mici, cu petale lungi de 5—7 mm. — Rară.

f. *pleniflora* (Prod.). — *Ran. fic.* f. *pleniflora* Prod. Fl. det. pl. Rom. I, 1, ed. II (1939) 351, cum diagn. rom. — Petale foarte numeroase. — Rară.

ssp. *calthifolia* (Rechb.) Vel. Fl. bulg. (1891) 5. — *Fic. calthaeifolia* Rechb. Fl. germ. exc. III (1832) 718; Ovez. in Fl. U.R.S.S. VII (1937) 333. — *Fic. nudicaulis* Kern. in ÖBZ XIII (1863) 188. — *Fic. intermedia* et *Fic. transilvanica* Schur Enum. pl. Transs. (1866) 14. — Exs.: FEAH nr. 1729 sub *calthaeif.*; FRE nr. 2667 sub ssp. *nudic.* — Ic.: Pl. 89, fig. 6.

Plantă fără bulbili, cu frunze numai la bază.

f. *stipitata* (Nyár.). — *Ran. fic.* ssp. *calthaeifolia* f. *stipitatus* Nyár. in BK l.c. (1941) 138, cum diagn. hung., Kv. fl. III (1942) 222 et in Bul. șt. Acad. R.P.R. l.c. — Ic.: Nyár. Kv. fl. l.c. fig. 3. — Tulpină scurtă cu majoritatea frunzelor și cu ramurile îngrămădite fasciculat deasupra primului internodiu îngroșat.

f. *pumila* (Vel.). — *Fic. verna* b. ssp. *pumila* Vel. Fl. bulg. Suppl. I (1898) 4. — Ic.: Nyár. Kv. fl. l.c., fig. 2. — Tulpină foarte scurtă (de 0—2 cm) acoperită cu teci. Frunzele la bază sinuate.

Întrebuințări. Frunzele tinere se întrebuințează ca salată. În timpul coacerii fructului, planta — după unele date — devine toxică. Rădăcinile, frunzele și tulpinile mai înainte se întrebuințau în medicină contra bolilor de piele, hemoroizilor, scorbutului sub numele de «Radix et Herba Chelidonii minoris».

Răsp. gen.: Europa, Caucaz, Siberia de V, Asia centrală.

Genul 126. **RANUNCULUS** *) L.

Gen. pl. [ed. I (1737) 165, nr. 464], ed. V (1754) 243, nr. 619. — *Hecaton* Lour. Fl. Cochinch. (1790) 302. — *Piciorul cocoșului*.

Plante ierboase, anuale, bianuale sau mai frecvent perene, uneori cu rizomi bine dezvoltati, alteori cu fibre radicale tuberculiform îngroșate. Tulpină de obicei ramificată și multifloră. Frunzele numai rar simple, de obicei lobate, palmate, penatipartite sau sectate. Flori regulate, (actinomorfe) solitare sau adunate în inflorescențe cimoase. Inveliș floral dublu, cu periantul extern format din 5 (rar 3—4) sepale și cel intern reprezentat prin 5 (rar mai multe) nectarii în formă de petale, galbene sau albe, cu câte o gropiță nectariferă nudă sau acoperită cu solzi. Stamine numeroase, cu antere galbene, dispuse în spirală. Carpele multe, așezate pe un receptacul păros sau glabru, uneori ± alungit. Fructe multe, monosperme, ± turtite lateral, cu laturi uneori spinoase, tuberculate, fin punctate, glabre sau păroase și cu un rostru drept, adeseori ± recurbat, de lungime diferită.

Determinarea speciilor

- | | | |
|-----|---|----------------------------|
| 1 a | Flori albe sau puțin violet nuanțate | 2 |
| 1 b | Flori galbene | 5 |
| 2 a | Plante înalte de 10—130 cm, ramificate, multiflore. Frunze aproape până la bază 3—7-palmatisectate, cu segmente lat lanceolate, acuminate, inegal inciz dentate | 1. R. platanifolius |
| 2 b | Plante înalte cel mult până la 20 cm, cu tulpină neramificată sau abia ramificată, cu 1—4 flori | 3 |
| 3 a | Caliciu des brun-roșcat păros, persistent. Petale lungi de 8—14 mm, murdar albe, la exterior violet nuanțate. Frunze bazale de 3 sau mai multe ori sectate, cu lacinii obtuze, lanceolate, ± cărnoase, cele tulpinale ± asemănătoare, subsesile | 2. R. glacialis |
| 3 b | Caliciu glabru, caduc. Frunze bazale orbicular reniforme, întregi sau până la mijloc trifidate. Flori curat albe | 4 |
| 4 a | Frunze bazale întregi, ± rotund reniforme, uneori ± oblongi, cordate la bază, de jur împrejur obtuz serate, cu dinți mărunți, care se măresc dela bază spre vârful frunzei. Flori 1—2, rar 3 | 4. R. crenatus |
| 4 b | Frunze bazale semirotunde, adânc trifidate, lobate cu lobi rotunjiți și nervuri pronunțat proeminente. Flori 1, rar 2 | 3. R. alpestris |
| 5 a | Cel puțin unele dintre fibrele rădăcinii tuberculiform, cilindric sau fusiform îngroșate | 6 |
| 5 b | Toate fibrele rădăcinii subțiri, neîngroșate | 11 |
| 6 a | Frunze întregi, cel mult lobate, cele inferioare ± rotunde, adeseori mai late decât lungi. Rădăcini cu fibre puțin îngroșate, spre capăt lent atenuate. Nucule bombate | 7 |

*) Nume derivat dela cuvântul latin «rana» = broască, deoarece multe specii de *Ranunculus* cresc în locuri apătoase, unde trăiesc și broaștele.

- 6 b Frunze fidate sau sectate. Nucule \pm turtite, sau foarte rar \pm cilindrice 8
- 7 a Tulpină de obicei neramificată, fără frunze bazale, la mijloc cu o frunză mare, pieleasă, reniformă sau rotundă, mai lată decât lungă, la bază \pm cordată sau retezată, pe margine crenată, la vârf emarginată și cu câțiva dinți mai mari. Mai sus, tulpina are o frunză mică, bracteiformă, întreagă sau 3—5-fidată 14. **R. Thora**
- 7 b Tulpină de obicei ramificată, cu 2 (—4) frunze bazale, lung pețiolate, cu limb reniform, continuat abrupt în pețiol, spre bază întreg, la vârf dur sau lobat seriat, pielos. Frunze tulpinale inferioare asemănătoare celor bazale. **R. hybridus**
- 8 a Fibre radicale slab sau fusiform îngroșate. Segmentele frunzelor bazale alungit obovate sau oblanceolate, adânc trilobate. Apocarp evident prelungit, de formă cilindro-conică, glabru. Nucule lung și subulat rostrate 30. **R. oxyspermus**
- 8 b Fibre radicale \pm accentuat îngroșate, de formă alungit ovată sau scurt cilindrică. Nuculele nu sunt lung subulat rostrate 9
- 9 a Frunze bazale de 2—4 ori penat sectate, cu numeroase lacinii liniar lanceolate, late de 1—2 mm, obtuziuscule. Apocarp de obicei oval sau elipoidal. Rostrul nuculelor subțire, drept, mai târziu recurbat. Tulpină cu puține flori, scundă, păroasă 33. **R. millefoliatus**
- 9 b Frunze bazale de 1—2 ori digitat sau pedat sectate, cu 3—7 lacinii lungi, îngust lanceolate, întregi sau rar dințate 10
- 10 a Plantă verde, glabră, numai cu tulpina pubescentă. Frunze inferioare aripat sectate, cu lacinii mijlocii întregi, cele laterale din nou sectate. Petale până la 1 cm lungime, galbene-aurii 31. **R. pedatus**
- 10 b Planta întreagă alb sericeu păroasă sau lanuginoasă. Frunze inferioare aripat sectate, cu 3—7 lacinii îngust lanceolate. Petale de obicei peste 1 cm lungime, lucitoare, galbene ca lămâia 32. **R. illyricus**
- 11 a Toate frunzele întregi, rotund ovate, lanceolat eliptice, alungite sau filiforme, cel mult slab trilobate sau serate 12
- 11 b Cel puțin frunzele tulpinale lobate, sectate sau fidate, rar întregi, (la *R. flabellifolius*) însă atunci frunzele bazale sunt cordat reniforme, iar cele tulpinale lat cuneiforme 16
- 12 a Tulpină bifurcat ramificată. Flori sesile sau subsesile în subțioara frunzelor. Petale lungi numai până la 1—1,5 mm 27. **R. lateriflorus**
- 12 b Tulpină nebifurcat ramificată. Flori de obicei lung pedicelate, cu petale de obicei mai lungi de 2 mm 13
- 13 a Plante polimorfe. Forma acvatică submersă, cu tulpină lungă până la 80 cm și frunze capilare, așezate în verticil, de 2 feluri, unele cu lamină redusă și lung pețiolate, altele sesile. Forma terestră înaltă până la cca 10 cm, cu frunze bazale numeroase, pețiolate, cu limb întreg, eliptic sau ovat, tridintat sau trilob 5. **R. polyphyllus**

- 13 b Plante terestre, de obicei mai mari, uneori cu baza tulpinii în apă, Mai ales frunzele tulpinale inferioare cu pețiol lățit în vagină \pm amplexicaulă, adesea cu marginea membranoasă 14
- 14 a Nucule verucoase pe ambele fețe. Frunze bazale pețiolate, lat ovate, cu bază \pm cordată 8. **R. ophioglossifolius**
- 14 b Nucule glabre, neverucoase pe ambele fețe. Frunze bazale pețiolate, înguste, ovat eliptice sau lanceolate, la bază cuneat atenuate, adesea lipsesc sau cad de timpuriu 15
- 15 a Petale de 3—6 mm lungime. Nucule cu rostru foarte scurt. Plante relativ mici, cu tulpini subțiri, adesea procumbente, radicante. Frunze tulpinale mici, îngust eliptice, la mijloc puțin mai late . . 7. **R. Flammula**
- 15 b Petale de 10—20 mm lungime. Nucule subțiate lent în rostru gros, slab curbat la vârf. Plante de obicei foarte înalte, cu tulpini groase, fistuloase, cu frunze de 10—20 cm lungime, la bază late de cca 1 cm, la vârf ascuțite 6. **R. Lingua**
- 16 a Nucule glabre, tuberculate sau spinoase 17
- 16 b Nucule pubescente 32
- 17 a Receptacul alungit după înflorire. Tulpină groasă, fistuloasă . . 18
- 17 b Receptacul globulos, se alungește puțin după înflorire 19
- 18 a Plantă glabră, cu flori mici (petale lungi de 2—4 mm). Nucule abia rână la 1 mm lungime, cu rostru foarte scurt. Frunze inferioare profund 3—5-digitat-sectate, cele superioare întregi. Plante de apă sau de substrat umed 13. **R. sceleratus**
- 18 b Plante abundent păroase, cu flori mari (petale lungi de 10—12 mm) Nucule mari de 4—5 mm, subulat rostrate, cu rostru mai lung decât corpul nuculei. Segmentele frunzelor bazale alungit obovate sau oblan-ceolate, adânc trifidate. Plante de terenuri uscate . . 30. **R. oxyspermus**
- 19 a Nucule pronunțat spinoase sau tuberculate pe ambele fețe . . . 20
- 19 b Nucule netede sau neînsemnat verucoase, fin punctate 21
- 20 a Frunze rotunde sau reniforme, 3—5-sectate, cu segmente lat obovate, inegal lobat serate. Nucule spinoase numai până la dunga marginală netedă, continuă 29. **R. muricatus**
- 20 b Frunze adânc trisectate, cu segmente cuneate, înguste Nucule spi-noase sau tuberculate și pe dunga marginală 28. **R. arvensis**
- 21 a Sepale la înflorire reflecte și alipite de pedunculul floral . . . 22
- 21 b Sepale nereflecte, patente sau alipite de petale 24
- 22 a Tulpină bulbiformă în sol (foarte rar nebulbiformă). Nucule bilateral turtite, netede sau fin punctate, cu rostru scurt, abia curbat, la maturitate de jur-îmrejor cu o singură dungă ascuțită. Frunze bazale lung pețiolate, cu 3 segmente trifidate sau sectate, cu segmente secundare din nou cîntate sau fidate. 20. **R. bulbosus**
- 22 b Tulpină nebulbiformă la bază. Nucula și rostrul de altă formă . . 23

- 23 a Nucule cu rostru subțire, încovoiat în formă de seceră. Frunze bazale lung pețiolate, până la $3/4$ parte trifidate; segmentele lat obovate, nu prea adânc 2—3-lobate, cu lobii dur dințați. Frunze tulpinale mici, liniare, așezate la ramificațiile tulpinii. Plantă perenă 22. **R. constantinopolitanus**
- 23 b Nucule cu rostru scurt, puțin încovoiat, cele mature pe ambele fețe netede sau fin punctate, de jur-împrejur pe margine cu 3 dungi, așezate pe un receptacul lung păros. Frunze bazale pețiolate, cu 3 segmente, cel mijlociu \pm pețiolulat. Toate segmentele din nou trisectate sau trifidate, cu segmente secundare \pm adânc lobate și dințate. Frunze tulpinale asemănătoare cu cele bazale, mai simple. Plantă anuală sau bianuală 21. **R. sardous**
- 24 a Frunze bazale lung pețiolate, trisectate, cu segmente pețiolulate, din nou trifidate; segmentele secundare lat ovate, din nou adânc sectate sau fidate. Tulpină ascendentă la bază, ramificată, cu stoloni radicanți foarte lungi. Flori de 2—3 cm în diametru. Receptacul păros. Nucule lungi de cca 3 mm, cu margine verzuie evidentă și rostru scurt, drept sau puțin încovoiat 15. **R. repens**
- 24 b Frunze bazale palmat fidate sau sectate, cu segmente nepetiolulate 25
- 25 a Receptacul glabru. Peduncul fructifer nebrăzdat 26
- 25 b Receptacul păros. Peduncul fructifer fin sau accentuat brăzdat, numai foarte rar neted 28
- 26 a Tulpină patent sau recurbat păroasă. Nucule cu rostru subțire, spiralat. Frunze bazale 5-fidate, late până la 15 cm, abundant păroase, cu segmentul din mijloc fidat până la $1/2$ — $3/4$ parte iar cele laterale numai până la cca $1/3$ parte. Segmentele lat obovate, se ating sau se acoperă cu marginile, uneori puțin divergente, dur și adânc dințate. Rizom scurt 23. **R. lanuginosus**
- 26 b Tulpină adpres păroasă, cel mult la bază cu peri \pm patenți. Nucule cu rostru scurt, aproape drept. Frunze altfel divizate 27
- 27 a Rizom foarte scurt, premors. Frunze bazale palmat 5—7-sectate, adpres păroase sau glabre. Segmente \pm trifidate și adânc dințate, cu lacinii îngust lanceolate sau ovate lanceolate. Flori cu diametru de 15—20 (25) mm. Nucule lungi de 2—3 mm, subrotunde, cu rostru foarte scurt 24. **R. acer**
- 27 b Rizom relativ lung, gros, orizontal. Frunze bazale adânc 5—7-palmat sectate. Segmente late, din nou 2—3-fidate, cu lacinii late, uneori peste 1 cm lățime, dur dințate, cu peri rigizi, adpreși. Flori cu diametru de 20—30 mm. Nucule lungi de 3—3,5 mm, lat eliptice, cu rostru foarte scurt. Plante viguroase 25. **R. Stevenii**
- 28 a Peduncul fructifer adânc brăzdat sau striat. Frunze tulpinale inferioare asemănătoare cu cele bazale. Tulpină și pețiol cu peri vilosi, patenți. Plante înalte de 10 — 60 (100) cm, cu rizom scurt 29

- 28 b Peduncul fructifer neted sau fin brăzdat. Frunze tulpinale inferioare diferite de cele bazale, numai 1—2, sau lipsesc. Tulpină cu peri adpreși sau glabră. Plante cu 1 sau puține flori 30
- 29 a Nucule cu rostru lung, în spirală. Frunze bazale 3—4, cu lamină adânc trifidată. Segmentele lat obovate, din nou trifidate, cu lobii secundari \pm adânc dințați. Petale de 15—20 mm lungime, galbene închise, cu nuanță portocalie 19. **R. nemorosus**
- 29 b Nucule cu rostru scurt, uncinat. Frunze bazale mai multe, cu lamină palmat 3—5-sectată sau fidată. Segmentele adânc 3-partite, cu lacinii de obicei îngust lanceolate sau liniare, adânc dințate, rar mai late sau ovate. Petale de 7—14 mm lungime, galbene-aurii . 18. **R. polyanthemus**
- 30 a Frunze bazale puține (1—2) sau lipsesc, asemănătoare cu cele tulpinale. Lamină trisectată aproape până la bază, cu segmente lat rombic obovate, lobate. Petale lungi de 2 cm. Plante alipit păroase sau glabrescente. Rizom orizontal, lung de 2—10 cm . . 26. **R. carpaticus**
- 30 b Frunze bazale mai multe, diferite ca formă de cele tulpinale, care au lacinii înguste, \pm filiforme. Petale cel mult de 15 mm lungime. Rizom scurt, vertical 31
- 31 a Receptacul păros. Frunze bazale trisectate până la bază, cu segmente lat ovate, care de obicei se ating sau se acoperă cu marginile, din nou fidate sau adânc dințate, cu dinți lat ovați, la vârf abrupt acumițați 16. **R. oreophilus**
- 31 b Receptacul păros numai la vârf. Frunze bazale trisectate aproape până la bază, cu segmente din nou adânc 2—3-fidate, cele secundare adânc dințate, \pm divergente, cu dinți obtuși sau rotunjiți . . 17. **R. montanus**
- 32 a Frunze bazale mici, adânc fidate sau sectate până la bază. Frunze tulpinale sectate până la bază, cu lacinii îngust lanceolate, cu margini aproape paralele și întregi. Plante gracile . . . 9. **R. binatus**
- 32 b Frunze bazale \pm rotunde, nedivizate, cu margini crenate sau crenat-dințate 33
- 33 a Frunze bazale relativ mici, late de 2—5,5 mm, rotund cordate sau reniforme. Sinul bazal larg deschis, cu margini divergente. Frunze tulpinale sectate până la bază, cu segmente îngust lanceolate, de regulă \pm dințate 10. **R. auricomus**
- 33 b Frunze bazale mai mari (până la 10 cm diametru), rotunde, adânc cordate. Sinul bazal cu marginile paralele, tangente sau încălecate. Frunze tulpinale întregi, în formă de pană sau 3—9-sectate, \pm alungit eliptice, dințate 34
- 34 a Toate frunzele tulpinale întregi, în formă de pană, la vârf subrotunde, \pm adânc crenat dințate. Frunze bazale mai mici. Sinul bazal închis, cu marginile tangente sau încălecate 12. **R. flabellifolius**
- 34 b Frunze tulpinale până la bază 3—9-sectate, cu segmente uneori semi-verticilate, \pm alungit eliptice, spre ambele capete \pm egal atenuate, pronunțat dințate, cele inferioare la mijloc late de 8—35 mm, sau

oblanceolate, atenuate spre bază în pețioluli lungi uneori până la 1—2 cm. Laciniile frunzelor supreme \pm întregi. Frunze bazale rotunde, late până la 10 cm. Sinul bazal deschis, cu margini paralele

11. *R. cassubicus*

Secția I. ALPESTRES (Prantl) Rapaics in Kert (1901) 393. — Subsect. *Epirotes* ser. *Alpestres* Prantl in Engl. Bot. Jahrb. XI (1888) 266.

Plante alpine și subalpine, cu flori albe și nucule cu suprafețe netede sau \pm netede.

1. *R. platanifolius* L. Mant. I (1767). — *R. aconitifolius* Auct. non L. — *Hecatonia aconitifolia* Schur Enum. pl. Transs. (1866) 13. — Exs.: FRE nr. 1242. — Ic.: Pl. 95, fig. 1.

2. Plantă înaltă de 10—130 cm, cu rizom scurt și rădăcini lungi, îngroșate. Tulpină erectă, ramificată, multifloră, de obicei glabră sau răzleț păroasă, cu frunze tulpinale sesile sau cele inferioare pețiolate, asemănătoare celor bazale. Frunze bazale lung pețiolate, aproape până la bază 3—7-palmatisectate cu segmente lat lanceolate, acuminate, inegal inciz dințate, uneori profund lobate, glabrescente. Peduncul și caliciu glabru. Flori albe, cu 5 petale ovale, lungi de cca 10 mm. Gropițe nectarifere bilabiate. Fructe nucule \pm globuloase, numai foarte slab turtite lateral, lungi de 2—5 mm, cu rostru foarte scurt, la vârf \pm curbat, cu laturi neînsemnat reticulate, așezate pe un receptacul alungit, păros. VI—VII.

Stațiunea. Prin locuri ierboase și stâncoase, din regiunea montană superioară până în regiunea subalpină.

Răsp. în țară: Reg. Baia Mare: Mții Rodnei: Pietrosul Mare, Izvorul Repede, V. Drăgușului. Reg. Cluj: Mții Tibleșului; Mții Rodnei: Puzdrele, Galați, Inău; Mții Bărgăului (Heniu); Poșaga pe Mt. Scărița (r. Turda). Reg. Aut. M.: Mții Călimani la Fața Gardului; Mții Gurghiului; Suseni pe «Csudálókő», Gheorghieni pe Mt. «Piricske»; Mții Giurgeului (Mt. «Öcsém»); Praid (r. Sângeorgiul de Pădure); Mții Harghita deasupra Com. Ciceu, Băile Harghita (r. Miercurea Ciuc). Reg. Stalin: Orașul Stalin pe Tâmpa, Predeal pe V. Râșnoavei, Mt. Piatra Craiului (Crăpătura); Mții Făgărașului: V. Viștea Mare, Urlea, Arpașul, Cascada Bălea, Scara, Surul; Râul Vadului pe Dl. Caprei (r. Sibiu); Mții Sibiului; Vulcan pe dealurile din împrejurimi (r. Sighișoara). Reg. Hunedoara: Mții Retezatului: V. Pietrilor, Pâr. Judele, Căldarea Zănoagii, Tăul Negru, Lacul Gemenea; Mții Parângului. Reg. Oradea: Mții Bihorului: Stâna de Vale, Cetățile Ponorului, V. Padeșului, V. Galbenă. Reg. Craiova: Mții Mehedinților (Gaura Mohorului); Mții Parângului. Reg. Pitești: Mții Făgărașului: Lespezi, Paltina, Jepii, Răiosul. Reg. Ploiești: Mții Bucegi: V. Izvorul Dorului. V. Peleșului, V. Babei, V. Urlătorilor, V. Jepilor, V. Cerbului. Reg. Bacău: Mții Oituzului (Nămira); Mții Tarcăului (Ciudamirul, Tărâhușul); Cheile Bicazului.

Răsp. gen.: Europa.

Obs. Această specie se aseamănă foarte mult cu *R. aconitifolius* L. Sp. pl. ed. I (1753) 551, care nu crește la noi, însă a fost de multe ori indicat. Deosebirea principală constă în

frunzele bazale care la *R. platanifolius* sunt adânc sectate, cu segmentele concrescute la bază, pe când la *R. aconitifolius* sunt sectate până la bază, iar segmentul mijlociu este atenuat într'un pețiol aparte, luând astfel o formă rombică.

2. **R. glaciális.** L. Sp. pl. ed. I (1753) 777. — *Oxygraphis vulgaris* Freyn in Flora LXX (1887) 141 L. Ovez. in Fl. U.R.S.S. VII (1937) 327, tab. XXXIV, fig. 2. — *Hecatonia glacialis* Schur Enum. pl. Transs. (1866) 12. — **Ic.:** Pl. 87, fig. 6.

4. Rizom vertical, gros, din care ies rădăcinile foarte lungi și numeroase. Tulpină relativ groasă, înaltă de 6—20 cm, unifloră sau ramificată, în total cu 2—4 flori. Frunze bazale 2—3, lung pețiolate, cu vagine late, membranoase. Limb rotund, de obicei trisectat până la bază, cu segmente pețiolate și, la exemplarele mari, din nou, de 3 sau mai multe ori sectate, cu segmente cărnoase, lanceolate, rotunjite sau obtuziuscule. Frunze tulpinale 1—3, asemănătoare, subsesile, cea supremă adeseori simplu trifidă. Intreaga plantă glabră, lucioasă, sau puțin păroasă, mai ales la vagine și ramificații. Flori mari, cu diametru de 15—30 mm, îndreptate în sus. Sepale 5, lungi de 6 mm, lat obovate, abundent și lung roșcat-brun păroase. Petale lungi de 8—14 mm și tot atât de late, brusc atenuate într'o unguiculă scurtă, de culoare albă-roză sau roșie-violetă, împreună cu caliciul persistente multă vreme și după înflorire. Stamine numeroase, galbene, mai scurte decât petalele. Nucule glabre, turtite, cu 2 aripi pe muchii și cu un rostru aproape drept, fin ascuțit. VII—IX.

Stațiunea. Pe grohotiș mărunț nisipos, crăpături de stânci, mai ales pe roci cristaline, în regiunea alpină.

Răsp. în țară: *Mții Rodnei*: Înău (2280 m), Corongiș (1900 m). *Mții Făgărașului*: Arpașul, Creasta Tărăța, Ucea Mare, Surul.

Variabilitatea speciei

f. albiflorus (Schur). — *Hecatonia glacialis* a. *albiflora* Schur Enum. pl. Transs. (1866) 13. — Flori albe. — *Mții Rodnei* (Corongiș).

Răsp. gen.: În munții înalți ai Spaniei, Alpi, Carpați, Europa de N, Groenlanda.

3. **R. alpestris** L. Sp. pl. ed. I (1753) 553. — *Hecatonia alpestris* et *H. Traunfellneri* Schur Enum. pl. Transs. (1866) 13. — **Ic.:** Pl. 87, fig. 5, 5a-c; Prod. Fl. II, ed. II (1939) 75, fig. 2.

4. Plante mici, înalte de 3—12 cm, cu rizom oblic și rădăcini fibroase. Tulpină cu mai multe frunze bazale și 1—2 frunze tulpinale mici, bractei-forme, unifloră, mai rar bifloră. Frunze bazale lung pețiolate, cu limb semi-

rotund sau reniform, adânc trifidat lobate, cu lobi rotunjiți și nervuri proeminente. Intreaga plantă glabră. Floarea curat albă, de 15—20 mm în diametru, cu 5 sepale albe verzui, membranoase, caduce, glabre, mai scurte decât petalele obcordate, albe. Stamine numeroase, cu mult mai scurte decât petalele. Nucule glabre, obovate sau aproape globuloase, umflate, lungi de 2 mm, cu un stil lung, drept, numai la vârf puțin îndoit. VI—IX.

Stațiunea. Pe locuri stâncoase din regiunea alpină, în munți calcaroși. Rară.

Răsp. în țară: *Mții Rodnei*: Corongiș. *Mții Bucegi*: Jepii Mici, V. Jepilor, V. Albă, V. Seacă din Caraiman, Coștila, V. Mălinului, Obârșia, Vf. Omul, Morarul, V. Mălăești. *Mții Bârsei*: Mt. Piatra Craiului. *Mții Făgărașului*: Arpașul.

Răsp. gen.: Alpi, Apenini, Pirinei, Carpați.

4. ***R. crenátus*** W. et K. Pl. rar. Hung. I (1802) 9, tab. 10. — *R. vaginatus* Somm. in *Flora XVI*. I (1833) 177. — *Hecatonia crenata* Schur Enum. pl. Transs. (1866) 13. — **Exs.:** FHE nr. 653; FRE nr. 768, — **Ic.:** Pl. 87, fig. 3; Pax Grundz. II (1908) 168, fig. 15 A-B; Hay. Pflzdecke. (1916) 438; W. et K. l.c.; Prod. Fl. II (1939) 523, fig. 2.

4. **Rizom** scurt, vertical, cu rădăcini lungi și numeroase, mai groase decât tulpina. Tulpină lungă de 5—12 (24) cm, cu o singură (rar 2) frunzișoară bractei f formă, lanceolată sau liniară, cu 1—2 flori și foarte rar cu 3 flori. Intreaga plantă glabră. Frunze bazale 2—3 sau mai multe, lung petiolate, cu vagină largă, alb membranoasă, care îmbrățișează baza tulpinii pe o distanță de 1—2 cm. Limb întreg, reniform sau rotund, uneori puțin oblong, cordat la bază, de jur împrejur obtuz seriat, cu dinți mărunți care se măresc treptat spre vârful frunzei. Flori late de 15—20 (25) mm, cu 5 sepale alungit ovate și 5 petale albe, lat obovate sau aproape rotunde, mai lungi decât sepalele. Stamine numeroase, mult mai scurte decât petalele. Apocarp ovat sau elipsoidal, cu numeroase nucule glabre, globuloase, abrupt atenuate într'un rostru aproape drept, puțin încârligat la vârf. VI—VIII.

Stațiunea. Prin locuri înierbate, nisipoase sau pietroase, în regiunea alpină, dela 1800 m în sus. Crește în grupe numeroase la marginea petecilor de zăpadă sau în locul lor după topire, pe sol șistos sau mai rar calcaros.

Răsp. în țară: *Mții Rodnei*: Pietrosul Mare, Fața Meselor, Știol, Vf. Repedea, Vf. Laptelui, Galați, Obârșia Rebri, Corongiș, Vf. Roșu, Vf. Puzdrelor, Mt. Cailor, Gărgălaș.

Plansa 90. — 1. *Ranunculus sceleratus* L., 1 a. apocarp mărit. — 2. *R. Thora* L. — 3. *R. lateriflorus* DC., 3 a. o nukulă mărită. — 4. *R. polyphyllus* W. et K. — 5. idem f. *submersus* Glück.



Chiș, Inău, Lacul Lala. *Mții Ciucașului*: Piroșca. *Mții Bârsei*: Piatra Mare, Postăvarul Piatra Craiului. *Mții Iezer-Păpușa*: Mt. Păpușa, Colții lui Andrei. *Mții Făgărașului*: Colții Brezii, Vf. Moșului, Vârtopelel, Lacul Urlea, Arpașul, Vânătoarea lui Buteanu, Lacul Bălea, V. Doamnei, Vf. Negoiu, Bârcaciu, Surul, Râiosul, Capra Budei, V. Zârnei la Scărișoara, *Mții Parângului*: Mândra. *Mții Retezatului*: Borăscu, Galbena, Tăul Negru. *Mții Mehedinților*: Cracul Micușului la Stâna Mare, Plaiul Oslei. *Mții Țarcu-Godeanu*: Godeanu.

Variabilitatea speciei

f. orbiculatus (Schur). — *Hecatonia cren. a. orbiculata* Schur Enum. pl. Transs. (1866) 13. — Frunze rotunde, \pm egal dințate, nelobate la vârf. — Împreună cu tipul.

f. vaginatus (Somm.). — *R. vaginatus* Somm. in Flora XVI. I (1833) 177, s.s. — *Hecatonia crenata* b. *major* Schur l.c. — Plantă mai mare, înaltă de 20—25 (30) cm, cu 2—4 flori. — Împreună cu tipul.

Răsp. gen.: Alpii de SE, Carpații din R.P.R., Balcani.

Secția II. XANTHOBATRACHIUM (Prantl) Ovcz. in Fl. U.R.S.S. VII (1937) 353. — Sect. *Marsypadenium* subsect. *Xanthobatrachium* Prantl in Engl. Bot. Jahrb. IX (1888) 266; Nat. Pflzfam. III. 2 (1891) 65. — Plante dimorfe, cu tulpini submerse în apă și frunze capilare așezate în verticil. Tulpini de uscat erecte, cu frunze eliptice, întregi sau trilobate, lung pețiolate. Flori \pm numeroase, lung pedunculate, abia de 3 mm în diametru.

5. **R. polyphyllus** W. et K. Pl. rar. Hung. I (1802) 44, tab. 45; Ovcz. in Fl. U.R.S.S. VII (1937) 359. — Exs.: FRE nr. 441. — Ic.: Pl. 90, fig. 4,5; W. et K. l.c.; Prod. Fl. II, ed. II (1932) 363.

4. Plantă polimorfă. Tulpinile de uscat lungi de cca 5—10 cm, ramificate și terminate cu câte o floare. Frunze bazale numeroase, lung pețiolate, eliptice sau îngust oblongi, până la 5 mm lungime, întregi sau trifidate, uneori adânc 3-lobate, glabre, cele superioare întregi, îngust liniare, aproape sesile. Tulpinile submerse până la 80 cm lungime, cu numeroase verticile compuse din 2 feluri de frunze; unele asemănătoare celor aeriene, însă foarte lung pețiolate și cu lamină redusă, altele sesile și îngust laciniate, capilare, mult mai scurte decât cele pețiolate și decât internodiile. Flori lung pedunculate, galbene, de 3—6 mm în diametru. Petale lungi de 2—3 mm. Florile laterale uneori 3-mere. Nucule globuloase, puține, grupate într'un apocarp IV—V.

Stațiunea. În locuri mocirloase, mlaștini puțin secate.

Răsp. în țară: Reg. Baia Mare: Satu Mare. Reg. Hunedoara: Alba Iulia; Deva (stațiuni nesigure). Reg. București: Periș (r. Căciulați); Comana la Padina lui Vasile (r. Vidra). Reg. Iași: Cristești (r. Iași).

Variabilitatea speciei

f. terrestris Glück Untersuch. Wassergew. IV (1924) 653. — Plante aeriene, numai cu frunze eliptice sau îngust oblongi, cu margini întregi sau ici-colo lobate. — Formă de uscat.

f. *submersus* Glück l.c. — Plantă în partea submersă cu internodii lungi și frunze de 2 feluri; unele lung pețiolate, cu lamină foarte redusă, altele sesile, capilar laciniate. În partea aeriană, frunzele sunt ca la f. *terrestris*.

Răsp. gen.: Europa centrală, U.R.S.S. de S.

Secția III. FLAMMULA Webb ex Spach Hist. vég. Phan. VII (1839) 208.

Tulpină decumbentă, ascendentă sau erectă, radicanță la noduri. Frunze simple, lanceolate sau liniare.

6. **R. Lingua** L. Sp. pl. ed. I (1753) 549; Ovcz. in Fl. U.R.S.S. VII (1937) 362. — Exs.: FRE nr. 779. — Ic.: Pl. 91, fig. 1, 1a.

4. Rizom foarte lung. Tulpină erectă, dreaptă, înaltă de 50—150 cm, fistuloasă, în partea inferioară groasă, la mai multe noduri cu numeroase rădăcini fibroase. Toate frunzele de aceeași formă, liniar lanceolate, de 10—20 cm lungime, cu pețoli foarte scurți, la vârf fin acuminate, întregi sau mărunț denticulate. Intreaga plantă glabră sau \pm păroasă, în partea superioară ramificată, ramurile terminându-se cu câte o floare. Flori mari, de 2,5—4 cm în diametru. Sepale lat obovate. Petale de 1—2 cm lungime, de 2 ori mai lungi decât sepalele, galbene-aurii, lucioase, aproape rotunde, foarte scurt unguiculate, cu o gropiță nectariferă, acoperită cu o sevă scurtă. Apocarp globulos, cu nucule numeroase, glabre, puțin turtite și muchiate, cu rostru gros, slab curbat la vârf. Receptacul glabru. VI—VII.


Stațiunea. În mlaștini, marginea bălților, în trestiișuri, locuri umede, destul de frecventă.

Răsp. în țară: Reg. Cluj: Cluj, Apahida; Turda; Aiud; Cucerdea (r. Luduș). Reg. Aut. M.: Tg. Mureș, Ungheni, Sângeorgiul de Mureș; Simionesti (r. Miercurea Ciuc). Reg. Stalin: Tapu (r. Mediaș); Saeș (r. Sighișoara); Rupea; Hărman (r. Stalin); Cislădie, Ocna Sibiului; între Avrig și Făgăraș. Reg. Hunedoara: Sebeș; Bretea Română (r. Hațeg). Reg. Timișoara: citată de Heuffel din « Banat ». Reg. București: București; Ghimpați (r. Mihăilești); Tâncăbești în bălțile Cocioc (r. Căciulați); Mrea Cernica (r. Brănești); Comana (r. Vidra). Reg. Constanța: Cernavoda, Medgidia. Reg. Galați: Tulcea; Galați (Lacul Brateș). Reg. Bacău: Ocea, Timișești (r. Tg. Neamț). Reg. Iași: Iași, Cristești. Reg. Suceava: Fălticeni; Bosanci (r. Suceava); Stâncă-Ștefănești (r. Trușești).

Variabilitatea speciei

f. *glabratus* (Wallr.). — *R. lingua* α . *glabratus* Wallr. Schedul. crit. I (1822) 288. — *R. lingua* α . *typicus* Beck Fl. NÖ I (1890) 416. — Intreaga plantă glabră sau aproape glabră. Cea mai frecventă formă.

Planșa 91. — 1. *Ranunculus Lingua* L., 1a. partea radicanță a tulpinii. — 2. *R. ophioglossifolius* Vill. — 3. *R. Flammula* L. — 4. idem, f. *tenuifolius* (Wallr.) Prod. — 5. idem, f. *serratus* (DC.) Prod.



f. *hirsútus* (Wallr.). Nyár. Kv. fl. III (1942) 223. — *R. lingua* β . *hirsutus* Wallr. Schedul. crit. l.c. — Tulpina, frunzele și sepalele adpres păroase. — *Reg. Cluj*: Apahida (r. Cluj). Citată de Borza (Consp.) din «Muntenia».

Răsp. gen.: Eurasia.

7. *R. Flámmulá* L. Sp. pl. ed. I (1753) 548; Ovez. in Fl. U.R.S.S. VII (1937) 363. — Ic.: Pl. 91, fig. 3–5.

24. Rizom scurt, vertical, cu rădăcini abundente, fibroase, cu sau fără stoloni. Tulpină înaltă de 20–50 cm, ramificată, erectă, sau arcuit ascendentă, radicanță, adesea procumbentă, temporar plutitoare în apă, de obicei glabră. Frunze bazale lung pețiolate, cu limb cordat, ovat, pe margini întregi, cele tulpinale eliptic lanceolate, îngust lanceolate până la liniare, sesile, cu margini întregi sau ușor dințate, ascuțite, glabre. Flori mai multe, cu diametru de 10–20 mm, rar mai mici, cu 5 sepale ovate, patente sau puțin răsfrânte și 5 petale lat obovate, lungi de 3–6 mm, scurt unguiculate, cu o gropiță nectariferă acoperită. Apocarp cu receptacul glabru. Nucule ovate, lungi de 1,5–1,8 mm, glabre, muchiate, cu un rostru foarte scurt. VI–IX.

Stațiunea. In livezi umede, apătoase și pe nămol umed.

Răsp. în țară: *Reg. Baia Mare*: Vișeu de Sus, Petrova; Arded (r. Satu Mare). *Reg. Cluj*: Rodna, Nimigea de Jos (r. Năsăud); Țaga, Sucutard (r. Gherla); Turda; Vidra de Jos, Vidra de Sus, Scărișoara, Albac (r. Câmpeni). *Reg. Aut. M.*: Bălan (r. Gheorghieni), Mt. «Öcsém», Racul, Băile Harghita, Sânmartin (r. Miercurea Ciuc); Căpâlnița (r. Odorhei); Reci (r. Sf. Gheorghe); Covasna (r. Tg. Săcuesc). *Reg. Stalin*: Arpașul, Scorei (r. Făgăraș); Porumbacul de Jos, Porumbacul de Sus, Avrig, Turnișor, Sibiu. *Reg. Hunedoara*: Vințul de Jos (r. Alba Iulia); V. Secașului (r. Sebeș); Baia de Criș (r. Brad); Bățălari (r. Hunedoara); Râul de Mori (r. Hațeg). *Reg. Oradea*: Ciucea, Valea Drăganului (r. Aleșd); Poeni (r. Beiuș). *Reg. Arad*: Șoimuș (r. Lipova). *Reg. Timișoara*: indicată de Heuffel din «Banat». *Reg. Craiova*: Tg. Jiu. *Reg. Pitești*: Slatina la Păd. dinspre Mrea Strihareț. *Reg. Constanța*: Cernavoda, Medgidia. *Reg. Iași*: V. Bahluiului, malul Prutului (r. Iași). *Reg. Suceava*: între Lozna și Dersca (r. Dorohoi); Coșna (r. Vatra Dornei).

Variabilitatea speciei

ssp. *Flámmula* (L.) Schinz et Kell. Fl. Schw. II (1905) 77. — *R. Flamm.* L. l.c. s.s.

Tulpină \pm erectă sau ascendentă, radicanță numai la nodurile inferioare sau neradicantă.

f. *eréctus* (Neilr.). — *R. flamm.* α . *erectus* Neilr. Fl. NÖ (1859) 686. — *R. flamm.* α *ty picus* Beck Fl. NÖ I (1890) 416. — Tulpină erectă, cu frunze întregi sau neînsemnat serate, glabre. Cea mai comună formă.

f. *altíssimus* (Schur). — *R. Flamm.* α . *altissimus* Schur Enum. pl. Transs. (1866) 14. — Tulpină înaltă până la 62 cm, ramificată în partea superioară, cu frunze întregi. *Reg. Sibiu*: prin șanțuri la Sibiu.

f. pilifer (Beck) Borza Consp. Fl. Rom. I (1947) 102. — *R. flamm.* β *pilifer* Beck. l.c. — Plantă delicată, sveltă, erectă, în partea superioară \pm dens și rigid păroasă. — *Reg. Oradea* (Borza Consp.).

f. serrátus (DC.) Prod. Fl. det. pl. Rom. I, ed. I (1923) 435. — *R. Flamm.* β *serrata* DC. Syst. I (1818) 247; Prodr. I (1824) 32. — *R. Flamm.* b. *dentatus* Schur et c. *ophioglossoides* Schur Enum. pl. Transs. (1866) 14. — **Ic.:** Pl. 91, fig. 5. — Tulpină erectă, ramificată, cu frunze \pm grosolan dințate. — *Reg. Baia Mare:* Carei, Foeni; Mții Țibleșului în V. Minghetului (r. Tg. Lăpușului). *Reg. Aut. M.:* Izvorul Mureșului (r. Gheorghieni); Băile Homorod (r. Odorhei).

f. tenuifolius (Wallr.). — *R. Flamm.* δ *tenuifolius* Wallr. Schedul. crit. I (1882) 289. — **Ic.:** Pl. 91, fig. 4. — Tulpină \pm repentă, radicanță, în partea superioară ascendentă. Frunze lanceolate, până la 5 mm lățime. — *Reg. Baia Mare:* Mții Țibleșului în V. Minghetului (r. Tg. Lăpușului). *Reg. Aut. M.:* Bălan (r. Gheorghieni); Reci (r. Sf. Gheorghe). *Reg. Stalin:* Răcoșul de Jos (r. Rupea); Sibiu. *Reg. Oradea:* Aleșd, Poiana Râmetului pe V. Iadului.

ssp. **reptans** (L.) Schinz et Kell. Fl. Schw. II (1905) 77. — *R. rept.* L. Sp. pl. ed. I (1753) 549, non Auct., Ovez. in Fl. U.R.S.S. VII (1937) 364.

Tulpină filiformă, repentă în întreaga lungime. Frunze liniar lanceolate, întregi. Flori mici, până la 5 mm diametru.

Reg. Stalin: Răcoșul de Jos lângă Râul Olt (r. Rupea). *Reg. Iași:* pe malul Prutului și al Bahluiului (r. Iași).

f. subdentátus (Schur). — *R. reptans* b. *subdentatus* Schur. l.c. (1866) 15. — Frunze spatulat oblongi, neînsemnat dințate. Flori mai mari. — *Reg. Baia Mare:* Mții Țibleșului în V. Minghetului (r. Tg. Lăpușului).

Răsp. gen.: Eurasia.

8. R. ophioglossifolius Vill. Hist. pl. Dauph. III (1789) 731; Ovez. in Fl. U.R.S.S. VII (1937) 368. — **Exs.:** FRE nr. 2669. — **Ic.:** Pl. 91, fig. 2.

○ — 4. Plantă asemănătoare cu *R. Flammula*. Tulpină de 30–50 cm înălțime, erectă sau ascendentă, flexuoasă, glabră sau alipit păroasă. Frunze bazale cordate, lat ovate, lung pețiolate, cele tulpinale inferioare pețiolate, \pm lat eliptice, întregi sau \pm neînsemnat dințate, cele mijlocii și superioare lanceolate sau îngust lanceolate, până la liniare, pe ambele fețe cu peri alipiți, cuneat atenuate într'un pețiol \pm scurt, la bază cu o vagină membranoasă pe margini, amplexicaulă. Flori mari, multe, galbene-aurii, de 12–15 mm în diametru. Sepale obovate, lat membranos marginate, pe dos adpres păroase. Petale mai lungi, lat obovate. Apocarp globulos, cu receptacul obovat sau \pm globulos, glabru. Nucule de 1 mm lungime, puțin turtite, verde carenate, pe ambele fețe verucoase. Rostru conic, foarte scurt. IV–VII.

Stațiunea. În locuri ierboase umede, mlăștinoase. Foarte rară la noi.

Răsp. în țară: *Reg. Baia Mare:* Satu Mare. — *Reg. Timișoara:* Mții Țarcu-Godeanu: Mt. Baicu în lacul subalpin «Ciungi».

Răsp. gen.: Euro, a de S și V, Asia de SV.

Secția IV. AURICOMUS Spach Hist. vég. Phan. VII (1839) 210.

Plante glabre sau glabrescente, cu frunze bazale lung pețiolate, rotunde sau reniforme, întregi sau palmatisectate. Frunze tulpinale sesile, adânc sectate, rar întregi, deosebite de cele bazale. Nucule pubescente sau catifelte, cu un rostru subțire, încârligat.

9. *R. binátus* Kit. in Rechb. Fl. germ. exc. III (1832) 723. — *R. auric.* Rechb. Ic. Fl. germ. IV (1840) 11, tab. XII, fig. 4599 sin. super, non e diagnosi. — Exs.: FRE nr. 771 sub *R. auric. f. binato*. — Ic.: Pl. 92, fig. 4, 4a; Nyár. in Bul. Grăd. Bot. Cluj. I. c. (1933) 87, fig. 1 et Kv. fl. III (1942) 230, fig. 31, nr. 2.

24. Plantă gracilă, glabră sau slab pubescentă, cu tulpină subțire, înaltă de 15–30 (35) cm, cu rizom vertical scurt și rădăcini fibroase numeroase, pe colet adeseori cu rămășițele fibroase ale pețiolilor din anul trecut. Frunze bazale 2–5, lung pețiolate. Limb reniform cordat, cu sinul bazal larg deschis, cu margini divergente, de obicei lat de 1,5–3 (5) cm. Unele frunze trisectate până la $1/2 - 3/4$ parte, cu segmentele laterale, uneori și cele mijlocii, din nou sectate, frunza având astfel 5–11 lacinii întregi sau \pm dințate (Pl. 92, fig. 4, 4a). Uneori, pe lângă frunzele divizate, se mai găsesc și 1–2 frunze bazale întregi. Tulpină ramificată dela nodurile superioare, cu frunze tulpinale sectate până la bază, cu 3–9 lacinii îngust lanceolate până la liniare, cu margini aproape paralele, toate întregi, uneori semiverticilate. Flori de 1,5–2 cm în diam. Caliciu cu 5 sepale lat eliptice, în formă de luntre, membranos marginate. Petale mai lungi decât caliciul. Stamine numeroase, cu antere liniare, atenuate treptat în filament. Apocarp ovat, cu receptacul scurt și des păros. Nucule păroase, cu laturi convexe și muchii abia accentuate, lungi de cca 3 mm, cu un rostru încovoiat. V–VI.

Stațiunea. Livezi, locuri ierboase, puțin umede, păduri luminoase.

Răsp. în țară: *Reg. Baia Mare*: Foeni, Urziceni (r. Carei). *Reg. Cluj*: Năsăud, Mții Rodnei (Corongiș, Păltiniș, Saca, Gaura sub Inău, Beneș); Zalău; Cluj, Gheorgheni, între Căpușul Mare și Căpușul Mic, Dângăul Mic; Călata pe Dl. Chicera (r. Huedin); Bonțida (r. Gherla). *Reg. Aut. M.*: Tg. Mureș; Iernuțeni, Petelea (r. Reghin); Sovata; Joseni (r. Gheorghieni); Mții Hargita pe V. Mădărașul Mare și V. Mădărașul Mic, Sâncrăieni, Miercurea Ciuc; Zetea (r. Odorhei). *Reg. Stalin*: Orașul Stalin; Sibiu. *Reg. Timișoara*: indicată de Heuffel din « Banat ». *Reg. Iași*: Păd. Bârnova, Dl. Repedea (r. Iași).

Variabilitatea speciei

f. *apétalus* (Schur). — *R. binatus* a. *apetalus* Schur Enum. pl. Transs. (1866) 23. — Flor lipsite de petale. — Sibiu.

Răsp. gen.: Europa.

10. *R. auricomus* L. Sp. pl. ed. I (1753) 551; Ovez. in Fl. U.R.S.S. VII (1937) 377. — *R. auric. a. R. reniformis* Kitt. Taschenb. Fl. Deutschl. II, ed. II (1844) 773. — Exs.: FRE nr. 770, a-c. p.p. — Ic.: Pl. 92, fig. 3; Nyár in Bul. Grăd. Bot. Cluj. XII (1933) 87, fig. 2, et Kv. fl. III (1942) 230, fig. 31, nr. 1.

4. Plantă înaltă de 15—50 cm, cu rizom scurt, vertical, cu rădăcini fibroase foarte numeroase, la colet adeseori cu resturile fibroase ale frunzelor vechi. Frunze bazale 1—3, lung pețiolate, cu limb rotund, cordat sau reniform, mici sau mijlocii, late de 2—5,5 cm, cu sinul bazal larg deschis, de obicei nedivizate, de jur împrejur dens și mărunț sau mai dur dințate, adeseori la vârf cu 1—3 dinți mai mari, glabre sau \pm pubescente. Tulpina cu 1—3 ramuri, sub ramuri cu frunze tulpinale sectate până la bază, cu lacinii (segmente) \pm semiverticilate sau ieșind dintr'o vagină comună, oblanceolate sau lanceolate, atenuate spre bază sau liniare, decrescente; cele dela frunzele inferioare adeseori cu 3—mulți dinți, uneori dințate numai unilateral, cele dela frunzele superioare cu margini \pm întregi. Uneori sub floare se află frunze bracteante, cuneiforme, trilobate sau trisectate, rareori întregi. Peduncul alungit, adpres păros. Flori de 1,5—2 cm în diam. Sepale 5, lat eliptice, în formă de luntre, membranos marginate, păroase. Petale mai lungi decât caliciul, câteodată lipsesc, sau se desvoltă numai 1—3. Stamine numeroase, cu antere liniare, atenuate treptat în filament. Apocarp ovat, cu receptacul scurt și îndesuit păros. Nucule lungi de cca 3 mm, păroase, cu laturi convexe, muchii abia accentuate și rostru încovoiat. IV—VI.

Stațiunea. În livezi și locuri ierboase, păduri luminoase, în regiunea de câmpie și montană.

Răsp. în țară: Reg. *Bia Mure*: Arded (r. Satu Mare); Carei. Reg. *Cluj*: Mții Rodnei (Corongiș), Sângeorz-Băi (r. Năsăud); Unguraș, Olpret (r. Dej); Zalău; Stâna (r. Huedin); Cluj, Boj. Căian, Corpadea, Cojocna, Căpușul Mic; Inău, Iclod, Bonțida, Sânțejude Puini, Țaga, Sucutard, Mureșenii de Câmp, Nicula, Dăbâca (r. Gherla); Silvașul de Câmpie (r. Sărmășel); Ciurila pe Dl. Arini, Săliște, Cheia Turzii (r. Turda); Aiud; Abrud pe Mt Vulcan (r. Câmpeni). Reg. *Au. M.*: Tg. Mureș; Borsec. Reg. *Stalin*: Bazna (r. Mediaș); Predeal (r. Stalin). Reg. *Hunedoara*: Mții Retezatului (Mormântul Fetei spre Radeș). Reg. *Oradea*: Oradea; între Valea lui Mihai și Curtuișeni (r. Săcuieni). Reg. *Timișoara*: Băile Herculane. pe Mt. Domogled, Tisovița, Plavișevița, Cazane (r. Mehadia); Timișoara. Reg. *Craiova*: Tr. Severin, Cerneti, Tg. Jiu, Mții Parângului (Gruia); Craiova, Molleni. Reg. *Pitești*: Pitești Conțești, Câmpulung. Reg. *Plocești*: Gara Prahova; Câmpina; V. Nișcovului (r. Buzău). Reg. *București*: București; Buftea, Ciocănești (r. Răcari); Periș (r. Căciulați); Comana (r. Vidra). Reg. *Galați*: Galați. Reg. *Bârlad*: Drăgănești (r. Tecuci); Podu Turcului (r. Răchitoasa). Reg.

Planșa 92. — 1. *Ranunculus cassubicus* L., 1a. apocarp. — 2. *R. flabellifolius* Heuff. — 3. *R. auricomus* L. — 4. *R. binatus* Kit., 4a. rozetă de frunze bazale.



L.

Bacău: Piatra Neamț; Mt. Ceahlău; Agapia (r. Tg. Neamț). *Reg. Iași*: Vaslui, Bălteni; Iași, Bucium, Nițelea, Cristești, Dl. Repede. *Reg. Suceava*: Botoșani; Suceava; Coșna (r. Vatra Dornei).

Variabilitatea speciei

f. apétalus (Wallr.). — *R. auric.* var. *apetala* Wallr. ap. Wimm. et Grab. Fl. Siles, I. 2 (1829) 129. — *R. auric.* d. *praecox* Schur Enum. pl. Transs. (1866) 23. — Flori fără petale, cu sepale galbene. — Frecventă.

f. imperfēctus Nyár. Kv. fl. III (1942) 232, c. diagn. hung. et in Bul. șt. Acad. R.P.R. Sect. Șt. biol. tom. III, nr. 1 (1951) 30. — Flori incomplete, numai cu 1–3 petale. — Cluj.

f. normālis Nyár l.c. — Flori cu petale bine dezvoltate. — Cluj.

f. fissus Nyár. in Bul. Grăd. Bot. Cluj XIII (1933) 99, fig. 16, nr. 4, 5, c. diagn. rom. et Kv. fl. 233, fig. 35, nr. 4, 5, c. diagn. hung. ex A. Nyár. in Add. pag. 686. — Frunze tulpinale cu segmente \pm lung fidate. — Cluj.

f. alpinus (Schur). — *R. auric.* a. *alpinus* Schur l.c. 23. — Plantă gracilă, unifloră. — Mții Făgărașului.

Răsp. gen.: Europa de S și V, Asia de SV.

11. *R. cassubicus* L. Sp. pl. ed. I (1753) 551; Ovez, in Fl. U.R.S.S. VII (1937) 379. — Exs.: FRE nr. 773. — *le.*: Pl. 92, fig. 1; Nyár. in Bul. Grăd. Bot. Cluj XIII (1933) 88, fig. 3, Kv. fl. III (1942) 223, fig. 31, nr. 3.

4. Plantă viguroasă, cu rizom vertical și rădăcini fibroase lungi, foarte abundente, la colet cu rămășițele fibroase ale pețiolilor din anii trecuți și o vagină ovat lanceolată, albă, membranoasă. Tulpină înaltă de 20–60 cm, de obicei ramificată la 2–3 noduri superioare, cu ramurile uneori din nou ramificate. Frunze bazale 1–2, de obicei nedivizate, lung pețiolate, rotunde, late până la 10 cm, adânc cordate, de jur împrejur adânc dințate sau crenate, glabre, în tinerețe pubescente, \pm pielose; sinul bazal cu margini paralele sau \pm tangente. Frunze tulpinale sesile, până la bază 3–9-sectate, cu segmente de obicei semiverticilate, \pm alungite eliptice, spre ambele capete \pm egal atenuate, pronunțat dințate, cele inferioare la mijloc late de 8–35 mm sau oblanceolate, atenuate uneori spre bază într'un pețiol de 1–2 cm lungime și inegal dințate, câteodată cu dinți foarte lungi; laciniile frunzelor supreme \pm întregi. Flori mari, aurii lucioase, late de cca 3–3,5 cm. Sepale 5, obovate, \pm membranoase, pubescente, lungi de cca 7 mm. Stamine numeroase, mai lungi decât ovarul. Petale 5, lat obovate sau aproape rotunde, de 2 ori mai lungi decât caliciul. Apocarp ovat sau scurt cilindric, cu receptacul des pubescent. Nucule ovat rotunde, pe ambele fețe bombate, fin păroase, cu un rostru subțire, încovoiat. IV–VI.

Stațiunea. In tufișuri, păduri luminoase, zăvoaie umede, pe soluri bogate în humus.

Răsp. în țară: *Reg. Baia Mare*: Arded (r. Satu Mare); Carei. *Reg. Cluj*: Rodna, Năsăud, Valea Vinului; Bistrița; Dej, Olpret, Canciu; Zalău în Mții Meseșului; Stâna (r. Huedin); Someșeni, Feiurdeni, Corpadea, Cojocna (r. Cluj); Bontida, Ineu, Sicu, Mintiul Gherlii, Țop (r. Gherla); Cheia Turzii; Aiud. *Reg. Aut. M.*: Sovata (r. Sângeorgiul de Pădure); Zagon (r. Tg. Săcuesc). *Reg. Stalin*: Blaj; Sighișoara; Zizin (V. Zizinului), Timișul de Jos, Mt. Postăvarul (r. Stalin); Sibiu, Gușterița, Noul, Șura Mare, Cisnădie, Cisnădioara pe Mt. « Götzenberg ». *Reg. Oradea*: între Valea lui Mihai și Curtuișeni (r. Săcuieni); Stâna de Vale (r. Aleșd). *Reg. Timișoara*: indicată de Heuffel din « Banat ». *Reg. Ploesti*: Sinaia. *Reg. București*: București în mlaștinile de sub cimitirul Belu. *Reg. Constanța*: Babadag (Păd. Babadag). *Reg. Galați*: Mrea Cilic (r. Tulcea.) *Reg. Bacău*: Câmpeni (r. Moinești); Sărata pe Dl. Balaurlui (r. Piatra Neamț); Petricani (r. Tg. Neamț). *Reg. Iași*: Iași (Păd. Bărnova), Păd. Repedea. *Reg. Suceava*: Suceava (Păd. Dragomirna).

Variabilitatea speciei

f. *normalis* Nyár. Kv. fl. III (1942) 232, c. diagn. hung. et in Bul. șt. Acad. R.P.R. Sect. șt. biol. tom. III, nr. 1 (1951) 30. — Flori cu petale mari, bine dezvoltate. — Cluj; V. Timișului (r. Stalin).

f. *paluster* (Rikli) Borza Consp. Fl. Rom. I (1947) 103. — *R. cassub.* var. *paluster* Rikli ap. Hegi Fl. Mitt. - Eur. III (1912) 568. — *R. cassub.* f. *imperfectus* Nyár. et f. *apetalus* Nyár l. c., p.p. — Flori fără petale sau cu petale incomplet dezvoltate. — Cluj; citată de Borza Consp. l.c.) din « Bihor ».

f. *plebejus* (Fries) Borza l.c. — *R. cassub.* var. *plebejus* Fries ap. Hegi l.c. 103. — Plantă mai scundă, cu frunze mai delicate. — Citată de Borza (Consp. l.c.) din « Bihor ».

f. *stipitatus* Nyár. in Bul. Grăd. Bot. Cluj XIII (1933) 99, fig. 16, nr. 3, c. diagn. rom. et Kv. fl. 233, fig. 35, nr. 3, c. diagn. hung., ex. A. Nyár. in Add. pag. 686. — Segmentele frunzelor tulpinale, îndeosebi cele inferioare, obovate, abrupt îngustate spre bază într'un pețiol ± lung. — Cluj.

f. *crenatus* Nyár. l.c. (1933) 100, fig. 16, nr. 3, et Kv. fl. 233, fig. 35, nr. 3, c. diagn. hung. — Segmentele frunzelor tulpinale inferioare obovate, cu margini crenate. — Cluj.

f. *vaginaceus* Nyár. l.c. (1933) 99, fig. 16, nr. 2, c. diagn. rom. et Kv. fl. 233, fig. 35, nr. 2, c. diagn. hung. — Baza segmentelor dela frunzele tulpinale unite într'o vagină ± lungă și ± membranacee, înconjurând tulpina. — Cluj.

f. *longidentatus* Nyár l.c. (1933) 99, fig. 16 nr. 1, c. diagn. rom. et Kv. fl. 233, fig. 35, nr. 1, c. diagn. hung. — Dinții segmentelor dela frunzele tulpinale de 2—3 ori mai lungi decât lați. — Cluj.

f. *fissus* Nyár l.c. (1933) 99, fig. 16, nr. 5, c. diagn. rom. et Kv. fl. 233, fig. 35, nr. 4, 5, c. diagn. hung., ex A. Nyár. in Add. pag. 687. — Dinții segmentelor dela frunzele tulpinale ± lungi, fidați. — Cluj.

f. *acuminatus* Nyár l.c. (1933) 99, c. diagn. rom. et Kv. fl. 233, c. diagn. hung. ex A. Nyár. in Add. pag. 687. — Segmentele frunzelor tulpinale lung acuminate. — Cluj.

Răsp. gen.: Europa.

Planșa 93. — 1. × *Ranunculus variifolius* (Schur). — 2. × *R. variifolius* var. *sibiricus* (Glehn). — 3. × *R. fallax* (W. et Gr.) — 4. × *R. fallax* var. *incisifolius* (Rchb.). — 5. × *R. silvicolus* (W. et Gr.) — 6. × *R. silvicolus* var. *diversifolius* (Schur).



12. *R. flabellifolius* Heuff. in Rechb. Fl. germ. exc. III (1832) 723. — *R. flabellifolius* α. *integer* Heuff. Enum. pl. Banat. in Verh. ZBG Wien VIII (1858) 43, Sep. pag. 8. — *R. cassub.* var. *flabellifolius* Borza Consp. Fl. Rom. I (1947) 103. — Ic.: Pl. 92, fig. 2; Nyár in Bul. Grăd. Bot. Cluj XIII (1933) 89, fig. 4 et Kv. fl. III (1942) 220, fig. 31, nr. 4. — Exs.: FRE nr. 169, p.p.

4. Plantă înaltă de 20–30 cm, cu rizom vertical și rădăcini fibroase, numeroase, în partea superioară ramificate. Frunze bazale lung pețiolate, cu limb rotund, adânc cordat, crenat dințate, glabrescente; sinul bazal închis, cu marginile tangente sau încălecate. Frunzele tulpinale așezate la ramificațiuni, nedivizate, cuneiforme, cu margini întregi, la vârf subrotunde, ± adânc crenat dințate, cele inferioare uneori în formă de evantai deschis, ± adânc divizate și dințate. Flori de mărime mijlocie, împreună cu fructele, asemănătoare celor dela *R. cassubicus*. IV–VI.

Stațiunea. Prin tufișuri și păduri, pe dealurile calcaroase din Banat.

Răsp. în țară: Reg. Timișoara: Carașova (r. Reșița); Oravița; Prigor, Plavișevita (r. Mehadia).

Răsp. gen.: Endemică în R.P.R.

Hibrizii din Secția « Auricomus »

- 1 a Frunze bazale rotunde, dințate, nedivizate 2
- 1 b Cel puțin 1–2 frunze bazale ± adânc sectate 4
- 2 a Laciniile frunzelor tulpinale ± uniforme, toate libere până la bază
× *R. fallax*
- 2 b Laciniile frunzelor tulpinale ± concrescute, de obicei în grupe de 2–3,
foarte late 3
- 3 a Plantă viguroasă, cu tulpina groasă. Frunza bazală cu lamină mare,
cordată, cele tulpinale cu laciniile libere evident lățite la mijloc
× *R. alliariifolius*
- 3 b Plantă debilă, cu tulpină subțire. Lamina frunzei bazale mai mică,
rotundă, mai deschis cordată. Laciniile libere ale frunzelor tulpinale mai
înguste, cu margini ± paralele × *R. auricomoides*
- 4 a Laciniile frunzelor tulpinale late, ± concrescute în 2–3 grupe
× *R. ambiguus*
- 4 b Laciniile frunzelor tulpinale libere, ± uniforme 5
- 5 a Plantă debilă. Frunzele bazale cu lamină mică, cele tulpinale cu lacinii
înguste, cu margini ± paralele, nedințate sau cu puțini dinți
× *R. variifolius*
- 5 b Plante mai viguroase. Frunzele bazale cu lamină mai mare, cele tulpi-
nale cu lacinii late la mijloc, îngustate spre ambele capete, pronunțat
dințate × *R. silvicolus*

× *R. fallax* (Wimm. et Grab.) = *auricomus* × *cassubicus*. — *R. auric. e fallax* Wimm. et Grab. Fl. Siles. I. 2 (1829) 128. — *R. auric. d. grandifolius* Schur Enum. pl. Transs. (1866) 23. — *R. cassubicus-auricomus* Schill. in MTE XXXV (1917) 424. — *R. auric. var. variifolius* Borza in Sched. ad FRE nr. 7 2 in Bul. Grăd. Bot. Cluj VIII (1928) 112, p.p. — *R. cassub. var. pinguior* Borza Consp. Fl. Rom. I (1947) 103. — Exs.: FRE nr. 772, p.p., 773. — Ic.: Pl. 93, fig. 3; Nyár. in Bul. Grăd. Bot. Cluj XIII (1933) 93, fig. 7 et Kv. fl. 231, fig. 32, nr. 7, sub *R. cassubico-auricomus*.

Frunze bazale rotunde, dințate dar nedivizate. Laciniile frunzelor tulpinale ± uniforme, mult lățite la mijloc, des dințate, toate libere până la bază. Flori adesea foarte mari. Prin laciniile mari, late, ale frunzelor tulpinale, dințatura mai deasă și florile adesea foarte mari, se aseamănă cu *R. cassubicus*. Unele exemplare se aseamănă cu *R. auricomus* prin laciniile mai înguste, dințatura mai rară și florile de dimensiuni mijlocii.

Reg. Baia Mare: Foeni (r. Carei). *Reg. Cluj*: Unguraș, Olpret (r. Dej); Nicula, Bontida, Sicu (r. Gherla); Cluj (Hajongard, Păd. Făget), Feiurdeni; Ciurila pe Dl. Peana și Dl. Arini (r. Turda); Aiud; Abrud. *Reg. Aut. M.*: Tg. Mureș; Sovata pe Dl. «Bekecs». *Reg. Stalin*: Mănărade (r. Mediaș); V. Timișului sub Predeal (r. Stalin); Mții Făgărașului (Arpașul). *Reg. Iași*: Păd. Strunga (r. Iași). *Reg. Suceava*: Pătrăuți (r. Suceava).

var. incisifolius (Rchb.). — *R. auricomus var. incisifolia* Rchb. Ic. Fl. germ. IV (1840) 11, tab. 12, fig. 4599, sin. inf. — *R. auricomus-cassubicus* Schill. l.c. 424. — *R. cassubicus var. incisifolius* Borza l.c. 103. — Ic.: Pl. 93, fig. 4; Nyár. in Bul. Grăd. Bot. Cluj l.c. 93, fig. 7 et Kv. fl. l. c. fig. 32, nr. 8, sub *R. auricomus-cassubicus*. — Laciniile frunzelor tulpinale ± lanceolate, la mijloc mai puțin lățite, mai rar dințate, uneori cu margini aproape întregi. Flori de mărime mijlocie. — *Reg. Cluj*: Rodna, Valea Vinului pe Dl. Popii (r. Năsăud); Chiochiș (r. Beclean); Olpret (r. Dej); Nicula, Ineu, Sicu, Iclod (r. Gherla); Cluj; Ciurilă, Săliște, Cheia Turzii (r. Turda). *Reg. Aut. M.*: Tg. Mureș; Odorhei. *Reg. Stalin*: Blaj la Păd. Bucurdea; Orașul Stalin pe Tâmpa. *Reg. Hunedoara*: Piatra Măceștilor sub Mții Retezatului r. Hațeg; Deva la Cetate. *Reg. Arad*: Arad (Păd. Ciala). *Reg. Ploesti*: Sinaia; V. Nișcovului pe Dl. Ciuhoiu (r. Buzău). *Reg. Iași*: Iași. *Reg. Suceava*: Botoșani.

× *R. alliariifolius* (Rchb.) = *cassubicus* × *flabellifolius*. — *R. auric. var. alliarifolius* Rchb. l.c. tab. 13, fig. 4599 sin. — *R. cassub. f. gracilis* Schur et e. *subflabellatus* Schur Enum. pl. Transs. (1866) 24, p.p. — *R. cassub. var. flabelliferus* Borb. Budap. fl. (1879) 245. — *R. cassubicus-flabellifolius* Schill. l.c. 425. — Exs.: FRE 1241, p.p. — Ic.: Pl. 94, fig. 4; Nyár in. Bul. Grăd. Bot. Cluj XIII (1933) 100, fig. 14 et Kv. fl. l.c. fig. 34, nr. 14.

Plantă viguroasă, cu tulpina mai groasă. Frunza bazală cu lamină mare, cordată, nedivizată. Frunze tulpinale cu lacinii ± concrescute, de obicei în grupe de 2—3, foarte late, dințate, eliptice sau lanceolate. Prin aceste

Planșa 94. — 1. × *Ranunculus auricomoides* A. Nyár. — 2. × *R. auricomoides* A. Nyár. var. *flabelloides* A. Nyár. — 3. × *R. alliariaefolius* (Rchb.) var. *subflabellatus* (Schur). — 4. × *R. alliariaefolius* (Rchb.). — 5. *R. ambiguus* (Schur). — 6. × *R. ambiguus var. binatifolius* A. Nyár.



caractere se aseamăna cu *R. cassubicus*. Unele exemplare au frunze tulpinale cu lacinii \pm concrescute în grupe, spre vârf lăţite, cuneiforme, asemănătoare cu cele dela *R. flabellifolius*.

Reg. Baia Mare: între Carei şi Arded. *Reg. Cluj*: Canciu (r. Dej); Sîcu, Bontida (r. Gherla); Cluj (Hajongard, Păd. Făget); Ciurilă pe Dl. Peana, Turda. *Reg. Aut. M.*: Tg. Mureş. *Reg. Stalin*: Sighişoara; Timişul de Sus (r. Stalin); Cîsnădioara (r. Sibiu).

var. *subflabellatus* (Schur). — *R. cassub. e. subflabellatus* Schur l.c. 24. — *R. ambiguus* Auct. transs., non Schur, nec Kern. — *R. cassub. f. gracilis* Schur l. c. p.p. — *R. flabellifolius-cassubicus* Schill. l.c. 425. — *lc.*: Pl. 94, fig. 3; Nyár. in Bul. Grăd. Bot. Cluj XIII (1933) 100, fig. 15 et Kv. fl. l.c., fig. 34, nr. 15, sub *R. flabellifolius-cassubicus*. — Laciniiile frunzelor evident concrescute, asemănătoare mult cu acelea dela *R. flabellifolius*. — *Reg. Cluj*: Cluj în Păd. Făget. *Reg. Stalin*: Guşteriţa, Şura Mare, Cîsnădioara, Valea Sadului (r. Sibiu).

× *R. auricomoides* A. Nyár. et L. Alex. nomen novum = *auricomus* × *flabellifolius*. — *R. auricomus* — *flabellifolius* Schill. l.c. 424. — *R. cassub. var. flabelliferus* Borb. Budap. fl. (1879) 245, pro syn. *R. auric-flabell* sec. Schill. l.c. — *lc.*: Pl. 94, fig. 2.

Frunze tulpinale inferioare sesile, aproape până la bază multisectate, cu segmente \pm înguste, divergente, dinţate spre vârf; numai frunzele tulpinale supreme cu lacinii concrescute în grupe, \pm înguste şi cu margini paralele, prin aceasta asemănându-se cu *R. auricomus*. Unele exemplare au frunzele tulpinale superioare cuneiforme, la vârf inegal dinţate, cu dinţi mari, mai rar lobate, asemănătoare cu cele dela *R. flabellifolius*.

Reg. Cluj: Cluj în Păd. Făget; Ciurilă pe Dl. Arini (r. Turda).

var. *flabelloides* A. Nyár. — *R. flabellifolius* — *auricomus* Schill. l.c. 425. — *R. auric. var. alliariifolius* Rehb. p.p., pro syn. *R. flabellif-auric.*, sec. Schill. l.c. — *R. ambiguus* Kern. in Sched. ad FEAH V (1888) 47, pro syn. *R. flabell. - auric.* sec. Schill. l.c. 427 et Nyár. kv. fl. 232. — *Exs.*: FRE nr. 1241, p.p. — *lc.*: Pl. 94, fig. 1; Nyár in Bul. Grăd. Bot. Cluj XIII (1933) 99, fig. 13 et Kv. fl. III (1942) fig. 33, nr. 11, sub *R. flabellifolius-auricomus*. — Frunze tulpinale superioare cuneiforme, la vârf inegal dinţate cu dinţi mari, mai rar lobate, asemănătoare cu cele dela *R. flabellifolius*. — *Reg. Cluj*: Cluj în Păd. Făget; Ciurilă pe Dl. Peana (r. Turda).

× *R. ambiguus* (Schur) = *binatus* × *flabellifolius*. — *R. ambiguus* Schur in Verh. SVN (1862) 189, Enum. (1866) 24, non Auct. Transs., nec Kern. — *R. flabellifolius-binatus* Schill. l.c. 423. — *R. binatus f. flabellifolius-binatus* Borza l.c. (1947) 103. — *Exs.*: FRE nr. 169, p.p.; FRE nr. 1241, p.p. — *lc.*: Pl. 94, fig. 5; Nyár in Bul. Grăd. Bot. Cluj l.c. 98, fig. 11 et Kv. fl. l.c. fig. 34, nr. 12, sub *R. flabellifolius-binatus*.

Plantă scurdă, cu frunze bazale lobate sau divizate, rareori unele întregi; cele tulpinale cuneiforme, asemănându-se cu acelea dela *R. flabellifolius*. Unele exemplare au frunzele bazale mai adânc lobate sau sectate şi cele tulpinale \pm până la bază multisectate, asemănându-se \pm cu acelea dela *R. binatus*.

Reg. Cluj: Cluj în Păd. Făget; Ciurilă pe Dl. Peana (r. Turda). *Reg. Timișoara:* Baziaș (r. Moldova Nouă).

var. *binatifolius* A. Nyár. comb. nova. — *R. ambiguus* Schur l.c. p.p. — *R. binatus* — *flabellifolius* Schill. l.c. 423. — *Ic.*: Pl. 94 fig. 6; Nyár. in Bul. Grăd. Bot. Cluj l.c. 98, fig. 12 et Kv. fl. l.c. fig. 34, nr. 13 sub *R. binato-flabellifolius*. — Frunzele bazale în parte pronunțat și până la bază multisectate, cele tulpinale adânc palmatisectate, cu segmentele lanceolate, asemănătoare cu acelea dela *R. binatus*, însă mai late. — *Reg. Cluj:* Lacul dela Sălicea (r. Turda). *Reg. Craiova:* Segarcea la Păd. Radovanu.

× *R. variifolius* (Schur) = *auricomus* × *binatus*. — *R. auricomus* b. *variifolius* Schur. l.c. (1866) 23. — *R. auric.* var. *sibiricus* Glehn in Acta Hort. Petrop. IV (1876) 16, p.p. — *R. auricomus-binatus* Schill. l.c. 423. — *R. auric.* var. *reniformis* Borza l.c. (1947) 103, non Kitt. — *Exs.*: FRE nr. 770 a—c, p.p. — *Ic.*: Pl. 93, fig. 1; Nyár. in Bul. Grăd. Bot. Cluj l.c. 92, fig. 5 et Kv. fl. l.c. f.g. 32, nr. 6 sub *R. auricomus-binatus*.

Plante debile, cu frunze bazale întregi sau slab lobate, cele tulpinale până la bază sectate, cu lacinii dințate, cu margini ± paralele, asemănătoare cu acelea dela *R. auricomus*. La unele exemplare, o parte din frunzele bazale sunt adânc sectate iar laciniiile frunzelor tulpinale nedințate, asemănându-se cu acelea dela *R. binatus*.

Reg. Cluj: Mții Rodnei (Corongiș); Canciu, Olpret, Unguraș (r. Dej); Sicu (r. Gherla); Cluj (Păd. Mănăstur, Păd. Făget, Hujongard, Fănațe); Cheia Turzii. *Reg. Aut. M.*: Tg. Mureș. *Reg. Stalin:* Cisnădioara pe Mt. « Götzenberg ». *Reg. București:* București (Otopeni).

var. *sibiricus* (Glehn). — *R. auric.* var. *sibiricus* Glehn in Acta Hort. Petrop. IV (1876) 16. — *R. auric.* b. *variifolius* Schur l.c.p.p. — *R. binatus* — *auricomus* Schill. l.c. 421. — *Exs.*: FRE nr. 770 b, p.p. — *Ic.*: Pl. 93, fig. 2; Nyár. in Bul. Grăd. Bot. Cluj l.c. 92, fig. 6 et Kv. fl. l.c. fig. 32, nr. 5 sub *R. binato-auricomus*. — Unele dintre frunzele bazale adânc digitat multisectate, cu segmente îngust lanceolate, divergente, altele numai lobate, cele tulpinale cu lacinii nedințate, asemănătoare cu acelea dela *R. binatus*. — *Reg. Baia Mare:* Foeni (r. Cirei). *Reg. Cluj:* Iclod (r. Gherla); Călata (r. Huedin); Feiurdeni, Cluj (Hujongard, Păd. Lomb, V. Popii, Fănațe); Ciurilă, Sălicea la Lacul Sălicea, Cheia Turzii (r. Turda). *Reg. Ploști:* V. Nișcovului pe Dl. Poiana Rotundă (r. Buzău).

× *R. silvicolus* (Wimm. et Grab.) = *binatus* × *cassubicus*. — *R. auric.* 8 *silvicola* Wimm et Grab. Fl. Sil. I. 2 (1829) 128. — *R. auric.* c. *fallax* Wimm. et Grab. l.c. pro min. p. — *R. auric.* var. *pinguior* Rehb. l.c. Fl. germ. IV (1840) 11, tab. XII, fig. 4599, dextr. — *R. auric.* c. *helleborifolia* Schur et *R. cassub.* d. *diversifolia* Schur l.c. 24, p.p. — *R. binatus-cassubicus* Schill. l.c. 423. — *R. cassub.* var. *fallax* Borza Consp. (1947) 103. — *Ic.*: Pl. 93, fig. 5; Nyár in Bul. Grăd. Bot. Cluj l.c. 95, fig. 9 et Kv. fl. l.c. fig. 33, nr. 9 sub *R. binato-cassubicus*.

Plante debile, cu laciniiile frunzelor tulpinale îngust lanceolate, puțin lățite la mijloc, uneori slab dințate, cele bazale în mare parte divizate, asemănătoare cu cele dela *R. binatus*. Unele exemplare mai viguroase, cu laci-

niile frunzelor tulpinale lat lanceolate, pronunțat dințate, cele bazale abia fidate sau întregi, asemănându-se cu acelea dela *R. cassubicus*.

Reg. Cluj: Năsăud; Unguraș (r. Dej); Chiochiș (r. Beclean); Nicula, Bonțida, Sieu (r. Gherla); Cluj (Hajongard, V. Popii, V. Plecica, Păd. Făget, Păd. Hoia), Gheorgheni; Lacul dela Sălicea, Săliște, Cacova Ierii (r. Turda). *Reg. Aut. M.*: Tg. Mureș, Cocoși, Acățari; Sovata; Zetea (r. Odorhei). *Reg. Timișoara*: Maidan pe Dl. Tilva Mare (r. Oravița). *Reg. Craiova*: Bucovăț (r. Craiova). *Reg. Ploști*: Păd. Tinoasa (r. Ploști); Sinaia. *Reg. Iași*: Păd. Strunga (r. Iași).

var. *diversifolius* (Schur). — *R. cassub.* var. *diversifolius* Schur Enum. pl. Transs. (1866) 24. — *R. auric.* *δ sylvicola* W. et Gr. Fl. Siles. I. 2 (1829) 128, p.p. — *R. cassibucus* — *binatus* Schill. l.c. 423. — *R. auric.* var. *pinguior* Rehb. p.p. — *lc.*: Pl. 93, fig. 6; Nyár in Bul. Grăd. Bot. Cluj l.c. 96, fig. 10 et Kv. fl. l.c. fig. 33, nr. 10, sub *R. cassubico-binatus*. — Plante viguroase, cu laciniiile frunzelor tulpinale lat lanceolate, cu dinți mai mari. Frunzele bazale în mică parte întregi sau abia fidate. — *Reg. Cluj*: Rodna; Cluj (Hajongard, Păd. Făget, Păd. Hoia, Dl. Peana); Cheia Turzii; Aiud. *Reg. Aut. M.*: Tg. Mureș; Sovata. *Reg. Stalin*: Orașul Stalin pe Dl. Stejărișul Mic, V. Timișului; Mții Făgărașului; Noul, Csnădioara pe Mt. « Götzenberg ».

Secția V. HECATONIA (Lour.) Gr. et Godr. Fl. Fr. I (1848) 38. — *Hecatonia* Lour. Fl. Cochinch. I (1790) 302, pro gen.

Plante anuale sau bisanuale cu tulpini fistuloase și cu flori mici. Petale mai multe de 5, egale sau mai mari decât sepalele. Fructe multe (70—100), mici, pe receptacul cilindric.

13. *R. scelerátus* L. Sp. pl. ed. I (1753) 551, 776; Ovcz. in Fl. U.R.S.S. VII (1937) 408. — Boglari. — Torzsika boglárka. — Giftiger Hahnenfuss. — *Exs.*: FRE nr. 781. — *lc.*: Pl. 90, fig. 1, 1 a.

☉, ☉. Plantă înaltă de 20—50 cm, cu numeroase rădăcini fibroase. Tulpină erectă, destul de groasă, netedă sau fin brăzdată, fistuloasă, la exemplele viguroase ramificată dela bază, multifloră, la cele mai slabe numai în partea superioară. Rozetele bazale cu frunze lung pețiolate, glabre, uneori în apă nutante, cu limb adânc trifidat și segmentele din nou ± adânc lobate, cu lobi rotunjiți. Frunze tulpinale decrescente spre partea superioară, ± pețiolate, digitat 3—5-sectate, cu lacinii cuneate spre bază, la vârful trilobate, cele supreme sesile, trifidate sau simple, cu lacinii întregi. Flori mici, late de 5—10 mm. Sepale de 4—6 mm lungime. Petale de 2—4 mm lungime, galben deschise, mai mici decât sepalele. Apocarp ovat, mai lung decât staminele, după înflorire se prelungește, devine cilindric, cu receptacul cilindric, cu peri rari și lurgi. Nucule numeroase (70—100) lungi de cca 1 mm, oblice ovate, pe laturi neînsemnat rugoase, cu rostru foarte scurt. V—VIII.

Stațiunea. In locuri mocirloase, prin livezi umede, marginea lacurilor, comună.

Răsp. în țară: *Reg. Baia Mare*: Borșa la poalele Mt. Pietrosul Mare (r. Vișeu); Foeni, Urziceni, Berveni, Carei. *Reg. Cluj*: Năsăud; Cluj, Dezmir, Someșeni; Cheia Turzii; Aiud. *Reg. Aut. M.*: Tg. Mureș. *Reg. Oradea*: Oradea; Mții Bihorului (V. Iadului). *Reg. Arad*: Arad. *Reg. Timișoara*: Timișoara; Buziaș (r. Lugoj). *Reg. Craiova*: Craiova în lunca Jiului. *Reg. Pitești*: Pitești în lunca Argeșului. *Reg. București*: București (pe Râul Colentina la Fundeni-Mărcuța); Ciocănești (r. Răcari); Periş (r. Căciulați). *Reg. Ploiești*: Crivina (r. Ploiești); Cotorca (r. Urziceni). *Reg. Constanța*: Cernavoda, Medgidia; Techirghiol; Babadag, Jurilovca, Nicolae Bălcescu. *Reg. Galați*: Tulcea; Galați (Lacul Brateș), *Reg. Bacău*: Slănic, Bogdănești (r. Tg. Ocna); Pietricica (r. Moinești); Bacău. *Reg. Bârlad*: Cosmești (r. Tecuci). *Reg. Iași*: Schiopeni (r. Huși); Iași (la Copou), Bârnova, Dl. Repedea, Cristești, Șorogari, Aroneanu, Nițelea. *Reg. Suceava*: Bosanci (r. Suceava).

Variabilitatea speciei

f. minimus (DC.) Nyár. Kv. fl. III (1942) 223. — *R. sceler.* *γ. minimus* DC. Prodr. I (1824) 34. — Plantă scundă, înaltă de 10 cm. — În locuri sărate. — *Reg. Cluj*: Sânicoadă (r. Cluj).

Răsp. gen.: Emisfera nordică.

Secția VI. THORA DC. Prodr. I (1824) 30. — Plante perene, cu rădăcina îngroșată. Nucule rotund bombate, cu nervuri proeminente.

14. *R. Thóra* L. Sp. pl. ed. I (1753) 550. — **Exs.**: FRE nr. 1940. — **Ik.**: Pl. 90, fig. 2.

4. Rizom vertical, cu numeroase rădăcini cărnoase îngroșate în părțile lor superioare. Tulpină erectă, de 10 — 25 cm, subțire, flexuoasă, neramificată sau foarte rar cu o ramură, de regulă unifloră, fără frunze bazale, la mijloc cu o frunză mare, sesilă sau subsesilă, reniformă sau rotundă, mai lată decât lungă, ± cordată sau retezată la bază, pielooasă, pe margini crenată, la vârf emarginată și cu câțiva dinți mai mari, cu nervurile pronunțate. Deasupra acesteia se află încă o frunzuliță bracteiformă, întreagă sau de obicei 3-, rar 5-fidată, glabră. Flori solitare, galbene, până la 20 mm în diametru, cu 5 sepal lungi de 6—7 mm și 5 petale mai lungi. Apocarp format dintr'un receptacul glabru cu puține nucule, lungi până la 3 mm, glabre, ± globuloase, cu nervuri pronunțate, cu un rostru subțire, puțin încârligat. VI—VII.

Stațiunea. Pe cline stâncoase și ierboase, bogate în humus, în zona subalpină și alpină.

Planșa. 95. — 1. *Ranunculus platanifolius* L. — *R. oreophilus* M.B., 2a. receptacul pârșos. — 3. *R. montanus* Willd., 3 a. un exemplar mic din reg. alpină; 3 b. receptacul pârșos numai la vârf și 2 carpele.



Răsp. în țară: *Mții Rodnei*: Pietrosul Mare (Piciorul Moșului), Obârșia Rebri, Fața Meselor, Piatra Rea, Putredul, Corongiș, Vf. Laptelui, Dosul Grajdului, Mt. Cailor Mihijasa, Galați, Vf. Puzdrelor. *Mții Bucegi*: Caraiman, Obârșia, (stațiuni neconfirmate) *Mții Bârsei*: Piatra Mare, Piatra Craiului. *Mții Făgărașului*: Negojul. *Mții Sibiului*: Mții Preajba. *Mții Tarcu-Godeanu*: Godeanu.

Variabilitatea speciei

var. *carpaticus* (Gris.) Hegi Fl. Mitt. - Eur. III (1912) 546. — *R. carpaticus* Gris. in Gris. et Schenk Iter hung. in Wieg. Arch. (1852) 312. non Herbich. — *R. Tátrae* Borb. in ÖBZ XXXVII (1888) 144. — *R. Thora* β. *carpaticus* Porc. Enum. pl. Naszód. in MNL II (1878) 2. — Frunză inferioară sesilă, la bază retezată orizontal (Pl. 90, fig. 2), sau în unghi foarte larg atenuat, de obicei mai lată decât lungă. — La noi este răspândită mai mult această varietate.

Obs. Tipul acestei specii are frunze inferioare rotunde sau reniforme, ± cordate, la bază atenuate într'un pețiol scurt. Acest tip este rar la noi și necesită confirmare.

Răsp. gen.: Europa centrală și de SV.

? *R. hybridus* Biria Hist. Renoncul. (1811) 38.

4. Se aseamănă mult cu *R. Thora*. Rizom scurt, vertical, cu numeroase rădăcini îngroșate, fusiforme. Tulpină erectă, de 10 — 15 cm, flexuoasă, de obicei ramificată, cu 2 (— 4) frunze bazale lung pețiolate, cu limb reniform, continuat abrupt în pețiol, spre bază întreg, spre vârf dur sau lobat seriat, pieloz, glabru ca și întreaga plantă. Frunze tulpinale inferioare asemănătoare cu cele bazale, scurt pețiolate, cele superioare 2—3, decrescente, 3-fidate sau întregi, toate ± pielose, pronunțat nervate, ± glauce. Flori asemănătoare cu cele dela *R. Thora*. Apocarp rotund, cu nucule puține, globuloase, glabre, cu nervuri pronunțate și cu rostru scurt și încovoiat. VI—VIII,

Stațiunea. In locuri stâncoase și ierboase, crăpături de stânci, printre jnepeni, în zona subalpină și alpină.

Răsp. în țară: Foarte rară și dubioasă. — A fost indicată din Mții Rodnei de pe Mt. Corongiș de Schur (exemplarul colectat de Schur se află în herb. din Lwow), Bucegi (Baumg.), Mții Făgăraș la Lacul Bălii (Schur).

Răsp. gen.: Alpi, Carpații de SE ?

Secția VII. CHRYSANTHAE Spach Hist. vég. Phan. VII (1839) 212.

Nucule turtite lateral, glabre, rareori păroase, cu margine și nervuri longitudinale vizibile. Frunze inferioare mai fidate decât cele superioare.

15. *R. répens* L. Sp. pl. ed. I (1753) 554; Ovez. in Fl. U.R.S.S. VII (1937) 423. — Floare de leac. — Kuszô boglárka. — Kriechender Hahnenfuss. — Лютик ползучий. — Exs.: FRE nr. 2665 et 2664 sub var. *prostrato*. — Ic.: Pl. 96, fig. 3.

4. Rizom vertical cu rădăcini fibroase, groase, foarte numeroase. Tulpină erectă sau ascendentă, de 20—40 (50) cm, ramificată dela bază, glabră sau păroasă, cu stoloni radicanți foarte lungi, puternici. Frunze bazale lung pețiolate, 3-sectate, cu segmente pețiolate și din nou trifidate; segmentele secundare lat ovate, din nou adânc sectate sau fidate. Frunze tulpinale asemănătoare cu cele bazale, decrescente, cele superioare trifidate sau întregi. Flori destul de numeroase, lung pedunculate, de 20—30 mm în diam., galbene-aurii, lucioase. Sepale ovate, mai scurte decât petalele alungit ovate, de 6—12 mm lungime, închizând complet floarea prin marginile lor. Receptacul globulos, păros, cu nucule \pm turtite, glabre, lungi de cca 3 mm, cu o margine verzuie evidentă și rostru scurt, drept sau puțin încovoiat. V—VIII.

Stațiunea. În păduri, fânețe, livezi, șanțuri, marginea apelor, locuri mlăștinoase, pe terenuri agricole, dela câmpie până în etajul montan.

Răsp. în țară: Foarte comună în toată țara.

Variabilitatea speciei

- | | | |
|-----|---|---|
| 1 a | Flori simple, normale | 2 |
| 1 b | Flori învoalte | |
| | f. <i>degeneratus</i> (Schur). — <i>R. repens</i> d. <i>degeneratus</i> Schur Enum. pl. Transs. (1866) 21. — Rodna prin grădini; Sibiu pe malul Cîbinului. | |
| 2 a | Baza tulpinii fără stoloni sau cu stoloni numai pe tulpina floriferă. Plante erecte, înalte de 30—50 cm | 3 |
| 2 b | Baza tulpinii cu stoloni. Tulpina floriferă fără stoloni | 4 |
| 3 a | Tulpina floriferă cu stoloni la subțioara frunzelor | |
| | f. <i>aerostolonus</i> A. Nyár. f. nova in Add. pag. 687. — Craiova la Balta Craiovești; Mt. Ceahlău la Schitul Durău; Iași la Păd. Bărnova, Cucuteni. | |
| 3 b | Tulpina floriferă lipsită de stoloni | |
| | f. <i>erectus</i> (DC.) Borza Consp. Fl. Rom. (1947) 104. — <i>R. repens</i> β <i>erectus</i> DC. Prodr. I (1824) 38. | |
| 4 a | Plante cu stoloni lungi, repenți, fără tulpină principală | 5 |
| 4 b | Plante cu tulpini principale și cu stoloni | 6 |
| 5 a | Tulpina și frunzele păroase, cu peri lungi, rari. Pedunculii cu peri alipiți | |
| | f. <i>Haynaldi</i> (Menyh.). Borza in Bul. Grăd. Bot. Cluj XXV (1945) 261. — <i>R. Haynaldi</i> Menyh. Kalocsa növ. teny. (1877) 28. — Exs.: FRE nr. 2664. — Reg. Arad: Mții Zărandului (Mt. Highiş). | |
| 5 b | Plantă glabriusculă | |
| | f. <i>prostratus</i> (Gaud.). — <i>R. repens</i> var. <i>prostratus</i> Gaud. Syn. Fl. helv. (1836) 462. — Exs.: FRE nr. 2664, p.p. | |
| 6 a | Tulpină și pețoli cu peri patenți | |
| | f. <i>villosus</i> Lamotte Pl. nouv. plat. centr. Fr. (1855) 50. — Ic.: Pl. 96, fig. 3b. | |
| 6 b | Tulpină și pețoli glabri sau alipit păroși | 7 |
| 7 a | Frunze inferioare simplu ternate, cu segmente trilobate sau fidate, scurt pețiolate .. | 8 |

- 7 b Frunze dublu ternate, cu segmente secundare pețiolate
 f. *myrrhiphyllus* (Wallr.) Nyár. Kv. fl. III (1942) 225. — *R. repens* α. *myrrhiphyllus* Wallr. Schedul. crit. I (1822) 294. — **Ic.:** Pl. 96, fig. 3a.
- 8 a Plante glabre
 f. *glabrátus* (DC.) Hay. Prodr. Fl. balc. I (1927) 341. — *R. repens* γ *glabratus* DC. Syst. I (1818) 285; Prodr. I (1824) 38.
- 8 b Plantă adpres pubescentă
 f. *typicus* (Beck) Nyár Kv. fl. III (1942) 224. — *R. repens* α *typicus* Beck Fl. NÖ. I (1890).

Răsp. gen.: Eurasia, Africa de N, adventiv în America de N.

16. **R. oreophilus** M. B. Fl. taur. - cauc. III (1819) 383; Ovez. in Fl. U.R.S.S. VII (1937) 437. — *R. Hornschuchii* Hoppe in Sturm Deutschl. Fl. (1826) Heft 46. — *R. Villarsii* Koch et Auct. rom., non DC. — *R. Brey-ninus* Kern. et Auct. rom., non Crantz. — *R. montanus* Baumg. p.p., non Willd. — *R. Pseudo-Villarsii* Schur Enum. pl. Transs. (1866) 19. — **Exs.:** FRE nr. 1942. — **Ic.:** Pl. 95, fig. 2, 2 a.

4. Rizom vertical, scurt, cu rădăcini fibroase, numeroase, la colet cu fibre uscate (rămășițe ale frunzelor uscate din anul trecut). Tulpina ± subțire, înaltă de (8) 20—30 (48) cm, simplă sau bifurcată, foarte rar cu 3 ramuri, ca și întreaga plantă, pubescentă, cu peri alipiți. Frunze bazale 1—4, lung pețiolate, rotunde sau poligonale, aproape până la bază trisectate. Segmentele lat ovate, din nou fidate sau adânc dințate, cu dinți lat ovați, la vârf abrupt acuminate, cu vârfuri puțin alungite, (caracteristic pentru această specie), de obicei se ating cu marginile sau se acoperă, mai rar ± distanțate. Frunze tulpinale 1—2, cu totul deosebite de cele bazale, trisectate până la bază, cu lacinii liniare și margini întregi. Flori 1—2 (3), lung pedunculat, galbene aurii, lucioase, mari, de 20—30 (35) mm în diam., cu 5 sepale oblong ovate, pe dos păroase și 5 petale lat obovate, mai lungi decât sepelele, la vârf larg arcuite sau neînsemnat emarginate; unguicula cu foveolă nectariferă acoperită cu o membrană rotundă, lungă de 1 mm. Apocarp globulos, cu nucule obovate, glabre, lungi de 2—2,5 mm, cu un rostru încârligat, așezate pe un receptacul păros pe toată lungimea lui. V—VIII.

Stațiunea. Prin locuri stâncoase, ierboase, pe stâncării, mai ales pe substrat calcaros, în regiunea subalpină, coborându-se și în cea montană.

Răsp. în țară: *Reg. Baia Mare:* Repedea pe Mt. Pietriceaua (r. Vișeu), Mții Rodnei: Pietrosul Mare, Fața Meselor, Izvorul Cailor, Piatra Rea. *Reg. Cluj:* Mții Rodnei: Crăciunel, Beneș, Corongiș, Inău, Dosul Grajdului, Negreasa, Rabla deasupra Ccm. Maieru (r. Năsăud); Cluj (Păd. Făget, Păd. Mănăstur, V. Plecica); Cheia Turzii, Rimetea pe Colții Trascăului, Poșaga pe Mt. Scărița, Runc (r. Turda); Abrud pe Mt. Vulcan și Mt. Sohor (r. Câmpeni); Stâna (r. Huedin). *Reg. Aut. M.:* Voșlăbeni (r. Gheorghieni); Mții Giurgeului:

Hăghimașul Mare, Mt. «Öcsém», «Terkő»; Căpâlnița, Vlăhița, Lueta (r. Odorhei). Mții Harghita. *Reg. Stalin*: Mții Ciucașului (Ciucaș, Tesla, Piroșca), Săcele pe Mt. Belrec (r. Stalin). Mții Bârsei (Postăvarul, Piatra Craiului); Mții Bucegi; Mții Făgărașului: Colții Brezii, Arpașul, Trăsnita, V. Bălei, V. Doamnei, Negoitul, Scara; Gura Râului (r. Sibiu); Mediaș. *Reg. Hunedoara*: Mții Trăscăului (Piatra Caprei); Uric pe dealurile din împrejurimi (r. Hațeg). *Reg. Oradea*: Mții Bihorului (Piatra Muncelu și Piatra Bochii). *Reg. Timișoara*: Oravița, Ciclova. *Reg. Craiova*: Mții Țarcu-Godeanu (Scărița); Mții Parângului (Mirul Mare, Găuri). *Reg. Pitești*: Mții Făgărașului (Negoitul, Râiosul, Capra Budei), Mt. Ghițu (r. Curtea de Argeș); Mții Iezer-Păpușa (Păpușa); Dâmbovicioara pe înălțimile din împrejurimi. *Reg. Ploiești*: Mții Bucegi: Jepi, Caraiman, Coștila, V. Cerbului, Obârșia, Doamnele, V. Ialomiței. *Reg. Bacău*: Mții Tarcăului (Tărâhuș); Mt. Ceahlău, Cheile Bicazului, Mții Giurgeului (Mt. Licaș), Tulgheș la Pietrele Roșii (r. Ceahlău).

Variabilitatea speciei

f. *marmarossicus* (Zap.) Borza Consp. Fl. Rom. I (1947) 103. — *R. Villarsii* a. *marmarossicus* Zap. Consp. Fl. Galic. crit. II (1908) 280. — Segmentele frunzelor bazale înguste, divergente. Plantă de 16—27 cm înălțime. — *Mții Rodnei*: Pietrosul, Piatra Rea, Galați, Inău.

Răsp. gen.: Alpi, Carpați, Balcani, Caucaz.

17. *R. montānus* Willd. Sp. pl. II. 2 (1800) 1321. — *R. montanus*. β. Baumg. Enum. stirp. Transs. II (1816) 124. — *R. gruinalis* Schott, Nym. et Ky. Analect. bot. (1854) 33. — *R. acris* c. *subalpinus* Schur Enum. pl. Transs. (1866) 17. — *R. gelidus* Schur l.c. (1866) 18. — *R. pseudomontanus* Schur Phytogr. in Verh. NV Brünn XV (1877) 42. — *Idem*: Pl. 95, fig. 3, 3 a, 3 b; Prod. Fl. II, ed. II (1939) 131, fig. 2.

24. Rizom scurt, cu rădăcini fibroase, puternic dezvoltate. Tulpină de 4—30 (40) cm, simplă sau cu o singură ramură, excepțional mai multe, adpres păroasă. Frunze bazale 2 sau mai multe, lung pețiolate, rotunde sau poligonale, glabre, glabrescente sau cu peri alipiți, pe dos cu nervațiune groasă, evidentă, adânc sau aproape până la bază trisectate. Segmentele divergente, nu se ating cu marginile, din nou adânc 2—3-fidate, cu segmente secundare adânc dințate, cu dinți obtuși sau rotunjiți la vârf. Frunze tulpinale 1—2, mici și mult diferite de cele bazale; cea inferioară adânc trisectată, cu lacinii îngust sau liniar lanceolate și din nou fidate, cea superioară 3-sectată, cu lacinii întregi, liniare. Flori 1—2, foarte rar mai multe, de 20—30 mm în diametru, deschis galbene-aurii, puțin lucioase, cu pedunculi relativ scurți, cilindrici, nestriați. Receptacul păros numai la vârf, spre deosebire de *R. oreophilus*. Nucule de cca 3 mm lungime, glabre,

Plansa 96. — 1. *Ranunculus sardous* L. — 2. *R. bulbosus* L. — 3. *R. repens* L., 3a. idem. f. *myrrhiphyllus* (Wallr.) Nyár., 3b. idem, f. *villosus* Lamotte.



puțin turtite, pe partea dorsală plane, pe cea centrală semicirculară, cu un rostru uncinat. VI—IX.

Stațiunea. Prin locuri pietroase și ierboase, pășuni alpine, în regiunea subalpină și alpină, scoborându-se și în cea montană superioară.

Răsp. în țară: **Mții Rodnei*: Pietrosul Mare, Obârșia Rebri, Corongiș, Inău. *Mții Bistriței*: Ceahlău, Cheile Bicazului. *Mții Oituzului*: Șandru, Nămira, Țiganca. *Mții Ciucașului*: Ciucașul. *Mții Baiului*: Clăbucetul Taurului, Susaiu (Predeal). *Mții Bârsei*: Piatra Craiului. *Mții Bucegi*: Vf. cu Dor, Furnica, Piatra Arsă, Jepi, Caraiman, Coștila, Obârșia, Doamnele, Bătrâna, Strunga, V. Ialomiței, Cocora, Lăptici. *Mții Iezer-Păpușa*: Păpușa, Oiticu. *Mții Făgărașului*: Urlea, Viștea, Podragul, Ucea, Arpașul, Vânătoarea lui Buteanu, V. Bălei, Laița, Negojul, Bărcaciu, Scara, Ciorteia, Surul, Lespezi, Râiosul, Prislopul. *Mții Sibiului*: Negovanul Mare, Frumoasa, Iezerul Cîbinului, Preajba, Mt. « Götzenberg » (Cisnădioara). *Mții Parângului*: Mirul Mare, Mândra. *Mții Retezatului*: Căldarea Zănoagei. *Mții Țarcu-Godeanu*: Godeanu. *Mții Metalici*: Mt. Vulcan (la Abrud, r. Câmpeni).

Variabilitatea speciei

- 1 a Frunze bazale 3—5-palmat fidate până la $3/4$ — $4/5$ parte, cu segmente concrescute la bază, \pm late, puțin divergente

var. **typicus** Beck Fl. NÖ I (1890) 422. — Cea mai frecventă formă.

f. **măjor** (Koch) Hay. Prodr. Fl. balc. I (1927) 339. — *R. montanus* β . *major* Koch Syn. I ed. III (1857) 15. — Tulpină înaltă până la 40 cm, cu mai multe flori. Toate frunzele, afară de cea supremă, palmat sectate, cu lacinii din nou fidate. Impreună cu tipul.

- 1 b Frunze bazale palmat 5-sectate până la bază, cu segmente înguste, divergente, nu se ating, adânc dințate, cu dinți subțiri

var. **carinthiacus** (Hoppe) Beck l.c. — *R. carinthiacus* Hoppe in Sturm Deutschl. Fl. (1826) Heft 46, tab. 10. — *R. gracilis* Schleich. Cat. ed. III (1815) 24, non Clarke (1819) nec Bory et Chaub. (1832). — *R. tenuifolius* Schleich. Cat. ed. IV (1821) 28. — *Mții Bucegi*: Jepii Mici.

Răsp. gen.: Europa, Caucaz.

18. *R. polyanthemos* L. Sp. pl. ed. I (1753) 554; Ovez. in Fl. U.R.S.S. VII (1937) 446, tab. XIX, fig. 2 a-c. — *R. laciniatus* Baumg. Enum. stirp. Transs. II (1816) 131. — *R. lanatus* Schur ap. Fuss in Verh. SVN II (1851) 197. — *R. polyanthemoides* Schur Enum. pl. Transs. (1866) 20. — Gălbenele. — Sokvirágú boglárka. — Vielblütiger Hahnenfuss. — Лютик многоцветковый. — **Exs.:** FRE nr. 2668. — **Ic.:** Pl. 97, fig. 2, 2 a-b.

24. Rizom scurt, cu multe rădăcini fibroase. Tulpină erectă, de (20) 30 — 60 (75) cm, dreaptă, ramificată, în partea inferioară, împreună cu pețiolii, cu peri patentți rigizi, spre vârf cu peri culcați. Frunze bazale mai multe, lung pețiolate, palmat 3—5-sectate sau fidate; segmentele adânc tripartite, cu lacinii de obicei îngust lanceolate sau liniare, adânc dințate, rar mai late

sau ovate. Frunze tulpinale asemănătoare cu cele bazale, cea inferioară pețiolată, cele următoare sesile, mai puțin sectate, cea supremă simplu sectată, cu lacinii liniare, toate răroase. Flori de (14) 18—25 (30) mm în diametru, cu 5 sepal ovate, răroase, alipite de petale și 5 petale obovate, galbene-aurii, lucioase, lungi de 7—14 (16) mm. Peduncul striat sau brăzdat, adpres păros. Nectaria acoperită cu o scvamă. Apocarp globulos ovat, cu multe nucule lungi de 3—5 mm, turtite lateral, glabre, cu margine pronunțată și cu un rostru scurt, uncirat. Receptacul păros. V—VII.


Stațiunea. Prin locuri ierboase, pe fânețe, marginea pădurilor, în tufărișuri, în regiunea de câmpie și montană, comună.

Răsp. în țară: Comună în toate provinciile.

Variabilitatea speciei

- 1 a Tulpină și pețoli glabri sau glabrescenți
f. *glaber* Rehm. et Wol. Fl. pol. exs. nr. 110. — *R. polyanth. f. glaberrimus* Nyár. in BK XXXVIII (1941) 138. — *Ic.*: Pl. 97, fig. 2b—2d.
- 1 b Tulpină și pețoli păroși..... 2
- 2 a Peri adpreși sau, pe pețoli, în parte \pm patenți..... 3
- 2 b Perii tulpinii și ai pețiolilor patenți..... 4
- 3 a Segmentele frunzelor late
f. *adpressilatisectus* Nyár l.c. cum diagn. hung., Kv. fl. III (1942) 228, cum diagn. hung. et in Bul. șt. Acad. R.P.R. Sect. Șt. Biol. tom. III, nr. 1 (1951) 30. — *R. polyanth. α . latifolius* Wallr. Schedul. crit. I (1822) 291, p.p. — *R. polyanth. var. latifissus* Simk. in Term. füz. IX (1885) 33, p.p. — Mții Harghita.
- 3 b Segmentele frunzelor înguste
f. *aceroides* Nyár in BK l.c. — *Reg. Aut. M.*: Tg. Mureș; Mții Harghita între râurile Ivo și Șicasău deasupra Com. Zetea (r. Odorhei). *Reg. Suceava*: Tolești (r. Fălticeni).
- 4 a Segmentele frunzelor bazale interne late, numai până la $1/3$ — $1/2$ parte fidate; cel mijlociu numai cu o pereche de lacinii
f. *latifolius* (Wallr.) Nyár Kv. fl. III (1942) 228. — *R. polyanthemos α . latifolius* Wallr. Schedul. crit. I (1822) 291. — *R. polyanth. f. latisectus* Neilr. Fl. NÖ (1859) 689. — *R. polyanth. var. latifissus* Simk. in Term. füz. IX (1885) 33. — *R. polyanth. β polyanthemoides* (Bor.) Beck Fl. NÖ I (1890) 421. — *Ic.*: Pl. 97, fig. 2a. — Frecventă.
- 4 b Segmentele frunzelor bazale interne mai adânc fidate, cu lacinii îngust lanceolate sau liniare. Segmentul mijlociu cu 2—3 perechi de lacinii suprapuse..... 5
- 5 a Segmentul mijlociu al frunzelor bazale interne, cu 2 perechi de lacinii suprapuse, îngust lanceolate

Planșa 97. — 1. *Ranunculus nemorosus* DC. var. *Crantzii* (Schur) Jáv., 1a. var. *aureus* (Schleich). Jáv., 1b. var. *astrantii folius* (Schur) Jáv., 1c. un apocarp mărit, 1d. receptacul. 2. *R. polyanthemos* L., 2a. idem, f. *latifolius* (Wallr.) Nyár., o frunză, — 2b. idem, f. *glaber* Rehm. et Wol., o frunză, 2c. apocarp mărit, 2d. receptacul.



f. *villosus* (Beck) Nyár. Kv. fl. III (1942) 228. — *R. polyanth.* var. *villosus* Beck in Glasn. XXXVII (1925) 465. — *R. polyanth.* f. *typicus* Nyár. in BX XXXVIII (1941) 138. — Frecventă.

5 b Segmentul mijlociu al frunzelor bazale interne, cu 3 perechi de lacinii suprapuse, liniar lanceolate

f. *elegans* (Beck) Nyár l.c. — *R. polyanth.* var. *elegans* Beck l.c. — Sporadică.

Răsp. gen.: Europa centrală și de SE.

19. *R. nemorosus* DC. Syst. I (1818) 280; Ovcz. in Fl. U.R.S.S. VII (1937) 448, tab. XXIX, fig. 1, a - c. — *R. Breyninus* Cr. Stirp. austr. II, ed. I (1763) 91, ed. II (1769) 115, tab. 4 fig. 2, non alior. — *R. geraniifolius* Baumg. Mant. (1845) 55. — *R. polyanth.* ssp. *Breyninus* Hegi Fl. Mitt.-Eur. III (1912) 559. — Gălbenele de pădure. — Erdei boglárka. — Wald-Hahnenfuss. — Лютик дубравный. — Exs.: FRE nr. 775. — Ic.: Pl. 97, fig. 1 a—d.

4. Rizom gros, premors, cu rădăcini fibroase numeroase, la colet cu resturi de fibre uscate Tulpină înaltă de 15—40 (100) cm, abundent ramificată, patent sau retrors păroasă. Frunze bazale 3—4, lung pețiolate, bogat păroase, adânc trifidate. Segmentele unite la bază, lat obovate, din nou trifidate, cu lobii secundari \pm adânc dințați. Frunza tulpinală inferioară pețiolată, asemănătoare cu cele bazale, de regulă solitară, uneori lipsește, cele mijlocii sesile, laciniate, cele superioare trisectate, cu lacinii liniare, întregi. Flori mari, lung pedunculate, până la 4 cm în diametru, de un galben intens, adeseori cu nuanță portocalie. Caliciu cu 5 sepale lat eliptice, membranos marginate, lung păroase. Petale 5, lat obovate, cuneat atenuate, de 15—20 mm lungime, cu scvame nectarifere \pm cordate. Apocarp globulos, mare, cu multe nucule ovate eliptice, turtite lateral, de cca 4 mm lungime, netede, crenate, cu un rostru lung, recurbat în spirală. Receptacul păros. VI—VIII.

Stațiunea. Prin locuri ierboase, stâncoase, prin păduri și poieni, din etajul montan până în cel alpin.

Răsp. în țară: Reg. Baia Mare: Mții Tibleșului, Mții Rodnei. Reg. Cluj: Mții Rodnei; Mții Bihorului. Reg. Aut. M.: Mții Călimani, Mții Giurgeului. Reg. Stalin: Mții Ciucașului, Mții Bârsei, IV. Timișului, Predeal, Mții Bucegi, Mții Făgărașului; Mții Sibiului; Sighișoara. Reg. Hunedoara: Mții Retezatului, Mții Parângului. Reg. Oradea: Stâna de Vale. Reg. Craiova: Mții Parângului. Reg. Pitești: Mții Căpățanei; Mții Făgărașului; Mții Iezer-Păpușa. Reg. Ploiești: Mții Bucegi, Sinaia. Reg. Galați: Puțeni (r. Bujoru). Reg. Bârlad Măgura Odobeștilor (r. Focșani). Reg. Bacău: Roman; Mt. Ceahlău; Tg. Neamț pe Dl. Măgurele. Reg. Suceava: Bosanci (r. Suceava).

Variabilitatea speciei

1 a Segmentul mijlociu al frunzelor evident mai lung și mai subțire decât cele laterale, 3-sectat, cu lacinii înguste, cuneate

var. *polyanthemoides* (Boreau). — *R. polyanthemoides* Bor. Fl. centr. Fr. II, ed.

- III (1857) 16, tab. I, non Schur. — *Mții Rodnei* (Crăciunel); *Mții Făgărașului* (Vf. Moșului).
- 1 b Segmentul mijlociu al frunzelor puțin mai lung decât cele laterale, lat obovat, cu dințatură diferită 2
- 2 a Segment mijlociu relativ întreg, \pm adânc dințat, foarte neînsemnat trisectat
var. *astrantiifolius* (Schur) Jáv. Magy. Fl. (1925) 378. — *R. astrantiæfolius* Schur in Verh. SVN IV (1853) 29; Enum. pl. Transs. (1886) 21. — **lc.:** Pl. 97, fig. 1b. — *Mții Rodnei*: Izvorul Repede, Crăciunel. *Mții Ciucașului*: Ciucașul. *Mții Făgărașului*: Vf. Moșului, Trăsnita, Viștea Mare, Arpașul. *Mții Retezatului*: Peleaga, Slăveiu.
- 2 b Segment mijlociu cel puțin până la mijloc trifidat și dințat 3
- 3 a Plantă scundă, de 8—12 (16) cm înălțime, cu 1—4 flori
var. *aureus* (Schleich.) Jáv. Magy. Fl. (1925) 378. — *R. aureus* Schleich. Cat. ed. III (1815) 24. — *R. nemorosus* β . *pauciflorus* DC. Prodr. I (1824) 37. — **lc.:** Pl. 97, fig. 1a. — *Mții Tibleșului*: *Mții Rodnei*: Păltiniș, Repede, Bătrâna, Bucuiescu, Inău; *Mții Rarăului*: Rarău, *Mții Bucegi*: comună în tot cuprinsul. *Mții Făgărașului*: Colții Brezii, Urlea, Viștea. *Mții Retezatului*: Căldarea Zănoagei.
- 3 b Plantă mai înaltă, cu mai multe flori. Frunze abundant păroase, cu segmentele des dințate
var. *Crantzii* (Schur) Jáv. lc. — *R. Crantzii* Baumg. in Herb. ex Schur Enum. — **lc.:** Pl. 97, fig. 1. — *Mții Rodnei*: Muncelul, Rabla, Dosul Grajdului, Fruntea Pietrei (la Com. Romuli), Crăciunel, Poarta (deasupra Com. Valea Vinului). *Mții Călimani*: Coama Călimanului. *Mții Rarăului*: Rarău. *Mții Giurgeului*: Hăghimașul Mare, Hăghimașul Negru, Piatra Singuratică. *Mții Vrancei*: Măgura Odobeștilor. *Mții Ciucașului*: Ciucașul. *Mții Baiului*: Clăbucetul Taurului, Urzicarul (la Predeal). *Mții Bârsei*: Postăvarul. *Mții Bucegi*: Vf. cu Dor, Furnica, Piatra Arsă, V. Jepilor, V. Cerbului, V. Mălăești, V. Ialomiței la Schitul Peștera. *Mții Făgărașului*: Urlea, Viștea, Arpașul, Colții Brezii, V. Bălei. *Mții Căpățânei*: Galbena. *Mții Parângului*: Mirul Mare, Găuri. *Mții Retezatului*: Peleaga, V. Lîpușnicul Mare, sub Vf. Păpușa, V. Pietrilor, sub Vf. Retezat, Slăveiu. *Mții Bihorului*: Stâna de Vale, V. Galbenă.

Răsp. gen.: Europa

20. *R. bulbosus* L. Sp. pl. ed. I (1753) 554; Ovez. in Fl. U.R.S.S. VII (1937) 449. — *R. brachiatus* Schur Enum. pl. Transs. (1886) 22. — **Exs.:** FRE nr. 774. — **lc.:** Pl. 96, fig. 2.

4. Plantă înaltă de 20—30 (40) cm, la bază bulbiform îngroșată, cu rizomi scurți și numeroase rădăcini uniforme. Tulpină erectă, ramificată, rar simplă, cu ramuri subțiri, striate, foarte des păroase, cu peri albi, moi, orizontali, numai în partea superioară și pe pedunculi cu peri adpreși. Frunze bazale lung pețiolate, cu 3 segmente, cel din mijloc lung pețiolat, toate adânc trifidate sau sectate; segmentele secundare din nou fidate, sau adânc dințate. Frunza tulpinală inferioară asemănătoare cu cele bazale, cele mijlocii și superioare sesile sau pe o teacă \pm alungită, simplu sectate, cu lacinii liniare. Toate frunzele bogat păroase sau glabre. Flori mai multe, rar numai una, de 2—3 cm în diametru. Sepale 5, reflecte pe peduncul, acuminate, lung păroase.

Petale 5, ovate, galbene-aurii, mai lungi decât sepalele. Apocarp globulos sau puțin alungit, cu multe nucule turtite bilateral, netede sau fin punctate, rotunde, lungi de cca 3—4 mm. Fruct matur, de jur-împrejur pe mijlocul muchiei, cu o cută ascuțită. Rostru scurt, abia recurbat. Receptacul păros. V—VII.

Stațiunea. Prin livezi și fânețe mai uscate, pe coaste ierboase și pietroase, locuri părăsite, lângă drumuri, în regiunea de câmpie și montană.

Răsp. în țară: Comună în întreaga țară.

Variabilitatea speciei

f. *valdepubens* (Jord.) Borza Consp. Fl. Rom. I (1947) 103. — *R. valdepubens* Jord. Diagn. I (1864) 82. — *R. bulbosus* var. *hirsutus* Saut. in ÖBZ XLIX (1899) 367. — Toată planta indesuit alb păroasă. — Indicată din Muntenia.

f. *incisus* (Grec.). — *R. bulbosus* β. *incisus* Grec. Supl. Consp. Fl. Rom. (1907) 7. — Frunze cu lacinii liniar lanceolate. — Reg. Craiova: Schela Cladovei (r. Tr. Severin).

f. *pseudobulbósus* (Schur). — *R. pseudo-bulbosus* Schur in Verh. SVN X (1859) 84, ÖBZ X (1860) 250, En. pl. Transs. (1866) 22; Ovcz. in Fl. U.R.S.S. VII (1937) 450 — *R. bulb.* f. *Aleae* (Willk.) Nyár. Kv. fl. III (1942) 224. — *R. Aleae* Willk. in Linn. XXX (1859) 84. — Baza tulpinii nu este bulbiform îngroșată. — Cluj, Apahida, Cojocna.

Răsp. gen.: Europa de NV.

21. *R. sardous* Cr. Stirp. austr. II, ed. I (1763) 84; ed. II (1769) 111; Ovcz. in Fl. U.R.S.S. VII (1937) 450. — *R. Philonotis* Ehrh. in Hanröw. Mag. 17 St. (1783) 270; Beitr. II (1788) 145. — *R. Phil.* β. *mediterraneus* Gris ap. Heuff. Enum. pl. Ban. in Verh. ZBG Wien VIII (1858) 45. — *R. Pseudo-hirsutus* Schur Enum. pl. Transs. (1866) 22. — Exs.: FEAH nr. 1725; HN nr. 4449; FRE nr. 777 sub var. *leve*. — Ic.: Pl. 96, fig. 1.

☉, ☉. Plantă asemănătoare cu *R. bulbosus*, înaltă de 10—30 (40) cm, cu rădăcină fibroasă și cu mai multe tulpini tufoase, ramificate, nebulboase, multiflore. Frunze bazale pețiolate, cu 3 segmente principale trisectate sau trifidate, cel mijlociu ± pețiolat, cu segmente secundare ± adânc lobate și dințate. Frunze tulpinale asemănătoare cu cele bazale, cele superioare sesile, simplu sectate, cu lacinii liniare. Toate părțile plantei lung și patent moi păroase, uneori devin glabrescente sau glabre. Flori galbene-aurii mai deschise și late de 10—20 (25) mm în diametru. Sepale 5, păroase, acute, la înflorire răsfărânte pe pedunculi, mai scurte decât cele 5 petale intrors ovate. Peduncul fructifer accentuat sulcat, caracter ce se observă bine sub fruct. Apocarp globulos, cu nucule glabre, rotunde, comprimate bilateral, lungi de 3—4 mm, netede sau foarte fin punctate, mature cu 3 dungi de jur împrejurul marginii. Rostru scurt, puțin încovoiat. Receptacul lung și păros. V—VII. Mai târziu planta înflorește încă odată.

Stațiunea. Pe arături umede, între semănături, șanțuri, pajiști, terenuri inundabile, în regiunea de câmpie și cea muntoasă.

Răsp. în țară: Comună în toate regiunile țării.

Variabilitatea speciei

- 1 a Plantă procumbentă, radicanță la noduri
f. *procumbens* Beck Fl. NÖ I (1890) 421.
 - 1 b Plantă erectă 2
 - 2 a Frunzele bazale și tulpinale lobate, nu sunt trisectate
f. *pseudomediterraneus* Porc. in Herb. ex. A. Nyár f. nova. — *Reg. Cluj*: Rodna.
Reg. Craiova: Păd. Zăvalu între Grindeni și Nedeia (r. Bechet)
 - 2 b Frunze trisectate 3
 - 3 a Plantă scundă, cu 1—2 flori. Frunze bazale întregi sau 3—7-lobate
f. *párvulus* (L.) Lge. in Willk. et Lge. Prodr. Fl. hisp. III (1880) 940. — *R. par-*
ovulus L. Mant. I (1767) 79. — *R. sard.* var. *nanus* Beck in Glasn. XXVI (1915) 218.
 - 3 b Plantă de statură normală 4
 - 4 a Plantă glabră, cel puțin în partea superioară. 5
 - 4 b Intreaga plantă păroasă 6
 - 5 a Partea inferioară a tulpinii și pețiolii frunzelor inferioare păroși, celelalte părți glabre
f. *subgláber* (Koch) Nyár. Kv. fl. III (1942) 244. — *R. Philonotis* B. *subglaber*
Koch Syn. I, ed. III (1857) 16. — *R. sardous* α. *typicus* Beck Fl. NÖ I (1890) 421.
 - 5 b Intreaga plantă aproape glabră
f. *lévis* Čel. Prodr. Fl. Böhm. III (1875) 418.
 - 6 a Frunze de 3 ori trisectate, cu segmente înguste
f. *disséctus* (Beck). — *R. sard.* var. *dissectus* Beck in Glasn. l.c.
 - 6 b Frunze trisectate 7
 - 7 a Nucule netede, fin punctate. Plantă patul viloasă
f. *villósus* (Beck) Hay. Prodr. Fl. balc. I (1927) 342. — *R. sard.* var. *villosus* Beck
l.c. (1915) 218.
 - 7 b Nucule verucoase spre margine sau pe întreaga suprafață
f. *hirsútus* Curt. Fl. Lond. II, ed. II (1821) 40. — *R. Philon.* var. *tuberculatus* Čel.l.c.
- Răsp. gen.: Europa, Asia de V.

22. *R. constantinopolitánus* D'Urv. Enum. pl. Archip. in Mém. Soc. Linn. Paris I (1822) 317, nr. 476, Sep. pag. 61; Ovez. in Fl. U.R.S.S. VII (1937) 452. — *R. lanuginosus* γ. *constantinopolitanus* DC. Syst. I (1818) 281 et δ DC. Prodr. I (1824) 37. — Exs.: FRE nr. 776. — Ic.: Pl. 98, fig. 2; Prod. Consp. Fl. Dobr. I (1935) 115, Pl. XXXII; Prod. Fl. II, ed. II (1939) tab. 47.

4. Tulpină până la 45 (80) cm înălțime, în partea inferioară, împreună cu pețiolii, patent viloasă, spre vârf adpres păroasă, ramificată. Frunze bazale

Planșa 98. — 1. *Ranunculus lanuginosus* L. — 2. *R. constantinopolitanus* D'Urv.



L.

3—5, lung pețiolate, cu lamină lată de 7—8 cm, până la $\frac{3}{4}$ parte trifidată. Segmente lat obovate, nu prea adânc bi- sau trilobate, cu lobi dur dințați, pe ambele fețe lung păroase, pe față închis, pe dos deschis verzi. Frunzele tulpinale la ramificații cu frunzișoare mici, liniare. Flori galbene, de 15—25 mm în diametru, cu sepele răsfrânte. Apocarp globulos, cu nucule glabre, netede, subrotunde, lungi de 4—5 mm, cu rostru subțire, încovoiat în formă de seceră. Receptacul glabru. IV—V.

Stațiunea. În lunci și păduri umede.

Răsp. în țară: *Reg. Craiova*: Craiova în lunca Jiului și la Păd. Bucovăț; Caracal la Păd. Romula. *Reg. Rucurești*: Malu Spart în Păd. Căscioarele (r. Crevedia); Intre Ghimpați și Căminasca la Păd. Slătioara (r. Mihăilești). *Reg. Galați*: Pechea (r. Galați).

Răsp. gen.: Balcani.

23. **R. lanuginosus** L. Sp. pl. ed. I (1753) 554, ed. II (1762) 779, em.; Ovez. in Fl. U.R.S.S. VII (1937) 467. — **Ic.**: Pl. 98, fig. 1.

4. Rizom scurt, premors, cu numeroase rădăcini. Tulpină erectă, înaltă de 30—50 (80) cm, ramificată, cilindrică, în partea inferioară fistuloasă, patent sau recurbat păroasă. Frunze bazale 2—3, mari, late până la 15 cm, lung pețiolate, abundant păroase, 5-fidate. Segmente lat ovate, seating sau se acoperă cu marginile, puțin divergente, dur și adânc dințate, cel din mijloc până la $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ parte fidat, cele laterale mai puțin fidate, cca până la $\frac{1}{3}$ parte. Frunze tulpinale 1—3, mari, asemănătoare cu cele bazale, scurt pețiolate, cele supreme sesile, simplu fidate, cu lacinii întregi. Flori multe, de (1,5) 2—3 (4) cm în diametru, cu peduncul cilindric, acoperit cu peri adreși. Sepale ovate, păroase. Petalele \pm de 2 ori mai lungi decât sepelele, galbene, lucioase, obovate, cu foveole nectarifere acoperite. Apocarp globulos, cu nucule glabre, rotunde, lungi de 4—5 mm, turtite lateral, cu un rostru subțire, recurbat în spirală. Receptacul glabru. V—VII.

Stațiunea. Pe sol bogat în humus, în păduri și tufișuri umede, văi înguste, umede, lângă pâraie în regiunea montană și subalpină.

Răsp. în țară: *Reg. Baia Mare*: Vișeu de Sus în V. Știopului, Vișeu de Jos (V. Morii), Petrova pe Mt. Șerban, Bistra pe Topolău, Mții Rodnei (Muncelu). *Reg. Cluj*: Valea Vinului, Mții Rodnei; Olpret (r. Dej); Mintiul Gherlii, Top (r. Gherla). *Reg. Aut. M.*: Gurghiu. *Reg. Stalin*: Bachnea (r. Târnăveni); Sighișoara; Mții Bucegi (V. Mălăești); Mții Făgărașului (Arpașul); Cislădioara pe Mt. « Götzenberg » (r. Sibiu). *Reg. Hunedoara*: Feneș (r. Alba Iulia). *Reg. Timișoara*: indicată de Heuffel din « Banat » fără localitate. *Reg. Galați*: Mrea Cocoș (r. Tulcea). *Reg. Bacău*: Tg. Ocna, Slănic, Câmpeni (r. Moinești); Mt. Ceahlău; Pipirig pe Mt. Petru Vodă; Mrea Neamțu (r. Tg. Neamț). *Reg. Iași*: Voinești, Dl. Repedea (r. Iași). *Reg. Suceava*: Mt. Rarău la Pietrele Doamnei; Solca la Păd. Slatina (r. Gura Humorului).

Răsp. gen.: Europa centrală și de S, Caucaz.

24. *R. ácer* L. Sp. pl. ed. I (1753) 554; Ovez. in Fl. U.R.S.S. VII (1937) 461. — *R. verrucosus* Schur in ÖBZ X (1860) 251. — *R. subtilis* Schur, *R. trachyticus* Schur et *R. Barthii* Schur Phytogr. in Verh. NV Brünn XV (1877) 41. — Floare broștească. — Réti boglárka. — Scharfer Hahnenfuss. — Лютик едкий. — Exs.: FRE nr. 1939. — Ic.: Pl. 99, fig. 2, 2 a — c.

4. Rizom scurt, premors cu numeroase rădăcini uniforme, la colet adeseori cu numeroase fibre rămase dela pețiolii din anii trecuți. Tulpină erectă, înaltă de (20) 30—60 (100) cm, ramificată, adpres hirsută. Frunze bazale de obicei mai multe, lung pețiolate, adpres păroase, mai rar glabrescente sau glabre, palmat 5—7-sectate. Segmente \pm 3-fidate și adânc dințate, cu lacinii îngust lanceolate la frunzele interioare și lanceolate sau ovat lanceolate la cele exterioare. Frunze tulpinale inferioare asemănătoare cu cele bazale, mai scurt pețiolate, cele superioare sesile, decrescente, sectate până la bază, cu lacinii \pm liniar lanceolate, cu 1—2 dinți, sau întregi. Flori multe, relativ mici, de cca 15—20 (25) mm în diametru. Peduncul adpres sericeu păros, cilindric, chiar și în stadiul fructifer. Sepale de 5—6 mm lungime, ovate sau eliptice, alipit păroase. Petale obovate, galbene-aurii, mai lungi decât sepelele, la bază cu foveola nectariferă acoperită cu o scvamă. Apocarp globulos, cu multe nucule așezate pe un receptacul glabru, subrotunde, glabre, lungi de 2—3 mm, turtite bilateral, cu un rostru foarte scurt. V—VIII (IX).


Stațiunea. Prin fânețe umede, șanțuri, locuri ierboase, turbării, mai ales în locurile umede.

Răsp. în țară: Foarte comună în întreaga țară, dela câmpie până în zona alpină.

Variabilitatea speciei

- | | | |
|-----|---|---|
| 1 a | Frunze bazale 5—7-sectate | 2 |
| 1 b | Frunze trisectate cu segmentele dințate | |
| | f. <i>trisectus</i> (Grec.) — <i>R. acris</i> δ . <i>trisectus</i> Grec. Supl. Consp. Fl. Rom. (1909) 7. — Curtea de Argeș pe Dl. Râpa cu Brazi. | |
| 2 a | Plantă mică de munte, înaltă de 5—20 (25) cm, cu 1—3 flori, cu frunze mai puțin sectate și lacinii mai late | 3 |
| 2 b | Plante mai înalte, normale | 4 |
| 3 a | Flori mici, de 8—12 mm în diametru, nu întrec sau abia întrec caliciul | |
| | f. <i>alpinus</i> Heuff. Enum. pl. Banat. in Verh. ZBG Wien VIII (1858) 44, Sep. pag. 9. — <i>R. acris</i> c. <i>subalpinus</i> Schur Enum. pl. Transs. (1866) 17, non Strobl. — <i>R. acer</i> var. <i>micranthus</i> Rikli ap. Schinz et Kell. Fl. Schw. II, ed. II, Krit. Fl. (1905) 78. — Mții Bucegi; Mt. Piatra Craiului; Mții Făgărașului. | |

Plansa 99. — 1. *Ranunculus Stevenii* Andr., 1a. apocarp. — 2. *R. acer* L., 2a, b. idem, var. *latiseetus* Beck, frunze, 2c. apocarp.



- 3 b Flori mai mari, mai lungi decât caliciul
f. *Kladnii* (Schur) — *R. acris* var. *Kladnii* Schur Phytogr. l.c. (1877) 42. — *R. acer* var. *subalpinus* Strobl. Fl. Admont. in Jahrb. Gymn. Melk (1882) 31, non Schur. — *R. parvulus* Clairv. Man. d'herb. (1811) 179, non L., nec Gmel. — *R. acris* d. *parvulus* Schur l.c. (1866) 18. — Mții Rodnei, Mții Făgărașului.
- 4 a Segment mijlociu sectat pe ambele laturi până la bază, sau aproape până la bază. 5
- 4 b Frunze nesectate până la bază, cu segmente laterale unite cu cel mijlociu 7
- 5 a Frunze multilaciniat. Segmentul mijlociu cu cel puțin 2 perechi de lacinii suprapuse, îngust laciniat sau liniare; laciniiile se încrucișează unele cu altele
f. *multifidus* (DC.) Nyár. Kv. fl. III (1942) 225. — *R. acris* γ. *multifidus* DC. Syst. I (1818) 278; Prodr. I (1824) 36. — *R. acer* α. *typicus* Beck Fl. NÖ I (1890) 420.
- 5 b Frunze cu mai puține lacinii. Segmentul mijlociu numai cu o singură pereche de lacinii mai late 6
- 6 a Segmentul mijlociu se subțiază într'un pețiol scurt
f. *stipitatus* Nyár. l.c. 225, fig. 29, nr. 3, cum diagn. hung. et in Bul. șt. Acad. R.P.R. Sect. Șt. Biol. tom. III, nr. 1 (1951) 30. — *Reg. Cluj*: Apahida, Sânicoadă. *Reg. Aut. M.*: Tg. Mureș; Lăzarea pe Dl. «Piricske» (r. Gheorghieni).
- 6 b Segmentul mijlociu la bază ± lat.
f. *napellifolius* (Cr.) DC. Syst. I (1818) 282. — *R. napellifolius* Cr. Stirp. austr. II, ed. I (1763) 90. — *R. acer* var. *napelloides* Borb. Vasvm. fl. (1887) 243.
- 7 a Marginea de jos a segmentelor inferioare constituie o linie ± continuă și ± perpendiculară pe pețiol; lacinii distanțate.
f. *rectangulus* Nyár. Kv. fl. III (1942) 225, fig. 29, nr. 6, cum diagn. hung. et in Bul. șt. Acad. R.P.R. l.c. (1951) 30. — Cluj (Păd. Făget).
- 7 b Marginile segmentelor inferioare fac cu pețiolii câte un unghi ascuțit; lacinii ± apropiate
f. *latisectus* (Beck) Nyár. Kv. fl. III (1942) 226. — *R. acer* β. *latisectus* Beck l.c. (1890) 420. — *R. rectus* Bor. Fl. centr. Fr. II (1857) 15.

Răsp. gen.: Eurasia, Africa de N, Caplanda, America de N.

25. *R. Stevenii* Andr. in Bess. Suppl. III Cat. pl. Gymn. Volh. (1814) 19 et Enum. pl. Volh. (1822) 22; Ovez. in Fl. U.R.S.S. VII (1937) 471. — *R. strigosus* Schur in ÖBZ X (1860) 252, n. nud. et Enum. pl. Transs. (1866) 17. — *R. malacophyllus* Schur l.c. (1866) 16. — *R. Kayseri* Schur Phytogr. in Verh. NV Brünn XV (1877) 43 et *R. Csatói* Schur l.c. (1866) 46. — Exs.: FEAH nr. 1720 I, II; FHE nr. 664; FRE nr. 778. — Ic.: Pl. 99, fig. 1, 1 a; Prod. Fl. ed. II, 2 (1932) 125, fig. 3.

4. Rizom lung, gros, orizontal. Plantă foarte viguroasă, înaltă de 40—100 cm, cu tulpină ramificată, în întregime acoperită cu peri rigizi, adpreși, în partea inferioară fistuloasă. Frunze bazale lung pețiolate, mari, edând 5—7-palmatisectate, segmente late, din nou 2—3-fidate, cu lacinii late, uneori peste 1 cm lățime, dur dințate. Frunze tulpinale asemănătoare, cele superioare sesile, sectate până la bază, cu lacinii late, întregi sau cu câțiva dinți. Pedunculi nesulcați, cilindrici. Flori mari, de 2—3 cm

în diametru. Sepale 5, alungit ovate, adpres lung păroase. Petale alungit obovate, de 8—24 mm lungime, de 2 ori mai lungi decât caliciul, galbene-aurii și lucioase, la bază cu o nectarie acoperită cu o scvamă. Apocarp globulos, cu multe nucule lungi de 3—3,5 mm, lat eliptice, atenuate spre ambele capete, glabre, cu rostru foarte scurt. Receptacul glabru. V—VIII.

Stațiunea. Prin livezi, fânețe umede, poieni, margini de păduri, din regiunea de câmpie până în cea subalpină.

Răsp. în țară: *Reg. Baia Mare*: Vișeu de Mijloc la Gura Bataei; Arded (r. Satu Mare); Carei, Urziceni, Ghilvaci. *Reg. Cluj*: Năsăud, Mții Rodnei (Corongiș, Inău); Unguș (r. Dej); Zalău, Mții Meseșului; Cluj, Someșeni, Dezmir, Sânicoadă, Apahida, Cojocna, Mții Gilăului; Turda, Cheia Turzii; Aiud, Vidra, Gârda de Sus (r. Câmpeni). *Reg. Aut. M.*: Tg. Mureș, Cocos; Borsec; Gheorghieni, Izvorul Mureșului, Bălan, Mții Giurgeului (Hăghimașul Mare, Mt. «Öcsém») Șumuleni, Simionești, Tușnad la turbăria Mohoș (r. Miercurea Ciuc); Tg. Săcuesc, Zagon, Cașon, Covasna. *Reg. Stalin*: Tiur (r. Târnăveni); Orașul Stalin, Predeal pe V. Râșnoavei; Mții Făgărașului (Arpașul, Breaza); Sibiu, Șura Mare, Cisnădioara pe Mt. «Götzenberg». *Reg. Hunedoara*: Cunța, V. Secașului, Mercurea, Armeni (r. Sebeș); Bărbant pe Dl. Bilac, Mesentea, Cetea, Mții Trascăului (V. Cricăului); V. Cernei (r. Hunedoara); Deva, Vărmaga; Luncoiul de Jos, Luncoiul de Sus (r. Brad). *Reg. Oradea*: Oradea; Stâna de Vale, Aleșd; Mții Bihorului (V. Iadului). *Reg. Arad*: Măscă, Macea (r. Arad); Pâncota, Arăneag (r. Ineu); Șimand (r. Chișineu-Criș); Cladova, Șoimuș, Bărzava, Săvârșin (r. Lipova); Dezna, Gurahonț, Hălmașiu (r. Gurahonț). *Reg. Timișoara*: Ghiroda (r. Timișoara). *Reg. Pitești*: Râmnicul Vâlcea; Dâmbovicioara (r. Câmpulung). *Reg. Ploiești*: Tinosu (r. Ploiești); Sinaia. *Reg. Constanța*: Ciucurova (r. Babadag). *Reg. Bacău*: Slănic (r. Tg. Ocna); Câmpeni, Pasul Ghimeș (r. Moinești); Mt. Ceahlău (Schitul Durău), Cheile Bicazului; Tg. Neamț, Schitul Tibucani. *Reg. Iași*: Scânteia (r. Negrești); Iași pe V. Bahluiului. *Reg. Suceava*: Bosanci (r. Suceava); Calafindești (r. Rădăuți).

Variabilitatea speciei


ssp. *eu-Stevenii* Nyár. Kv. fl. III (1942) 226, fig. 29, nr. 9, 10 cum diagn. hung.

Frunze 3—5-sectate aproape până la bază, cu segmente lat cuneate ce nu se ating. Lacinii fidate până la $1/2 - 1/3$, \pm subțiri.

f. *typicus* Nyár. Kv. fl. III (1942) 227, cum diagn. hung. — Tulpină în partea inferioară glabră sau cu peri adpreși, rar puțin patuli. — Cluj.

f. *strigulosus* (Schur) Nyár. l.c. — *R. strigulosus* Schur Enum. pl. Transs. (1866) 17, s.s. — *R. geraniiifolius* Schur in Verh. SVN X (1859) 128. — *R. strigulosus* var. *platyphyllus* Schur Phytogr. l.c. (1877) 44. — Tulpină în partea inferioară cu peri patenți, duri. — *Reg. Baia Mare*: Carei. *Reg. Cluj*: Năsăud, Mții Rodnei (Inău); Cluj. *Reg. Stalin*: Valea Lungă (r. Mediaș); Predeal (r. Stalin); Sibiu, Cisnădioara pe Mt. «Götzenberg». *Reg. Hunedoara*: Deva. *Reg. Ploiești*: Sinaia.

Plansa 100. — 1. *Ranunculus carpaticus* Herb., 1a. apocarp — 2. *R. pedatus* W. et K., 2 a. apocarp. — 3. *R. illyricus* L.



ssp. **Frieseanus** (Jord.) Nyár. l.c. — *R. Frieseanus* Jord. Obs. VI (1847) 17. — *R. malacophyllus* Schur Enum. fl. Transs. (1866) 16, s.s. — **Ic.**: Nyár. Kv. fl. III (1942) 226, fig. 29, nr. 11—13.

Segmente lat ovate, cu marginile tangente sau încălecate și cu lacinii foarte scurte, mai grosolan dințate.

Reg. Cluj: Cluj, destul de frecventă. *Reg. Stalin*: Sibiu, Cisnădia, Cisnădioara. *Reg. Aut. M.*: Izvorul Mureșului (r. Gheorghieni); Atid (r. Odorhei).

Răsp. gen.: Europa centrală și de S.

26. **R. carpaticus** Herb. Pl. rar. Galic. (1836) 15. — *R. montanus* var. *α. dentatus* Baumg. Enum. stirp. Transs. II (1816) 124. — *R. Gouani* Baumg. l.c. (1816) 125. — *R. Lerchenfeldianus* Schur in Verh. SVN (1852) 84, n. nud., IV (1853) 14 descr. — **Exs.**: FHE nr. 655 sub *dentato*; FRE nr. 1240 sub *dent.* — **Ic.**: Pl. 100, fig. 1, 1 a; Römer Pflzw. Sieb. (1898) tab. 20 sub *dent.*

4. Rizom orizontal, alb, gros de 8—15 mm și lung de 2—10 cm, adeseori ramificat, cu rădăcini fibroase abundente. Tulpină erectă, înaltă de 15—40 (50) cm, simplă sau puțin ramificată, cu 1—2 ramuri, de obicei unifloră, rar cu 2—3 flori. Toată planta glabrescentă sau adâres pubescentă. Frunze bazale 1—3, uneori lipsesc, mari, late până la 15 cm, lung petiolate, adânc trisectate, cu segmente mari, lat rombic obovate. Segmentele laterale adânc fidate, peste jumătate; cel mijlociu cu mult mai puțin trifidat; toate segmentele adânc și acut serate. Frunza tulpinală inferioară asemănătoare cu cele bazale, cea superioară sesilă, mai scurt trifidată, cu lacinii lanceolate, întregi sau dințate. Flori mari, de 3—4,5 cm în diametru, galbene-aurii. Sepale 5, alungit ovate, spre vârf îngustate, păroase. Petale de cca 2 cm lungime, lat obovate, de 2 ori mai lungi decât sepalele. Stamina numeroase. Carpele cu stigmat recurbat. Arocarp globulos, cu numeroase nucule, lungi de 3 mm, rotund obovate, glabre, cu un rostru scurt, încovoiat. Receptacul păros. VI—VII.

Stațiunea. În păduri montane și subalpine, marginea pădurilor, poieni, între 1100—1800 m.

Răsp. în țară: *Reg. Baia Mare*: Mții Rodnei: Pietrosul Mare, Izvorul Repede, Fața Meselor, Piatra Rea; Mții Țibleșului, Mții Gutinului. *Reg. Cluj*: Mții Rodnei: Ineu, Corongiș, Saca, Galați, Puzdrele, Șeaua Rebrii, Bătrâna, Bucuiescu, Priporul Pietrei Albe, Păltiniș, Izvorul Roșu, V. Vinului, Beneș. *Reg. Aut. M.*: Mții Călimani (Fătăcel-Drăguș, Scaunul), V. Mureșului între Deda și Toplița, Borsec, Bilbor; Mții Gurghiului (Dl. Crucii); Ciurmani (r. Gheorghieni); Sândominic în Mții Harghita, Pasul Tolvaioș, Tușnad pe Mt. «Büdös» (r. Miercurea Ciuc), Mții Giurgeului (Hăghimașul Mare, «Öcsém»); Căpălnița, Zetea la «Ördögtő»; Comandău (r. Tg. Săcuesc). *Reg. Stalin*: Pasul Buzău, Mții Ciucașului,

Mții Bârsei (Piatra Mare, Postăvarul, Piatra Craiului), Predeal (r. Stalin), Mții Bucegi; Șinca Nouă, Porumbacul de Sus (r. Făgăraș), Mții Făgărașului: Arpașul, V. Bâlei, V. Doamnei, Prislopul, Racovița, Surul. *Reg. Pitești*: Mții Făgărașului (Lespezi sub Negoiiul). *Reg. Ploști*: Sinaia, Bușteni, Azuga, Mții Bucegi: Piatra Arsă, Jepi, V. Jepilor, Caraiman, Coștila, V. Cerbului. *Reg. Bacău*: Mrea Horaița (r. Piatra Neamț); Mt. Ceahlău sub Piatra Lată, Cheile Bicazului, Mt. Ghilcoș, Tulgheș (r. Ceahlău); Agapia pe Dl. Sărții (r. Tg. Neamț). *Reg. Suceava*: Mții Bistriței (Pietrosul); Mt. Rarău la Pietrele Doamnei; Cărlibaba pe V. Cărlibaba (r. Vatra Dornei).

Variabilitatea speciei

f. pygmaeus Porc. Phaner. Năsăud (1881) 152. — *R. carp.* var. *rupicolus* Zap. Consp. Fl. Galic. crit. II (1908) 274. — Plantă scundă, de 15–25 cm înălțime, cu frunze mărunț și obtuz dințate; flori mari, cu petale lungi de 13–18 mm și late de 9–13 mm. — Mții Rodnei: Pietrosul Mare. Mții Călimani: sub Vf. Pietrosul. Mții Dornelor: Lucaciul. Mții Bistriței: Ceahlău la Boambe. Mții Bucegi: Caraiman.

f. flabellatus A. Nyár. *f. nova* in Add. pag. 687. — Frunze tulpinale inferioare rotunde, par a fi întregi, dar în realitate sunt fidate în formă de evantai până la 1/3 parte; lobii dințați. — Mții Călimani: Scaunul deasupra comunei Deda (1200 m).

f. plenus Zap. l.c. 274. — Petale numeroase (staminele transformate în petale). — Mții Călimani: Scaunul deasupra comunei Deda (1200 m).

f. anomalous A. Nyár. *f. nova* in Add. pag. 687. — Sepale mari cât petalele sau și mai mari, tridentate sau fidate. Plantă scundă. — *Reg. Aut. M.*: V. Gurghiului la Lăpușna (r. Reghin).

Răsp. gen.: Endemism carpatic.

Secția VIII. MICRANTHUS (Ovcz.). — *Micranthus* Ovcz. in Fl. U.R.S.S. VII (1937) 474, pro subgen., cum diagn. ross.

Flori sesile, mici, până la 2–3 mm în diametru, așezate la subțioara frunzelor și la bifurcațiile tulpinilor, la bază cu mici bractee formând involucre în jurul florii.

27. *R. lateriflorus* DC. Syst. I (1818) 251; Ovcz. in Fl. U.R.S.S. VII (1937) 474. — *R. nodiflorus* W. et K. Pl. rar. Hung. II (1805) 192, tab. 176, non L. — *R. nodifl. β. dentatus* Heuff. Enum. pl. Banat. in Verh. ZBG Wien VIII (1858) 45, Sep. pag. 10. — *Exs.*: FRE nr. 2670 a, b. — *lc.*: Pl. 90, fig. 3, 3a; W. et K. l.c.

○. Rădăcini numeroase, fibroase. Tulpină înaltă de 20–30 cm, glabră, fistuloasă, în partea superioară divaricată și bifurcată, bogat ramificată. Frunza bazală foarte lung pețiolată, cu limb lanceolat eliptic, cu margini întregi sau denticulate, se vestejește curând. Frunze tulpinale inferioare asemănătoare, celelalte decrescente, cele superioare îngust lanceolate, scurt pețiolate. Flori sesile pe ramificațiuni sau la subțioara frunzelor, cu petale foarte mici, lungi abia de 1–1,5 mm, galbene deschis. Apocarp globulos, sevaros, cu nucule lungi de 2–2,5 mm, ovate eliptice, glabre, pe laturi verucoase, cu un rostru drept, lung de 0,5 mm. IV–V.

Stațiunea. În locuri mocirloase, pășuni temporar inundate, bălți uscate, sărate, dela câmpie.

Răsp. în țară: *Reg. Baia Mare*: Carei, Foeni, *Reg. Cluj*: citată de Janka din «Câmpia Ardealului». *Reg. Oradea*: Sântioan (r. Oradea); Tileagd (r. Aleșd). *Reg. Arad*: Chișineu-Criș, Adea, Socodor, Șimand (r. Chișineu-Criș). *Reg. București*: București (Pantelimon). *Reg. Galați*: Tulcea, Mălcoci.

Răsp. gen.: Europa de S, Asia de SV.

Secția IX. ECHINELLA DC. Prodr. I (1824) 41. — *Pachyloma* Spach Hist. vég. Phan. VII (1839) 194, pro gen., Ovcz. in Fl. U.R.S.S. VIII (1937) 475 pro subgen.

Nucule turtite, acoperite cu asperități numeroase. Flori cu pedunculi lungi, fără bracte la bază.

28. *R. arvensis* L. Sp. pl. ed. I (1753) 555; Ovcz. in Fl. U.R.S.S. VII (1937) 478. — **Exs.**: FRE nr. 780 a-c. — **Ic.**: Pl. 101, fig. 1, 1 a, b.

○. Plantă înaltă de 20—30 cm, erectă, ramificată, multifloră, glabră sau pubescentă. Frunze variate, cele bazale pețiolate, la exemplarele mai slabe întregi, cuneat obovate, sau oblanceolate, la vârf adânc dințate sau trisectate, cu segmente dințate la vârf. Frunze tulpinale inferioare 3-sectate, cu segmente cuneat lanceolate, la vârf dințate. La exemplarele viguroase frunzele inferioare sunt palmat sectate sau aripat bisectate, cu lacinii cuneate, îngust lanceolate. Frunze superioare trisectate, cu lacinii \pm întregi. Peduncul pubescent. Flori relativ mici, de 5—10 mm în diametru. Sepale 5, alungit ovate, gălbui-verzi. Petale 5, obovate, de culoare galbenă, cu foveole nectarifere acoperite. Nucule 4—8, ovale, libere, bilateral turtite, lungi de 6—8 mm, cu un rostru subțire, lung de 2—3 mm, ușor curbat. Fetele nuculelor acoperite cu spinișori deși, conici; marginea lor cu o serie de spinișori mai lungi (2—3 mm). V—VII.

Stațiunea. Prin locuri cultivate, semănături, pârlouge, uneori ruderală.

Răsp. în țară: *Reg. Baia Mare*: Arded (r. Satu Mare); Berveni, Cămin, Carei. *Reg. Cluj*: Rodna, V. Șieului (r. Bistrița); Olpret (r. Dej); Morlaca (r. Huedin); Cluj, Gilău, Someșeni, Apahida, Cojocna, Boj; în jurul Cheii Turului prin semănături (r. Turda); Aiud. *Reg. Aut. M.*: Tg. Mureș (Dl. Sf. Ana) Corunca, Săbed; Căpâlnița (r. Odorhei). *Reg. Hunedoara*: Cunța (r. Sebeș); Șard (r. Alba Iulia). *Reg. Oradea*: Oradea. *Reg. Timișoara*: Timișoara, Sântandrei. *Reg. Craiova*: între Mîrga și Cireșul pe V. Topolniței (r. Tr. Severin); Coțofenii din Față, Bucovăț pe malul Jiului, Craiova în parcul Poporului. *Reg. București*: București (Pantelimon, Herăstrău, Chitila). *Reg. Constanța*: Constanța. *Reg. Iași*: Iași, Cristești, Cucuteni.

Variabilitatea speciei

var. *spinósus* Neilr. Fl. NÖ (1859) 690. — *R. arvensis* α . *typicus* Beck Fl. NÖ I (1890) 420. — Laturile nuculelor cu spinișori scurți sau mai lungi.

var. *tuberculatus* (DC.) Mert. et Koch in Röhl. Deutsch. Fl. IV, ed. III (1833) 188. — *R. tuberculatus* DC. Syst. I (1818) 297. — Laturile nuculelor numai cu verucozități \pm sferice.

Răsp. gen.: Eurasia, Africa de N.

29. *R. muricatus* L. Sp. pl. ed. I (1753) 555, ed. II (1762) 780, em.; Ovez. in Fl. U.R.S.S. VII (1937) 476, tab. XXX, fig. 1. — **Ic.:** Pl. 101, fig. 2, 2a.

○. Plantă înaltă de 10—50 cm, cu rădăcină fibroasă. Tulpină procumbentă, ascendentă sau erectă, fistuloasă, ramificată, glabră sau cu sete rare. Frunze bazale pețiolate, rotunde sau reniforme, 3—5-sectate, cu segmente lat obovate și lobat serate, cele tulpinale asemănătoare, pețiolate, cu vagine străvezii, membranoase, alipit rărit păroase sau glabrescente. Flori pedunculate, relativ mici. Sepale patente. Petale galbene deschis, alungit obovate, cu scvame nectarifere relativ mari. Nucule mari, bilateral comprimate, obovate, de cca 7—8 mm lungime, cu marginea netedă, verde, pe ambele laturi cu spinișori perpendiculari; rostrul până la 3 mm lungime, aproape drept. Receptacul păros. V—VI.

Stațiunea. Prin locuri umede, mocirloase.

Răsp. în țară: Plantă foarte rară lângă Galați.

Răsp. gen.: Regiunea mediteraneeană, India.

Secția X. RANUNCULÁSTRUM DC. Prodr. I (1824) 27. — Nucule comprimate lateral, adesea aripate, glabre sau păroase, fără asperități. Rădăcinile în parte îngroșate, tuberculiforme, în parte fibroase.

30. *R. oxyspermus* M. B. in Willd. Sp. pl. II, 2 (1800) 1328; Ovez. in Fl. U.R.S.S. VII (1937) 483. — **Exs.:** FRE nr. 769. — **Ic.:** Pl. 101, fig. 3, 3a, b; Prod. Cons. Fl. Dobr. I (1935) 109, pl. 29 et Fl. II, ed. II (1939) pl. CXXXI.

4. Rădăcini fibroase și în parte îngroșate, fusiforme. Tulpină înaltă până la 33 cm, mult ramificată, alb păroasă, cu peri moi, ratenți. Frunze radiale numeroase, pețiolate. Limb reniform, alipit păros, adânc trisectat, cu segmente obovate, spre vârf dilatate, trifidate; segmentele secundare adânc și neegal obtuz dințate. Pețiolii patent păroși. Frunze tulpinale mijlocii adânc sectate, cu lacinii lung cuneate și din nou adânc fidate, cele supreme trisectate, cu lacinii întregi, liniar oblanceolate. Peduncul lung, cilindric,

Planșa 101. — *Ranunculus arvensis* L., 1a. nuculă, 1b. *R. arvensis* var. *tuberculatus* (DC.) Mert. et Koch, nuculă. — 2. *R. muricatus* L., 2a. apocarp, 2b. nuculă mărită. — 3. *R. oxyspermus* M.B., 3a. apocarp, 3b. nuculă mărită.



lung patul păros. Flori de 20 — 25 (30) mm în diametru. Sepale reflecte, lungi de 7—8 mm, pe dos păroase. Petale galbene, lungi de 10—12 (14) mm. Apocarp oblong ovat, cu receptacul alungit cilindro-conic, glabru. Nucule lungi de 4—5 mm, cu rostru drept, erect, subulat, mai lung decât corpul nuculei. V — VI.

Stațiunea. Prin locuri nisipoase, pietroase și ierboase, mărăci-nișuri.

Răsp. în țară: *Reg. București*: Ciulnița (r. Călărași); Slobozia spre Bora (r. Slobozia). *Reg. Constanța*: Medgidia; Basarabi, Constanța la Anadolchioi, Techirghiol, Mangalia; Enisala (r. Babadag). *Reg. Galați*: Malcoci, Tulcea; Măcin. *Reg. Iași*: Iași pe V. Bahluiului.

Răsp. gen.: Balcani. U.R.S.S. de S, Caucaz.

31. **R. pedátus** W. et K. Pl. rar. Hung. II (1805) 112, tab. 108; Ovez. in Fl. U.R.S.S. VII (1937) 494. — **Exs.**: FEAH nr. 1710 I, II; FRE Nr. 49. — **Ic.**: Pl. 100, fig. 2, 2a; W. et K. l.c.

4. Rădăcini îngroșate, cilindrice sau fusiforme. Tulpină erectă, înaltă de 14—30 cm, pubescentă, bifurcat ramificată, cu ramuri subțiri. Frunze bazale numeroase, glabre, palmat sectate; segmentul mijlociu întreg, cele laterale din nou adânc sectate, cu lacinii liniar-lanceolate, întregi sau rar dințate. Frunze tulpinale mijlocii trifidate, cele supreme bifidate sau simple, filiforme. Flori late de 15—20 mm, cu sepale eliptice, păroase, de cca 5 mm lungime și petale alungit obovate, galbene ca lămâia, lungi de cca 10 mm. Apocarp elipsoidal. Nucule cu rostru erect, cu vârful îndoit. IV—V.

Stațiunea. Locuri ierboase, însorite, pe soluri slab alcaline.

Răsp. în țară: *Reg. Baia Mare*: Foeni, Cămin, Carei. *Reg. Cluj*: Turda. *Reg. Timișoara*: Timișoara, Moravița (r. Deta). *Reg. Craiova*: Popoveni între Lacul Popii și canalul colector (r. Craiova); Padea (r. Bechet). *Reg. București*: Comana spre Grădiște (r. Vidra); Ghimpați în pășunile « La Slătioare » (r. Mihăilești). *Reg. Ploști*: Buzău spre Păd. Crângu. *Reg. Bârlad*: Tecuci, Drăgănești; Bârlad în Grădina publică și la Țuguiața; V. Elanului (r. Murgeni). *Reg. Iași*: Vaslui; Iași (V. Nicolinei), Șorogari, Lețcani, Cucuteni, Erbiceni, Mânzătești, Cărlig, Munteni, Valea Lungă, Mânzătești, Focuri, Vlădeni, V. Bahluiului dela Podul Iloaiei până la Prut.

Răsp. gen.: Balcanii de E., U.R.S.S. de S.

32. **R. illyricus** L. Sp. pl. ed. I (1753) 552; Ovez. in Fl. U.R.S.S. VII (1937) 489. — Trânjoaică. — *Selymes boglárka*. — *Illyrischer Hahnenfuss*. — Лютик иллирийский. — **Exs.**: FRE nr. 50. — **Ic.**: Pl. 100, fig. 3.

4. Plantă cu rădăcini îngroșate, tuberculiforme, lungi de 5—12 mm și cu rădăcini fibroase. Tulpină erectă, subțire, înaltă de 20—50 cm, ca și

întreaga plantă, alb lănoasă, simplă sau ramificată. Frunze bazale lung pețiolate, de obicei trisectate, cu lacinii liniar lanceolate și întregi, sau 2—3-sectate, fin ascuțite, albe, mătăsoase lucioase din cauza perilor deși, adpreși. Frunze superioare trisectate, sau cele supreme simple, liniar lanceolate. Flori de 15—30 mm în diametru, galbene deschise, lucitoare. Sepale 5, reflecte, păroase. Petale de 8—14 mm lungime, lat obovate, la bază cu o pungă de glande nectarifere lunguiețe. Apocarp ovat sau elipsoidal. Nucule numeroase, bilateral turtite, ovate, de jur împrejur muchiate, cu un rostru drept, conic ascuțit, lung de cca 3 mm. Receptacul cilindric, glabru. V—VI. Stațiunea. În locuri ierboase, însoțite, tufișuri, coline, pășuni.

Răsp. în țară: *Reg. Baia Mare*: Carei. *Reg. Cluj*: Cluj pe dealurile de deasupra Com. Sâncioară (cariera părăsită); Cheia Turzii. *Reg. Stalin*: pe malul drept al Râului Sebeș (r. Făgăraș). *Reg. Hunedoara*: Sebeș; Orăștie; Deva. *Reg. Oradea*: Băile Felix, Betfia pe Dl. Șimlăului (r. Oradea). *Reg. Arad*: Mocrea (r. Ineu). *Reg. Timișoara*: Mehadia. *Reg. Craiova*: Turnu Severin; Calafat; Bechet; Celaru pe marginea Păd. «Grinduri» și la «La Tir» (r. Caracal). *Reg. București*: Alexandria; Ciulnița (r. Călărași); Slobozia, Mărculești la Păd. Berlești-Popești (r. Slobozia). *Reg. Constanța*: Cernavoda; Constanța la vii; Babadag, Enisala. *Reg. Galați*: Agighiol, Tulcea pe Dl. Lozova, Filimon Sârbu pe Dl. Consul, Nifon; Măcin, Greci pe Dl. Țuțuiatu; Hanu Conachi (r. Măicânești). *Reg. Bârlad*: Puțeni (r. Tecuci); Panciu. *Reg. Iași*: Iași (Copou), Aroneanu, Breazu, Păun, Dl. Repedea, Șorogari, Coadă Stâncii, Mărzești, Spinoasa, Ciurea (r. Iași). *Reg. Suceava*: Dorohoi; Ciornohalu (r. Trușești).

Variabilitatea speciei

f. *moldávicus* (Proc.-Procop.) Borza Cons. Fl. Rom. I (1947) 102. — *R. illyricus* ssp. *moldavica* Proc. - Procop. Enum. pl. vasc. St.-Ștef. in Publ. Soc. Natur. Rom. I (1901) 20. — Tulpini și ramuri îngroșate. Frunze lanceolate, cu margini întregi. — *Reg. Suceava*: Stânca-Ștefănești (r. Trușești).

Răsp. gen.: Europa centrală și de SE, Asia.

33. *R. millefoliatus* Vahl Symb. II (1791) 63, tab. 37. — *R. garganicus* Ten. Fl. Nap. IV (1830) 78. — *lc.*: Prod. Cons. Fl. Dobr. I (1935) 107, pl. XXVIII; Prod. Fl. ed. II (1939) pl. CLVIII.

4. Plantă cu numeroase rădăcini îngroșate, fusiforme, lungi până la 12 mm, cele neîngroșate fibroase. Tulpină erectă, adeseori ramificată, cu una sau puține flori, înaltă de 20—50 cm, patent lung păroasă; numai pedunculii alipit păroși. Frunze bazale numeroase, ± glabrescente, dublu penatisectate, cu lacinii numeroase, liniar lanceolate, late de 1—2 mm, obtuziuscule. Frunze tulpinale palmatisectate, cu lacinii liniare, întregi sau slab dințate, pubescente, cele supreme trifidate sau solitare. Flori mari, de 20—30 mm în diametru. Sepale lanceolate, alipit păroase, Petale 5, alungit obovate, lungi de 10—13 mm. Apocarp ovat sau elipsoidal, cu nucule numeroase, glabre, lungi de

2—3 mm, cu rostru lung, drept, mai târziu recurbat. Receptacul glabru. IV — VI.

Stațiunea. Locuri ierboase.

Răsp. în țară: Reg. Craiova: pe malurile Dunării la Calafat.

Răsp. gen.: Balcani.

Hibridi

× *R. malomvölgyensis* Nyár. Kv. fl. III (1942) 229, cum diagn. hung. et in Bul. št. Acad. R.P.R. Sect. Șt. biol. tom. III, nr. 1 (1951) 30 = *bulbosus* × *polyanthemus*. — × *R. bulbosus* × *polyanthemus* Nyár. in Bul. Grăd. Bot. Cluj XVI (1936) 67, cum descr. rom. et ibid. pag. 115 in Sched. ad FRE nr. 1463. — × *R. malomvölgyensis* (= *R. bulbosus* — *sardous*) Nyár. l. c. (1942) 229, emend. l. c. VIII—IX (1944) 665, nr. 229 (= *bulbosus* — *polyanthemus*).

Se poate recunoaște ușor după părozitate. *R. polyanthemus* tipic are părozitate patentă, galbenă-roșcată, rigidă, tare, elastică, cu peri culcați numai pe peduncul. *R. bulbosus* are părozitate albă, compusă din peri subțiri, moi, neelastici, ca o vată, iar perii de pe pedunculi și de pe marginea frunzelor sunt tot patenți. Hibridul are în măsură egală peri amestecați de ambele feluri.

Cluj la V. Morii.

× *R. intercédens* Domin in Preslia XIII—XV (1935) 83 = *acer* × *Stevenii*. — *R. acris* × *Steveni* Porc. Năsăud (1881) 151.

Se găsește între părinți, în forme variabile, asemănându-se mai mult când cu una, când cu cealaltă specie.

Reg. Cluj: în pometuri la Năsăud; Cluj, frecvent. Reg. Aut. M.: Tușnad. Reg. Oradea: Diosig (r. Săcuieni).

× *R. pseudoacris* Schur Phytogr. l. c. (1877) 41 = *acer* × *oreophilus*. — *R. pseudoacris* (*Breyninus* × *acer*) Simk. Enum. Fl. Transs. (1866) 49. —

Are caractere intermediare între *R. acer* și *R. oreophilus*.

Orașul Stalin, în locuri ierboase și umbroase pe Mt. Tâmpa.

Genul 127. *THALICTRUM* *) L.

Gen. pl. [ed. I (1737) 146, nr. 461], ed. V. (1754) 242, nr. 617. — *Rutisor*.

Plante perene ierbacei, cu rădăcini secundare dese, adesea cu rizomi subterani rari, repenți. Frunze alterne, pețiolate sau sesile, de obicei penat com-

*) Dela grecescul « thálictron » numele speciei *Thalictrum minus* la Dioscorides (sec. I e.n.), « thalíectron » la Galenus (131—203 e.n.).

puse, cu sau fără stipele. Inflorescența un racem terminal pauciflor, sau foarte ramificată, formând paniculă sau corimb. Flori actinomorfe. Periant simplu, de obicei cu 4 foliole petaloide, libere, caduce, mai scurte decât staminele. Nectarile lipsesc. Stamine multe, cu filamente lățite sau filiforme, ± lungi, viu colorate. Carpele puține sau mai multe (1—12), libere, sesile sau pedunculate, erecte sau pendule. Fruct nukulă aripată sau mai des numai longitudinal costată.

Genul cuprinde peste 80 de specii răspândite în Europa și regiunile extra-tropicale ale Asiei și Americii de N. La noi cresc 8 specii.

Determinarea speciilor

- 1 a Fructe pedunculate, lungi de 10—18 mm, pendule, trimuchiāt aripate. Flori violetesau albicioase 1 **Th. aquilegifolium**
- 1 b Fructe sesile sau foarte scurt pedunculate, lungi de 1—7 mm, cu coaste nearipate. Flori galbene 2
- 2 a Filamentele se lățesc foarte accentuat spre antere și devin mult mai late decât acestea. Inflorescența corimb cu puține flori . . . **Th. petaloideum**
- 2 b Filamentele peste tot egal de subțiri sau chiar dacă sub antere se lățesc puțin, nu sunt mai late decât acestea 3
- 3 a Flori așezate în racem terminal pauciflor, nutante. Fructe puține, foarte scurt pedunculate, cu stigmat curbat. Tulpină scundă (— 15 cm) numai cu frunze bazale 2. **Th. alpinum**
- 3 b Flori în paniculă sau corimb multiflor. Tulpină de obicei mai înaltă, rareori scundă 4
- 4 a Foliolele frunzelor aproape tot atât de lungi cât late, sau numai cu puțin mai lungi, lat ovate sau rotunde 5
- 4 b Foliolele frunzelor (cel puțin la frunzele mijlocii și superioare) cu mult mai lungi decât late, înguste, alungite 6
- 5 a Nucule ± turtite, ascuțit longitudinal muchiate, glandulos păroase. Stigmat denticulat pe margini. Tulpină. pețiole și frunze scurt glandulos păroase și des simplu păroase, rar glabre (var. *alpestre*). Foliole de regulă mai scurte de 1 cm, lobate sau fidate 3. **Th. foetidum**
- 5 b Nucule cu fețe convexe. Stigmat nedenticulat. Plantă de regulă glabră, uneori glandulos păroasă sau, mai ales la noduri, fin pubescentă. Foliole de 4—30 (50) mm lungime, de obicei orbiculare sau cordate, cu 2—3 lobi obtuziusculi 4. **Th. minus**
- 6 a Vârful anterelor de regulă acut sau acuminat. Inflorescența o paniculă mică, îngustă, ovată sau conică 5. **Th. simplex**
- 6 b Vârful anterelor obtuz. Inflorescența corimboasă, lată, cu ramurile laterale patente, alungite. Tulpină de regulă înaltă, puternică 7
- 7 a Rizom târător, stolonifer, cu stoloni galbeni. Frunze de obicei stipe late. Foliolele alungit eliptice, lanceolate sau cuneat ovate, mari, de 2—3 cm lungime, mai lungi decât late, întregi sau acut lobate . . . 6. **Th. flavum**

- 7 b Rizom netârător, cu numeroase rădăcini. Frunze nestipelate. Foliiolele, cel puțin la frunzele mijlocii și superioare, liniare sau lanceolate, la cele inferioare mai late, întregi sau cu 2—3 lobi . . 7. **Th. lucidum**

Secția I. **TRIPTERIUM** DC. Syst. I (1818) 168.

Nucule pedunculate, cu muchii aripate.

1. **Th. aquilegiifolium** L. Sp. pl. ed. I (1753) 547; S. Nevski in Fl. U.R.S.S. VII (1937) 512, tab. XXXV, fig. 3. — *Tripterium aquilegifolium* Schur Enum. pl. Transs. (1866) 7. — Rutișor. — Cămolylevelü virnânc. — Ackeleiblättrige Wiesenraute. — Василисник водосборолистный. — Ic.: Pl. 102, fig. 1, 1a—c.

4. Tulpină erectă, înaltă de 30—100 (—130) cm, glabră, longitudinal fin brăzdată. Frunze 2—3-ternat penate, stipelate, mari. Stipele mici, membranoase. Foliiole lat rotund obovate sau cuneate, la bază adesea cordate, la vârf de obicei lat trilobate sau grosolan crenate. Foliiole late de 5—40 mm și lungi de 20—50 mm. Flori numeroase în paniculă corimbiformă, cu pedunculi floralî lungi de 5—20 mm. Periant cu 4 foliole caduce, obovate sau obovat cuneate, de 4—4,5 mm lungime și 2—2,5 mm lățime, glabre, verzui sau rar albe. Nectarîi lipsesc. Stamine multe, mai lungi decât periantul. Filamentele liliachii sau albe, se lățesc treptat spre antere și devin tot atât de late sau mai late decât anterele. Vârful anterelor rotunjit. Carpele puține, ovoide sau elipsoidale. Nucule glabre, de 10—18 mm, de culoare brună, trimuchiata aripate, cu pedunculi de 3—5 mm lungime, pendule, de formă invers ovoidă, la capăt obtuze, cu cioc lung de 0,5 mm. V—VIII.

Stațiunea. Marginea pădurilor, a tufișurilor, prin livezi și fânețe.

Răsp. în țară: Comună pretutindeni, dela șes până în regiunea montană și subalpină.

Variabilitatea speciei

var. **typicum** Beck Fl. NÖ I (1890) 423. — Foliiolele frunzelor la vârf obtuze sau rotunjite, majoritatea lor cu dinți mari, rotunjiți. Filamente albicioase sau violet deschise. Plante înalte, viguroase. — Foarte comună.

f. **atropurpureum** (Jacq.). — *Th. atropurpureum* Jacq. Hort. Vindob. III (1776) 34, tab. 61. — Tulpină deschis sau mai întunecat purpuriu colorată.

f. **niveum** (Baumg.). — *Th. aquilegiaefolium* γ *niveum* Baumg. Enum. stirp Transs. II (1816) 118. — *Th. australe* Bornm. ap. Fritsch in Verh. ZBG Wien XLIX (1908) 225. — Plantă cu flori albe. — Sporadică.

var. **acutidentatum** A. Nyár. var. nova in Add. pag. 687. — Foliiolele frunzelor tulpinale multidentate, cu dinți sau lobi ± alungiți, acuți sau unii puțin obtuziusculi. — *Reg. Aut. M.*: Tg. Mureș între oraș și Căpâlna spre cimitirul « Măriași ».

var. **pauciflorum** (Schur). — *Tripterium pauciflorum* Schur in Verh. SVN III (1852) 82, n. nud., ibid. IV (1853) 8, descr.; Enum. pl. Transs. (1866) 7. — *Th. aquilegifolium* ssp. *pauciflorum* Simk. Enum. Pl. Transs. (1866) 33. — *Th. aquilegif.* f. *alpestre* Rikli ap.

Hegi Fl. Mittel-Eur. III (1912) 589. — Plantă mică, înaltă de 20–25 cm, cu frunze mici. Flori albe, puține (9–12). — *Reg. Cluj*: Mții Rodnei (Vf. Gărgălău); Poșaga pe Mt. Scărița, Runc (r. Turda); Vidra, Neagra, Scărișoara, Mții Bihorului (Mt. Mare). *Reg. Stalin*: Mt. Piatra Mare în V. Gârcinului, Mții Bucegi (r. Stalin); Mții Făgărașului (Breaza, Arpașul, Cascada Bălea); Sadu pe Dl. Muma (r. Sibiu). *Reg. Hunedoara*: Mții Retezatului (Lacul Zănoaga). *Reg. Ploști*: Mții Bucegi (Caraiman, Peștera Ialomiței). *Reg. Bacău*: Mt. Ceahlău (Panaghia spre Schitul Durău), Mt. Măgura din V. Bistricioarei (r. Ceahlău).

Răsp. gen.: Europa, Asia Mică.

Secția II. EUTHALICTRUM DC. Syst. I (1818) 172. — Nucule sesile sau cu pedunculi foarte scurți, numai cu muchii longitudinale proeminente, nearipate.

Th. petaloidéum L. Sp. pl. ed. II (1762) 771; S. Nevski in Fl. U.R.S.S. VII (1937) 518, tab. XXXV, fig. 5. — *Ic.*: Pl. 106, fig. 4, 4a.

4. Tulpină erectă, glabră, înaltă de 15–30 (–50) cm, subtil angulat costată, la bază adesea violetă. Frunze bazale suriu-verzi, lat triunghiulare, ternat tripenate, de 4–10 cm lungime, cele tulpinale numai 1–2, mici, așezate spre baza tulpinii, cu pețioali lungi de cca 20 cm. Foliiolele frunzelor lipsite de nervuri proeminente, subrotund ovate sau ovate, lungi de 2–10 mm și late de 1–6 mm, întregi sau, în parte, cu 2–3 lobi obtuzi. Stipele lipsesc. Auriculele vaginilor mici, rotunjite. Inflorescență erectă, în corimb. Flori albe sau slab roze, cu peduncul de 1–3 cm lungime. Foliiole periantiale 4, obovate, lungi de 4–5 mm și late de cca 2,5 mm. Stamina numeroase, albe, lungi de 6–8 mm, cu antere eliptice, obtuze la vârf și lungi numai de 0,5–1 mm. Filamentele staminelor se lătesc evident spre antere, fiind de 2–3 ori mai late decât acestea. Carpele 4–12, sesile, eliptice, evident lung costate. Nucule ovate, groase, fără peduncul, de 3,5–4 mm lungime și de cca 2–2,5 mm grosime, cu 8 muchii proeminente, nearipate și cu rostru lung de 1 mm, uncinat. V–VI.

Stațiunea. În stepe pietroase, mai rar în fânețele de stepă.


Răsp. în țară: citată de Janka (Term. füz. 1866) dela Ditrău (Reg. Aut. M., r. Gheorghieni). Ulterior nu a mai fost regăsită.

Răsp. gen.: Galiția de E, Siberia, Asia de E.

2. **Th. alpinum** L. Sp. pl. ed. I (1753) 545; S. Nevski in Fl. U.R.S.S. VII (1937) 519, tab. XXXV, fig. 1. — *Ic.*: Pl. 103, fig. 2, 2a.

4. Tulpină erectă, neramificată, înaltă de 5–15 (20) cm, fără frunze sau numai cu o singură frunză tulpinală. Frunze bazale cu pețioali lungi

Plansa 102. — 1. *Thalictrum aquilegifolium* L., 1 a. o stamină, 1 b. apocarp, 1 c. secțiunea transversală a nuculei. 2. — *Th. foetidum* L., 2 a. apocarp.



de 1—4 cm, adunate în rozetă, de 2 ori penate, lungi de 1,5—3 cm și late de 1—2,5 mm. Foliiolele frunzelor rotunde sau rotund obovate, la vârf cu 3—4 dinți obtuși, aproape pieleose, cu margini puțin recurbate, lungi de 3—5 (7) mm și aproape de aceeași lățime, glabre, ± lucioase și verzi închise pe partea superioară, verzi-albăstrui pe cea inferioară. Stipele lipsesc. Inflorescența un racem simplu, cu puține flori, lung de 1,5—8 cm. Flori pedunculate, cu pedunculi lungi de 2—4 mm, îndoiți în jos în formă de arc. La baza pedunculilor se află bractei verzi, ovale sau alungit ovale și dințate la vârf, lungi de 3—4 mm. Periant cu 4 foliole eliptice, obtuze, lungi de 2—3 mm, roșii-brune. Stamine 8—10 (—15), lungi de cca 6 mm, pendule, cu filamente filiforme, neîngroșate, violet, cu antere galbene și acuminate la vârf. Carpele puține, cu pedunculi scurți, de formă alungit ovată, cu stigmat roșu și curbat. Fructe nucule ovoide, slab turtite lateral, scurt pedunculate sau subsesile, lungi de 3—3,5 mm și late de cca 1 mm, cu cioc scurt, îndoit, cu 10—15 coaste longitudinale, ± anastomozate. V—VII.

Stațiunea. În pășunile pietroase alpine și subalpine.

Răsp. în țară: *Mții Rodnei* (Inău). *Mții Bistriței*: Ceahlău. *Mții Bucegi*: Piatra Arsă, Caraiman pe brâne, Coștila pe Brâna Mare între V. Albă și V. Coștilei. — Confirmată recent numai în stațiunile din Bucegi.

Răsp. gen.: Europa de N, Asia de N, Caucaz, America de N.

3. **Th. foetidum** L. Sp. pl. ed. I (1753) 545; S. Nevski in Fl. U.R.S.S. VII (1937) 520, tab. XXXV, fig. 2. — **Exs.:** FEAH nr. 2560. — **Ic.:** Pl. 102, fig. 3; W. et K. Ic. II (1805) tab. 174.

4. Plantă înaltă de 15—50 (80) cm, cu rizom scurt, viguros. Tulpină erectă, dreaptă sau în zig-zag, des și uniform frunzoasă, în partea inferioară violetă, ramificată, cilindrică, abia muchiată. Intreaga plantă și mai ales dosul frunzelor scurt glandulos păroasă, des simplu păroasă, foarte rar glabră sau acoperită cu peri glanduloși mici. Frunze de 3—4 ori penate, pețiolate sau (cele superioare) aproape sesile, cu pețiol ± cilindric, lung de 1—4 cm, cu lamină lat triunghiulară, până la 10—20 cm lungime și ± de aceeași lățime. Foliiole mici, lungi de 2—10 (15) mm, aproape rotunde, rotund ovate sau invers ovate, cu baza uneori slab cordată, la vârf trilobate sau fidate, cu lobi neuniform obtuși dințați, pe ambele fețe păroase sau foarte rar glabre, cu pețiole de obicei foarte scurte. Stipele lipsesc. Inflorescență paniculă sau corimb, bogată în flori lung pedunculate. Foliiole periantiale 4, lungi de 3—5 mm și late de 1—2 mm, ovoide, verzi sau slab colorate în violet, glabre, caduce. Stamine numeroase, pendule, de 2 ori mai lungi decât foliolele periantului. Filamentele staminelor liniare sau puțin lățite

spre antere, dar totdeauna mai înguste decât anterele. Carpele sesile, de cca 10 ori mai scurte decât periantul, cu stigmat roșu, sesil, denticulat pe margine. Nucule sesile, ovoide sau ovoid alungite, comprimate, lungi de 2—3,5 mm și late de 1,5—2,5 mm, glandulos păroase, cu muchii longitudinale, nearipate, cu cioc drept sau puțin îndoit, lung de cca 1 mm. VI—VIII.

Stațiune a. Pe coaste stâncoase, stâncării și râpe în regiunea montană.

Răsp. în țară: *Reg. Cluj:* Cheia Turzii, Rimetea pe Colții Trascăului, dealurile din jurul Com. Lunca, Poșaga pe Mt. Scărița; Poiana Aiudului. *Reg. Aut. M.:* Aluniș (r. Reghin). *Reg. Stalin:* Racoșul de Jos pe Dl. «Töpehegy» (r. Rupea); Orașul Stalin. *Reg. Hunedoara:* Mții Trascăului (Piatra Ceții, Piatra Caprei). *Reg. Timișoara:* Băile Herculane. *Reg. Pitești:* Mrea Bistrița pe V. Bistriței (r. Horezu); V. Dâmbovicioarei (r. Câmpulung). *Reg. Ploiești:* Mții Bucegi (Zănoaga); Urziceni, Bărcănești-Speteni. *Reg. Bacău:* Mt. Ceahlău la Răchitiș; Mrea Neamțului (r. Tg. Neamț).

Variabilitatea speciei

- 1 a Plantă scundă, numai de 10—20 cm înălțime, cu frunze bazale îndesuite. Plantă alpină var. **alpêtre** Gaud. Fl. helv. III (1828) 502. — *Reg. Cluj:* Cheia Turzii. *Reg. Bacău:* Tulgheș la Pietrele Roșii (r. Ceahlău).
- 1 b Plantă înaltă de 20—80 cm, cu tulpină frunzoasă. 2
- 2 a Foliiolele frunzelor cel mult de 10 mm lungime, mai ales pe dos bogat glandulos păroase var. **genúinum** Rikli ap. Hegi Fl. Mitt.-Eur. III (1912) 591.
- 2 b Foliiolele frunzelor lungi de 10—17 mm, mai slab glandulos păroase var. **macrólobum** Schur Enum. pl. Transs. (1866) 7. — Cheile Bicazului; Mții Bucegi (numai pe vers. de S al Mtelui Zănoaga).

Răsp. gen.: Eurasia.

4. *Th. minus* L. Sp. pl. ed. I (1753) 546; S. Nevski in Fl. U.R.S.S. VII (1937) 524. — Rutisor. — Kőzönséges virnanc. — Kleine Wiesenraute. — Василисник малый. — **Ic.:** Pl. 104—105 cum formis multis.

4. Plantă de 30—120 (—150) cm înălțime, cu tulpină erectă, ramificată, la noduri slab geniculat îndoită, ± în zig-zag, adânc sau mai atenuat longitudinal brăzdată. Frunze pețiolate, numai cele tulpinale superioare sesile, cu lamina de 2—3 ori penată, lat triunghiulară, de 7—30 cm lungime și aproape de aceeași lățime. Stipele de obicei lipsesc. Foliiolele frunzelor de mărime și formă foarte variată, de obicei tot atât de lungi cât late sau numai cu puțin mai lungi, între 4—50 mm, lat ovate sau rotunde, cu 2—3 lobi obtuziusculi, groase, pieltoase sau subțiri și membranoase, cu nervațiune pe dos proeminentă sau slab vizibilă, de

Plansa 103. — 1. *Thalictrum simplex* L. — 2. *Th. simplex* L. var. *soboliferum* Schur. — 3. *Th. alpinum* L. — 4. *Th. simplex* L. ssp. *galioides* (Nestl.) Borza.



culoare verde sau albăstruie-surie. Flori pendule, galbene, de obicei cu pedunculi lungi de 5 — 10 (— 20) mm, adunate în paniculă piramidală sau ovală, multifloră, cu ramuri erecte sau \pm aplecate. Foliule periantiale 4, ovoide, lungi de 3—4 mm și late de 1,5—2 mm. Stamine multe (10—15), pendule, lungi de 7—8 mm, cu filament subțire. Stigmat nedenticulat. Nucule sesile, erecte, ovoide sau ovoid eliptice, cu fețe convexe, lungi de 2,5—4 mm și late de 1,2 mm, longitudinal pronunțat costate, cu cioc drept, cca de 1 mm lungime. V—VIII.

Stațiunea. Prin fânețe de stepă, coline ierboase, livezi, marginea pădurilor, locuri stâncoase dela câmpie până în regiunile montane și subalpine.

Obs. *Th. minus* este o specie foarte polimorfă, care se compune din unități numeroase și variate, de cele mai multe ori independente ecologic și morfologic. Forma tipică, pe care o prezentăm în planșa 104, fig. 2, nu crește la noi.

Variabilitatea speciei

- 1 a Cel puțin dosul frunzelor \pm glandulos sau glandulos păros..... 2
- 1 b Frunze glabre sau pubescente, neglanduloase..... 5
- 2 a Frunze rigide, pieleose, mici, cu lobii foliolelor obtuz mucronați și nervuri foarte proeminente. — *Reg. Constanța*: Medgidia; Mangalia
var. *olympicum* Boiss. Fl. or. I (1867) 8. — *Reg. Constanța*: Medgidia; Mangalia.
- 2 b Frunze mai moi, papiracee, cu nervuri puțin proeminente..... 3
- 3 a Tulpină, pețiole, foliole pe dos sau și pe față, stipitat glanduloase
var. *glandulosum* (Wallr.) Koch Syn. I, ed. III (1857) 4. — *Th. montanum* γ . *glandulosum* Wallr. Schedul. crit. I (1822) 255.
- 3 b Planta numai pe dosul frunzelor, mai ales pe nervuri, mai rar și pe față și pețiol foarte fin glandulos punctată..... 4
- 4 a Foliiolele frunzelor lungi de 10—15 mm, mai adânc și mai acuminat lobate, pe dos surii.
Glande mai pronunțate
var. *expansum* (Jord.) Borza Consp. Fl. Rom. I (1947) 105. — *Th. expansum* Jord. Obs. V (1847) 6. — *Th. minus* ssp. *expansum* Rouy et Fouc. Fl. Fr. I (1893) 19. — **Exs.:** FRE nr. 1243. — *Reg. Ploști*: Speteni (r. Urziceni).
- 4 b Foliiolele frunzelor lungi de 15—20 (30) mm, mai obtuz sau rotunjit lobate, pe dos verzui. Glande foarte mici, punctiforme
var. *Árpáedianum* (Borb.) Borza l.c. — *Th. Árpadianum* Borb. in Term. füz. XVI (1893) 42. — **Exs.:** FEAH nr. 2910 pro sp., FRE nr. 1246 pro sp. — **lc.:** Pl. 105, fig. 3. — *Reg. Timișoara*: Băile Herculane pe V. Prolaz, Defileul Dunărei la Cazane.
- 5 a Plantă scundă de munte, înaltă de 15—30 cm. Inflorescența cu puține flori, de obicei ridicându-se imediat deasupra frunzișului îndesuit
var. *saxatile* (DC.) Borza l.c. — *T. saxatile* Schleich. ex DC. Fl. fr. V (1815) 633. — *Th. transsilvanicum* Schur in Verh. SVN III (1852) 84, n. nud., IV (1853) 10 descr. et Enum. pl. Transs.(1866) 9. — *Reg. Cluj*: Mții Rodnei. *Reg. Aut. M.:* Mții Călimani spre Izvor. *Reg. Stalin:* Mții Făgărașului (Trăsnita, Arpașul, Cascada Bălea). *Reg. Hunedoara:* Mții Retezatului (V. Lăpușnicul Mare, V. Lăpușnicul Mic). *Reg. Pitești:* Mții

- Făgăraşului (Capra Budei); Mt. Arefu (r. Curtea de Argeş); Rucăr la V. Muierii (r. Câmpulung). *Reg. Ploesti*: Mţii Bucegi (V. Urlătoarei, Brânele Jepilor Mici, Caraiman în V. Seacă, Guţanu); Scăeni, Valea Călugărească pe Dl. Mare (r. Ploesti); Bâsca (r. Cislău); Slobozia Nouă (r. Slobozia). *Reg. Bacău*: Tazlău (r. Buhuşi); Piatra Neamţ pe Dl. Cozla, V. Tarcăului; Hangu pe V. Bistriţei; V. Cracăul Negru (r. Tg. Neamţ). *Reg. Iaşi*: Iaşi. *Reg. Suceava*: Mt. Rarău pe Todirescu; Botoşani la Păd. Rediu.
- 5 b Plantă mai înaltă, subţire, cu frunze rărite. Inflorescenţă mai mare, multifloră.... 6
- 6 a Plantă curat verde..... 7
- 6 b Plantă albastrui-cenuşie, glaucă..... 14
- 7 a Frunze tulpinale mijlocii cu foliole mărunte, lungi de 4—6 (—8) mm
var. *minutifolium* Borb. Magy. Homokpuszt. (1886) 90, n. nud. — *Ic.*: Pl. 105, fig. 6. — Cluj (Păd. Hoia, Fânaţe, Dl. « Kesely »), Apahida.
- 7 b Foliole mai mari 8
- 8 a Foliole lungi de cca (8) 10 (12) mm..... 9
- 8 b Foliole mai lungi de 12 mm..... 11
- 9 a Foliole adânc fidate sau \pm aripat lobate, cu lobi lanceolaţi
var. *palmatifidum* Borb. Budapest fl. (1879) 241. — *Ic.*: Pl. 105, fig. 5. — Cluj la Fânaţe, între Boj şi tunelul Cojocna.
- 9 b Foliolele numai dintate 10
- 10 a Dinţii foliolelor obtuzi
var. *flexuosum* (Bernh.) Schinz et Kell. Fl. Schw. ed. II (1905) 81. — *Th. flexuosum* Bernh. Cat. Hort. Erf. (1815). — *Th. collinum* Wallr. Schedul. crit. I (1822) 259. — *Th. Jacquinianum* Koch in Flora XXIV. 2 (1841) 427. — *Th. petrosum* Schur Enum. pl. Transs. (1866) 8. — *Th. saxatile* et *Th. Csatói* Schur Phytogr. l.c. (1877) 15. — *Exs.*: FRE nr. 1245. — *Ic.*: Pl. 104, fig. 1, 1 a. — *Reg. Cluj*: Mţii Rodnei; Gilău, Nădăşel, Mera, Cluj, Apahida, Cojocna, Boj, Feiurdeni (r. Cluj); Cheia Turzii; Ciumbrud (r. Aiud). *Reg. Hunedoara*: Bărbant pe Dl. Bilac. *Reg. Timişoara*: Timişoara. *Reg. Bucureşti*: Dâlga (r. Slobozia). *Reg. Ploesti*: Gura Sărăţii pe Dl. Dobrileşti (r. Buzău); Beceni în Păd. Ocea. *Reg. Constanţa*: între Cernavoda şi Medgidia; Techirghiol, Agigea (r. Constanţa). *Reg. Galaţi*: Tulcea, Niculiţel, Mrea Cocoş, V. Teliţa; Greci; Pechea (r. Galaţi); Hanu Conachi (r. Măicăneşti). *Reg. Bârlad*: Tecuci; Bârlad pe Dl. Mare. *Reg. Bacău*: Roman; Caraculău la Păd. Veveriţa (r. Tg. Ocna). *Reg. Iaşi*: între Banu şi Dumeşti, Iaşi. *Reg. Suceava*: Antoceni (r. Fălticeni).
f. *puberulum* (Schur). — *Th. flexuosum* a. *puberulum* Schur l.c., non Regel. — Vaginale frunzelor inferioare fin pubescente. — *Reg. Cluj*: Cluj. *Reg. Aut. M.*: Căpâlniţa în Mţii Harghita (r. Odorhei). *Reg. Stalin*: Şura Mare, Guşteriţa, Slimnic (r. Sibiu). *Reg. Galaţi*: Hanu Conachi (r. Măicăneşti).
- 10 b Dinţii foliolelor acuminati sau alungiţi
var. *ambigens* Jord. Obs. V (1847) 6. — *Th. Jacquinianum* var. *apiculatum* Borb. Budapest fl. (1879) 126. — *Ic.*: Pl. 105, fig. 4. — *Reg. Cluj*: Cluj la Fânaţe, Corpadea; Olpret (r. Dej). *Reg. Iaşi*: între Banu şi Dumeşti (r. Iaşi).
- 11 a Foliole lungi de (13) 15 (18) mm, de obicei cu dinţi obtuzi
var. *majoriforae* Nyár. Kv. fl. III (1942) 237, cum diagn. hung. et in Bul. şt.

Planşa 104. — 1. *Thalictrum minus* L., var. *flexuosum* (Bernh.) Schinz et Kell., 1 a. apocarp (mărit). — 2. *Th. minus* L. tipul.



Acad. R.P.R. Secț. Șt. Biol. tom. III, nr. 1 (1951) 30. — *Reg. Cluj*: Cluj pe « Kúp-hegy », între Boj și Tunelul Cojocnei.

- 11 b Foliole mai mari. 12
- 12 a Foliole lungi de 15—20 mm. 13
- 12 b Foliole lungi de 20—30 mm, puțin alungite, cu dinți obtuși
 var. *elatum* (Jacq.) Schinz et Kell. Fl. Schw. ed. II (1905) 21. — *Th. elatum* Jacq. Hort. Vindob. III (1776) 49, tab. 95. — *Th. Barthii* Schur Phytogr. (1877) 14. — *Th. silvaticum* Heuff. Enum. pl. Banat. in Verh. ZBG Wien VIII (1858) 40. — **Exs.:** FRE nr. 1244 a, b. — **Ic.:** Pl. 105, fig. 1. — *Reg. Cluj*: Sucutard (r. Gherla); Cheia Turzii. *Reg. Stalin*: Valea Lungă (r. Mediaș). *Reg. Hunedoara*: Subcetate (r. Hațeg). *Reg. Timișoara*: Băile Herculane, Defileul Dunărei la Cazane. *Reg. Ploiești*: Gara Prahova, Crivina (r. Ploiești). *Reg. București*: Ghergani, Ciocănești, Buftea (r. Râcari); Periș (r. Căciulați); Fundulea (r. Brănești); Comana (r. Vidra). *Reg. Galați*: Caraorman în Delta Dunării; Pechea (r. Galați). *Reg. Bârlad*: Adjud. *Reg. Iași*: Tăutești, Epureni, Zahorna, Cârlig, Ungheni, Cristești, Rădeni, Păuleni (r. Iași).
 f. *subintegrum* A. Nyár. f. nova in Add. pag. 687. — **Ic.:** Pl. 105, fig. 2. — Majoritatea foliolelor întregi sau numai cu 1—2 dinți obtuși. — *Reg. Hunedoara*: Săsciori (r. Sebeș).
- 13 a Foliole ± cuneiforme, cu dinți acuți.
 var. *medium* (Jacq.) Borza Consp. Fl. Rom. (1947) 105. — *Th. medium* Jacq. Hort. Vindob. III (1776) 50 tab. 96. — **Ic.:** Pl. 105, fig. 7. — *Reg. Cluj*: Mții Rodnei (Coronișul Mic); Cluj la Fânațe, Someșeni, Cojocna, Boj; Turda, Cheia Turzii. *Reg. Hunedoara*: Bărbant pe Dl. Bilac. *Reg. Stalin*: Bazna (r. Mediaș); Mții Făgărașului (Surul); Sibiu, Șura Mare. *Reg. București*: București (Herăstrău). *Reg. Bârlad*: Nicorești (r. Tecuci). *Reg. Iași*: Chiperești, Zahorna, Văiluța, Epureni (r. Iași); Hârlău.
- 13 b Foliole rotunjite sau cordate la bază. Plante înalte, uneori cu frunze mari
 var. *majus* Cr. Stirp. austr. II (1763) 108. — *Th. sylvaticum* Schur in Verh. SVN III (1852) 84, Enum. pl. Transs. (1866) 8. — *Th. minus* b. *macrophyllum* Schur l.c. — *Th. capillare* Schur l.c. (1866) 9. — **Ic.:** Pl. 105, fig. 8. — *Reg. Cluj*: Beclean; Cluj. *Reg. Stalin*: Blaj, Mediaș, Biertan; Sighișoara; Rupea; Predeal, Mt. Piatra Craiului (r. Stalin); Mții Făgărașului (Arpașul); Rășinari, Turnu Roșu (r. Sibiu); Merghindeal (r. Agnita). *Reg. Timișoara*: Băile Herculane pe V. Prolazului, Defileul Dunării la Cazane. *Reg. Ploiești*: Gara Prahova. *Reg. București*: Dâlga (r. Slobozia). *Reg. Galați*: Pechea (r. Galați). *Reg. Bacău*: Mt. Ceahlău. *Reg. Iași*: Rediul Aldei (r. Iași).
- 14 a Foliole lungi de (8) 10 (12) mm. 15
- 14 b Foliole mai lungi. 17
- 15 a Foliole adânc fidate sau ± penat lobate, cu lobi lanceolați
 var. *multipartitum* Nyár. Kv. fl. III (1942) 236 et in Bul. Acad. R.P.R. l.c. — Cluj pe coama Mărgăului
- 15 b Foliole numai dințate. 16
- 16 a Dinții foliolelor obtuși
 var. *glaucescens* (Willd.) Nyár. Kv. fl. l.c. — *Th. glaucescens* Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl. (1813) 40 et in Rechb. Ic. Fl. germ. III (1839) 14, tab. 29, fig. 4628 b. — *Reg. Cluj*: Cluj (Fânațe, Dl. Mărgău) Apahida pe Dl. Ciuha, Boj, Cojocna; Valea Florilor, Turda. *Reg. Stalin*: Mt. Piatra Mare (r. Stalin); Slimnic (r. Sibiu). *Reg. Hunedoara*: Alba Iulia pe Dl. Bilac.

- 16 b Dinții foliolelor acumițați, acuti
var. *glaucoambigens* Nyár. Kv. fl. l.c., cum diagn. hung. et in Bul. șt. Acad. R.P.R.
l.c. — Cluj la Fănațe.
- 17 a Foliole lungi de (13) 15 (18) mm, cu dinți obtuși
var. *glaucomăjus* Nyár. Kv. fl. l.c. cum diagn. hung. et in Bul. șt. Acad. R.P.R.
l.c. — Cluj la Fănațe.
- 17 b Foliole lungi de 15—20 mm, cuneiforme, cu dinți acuti
var. *glaucomedium* Nyár. Kv. fl. l.c. cum diagn. hung. — Foarte rar.
- Răsp. gen.: Eurasia.

5. *Th. simplex* L. Mant. I (1767) 78; S. Nevski in Fl. U.R.S.S. VII (1937) 526. — **l.c.**: Pl. 103, fig. 1.

4. Plantă ierboasă, glabră, cu rizom târător. Tulpină înaltă de 45—120 cm, angulat sulcată. Frunze inferioare pețiolate, cu pețiol lung de 2—7 cm, cele superioare sesile, de 2—3 ori penate, oblong ovate. Foliolele frunzelor lungi de 10—40 mm și late de 5—20 mm, sesile sau aproape sesile, cuneat trilobate, cu lobi ± dințați sau întregi. Foliole oblanceolate sau (cele superioare) alungit liniare, de obicei nedivizate, cu margini revolute, pe partea superioară mate, rar slab lucitoare. Inflorescența paniculă mică, conică, lată de 4—13 cm și lungă de 10—15 cm. Flori mici, cu pedunculi lungi de 3—10 (12) mm. Periant cu 4 foliole verzi sau purpuri, ovate, de 2—4 mm lungime și 1,5—2 mm lățime. Stamine 10—15, pendule, cu filamente subțiri și antere acute sau acuminate la vârf. Nucule sesile, glabre, ovoide sau alungit ovoide, lungi de 2—2,5 mm și late de 0,7—1 mm, cu 6 coaste longitudinale și cu stigmat revolut. VI—VII.

Stațiunea. Pe coline ierboase, prin tufișuri, dela câmpie până în regiunea dealurilor.


Răsp. în țară: În întreaga țară.

Variabilitatea specie.

ssp. *galioides* (Nestl.) Borza Consp. Fl. Rom. I (1947) 105. — *Th. galioides* Nestl. in Pers. Syn. II (1807) 101. — *Th. Bauhini* Cr. Stirp. austr. II, ed. I (1763) 70, ed. II (1769) 105, p.p. — *Th. angustifolium* L. sp. pl. I (1753) 546. — **l.c.**: Pl. 103, fig. 4.

Foliole îngust liniare, cu margini revolute, întregi.

Planșa 105. — Forme de frunze la *Thalictrum minus* L.: 1. var. *elatum* (Jacq.), partea superioară a segmentului de mijloc. — 2. var. *elatum* (Jacq.) f. *subintegrum* A. Nyár. — 3. var. *Arpadianum* (Borb.), partea superioară a segmentului mijlociu. — 4. var. *ambigens* Jord. — 5. var. *palmatifidum* Borb., o aripă. — 6. var. *minutifolium* Borb. — 7. var. *medium* (Jacq.). — 8. var. *majus*. Cr.



Reg. Cluj: Chiochiș (r. Beclean); Abrud pe Dl. Stiurt și Râul Cernic (r. Câmpeni). *Reg. Stalin*: Orașul Stalin; Mândra (r. Făgăraș); Șura Mare, Ocna Sibiului. *Reg. Hunedoara*: Deva. *Reg. Timișoara*: Timișoara la Păd. Casa Verde. *Reg. Bârlad*: Făurei (r. Focșani). *Reg. Bacău*: Petricani (r. Tg. Neamț). *Reg. Suceava*: Vatra Dornei.

ssp. **eusimplex** A. Nyár. ssp. nova in Add. pag. 687.

Foliole \pm oblanceolate, la vârf trilobate, cele inferioare mai late. — **Ic.**: Pl. 103, fig. 1. — Are următoarele varietăți și forme:

1 a Foliolele frunzelor mijlocii la baza lobilor late de cca 2—5 mm, lungi de 15—23 mm. Plantă verde

var. **angustum** Nyár. Kv. fl. III (1942) 237, cum diagn. hung. et in Bul. șt. Acad. R.P.R. l.c. — Cluj (Fânațe, Dl. Sânpaul, «Csigadomb»), Feiurdeni.

f. **glaucinum** Nyár. l.c. et in Bul. șt. Acad. R.P.R. l.c. — La fel cu var. *angustum*, însă cu frunze glauce. — Cluj la Fânațe.

1 b Frunze cu foliole mai late. 2

2 a Foliolele la baza lobilor late de 6—12 mm, verzi.

var. **normale** Nyár. l.c. cum diagn. hung. ex A. Nyár. in Add. pag. 687. — *Th. strictum* a. *rufinerve* Schur Enum. pl. Transs. (1866) 9. — *Th. exaltatum* Schur l.c. (1866) 10. — *Th. nigricans* Schur l.c. — *Th. axilliflorum* Schur l.c. — *Reg. Cluj*: Cluj la Fânațe; Zăul de Câmpie (r. Luduș)

f. **caesium** Nyár. Kv. fl. l.c. et in Bul. șt. l.c. — La fel cu var. *normale*, însă cu frunze glauce. — Cluj la Fânațe.

2 b Foliolele la baza lobilor late de 12—25 mm.

var. **soboliferum** Schur in ÖBZ X (1860) 250. — *Th. perrobustum* Borb. Balaton fl. (1900) 385, in nota. — *Th. strictum* Auct. — **Ic.**: Pl. 103, fig. 2. — Cluj la Fânațe pe Copârșae și Techintău; Cheile Bicazului.

Răsp. gen.: Europa centrală și de S, Caucaz, Siberia.

6. **Th. flavum** L. Sp. pl. ed. I (1753) 546; S. Nevski in Fl. U.R.S.S. VII (1937) 527. — Rutisor galben. — Sárga virnanc. — Gelbe Wiesenraute. — Висилисник желтый. — **Ic.**: Pl. 106, fig. 2.

4. Rizom repent, în general stolonifer, cu stoloni galbeni. Tulpină erectă, înaltă de 50—100 (200) cm, glabră, angulat sulcată, de obicei nera-mificată, uniform foliată. Frunze triunghiulare, ovate sau oblongi, de 2—3 ori penate, lungi de 10—20 cm și late de 7—15 cm, la bază cu ligulă membranoasă brună, cele inferioare pețiolate. Foliolele frunzelor inferioare obovate sau subrotunde, uneori puțin cordate, cele ale frunzelor superioare alungit-eliptice, cuneat obovate sau lanceolate, mai lungi decât late, de 20—35 (45) mm, cu vârf trilobat și lobi acuti sau \pm obtuși, rareori întregi sau cu 2—3 dinți. Foliolele pe față verzi închise, pe dos mai palide și de obicei glabre. Flori odorante, cu pedunculi scurți (2—10 mm), îndesuite la capetele ramurilor inflorescenței. Inflorescența paniculă subcorimboasă. Foliole periantiale 4, albicioase, ovate sau lanceolat oblongi, lungi de

2,5 — 4 mm și late de 2 mm. Stamine 12—20, galbene, erecte, cu filamente subțiri, aproape de 2 ori mai lungi decât anterele obtuziuscule la vârf. Nucule sesile, ovoide, glabre, lungi de 2—3,5 mm, cu 6 coaste longitudinale și cu cioc brun roșcat, lung de 1 mm. VI—VIII.

Stațiunea. Prin locuri umede, fânețe mlăștinoase, pe malul pâraielor.

Răsp. în țară: *Reg. Cluj:* Beclean; Canciu (r. Dej); Abrud pe V. Abrudului, Roșia Montană, Câmpeni. *Reg. Aut. M.:* Tg. Mureș; Reghin, Gurghiu. *Reg. Stalin:* Sighișoara, Boiu; Rupea; Orașul Stalin, Mt. Postăvarul; Turnișor (r. Sibiu); *Reg. Hunedoara:* Galda de Sus, Bărbant pe Dl. Bilac (r. Alba Iulia); Deva, Dobra. *Reg. Constanța:* Babadag (în poienile din Păd. Babadag). *Reg. Galați:* Galați la Lacul Brateș spre gura Prutului. *Reg. Bârlad:* Condrea pe V. Bârladului (r. Tecuci). *Reg. Bacău:* Mt. Ceahlău. *Reg. Iași:* Glodoasa, Neteda, Santa, V. Știavnicului.

Variabilitatea speciei

var. rufinerve (Lej. et Court.) Jáv. Magy. Fl. (1925) 382. — *Th. rufinerve* Lej. et Court. Comp. Fl. Belg. II (1831) 207. — Fără stoloni. Foliiolele superioare mai înguste. Axa frunzelor la bază fără ligulă membranoasă. Tulpină adeseori cu dungi purpurii. — *Reg. Galați:* Delta Dunării pe ostroave.

Răsp. gen.: Eurasia.

7. ***Th. lucidum*** L. Sp. pl. ed. 1 (1753) 546, em. C. Fritsch in Verh. ZBG Wien XLIV (1895) 104. — *Th. angustifolium* Jacq. Enum. stirp. Vindob. (1762) 96. — **Exs.:** FRE nr. 1937 sub *Th. simplicae*. — **Ic.:** Pl. 106, fig. 1, Pl. 107, fig. 1, 2, 3 a.

4. Rizom scurt, repent, fără stoloni. Tulpină înaltă de 50—150 cm, erectă, de obicei neramificată, glabră, sulcată. Frunze 2—3-penate, nestipelate. Foliiolele sesile sau pețiolate, oblong liniare, liniare, lanceolate sau oval cuneate, întregi sau mai rar 2—3-lobate sau 3-dințate (la cele inferioare), de dimensiuni variabile (între 15—50 mm lungime și 1—10 mm lățime), pe față verzi închise, glabre, lucitoare, pe dos de un verde mai deschis, rar slab păroase. Foliiolele frunzelor inferioare de obicei mai late decât cele ale frunzelor superioare. Inflorescență aproape corimboasă. Ramurile laterale patente și alungite, cu flori dese, grupate spre vârf. Foliiolele periantului 4, ovate, până la 5 mm lungime, albe-gălbui. Stamine drepte, cu filamente uniform de late, mai lungi decât periantul. Antere cu vârf obtuz sau aproape obtuz. Fructe sesile, erecte, lungi de 1—2,5 mm, cele mici ovoidee, cele mai

Planșa 106. — 1. *Thalictrum lucidum* L. var. *heterophyllum* W. et Gr. — 2. *Th. flavum* L.



mari fusiforme, cu 8—10 muchii longitudinale, glabre sau uneori păroase, cu cioc scurt. VII—VIII.

Stațiunea. Prin fânețe și livezi umede, pe terenuri inundabile, soluri nisipoase umede, în tufișuri, din regiunea de câmpie până în cea montană.

Răsp. în țară: Comună în întreaga țară, în forme foarte variate.

Obs. Această specie este foarte variabilă, atât în ce privește mărimea și indumentul frunzelor, cât și forma fructelor. Aceste însușiri se îmbină în toate combinațiile posibile. După forma frunzelor putem deosebi 4 varietăți principale. Fiecare varietate se desparte în forme glabre și păroase, cu fructe fusiforme sau sferice.

Variabilitatea speciei

var. **angustifolium** (Jacq.) Nyár. Kv. fl. III (1942) 234, fig. 36. — *Th. angustifolium* Jacq. Hort. Vindobon. III (1776) tab. 3. — **lc.:** Pl. 107, fig. 2. — Foliiolele frunzelor inferioare filiforme, de cca 1 mm lățime. — **Reg. Baia Mare:** Cămin (r. Carei). **Reg. Cluj:** Cojocna. **Reg. Craiova:** Vârciorova, Turnu Severin; Tismana, Baia de Aramă. **Reg. Pitești:** Râmnicul Vâlcea, Ocnele Mari; Corbeni (r. Curtea de Argeș); Câmpulung, Rucăr; Vultureanca (r. Găești). **Reg. București:** Moșteni-Brătășani (r. Vârtoapele); Titu, Ciocănești (r. Răcari); București (Chitila); Periș; Comana (r. Vidra). **Reg. Ploiești:** Gura Sărării pe Dl. Dobrițești (r. Buzău). **Reg. Galați:** Greci pe Dl. Teilor (r. Măcin). **Reg. Bârlad:** Tecuci; Bârlad. **Reg. Bacău:** la poalele Mtelui Ceahlău și spre Bicaz, Bistricioara (r. Ceahlău); Petricani, Pipirig pe Mt. Petru Vodă, Mrea Neamț (r. Tg. Neamț). **Reg. Iași:** Șendreni, Ungheni, Soloneți Bivolari, Dl. Repede, Cristești, Mârzești (r. Iași). **Reg. Suceava:** Stâncă-Ștefănești (r. Trușești).

f. **angustissimum** (Cr.) Nyár. l.c. fig. 36. — *Th. angustissimum* Cr. Stirp. austr. II (1763) 105. — Dosul frunzelor ± păros. — **Reg. Cluj:** Mții Rodnei; Olpret (r. Dej); Cluj (la Fânațe, « Sodorret », V. Morii, Păd. Feiurd), Cojocna, Boj; Aiud. **Reg. Aut. M.:** Zagon (r. Sf. Gheorghe). **Reg. Stalin:** Mănărade (r. Mediaș); Orașul Stalin la Poiana Stalin. **Reg. Hunedoara:** Bărbant pe Dl. Bilac, Ighiu (r. Alba Iulia); Baia de Criș (r. Brad). **Reg. Timișoara:** Timișoara. **Reg. Iași:** Dl. Repede, Cristești, Mârzești (r. Iași).

f. **danubiăle** (Borb.). *Th. angustif. var. danubiăle* Borb. in Term. füz. (1893) 44. — Nucule fusiforme; foliole cel puțin pe nervuri glandulos păroase. — **Reg. Cluj:** Cluj în Păd. Făget.

f. **peucedanifolium** (Gris. et Schenk). — *Th. peucedanifolium* Gris. et Schenk Iter hung. in Wieg. Arch. (1852) 105. — Cel puțin dosul frunzelor glabru. — **Reg. Cluj:** Cluj (Fânațe, Păd. Făget), Cojocna, Boj; Valea Florilor (r. Turda). **Reg. Aut. M.:** Căpâlnița în Mții Harghita (r. Odorhei); Reci (r. Sf. Gheorghe). **Reg. Stalin:** Bazna (r. Mediaș). **Reg. Hunedoara:** Bărbant pe Dl. Bilac (r. Alba Iulia). **Reg. Oradea:** Oradea, Băile Felix, Cordău, Săldăbagiu (r. Oradea); Sâmbăta, Pocola, Beiuș, Băița (r. Beiuș). **Reg. Timișoara:** Băile Herculane. **Reg. Pitești:** Cheile Argeșului (r. Curtea de Argeș). **Reg. Constanța:** Constanța. **Reg. Bacău:** Slănic (r. Tg. Ocna); Mt. Ceahlău.

var. **stenophyllum** (Wimm. et Grab.) Hay. Fl. Steierm. I (1908) 383. — *Th. angustif. var. stenophyllum* Wimm. et Grab. Fl. Siles. II (1829) 157. — **lc.:** Pl. 107, fig. 1. — Foliiolele frunzelor tulpinale inferioare și mijlocii liniare, late de 2—7 mm. — **Reg. Aut. M.:** Răstolița, Toplița; Lăzarea pe Pâr. Ciuroiului, Izvorul Mureșului (r. Gheorghieni); Mții Harghita.

Căpâlnița, Firtușu, Băile Homorod (r. Odorhei); Racul, Simionești, Tușnad (r. Miercurea Ciuc). *Reg. Bacău*: Râpciuni, Bistricioara (r. Ceahlău); Petricani, Pipirig pe Mt. Petru Vodă (r. Tg. Neamț).

f. *hirtostenophyllum* Nyár. Kv. fl. III (1942) 234, fig. 36, cum diagn. hung. et in Bul. șt. Acad. R.P.R. l.c. — Cel puțin dosul frunzelor \pm păros. — *Reg. Cluj*: comun în jurul Clujului, Cojocna, Boj.

f. *subglabrum* (Simk.) Nyár. Kv. fl. l.c. cum diagn. hung. et in Bul. șt. Acad. R.P.R. l.c. — *Th. peuced.* var. *subglabrum* Simk. in Arad vm. (1893) 3. — Nucule mai mari, fusiforme. — *Reg. Arad*: Arad (Păd. Ciala), Pecica, Bodrogul Vechi; Ineu, Mocrea; Dezna (r. Gurahonț).

f. *glabrostenophyllum* Nyár. Kv. fl. l.c. cum diagn. hung. et in Bul. șt. Acad. R.P.R. l.c. — Foliiolele glabre; nucule mari, fusiforme. — *Reg. Cluj*: comun în jurul Clujului, Apahida, Boj, Cojocna.

var. *heterophyllum* (Wimm. et Grab.) Hay. Prodr. Fl. balc. I (1927) 326. — *Th. angustif.* var. *heterophyllum* Wimm. et Grab. l.c. — Foliiolele frunzelor inferioare și mijlocii oblong lanceolate sau lat liniare, late de 7–10 mm, cele superioare liniare. — *Reg. Cluj*: Rodna, Sângeorz-Băi (r. Năsăud); Beclean; Aiud, Ciumbrud. *Reg. Aut. M.*: Lunca Bradului (r. Toplița); Gheorghieni pe Râul Bacta; Firtușu (r. Odorhei); Tușnad pe Mt. «Büdös». *Reg. Stalin*: Bazna (r. Mediaș); Sibiu, Gușterița, Cislădie, Cislădioara; Nochrich, Marpod, Merghindeal (r. Agnita). *Reg. Hunedoara*: Cunța (r. Sebeș); Bărbant pe Dl. Bilac (r. Alba Iulia); Zam (r. Deva); Mții Retezatului (V. Lăpușnicul Mare, V. Lăpușnicul Mic); Petroșani. *Reg. Oradea*: Seleuș, Sinmartin, Băile Felix, Cordău (r. Oradea) Săldăbagiu, Sâmbăta, Pocola, Beiuș, Băița (r. Beiuș). *Reg. Craiova*: Turnu Severin. *Reg. Pitești*: Olănești (r. Râm. Vâlcea); Călimănești (r. Brezoiu), Mt. Cozia (Mrea Stănișoara). *Reg. București*: București; Comana (r. Vidra). *Reg. Bârlad*: Bârlad. *Reg. Bacău*: Petricani (r. Tg. Neamț). *Reg. Iași*: Prisăcani (r. Iași); Buhălnița (r. Hârlău).

f. *Candollei-nigricans* Nyár. Kv. fl. 235, fig. 36, cum diagn. hung. et in Bul. șt. Acad. R.P.R. l.c. — *Th. nigricans* DC. Syst. I (1818) 182; Prodr. I (1824) 14. — Cel puțin dosul frunzelor \pm glandulos păros. — *Reg. Cluj*: Cluj (la Făget), Cojocna; Valea Florilor (r. Turda).

f. *typicum* Nyár. Kv. fl. l.c. et in Bul. șt. Acad. R.P.R. l.c. — Nucule mai mari, fusiforme. — Impreună cu precedentă.

f. *Scopolii-nigricans* Nyár. Kv. fl. l.c. et in Bul. șt. Acad. R.P.R. l.c. — *Th. nigricans* Scop. Fl. carn. II, ed. II (1772) 391. — Dosul frunzelor glabru. — *Reg. Cluj*: Cluj, Nădășel.

var. *laserpitiiifolium* (Willd.) Hay. Fl. Steierm. I (1908) 383. — *Th. laserpitiiifolium* Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl. (1813) 40. — Ic.: Pl. 107, fig. 3, 3 a. — Foliiolele dela toate frunzele, oblongi, late de 7–10 mm, cele dela frunzele superioare cu puțin mai înguste. — *Reg. Baia Mare*: Cămin (r. Carei). *Reg. Cluj*: Sângeorz-Băi (r. Năsăud). *Reg. Aut. M.*: Băile Homorod, Căpâlnița, Zetea (r. Odorhei); Reci (r. Sf. Gheorghe); Tg. Săcuesc. *Reg. Ploiești*: Gura Sărății pe Dl. Dobrițești (r. Buzău). *Reg. Iași*: Mărzești, Bran, Ungheni, Cristești (r. Iași).

Planșa 107. — 1. *Thalictrum lucidum* L. var. *stenophyllum* (Wimm. et Gr.) Hay., o frunză. — 2. *Th. lucidum* L. var. *angustifolium* (Jacq.) Nyár. — 3, 3 a. *Th. lucidum* var. *laserpitiiifolium* (Willd.) Hay. — 4. *Th. petaloideum* L. o frunză, — 4 a. o floare cu stamine lățite.



f. **glabrum** Nyár. Kv. fl. III (1942) 235, fig. 36 sub *lucido-glabro* Kern. exs. c. diagn. hung. ex. A. Nyár. in Add. pag. 688. — Frunze pe dos glabre. — Apahida (r. Cluj).

Răsp. gen.: Europa centrală și de E, Asia Mică.

Hibrizi

× **Th. subcorymbosum** Borb. in Akad. Értek. IX (1879) 9 et in ÖBZ XXIX (1879) 201 = *lucidum* f. *peucedaniifolium* × *simplex*.

De *Th. simplex* se deosebește prin inflorescența corimbiformă și prin creșterea mai viguroasă.

Orașul Stalin (locul clasic).

× **Th. iodostemon** Borb. in Értek. Termtud. Köréből IX, nr. XV (1879) 7 = *elatum* × *lucidum* var. *angustifolium*.

Rizom premors, scurt. Tulpină erectă, fistuloasă, acut multicostată, cu frunze decrescente, cele inferioare la înflorire lipsesc. Frunze lat triunghiulare, ternat compuse, cu aripile inferioare de cca 2 ori mai scurte decât celelalte; foliolele lungi ca la *Th. flexuosum*, dar mai înguste, cele laterale lanceolate sau oblic lanceolate, întregi, la vârf bifide. Unele foliole dela baza pețiolulilor ± mai late, mai accentuat cuneiforme, sau rotunjite, trifidate, cu lobi alungți, acuți, deasupra verzi închise, nelucioase, pe dos glaucescente, cu nervuri proeminente. Frunzele supreme și cele de pe ramuri foarte înguste și asemănătoare cu cele dela *Th. angustifolium*. Inflorescență corimb, ca la *Th. angustifolium*. Flori erecte, lung pedunculate, cu pedunculii inferiori mai lungi. Stamine cu filamente erecte, violacee și după uscarea, capilare. Antere la înflorire galbene apoi violacee, cu vârful scurt mucronat. Stigmat mărișoare, cordate. VI—VII.

Reg. Cluj: Băile sărate dela Turda, între părinți; Hunedoara în fânețe la V. Seacă.

Genul 128. ADONIS*) L.

Gen. pl. [ed. I (1737) 166, nr. 465], ed. V (1754) 242, nr. 618. — Ruscuță.

Plante anuale sau perene, cu tulpină erectă, foliată. Frunze compuse, 2—3-penat sectate, cu lacinii filiforme. Flori viu colorate, ± mari, solitare, actinomorfe (radiar simetrice). Sepale de obicei 5. Petale 3—20, viu colorate, fără foveolă nectariferă. Stamine multe. Carpele numeroase, așezate pe un receptacul conic sau cilindric. Fructe nucule monosperme, cu înveliș pronunțat transversal nervat.

Determinarea speciilor

- | | | |
|-----|--|---|
| 1 a | Plante anuale, cu rădăcini slabe și flori roșii | 2 |
| 1 b | Plante perene, cu rizom gros, lemnos, cu rădăcini groase și cu flori galbene | 4 |

*) Dela «Adonium», nume de plantă la Plinius (sec. I e.n.), după numele lui Adonis, un favorit al zeiței Venus, transformat de aceasta, după mitologia romană, într'o floare roșie.

- 2 a Sepale păroase, orizontal patente. Rostrul nuculelor negru la vârf 3. *A. flammea*
- 2 b Sepale de regulă glabre. Rostrul fructului verde 3
- 3 a Sepale alipite de corolă. Corola plană. Fruct matur pe spate cu 1 dinte, pe partea dorsală cu 2 dinți 4. *A. aestivalis*
- 3 b Sepale nealipite de corolă. Corola semiglobuloasă. Fruct pe dos fără dinți 5. *A. autumnalis*
- 4 a Laciniile frunzelor îngust liniare, nedințate, cu margini paralele 5
- 4 b Laciniile frunzelor lat liniare, la mijloc puțin mai late, cele de gradul III de pe aripile inferioare foarte scurte, în formă de dinți 6
- 5 a Lacinii mai înguste de 1 mm, fără dinți. Plante verzi 1. *A. vernalis*
- 5 b Lacinii late de 1 mm și mai late, ici colo cu câte un dinte \times *A. hybrida*
- 6 a Lacinii late, cele de gradul III în formă de dinți scurți, pe aripile superioare lipsesc 2. *A. volgensis*
- 6 b Lacinii mai înguste, cele de gradul III mai subțiri. Aripile cu vârf alungit \times *A. hybrida* f. *Walziana*

1. *A. vernalis* L. Sp. pl. ed. I (1753) 547; E. Bobr. in Fl. U.R.S.S. VII (1937) 535, tab. XXXVI, fig. 2 a. — Ruscuță primăvărată. — Tavaszi hérics. — Frühlings Adonisröschen. — Адонис весенний. — Exs.: FEAN nr. 2802 II; FRE nr. 1700 a, b. — Ic.: Pl. 89, fig. 1, 1 a; Nyár. Kv. fl. III (1942) 239, fig. 37.

4. Rizom gros, tare, cu numeroase rădăcini fibroase, brunii-negre. Tulpină erectă, moderat ramificată, glabră, înaltă de 10–40 cm, rareori și mai înaltă. Pe lângă tulpini florifere găsim și lăstari sterili, la bază cu scvame late, membranoase, brune, fără frunze bazale. Frunze tulpinale dese, sesile, până la vârf distribuite, de 2–4 ori penat sectate, cu lacinii îngust liniare, cu margini paralele, sub 1 mm lățime, fără dinți. Flori solitare la vârful tulpinii, mari, late până la 8 cm, galbene-aurii, lucioase. Sepale 5, lat ovate sau eliptice, brun membranoase, \pm păroase, lungi cât jumătatea petalelor. Petale 10–20, oblanceolat cuneate, întregi sau serulate, lungi de 20–42 mm. Stamine numeroase. Apocarp ovat globulos, dens, cu nucule globuloase, \pm reticulat verucoase, scurt păroase, cu rostru încârligat. IV–V; uneori înfloarește și a doua oară.

Stațiunea. Pășuni și fânețe uscate, coaste abrupte, înșorite, în păduri, din regiunea câmpiei până în cea montană.

Planșa 108. — 1. *Adonis autumnalis* L., 1a nukulă (3/4). — 2. *A. aestivalis* L., 2 a. nukulă (3/4). — 3. *A. flammea* Jacq., 3 a. nukulă (3/4). — 4. *Delphinium fissum* W. et K.



Răsp. în țară: *Reg. Cluj*: Rodna (r. Năsăud); Bistrița; Olpret (r. Dej); Stâna (r. Huedin); Cluj (Păd. Hoia, Păd. Făget, Mănăstur, Fănațe), Florești, Apahida, Cojocna, Suatu, Boj; Valea Florilor, Cheia Turzii, Turda pe V. Botorom; Ocna Mureșului (r. Aiud); Zăul de Câmpie, Luduș, Chețani, Hărdăreni, Săușa (r. Luduș); Berchieș (r. Sărmășel). *Reg. Aut. M.*: Fărăgău pe Dl. Ghiemeș, Târgul Mureș; Vârghiș (r. Sf. Gheorghe). *Reg. Stalin*: Valea Lungă, Cenade, Șeica Mare, Mediaș, Bazna; Sighișoara, Cristur; Sibiu, Gușterița, Daia, Șura Mare; Veseud, Merghindeal (r. Agnita). *Reg. Hunedoara*: V. Secașului (r. Sebeș); Bărbant pe Dl. Bilac, Alba Iulia; Orăștie; Nădăștia de Jos, Streiu (r. Hunedoara). *Reg. Arad*: Sfta Ana (r. Chișineu-Criș). *Reg. Timișoara*: citată de Heuffel din « Banat » pe coline nisipoase. *Reg. Craiova*: Perișoru (r. Băilești); Radovanu (r. Segarcea). *Reg. București*: Fundulea în Păd. Zoicar, Brătășani în Păd. Tămădău (r. Brănești); Lehliu; Comana (r. Vidra); Băneasa (r. Giurgiu); Ulmeni (r. Alexandria); Oltenița; Călărași. *Reg. Ploiești*: Dl. Istrița, Gura Sărății pe Dl. Ciuhoiu (r. Buzău); Cotorca (r. Urziceni). *Reg. Constanța*: Fetești, Hăgieni; Basarabi, Constanța, Mangalia; Enisala, Jurilovca (r. Babadag). *Reg. Galați*: Lozova, Niculițel (r. Tulcea); Galați. *Reg. Bârlad*: Focșani, Odobești; Bârlad la Păd. Balaure. *Reg. Bacău*: Piatra Neamț. *Reg. Iași*: Iași, Focuri, Șorogari, Vlădiceni, Ciurea, Proselnici, Ezăreni, Aroneanu, Mărzești, Coada Stâncii, Mânzătești, Spinoasa, Belcești, Vlădeni, Șipote, Fântânele (r. Iași). *Reg. Suceava*: Bosanci pe Dl. Frumoasa și Dl. Strâmbu (r. Suceava); Calafindești (r. Rădăuți).

Variabilitatea speciei

f. *minor* (Dieudonné) Nyár. Kv. fl. III (1942) 239. — *A. vernalis* var. *minor* Dieudonné în Bull. Soc. Bot. Belg. (1876) 106. — *A. vern.* var. *minoriflora* Borb. în MBL III (1904) 112. — *A. parviflora* Jka în ÖBZ V (1855) 230, non Fisch. — Floarea numai pe jumătate sau a treia parte decât cea normală; înfloarește de obicei târziu, în Iunie. — *Reg. Cluj*: Cluj pe Dl. « Csillághegy »; *Reg. Hunedoara*: Șeușa (r. Alba Iulia). *Reg. Suceava*: Stânca-Ștefănești (r. Trușești).

f. *soproniensis* (Mygind) Borb. l.c. (1904) 112. — *A. soproniensis* Mygind ap. Borb. în Akad. Közlem. IX (1872) 46. — Înfloarește târziu. Flori de mărime normală, însă cu petale foarte înguste, late de 1,5–2 mm. Lăciniile frunzelor mai late. — Cluj.

var. *murfatlarıensis* Prod. Consp. Fl. Dobr. I în Bul. Acad. Stud. Agron. Cluj V (1935) 286, Sep. pag. 114. — *A. Walziana* Grec. Consp. Fl. Rom. (1898) 29, non Simk. — Frunze păroase, culacinii late de 1–2 (3) mm, relativ depărtate una de alta. — *Reg. Constanța*: Basarabi, Cobadin (r. Constanța) *Reg. Galați*: Tulcea.

Răsp. gen.: Europa de Mijloc și de S, Asia de V.

În treburi ări. Plantă cu gust amar arzător; animalele nu o pasc. Se colectează în cantitate mare ca drog. (« Herba Adonidis »). Conține cca 1% glicozizi (adonidină, adoni vernosida), precum și saponină, cholină, etc. — Datorită glicozizilor se folosește în medicină la tratamentul bolilor de inimă, având un efect calmant.

2. *A. volgensis* Stev. în DC. Syst. I (1818) 545; E Bobr. în Fl. U.R.S.S. VII (1937) 536, tab. XXXVI, fig. 3 a. — Exs.: FRE nr. 48, HN nr. 5201. — Ic.: Pl. 89, fig. 2; Hay. Pflzd. (1916) 463; Nyár. Kv. fl. III (1942) 240, tab. 38.

4. Plantă înaltă de 15–45 cm, erectă, glabră sau ± viloasă, puțin glaucă, ramificată, des foliată, fără frunze bazale. Rizom tare, viguros, cu numeroase

rădăcini bruniiu-negre. Baza tulpinii cu scvame membranoase, mari, alungit ovate, brun negricioase sau închis brun-roșcate. Frunze tulpinale sesile, lat deltoidee, 2—3-penat sectate; segmentul inferior de 2 ori sectat, cele superioare succesiv mai puțin sectate sau fidate, cel terminal simplu fidat. Lacinii ovate lanceolate, late de 1,5—3 mm, cu laciniiile secundare, respectiv dinții de la vârful laciniiilor secundare, alipite. Flori solitare, până la 5 cm în diametru, palid galbene. Sepale lat lanceolate, bruniiu-verzi, slab păroase, lungi până la $\frac{3}{4}$ din lungimea corolei. Petale multe, îngust lanceolate, întregi sau serulate. Apocarp globulos, lat de 12—15 mm, cu nucule sferice, catifelat scurt păroase. Rostru rășfrânt, alipit de nukulă. IV—V.

Stațiunea. Stepe ierboase, uscate, mai rar poieni de pădure.

Răsp. în țară. *Reg. Cluj:* Cluj la Fănațe (într'un singur loc, în V. Primă). *Reg. Pitești:* Băile Olănești în pășuni montane (r. Râm. Vâlcea). *Reg. Constanța:* Basarabi (r. Constanța). *Reg. Bârlad:* Focșani, Odobești. *Reg. Iași:* Huși.

Variabilitatea speciei

f. pilosa (Schur) Nyár. in BK XXXVIII (1941) 138, Kv. fl. III (1942) 240, em. et in Bul. șt. Acad. R.P.R. l.c. — *A. villosa* Ldb. Fl. ross. I (1842) 25. — *A. wolgensis* b. *pilosa* Schur Enum. pl. Transs. (1866) 6. — Tulpina și dosul frunzelor ± abundent păroase. — *Reg. Cluj:* Cluj la Fănațe. *Reg. Bârlad:* (Dimonie Syn. Polyt. (1931) 9).

f. subglabra Nyár II. cc. resp. 138 et 240, cum diagn. hung. et in Bul. șt. Acad. R.P.R. l.c. (1951) 31. — Face impresia unei plante glabre, însă pe tulpină și frunze se găsesc ici colo câte unul sau puțini peri. — la Fănațele Clujului. — *Reg. Bârlad:* Huși la Crama lui Pintilie.

f. glaberrima Nyár II. cc. resp. 138 et 240, cum diagn. hung. et in Bul. șt. Acad. R.P.R. l.c. — Tulpină și frunze complect glabre. — Cluj la Fănațe.

Răsp. gen.: R. P. Română și Ungară, U.R.S.S. Asia centrală.

3. A. flammæa Jacq. Fl. austr. IV (1776) 29 tab. 355; E. Bobr. in Fl. U.R.S.S. VII (1937) 538. — *A. caudata* Jka. in Linn. XXX (1859) 551. — Ruscuță. — Lángszinű hérics. — Scharlatrotes Feuerröschen. — Адонис пламенный. — Ic.: Pl. 108, fig. 3, 3a.

○. Tulpină erectă, înaltă de 20—50 cm, simplă sau ramificată, egal foliată. Toată planta ± pubescentă. Frunze sesile, de 3—4 ori aripate sectate, cu lacinii foarte înguste, filiforme. Flori solitare, de 2—3 cm în diametru. Sepale 5, păroase, alipite de corolă. Petale 5 sau mai multe, întinse orizontal, viu roșii, lungi de 5—20 mm, la bază adeseori negru pătate. Apocarp cilindric, cu multe nucule ovoide, lungi de 3—4 mm, cu un rostru scurt, negru la vârf, cu laturi verucoase, glabre, sub rostru în partea ventrală internă) cu un dinte obtuz. V—VIII.

Stațiunea. In semănături și ogoare. Rară.

Răsp. în țară: *Reg. Cluj*: Bistrița; Cluj, Florești, Turda. *Reg. Stalin*: Mediaș; Bahnea (r. Târnăveni); Sibiu, Gușterița; Nochrich (r. Agnita). *Reg. Oradea*: Oradea. *Reg. Constanța*: Basarabi, Constanța la vii, Mangalia; Jurilovca (r. Babadag). *Reg. Galați*: Mahmudia, Beștepe, Malcoci (r. Tulcea); Greci, Măcin; Brăila. *Reg. Iași*: Chiperești, Goruni (r. Iași).

Variabilitatea speciei

f. typica (Beck). — *A. flammeus* α . *typicus* Beck Fl. NÖ I (1890) 426. — Flori mari, cu diametru de 2–3 cm. Petale 6–8, roșii ca focul, la bază adesea cu pată neagră. — Hagilar pe Dl. Denistepe (r. Tulcea).

f. minoriflora Prod. Consp. — Fl. Dobr. I (1935) 116. — Flori mici, de cca 1,5 cm în diametru. — *Reg. Constanța*: între Constanța și Techirghiol, Constanța spre vii, Basarabi.

f. pallida Koch. Syn. I. ed. III (1857) 9. — *A. citrina* DC. Syst. I (1818) 223. non Hoffm. — *A. flammeus* β . *stramineus* Beck. Fl. NÖ I (1890) 426. — Flori galbene ca paietele. — Sporadică.

Răsp. gen.: Europa centrală și de SE, Asia Mică și Caucaz.

4. *A. aestivális* L. Sp. pl. ed. II (1762) 771; E. Bobr. in Fl. U.R.S.S. VII (1937) 537. — *A. annua* α . *phoenicea* L. Sp. pl. ed. I (1753) 547. — *A. squarrosa* Jka. in Linn. XXX (1859) 551, non Stev. — *Anemone aestivális* Brandza Prodr. Fl. Rom. (1879–83) 30, 526. — *Adonis phoenicea* Borb. Bal. fl. (1900) 386. — Cocoșei de câmp. — Nyári hériés. — Sommer-Feuerröschen. — Адонис летний. — Ic.: Pl. 108, fig. 2, 2 a.

○. Tulpină erectă, de 20–50 cm înălțime, simplă sau ramificată, în mod egal foliată, glabră sau \pm pubescentă. Frunze tulpinale inferioare petiolate, cele mijlocii și superioare sesile, de 3–4 ori penat sectate, cu segmente îngust liniare. Flori solitare, erecte, mari, de 15–35 mm în diametru, de culoare roșie de miniu sau portocalii, rar galbene. Sepale 5, glabre, lat ovate, alipite de corolă. Petale 6–8, îngust obovate, orizontale, lungi de 10–17 mm, la bază cu, sau fără pată neagră. Apocarp \pm cilindric, cu numeroase nucule lungi de 5–6 mm, glabre, puțin verucoase, cu o muchie dorsală pronunțată și cu un dinte, pe partea ventrală cu 2 dinți. Rostru drept, verde. V–VII.

Stațiunea. Prin arături, ogoare, semănături.

Răsp. în țară: În toate regiunile, comună.

Variabilitatea speciei

f. typica A. Nyár. f. nova in Add. pag. 688. — Flori mari, de cca 15–35 mm în diametru, cu petale cu mult mai lungi decât caliciul, la bază, cu sau fără pată neagră. — Frecventă.

f. parviflora (Fisch). — *A. parviflora* Fisch in DC. Prodr. I (1824) 24. — *A. aestiv.* f. *micropetalus* Zap. Consp. Fl. Galic. crit. II (1908) 300. — Flori mici, cu petale cca de lungimea separelor sau cu puțin mai lungi. — Frecventă.

f. robusta Zap. l.c. — Tulpină înaltă până la 75 cm, groasă de cca 10 mm, ramificată, cu ramuri groase și frunze mari.

f. *reducta* Nyár f. nova in Add. pag. 688. — Tulpină de obicei neramificată, subțire, de regulă cu 1—2 (3) flori, înaltă de 15—30 cm. — *Reg. Cluj*: Cheia Turzii prin semănături. *Reg. Craiova*: Coșofenii din Față (r. Craiova). *Reg. Constanța*: Medgidia. *Reg. Iași*: Bârnova Mânzătești, Voințești (r. Iași).

f. *citrina* (Hoffm.) — *A. citrina* Hoffm. Deutsche Fl. I, ed. II (1800) 251. — Flori de culoare galbenă straminee. — *Reg. Cluj*: Sânmărtin (r. Cluj). *Reg. Timișoara*: Timișoara. *Reg. Craiova*: Caracal.

f. *miniata* (Jacq.) Zap. l.c. — *A. miniata* Jacq. Fl. austr. IV (1776) 29, tab. 354. — Flori roșii, la bază fără pată mai întunecată. — Cluj.

Răsp. gen.: Europa.

5. *A. autumnalis* L. Sp. pl. ed. II (1762) 771; E. Bobr. in Fl. U.R.S.S. VII (1937) 538. — *A. annua* β. *atrorubens* L. Sp. pl. ed. I (1753) 517. — *A. perramosa* Schur Enum. pl. Transs. (1866) 6. — *Anemone autumnalis* Brandza Prodr. Fl. Rom. (1879—83) 30, 526. — Ruscuța tomnatică. — Ōszi hérics. — Herbst-Feuerröschen. — Ic.: Pl. 108, fig. 1, 1 a.

○. Tulpină erectă, înaltă de 25—50 cm, simplă sau ramificată, glabră, foliată. Frunze inferioare și mijlocii pețiolate, cele superioare sesile, de 3—4 ori penat sectate, cu segmente liniare, acute sau unele acut tridintate la vârf. Flori solitare, erecte, de 15—25 mm în diametru. Sepale 5, glabre sau la margini rar pubescente, patente sau reflecte, nealipite de corolă. Petale 6—10, alungit obovate, purpuriu închise, se închid formând un semiglob concav, cu pete negre în fund. Stamine numeroase, violet închise. Apocarp alungit, ovat, cu nucule ovoide, netede, cu o muchie longitudinală, fără dinți. Rostru drept și scurt. VI—IX.

Stațiunea. Cultivată prin grădini. Adeseori sălbătică prin semănături.

Răsp. în țară: *Reg. Cluj*: Rodna numai în grădini; Bistrița; Turda. *Reg. Stalin* Blaj; Micăsău (r. Mediaș); Sighișoara; Făgăraș; Sibiu, Gușterița. *Reg. Hunedoara*: Alba Iulia.

Obs. Toate acestea sunt date vechi, neconfirmate recent.

Răsp. gen.: Europa de S, Asia de SV.

Hibridi

× *A. hybrida* Wolff in Verh. SVN VIII (1857) n. nud. ex Simk. in MNL II (1878) 146 = *vernalis* × *volgensis*. — Exs.: FRE nr. 47. — Ic.: Pl. 89, fig. 3; Nyár. Kv. fl. III (1942) 239, fig. 37 dextr.

Frunze îngust liniar lanceolate, late de 1 mm sau mai mult, cu margini paralele, întregi sau ici-colo cu câte un dinte, asemănătoare cu acelea dela

A. vernalis. Unele exemplare, cu frunzele mai lat liniar lanceolate, se aseamănă cu *A. volgensis*.

Reg. Cluj: Cluj la Fânațe, între părinți. *Reg. Bârlad*: Vaslui (Grec. Consp. (1898) 29).

f. *Walziána* (Simk.). — *A. hybrida* b. *A. Walziana* (*vernalis* × *supervolgensis*) Simk. l.c., Enum. Fl. Transs. (1866) 42. — *le.*: Pl. 89, fig. 4; Nyár Kv. fl. 240, fig. 38 dextr. — Laciniile mai late la mijloc, cu diviziuni de ordinul III în formă de dinți. — *Reg. Cluj*: Cluj la Fânațe. *Reg. Bacău*: Roman la Păd. Strunga (Grec. Supl. (1909) 4).

A D D E N D A

DIAGNOSES PLANTARUM NOVARUM IN TOMO II FLORAE R.P.R. COMMEMORATARUM

CERASTIUM L.

C. brachypetalum Desp. f. **interpositum** Nyár. et Prod. f. nova.

Filamentis staminum glabris.

Reg. Constanța: inter pagos Erchesec et Satischioi.

C. arvense L. ssp. **calcicolum** (Schur) Borza f. **turfosum** Nyár. et Prod. f. nova.

Caudiculis 30 cm altis, foliis linearibus, glabris vel margine foliorum superiorum ciliatis.

Reg. Stalin: Sâncrăieni, in turfosis.

× **C. triculinum** Nyár. et Prod. sp. hybr. nova = *brachypetalum* var. *tauricum* × *glomeratum*.

Ad *C. brachypet.* var *tauricum* vergens, inflorescentia laxiore, capsula brevior, calyce subaequali, floribus pauce majoribus, caulibus superioribus glandulosi. *C. glomerato* simile pedunculis fructiferis brevioribus et filamentis glabris.

Reg. Timișoara: inter ruinam Tricule et pagum Tisovița.

HERNIARIA L.

Herniaria incana Lam. var. **viridis** Nyár. et Prod var nova.

Foliis utrinque viridibus, brevissime hirtis.

Reg. Constanța: Murfatlar, in steppaceis.

H. glabra L. var. **moldavica** Prod. var. nova.

Caulis albo-ciliatus. Folia lata, sessilia vel vix sessilia. Stipellae laceratae. Folia caulina inferiora radicalibus similia.

Reg. Bacău: prope riv. Bistrița, non procul ab oppid. Piatra, in locis turfosis.

H. glabra L. var. **dobrogensis** Prod. var. nova.

Caulis disperse pilosus, glandis numerosis sessilibus obtectus. Folia elongata vel elongato-oblongata, utrinque sensim attenuata, longe petiolata. Inflorescentia tenuior.

Reg. Galați: in mont. Pricopan prope pag. Măcin.

BEHEN Mneh.

B. Csereii Baumg. f. **elatio** Guşul. f. nova.

Folia magna, ovato-lanceolata, usque ad 9 cm longa et 4 cm lata.

Reg. Constanța: Ester, Gura Dobrogei.

B. Csereii Baumg. f. **tenella** Guşul. f. nova.

Folia elliptica vel lanceolata, parva, usque 3 cm longa et 1 cm lata.

Reg. Hunedoara: Şoimuş prope Deva.

B. vulgaris Mneh. ssp. **paniculatus** (Grec.) Guşul. f. **intermedius** Guşul. f. nova.

Longitudo totius inflorescentiae e dichasiis compositae 14 — 15 cm.

Reg. Stalin: Satulung.

B. vulgaris Mneh. ssp. **paniculatus** (Grec.) Guşul. f. **fallacinus** Guşul. f. nova.

Folia lata, ovali-oblonga vel ovato-lanceolata, glabra. Planta habitu similis *B. Csereii*.

Reg. Timișoara: Valea Marila.

B. vulgaris Mneh. ssp. **paniculatus** (Grec.) Guşul. f. **grandifolius** Guşul. f. nova.

Folia maxima (usque 10 cm longa) late-ovalia vel late-oblonga.

Reg. Cluj.: Cluj in Făget.

SILENE L.

S. conica L. ssp. **euconica** Guşul. ssp. nova. — *S. conica* L. Sp. pl. ed. I (1753) 418. — *S. conoidea* Huds. Fl. angl. ed. II (1778) 183, non L.

Calyx pilis brevibus, reversis, nonnunquam glandulis intermixtis praecipue ad nervos tectus. Capsula sessilis.

Reg. Constanța: Murfatlar, in valle Serpla Kula.

S. Saxifraga ssp. **petraea** (W. et K.) Guşul. f. **intricata** Guşul. f. nova.
Caules gracillimi, e basi ramosissimi usque 100 cespites densissime intricatos formantes.

Reg. Timișoara: ad Thermas Herculis.

S. Saxifraga ssp. **petraea** (W. et K.) Guşul. f. **macrocarpa** Guşul. f. nova.
Capsula e calyce superne dilacerato exserta.

Reg. Timișoara: Plugova ad Mehadia.

S. dinarica Spreng. f. **genuina** Guşul. f. nova.

Caules humiliores, floribus solitariis.

In monte Negoi.

S. dinarica Spreng. f. **elatio**r Guşul. f. nova.

Caules usque 10 cm alti, 2 — 4 flores gerentes.

In monte Arpaş Carpat. meridionalium (alt. 2000 m), una cum f. *genuian*.

S. compacta Fisch. f. **elatio**r Guşul. f. nova.

Caulis 30 — 50 cm altus, folia magna, caulina inferiora oblonge spatulata, 11 cm longa et 3,5 cm lata.

Reg. Galați: Mt. Suluc prope Măcin (alt. 365 m.s.m.).

S. viridiflora L. var. **banatica** Guşul. var. nova.

Caulis 40 — 55 cm altus, foliis fasciculorum basaliu lanceolatis, longe petiolatis, pilis brevibus, canescentibus; mediis sessilibus, brevibus ovatis; superioribus bracteiformibus. Internodia 2 — 5 cm longa. Inflorescentia 5 — 1 flora.

Reg. Timișoara: Svinița et Tisovița.

S. Grecescui Guşul. sp. hybr. nova = *nutans* × *viridiflora*. — *S. livida* Willd. Enum. Pl. Hort. Berol. (1809) 494, p.p.; Grecescu Consp. Fl. Rom. (1898) 108, p.p.

Calyx in pedicellum decurrens, ideo non vel parum umbonatus. Dichasia racemi longe pedunculata, pedunculi pauciflori. Capsula ovalis medio inflata, apicem et basin versus attenuata.

Reg. Cluj: Turda, inter parentes.

S. dubia Herb. f. monstr. **acaulis** Guşul. f. nova.

Caulis brevissimus, foliis fasciculatis, dichasia ab ima basi emittens.

Reg. Stalin: in vicinitate oppidi Stalin.

S. italica (L.) Pers. var. **Porciusii** Guşul. var. nova. — *S. italica* (L.) Pers. var. *glabra* Porcius in Sched. n. nud. in Herb. Inst. Bot. Bucureşti.
 Planta omnino glabra exceptis pedunculis parcissime pilosis.
 Reg. Cluj: prope urbem Rodna; Reg. Stalin: in pago Valea Lungă.

DIANTHUS L.

D. pseudarmeria M. B. ssp. **dobrogensis** Borza et Nyár. f. **microcalyx** Prod. f. nova.

Calyx 10 — 11 mm longus et 2 mm latus.

Reg. Galaţi: prope pag. Măcin.

D. glabriusculus (Kit.) Borb. f. **typicus** Nyár. ex Prod.

Planta glabra, foliis tantum margine \pm scabris. Frequens in foenetis et ad marginem silvarum.

D. diutinus Kit. ssp. **Hajdoae** Prod. ssp. nova.

Radix fusiformis. Caulis 40 — 50 cm altus, cylindraceus vel quadrangularis. Folia inferiora setacea, 4 — 5 cm longa et 0,5 — 1 mm lata, caulina 5 — 6 cm longa, 1 — 2 mm lata, vagina 1 — 1,5 cm longa. Capitulum 7 — 12 (4 — 14)-florum. Folia basin capituli fulcrantia straminea, late-lanceolata, elliptica, margine membranacea, in aristam 2 — 3 mm latam producta. Squamae calycinae ochroleucae, ellipticae, margine membranaceae, 4 — 5 mm latae, membrana 0,25 — 0,5 mm lata, dimidium calycis longa. Calyx 10 mm longus, dentibus obtusis, rubescens. Petalorum lamina rubra, atro-rubens, parva, supra pilosa, margine dentata.

Reg. Bârlad: in arenosis fluv. ad Hanu Conachi, una cum specie typica.

Differt a typo numero majore florum capituli (7 — 12, rarius 1 — 3) calyce brevioris, colore rubro in parte superiore calycis, corolla minore, atro-rubra (non rosea) atque pilis in hujus parte superiore praedita. Universe *D. Hajdoa* pro *D. diutino* perinde ut *D. giganteiformis* pro *D. giganteo* est.

D. diutinus Kit. ssp. **Hajdoae** Prod. var. **luxuriosus** Nyár. et Prod. var. nova.

Foliis universe latioribus (2 — 2,5 mm), multo longioribus (inferioribus 14 cm longis). Capitulis magnis 12 — 25 (30)-floris. Calyx 2 cm longus.

Reg. Galaţi: Tulcea in silva Letea; Reg. Constanţa: ad Mamaia.

D. Pontederæ Kern. f. **pseudo-Pontederæ** Prod. f. nova.

A typo differt capitulis paucifloris, calyce latiore et squamis calycinis angustioribus membranaceis.

Reg. Rodna: ad pagum Nimigea de Jos, in loco dicto « Streua ».

D. urziceniensis Prod. comb. nova. — *D. Pontederæ* Kern. ssp. *urziceni* Prod. Fl. det. pl. Rom. II (1939) 1241, cum diagn. rom.

D. Pontederæ similis a quo differt colore magis pruinoso, caule tenuiore, foliis angustis et rigidioribus. Non solum caulis, sed etiam folia evidenter scabre-pilosa, pilis præcipue ad marginem foliorum longis. Flores in capitulo ad summum decem.

Reg. Baia Mare: In arenosis silvaticis silvæ Foeni ad pagum Urziceni.

var. **pauciflorus** Prod. comb. nova. — *D. Pontederæ* Kern. ssp. *urziceni* Prod. var. *pauciflorus* Prod. l. c. cum diagn. rom.

Differt a specie typica foliis angustioribus, brevioribus, magis viridibus, capitulis 1—5-floris.

Reg. Baia Mare: In silva pagi Urziceni.

D. giganteiformis Borb. var. **baleianus** Prod. var. nova.

Planta inter *D. membranaceum* — *giganteiformem* — *banaticum* intermedia. *D. membranaceo* squamis calycinis internis late membranaceis similis, sed squamis internis exaristatis nec non calyce angustiore et petalis minoribus differt. *Dianthum giganteiformem* admonet mucrone squamarum calycis et colore albo-sordido vel brunnescente, differt autem calyce multo longiore (ad *D. giganteum* accedens) et angustiore, squamis internis longioribus, exaristatis, solum breviter mucronatis. Demum a *D. banatico* differt squamis calycinis longioribus, non rubescentibus neque aristatis, atque petalis minoribus.

Reg. Hunedoara: Mtes Retezatenses, in fœnatis ad locum « Clonţul Trandafirilor » dictum, prope « Cabana Baleia ».

D. giganteiformis Borb. var. **craiovensis** Prod. var. nova.

Diantho giganteiformi valde similis colore albescente squamarum internarum et externarum pseudomembranacearum; differt autem primo intuitu omnibus squamis multo longioribus, atque calyce fere nunquam typo aequilongo. Differt etiam calyce angustiore, dentibus acutioribus et colore petalorum saturate-roseis. Color atque petala magna *Dianthum banaticum* Heuff. admonent.

Reg. Craiova: in horto populari urbis Craiova.

D. giganteus D'Urv. f. **capitiformis** Prod. f. nova.

Caule et foliis *Diantho giganteo*, capitulis magnitudine, calycis et forma squamarum et bractearum. *D. capitato* similis.

Reg. Craiova: ad oppid. Craiova.

D. giganteus d'Urv. f. **grossenodosus** Prod. f. nova.

Nodi caulis valde crassi, tumidi.

Reg. Craiova: circa pagum Segarcea.

D. giganteus D'Urv. f. **setaceus** Prod. f. nova.

Folia omnia setacea, 1 — 2 mm lata.

Reg. Pitești: in valle Aluti, prope pag. Căineni.

D. Henteri Heuff. var. **cloșanicus** Prod. var. nova.

Caulis cca 35 cm altus, tenuis, 4-angularis, nodis 5 — 6 obsoletis, e rhizomate tenui descendens. Folia angusta, 1 — 1 $\frac{1}{4}$ mm lata, inferiora 9 — 10 cm longa, suprema omnia scabriuscula, margine parce dentata, vaginis 1 cm longis. Flores numero 2 — 5 (— 6) in capitulum congesti; folia fulcrantia (subfloralia) lanceolata, longe aristata, arista plerumque calyci aequilonga. Squamae externae calycis brunneo stramineae, sat validae, parum longiore quam internae. Bractae internae calyci adpressae, numero 4, \pm membranaceae, plerumque tenues obovatae vel lanceolatae, 5 mm longae et in parte superiore cca 3 mm latae, margine membranaceo, fere hyalino, apice in aristam 1,5 — 2,5 mm longam contracta, dentibus lanceolatis, longe acuminatis, 3 mm longis, margine membranaceis. Lamina petalorum parva, 4 — 4,5 mm longa et 2,5 — 3 mm lata.

Reg. Craiova: in graminosis saxosisque montis Piatra Cloșanilor, alt. 1200—1427 m s.m. solo calc.

D. banaticus Heuff. a planta nostra differt caule validiore, foliis latioribus, magis evidenter nervosis, foliorum vagina multo longiore, numero florum majore, squamis calycinis latioribus, internis brevius aristatis, colore rubescente calycis, eorum dimensione, dentibus calycinis longioribus, petalis multo majoribus, margine profundius dentato. **D. cloșanicus** primo intuitu a **D. banatico** colore pallide-brunneo calycis et squamarum calycinarum nec non calycis dimensione minore differt. **A. banaticus** calyce longiore a **D. cloșanico** discrepans ad **D. giganteum** imprimis in Banatu vergit.

D. Henteri Heuff. var. **eu-Henteri** Prod. var. nova.

Lamina petalorum longiore quam 5 mm, obovato-cuneata. Dentibus calycinis mucronatis. Huc pertinent nonnullae formae vetustae (conf. descr. rom).

D. carthusianorum L. var. **stolonifer** Prod. var. nova.

Caules numerosi (10 — 15), in parte inferiore stolones aut caudiculos soboliformes longos et validos emittentes.

Reg. Cluj: in pratis et pascuis ad pagum Ilva Mare, versus Mt. Corni.

D. carthusianorum L. var. **stolonifer** Prod. f. **subsolutus** Prod. f. nova
Caulis apice in tres ramos solutus.

Una cum var. praecedente ad pagum Ilva Mare.

D. kladovanus Deg. var. **rigidus** Prod. var. nova.

Planta caespitosa, habitu parva, 20—30 cm alta, caulibus ac foliis scabris, margine dentato scabro. Folia angusta (usque 1 mm lata) rigida. Folia fulcrantia duo, plerumque viridia, lanceolata et longe aristata. Bractee (squamae) calycinae longe aristatae et plerumque crassiores, membrana marginali angustiore, mucrone apicali valido et sat longo, saepe aristiforme. Calyx validior, angustior et longior, plerumque colore rubro vel rubro-brunneo. Flores rosei.

Reg. Bârlad: in arenosis mobilibus ad Hanul Conachi.

D. kladovanus Deg. var. **typicus** Prod. nova comb. — *D. subkladovanus* Prod. Fl. pt. det. pl. Rom. ed. II (1939) 303 cum descr. rom.

Planta parum pallide virens, caule ac foliis mollibus. Universe floribus paucis numero cca 4, raro 1—10. Folia inflorescentiam fulcrantia saepe bracteis externis calycinis intermixta, sat valida, elliptica, breviter. Bractee calycinae latissime vel per totum \pm membranaceae, apice universe in mucronem brevem, mollem, cartilagineum productae. Calyx viride-caerulescens. Flores rosei vel rubelli. Petala non raro supra pilis brevibus tecta.

Reg. Bârlad: in arenosis mobilibus ad Hanul Conachi.

f. **alba** Prod. f. nova.

Planta robustior, foliis latioribus. Calyx longior et latior, laete virens. Flores albi.

Reg. Bârlad: in arena mobili ad Hanu Conachi.

D. guttatus M. B. ssp. **divaricatus** Prod. ssp. nova.

Planta gracilis, 40—50 cm alta, caule virescente laevi, divaricate ramoso, compluribus nodis parum inflatus praedito, internodiis 4,5—5 cm longis. Folia scabra, 2,5 mm lata et 4—4,5 mm longa, longe acuminata, vagina brevi, 3-nervata, margine scabre dentata; folia inferiora et media plerumque internodiis caulis longiora. Flores terminales divaricati. Squamae calycinae 4, basi albescentes et margine membranaceae ceterum virides, multinervae, ovato-lanceolatae, 16 mm longae, in apicem longum viridem calyce aequilongum vel parum breviorum subito attenuatae. Calycis tubus cca 28 mm longus et 4 mm latus. Petala oblonga caeruleo lilacina, paucidentata, supra barbata.

Reg. Craiova: prope oppid. Craiova.

D. Șerbani Prod. comb. nova. — *D. campestris* M. B. ssp. *Șerbani* Prod. Consp. Fl. Dobr. in Bul. Acad. Stud. Agron. Cluj V, I (1935) 259, Sep. p. 87, tab. 18, cum descr. rom. et germ.

4. Planta gracilis, rhizomate crasso et lignoso, multos caules tenues (1 — 1,5 mm latos), sed sat validos, 35 — 46 cm altos, basi parum procumbentes, in parte superiore bifido-ramosos, raro simplices emittente; caulis in parte superiore cylindricus vel subquadrangularis, minute scaberule pubescens, plerumque 6 — 9-nodis foliosis in parte inferiore approximatis (internodiis cca 1,5—3 cm longis), in parte superiore remotis (internodiis cca 6—6,5 cm longis) praeditus. Folia tenuia, herbacea, mollia, lamina angustelineari, 3,5 — 4,5 cm longa, 1,5 — 2,5 mm lata, 5-nervia, nervis ceteris minus conspicuis, margine superiore scabra vel scaberula, subtus scabra vel imprimis ad nervos minute pubescentia, margine scaberrima, apice acuta, attenuate acuminata, non raro ad apicem convoluta. Vagina foliorum 5—7,5 (10) mm longa, conspicue striata et scaberula seu prope laevis. Flore in capitulis solitariis vel subfasciculato aggregatis, paucifloris (2—3, raro 4-flores). Folia inflorescentiam fulcrantia marginis membranacea, 7 mm longa ac arista viridi, scabra, 2,5 mm longa, praedita. Squamae calycinae numero 4 — 6, inaequales, 10 mm longae (2 mm longitudinis ad aristam pertinentibus), margine late membranaceae, 3,5 mm latae, late lanceolatae vel elongato ovatae, duobus internis magis membranaceis. Squamae dimidium calycem aequantes vel parum breviores. Calyx plerumque viridis, rarissime aegre purpurascens conspicue maculatus, dentibus inaequalibus, 4—4,5 mm longis, margine anguste membranaceo et breviter ciliato, apice acutis vel aristatis. Lamina petalorum utroque latere purpurascens, 10 mm longa et 5 mm lata, ad basin barbulata, margine inaequaliter dentata.

Reg. Constanța: in pratis graminosis ad viam ferream versus meridiem pago Medgidia.

D. nardiformis Janka f. *sobolifer* Prod. f. nova.

Radix principalis complures stolones tenues, sobolos dictos, 4—5 cm longos, efoliatos emittit.

Reg. Galați: ad oppidum Tulcea.

× **D. Gușuleacii** Prod. ssp. hybr. nova = *glabriusculus* × *Rehmannii*.

Planta 65 — 68 cm alta, caespitosa, viridis, internodiis numerosis (usque ad 10), non tumidis. Folia viridia, lineari-lanceolata, 5-nervia (excepto nervo principali et nervo secundario conspicuo), elongato acuminata, media 7 — 8 cm longa et 4 — 5 cm lata, laevia, vagina 10 — 15 mm longa. Folia inflorescentiam fulcrantia anguste lanceolata, longe aristata. Flores 4 — 5 in capitulum

aggregati. Arista longitudinem calycis aequans vel parum brevior, margine membranacea. Squamae calycinae late lanceolatae, margine anguste vel late membranaceae, non raro per totum membranaceae, in aristam brunneam plerumque mollem contractae. Calyx (cum dentibus) 18 — 20 mm longus, plerumque viridis, solum dentes straminei acuminati et basi rubescente maculati. Lamina petalorum magna, 5,7 — 10 mm longa, obovato-cuneata, rosea. Habitu, foliis latioribus, caule laevi (una cum foliis), foliorum vagina longiore nec non petalis majoribus *D. glabriusculo*, colore viridi foliorum fulcrantium ac squammis calycinis margine vel per totum membranaceis *D. Rehmannii* propior.

Reg. Suceava: Dumbrava. Crescit etiam in U.R.S.S. prope Cuciurul Mare.

× *D. vârciorovens* Prod. sp. hybr. nova = *capitatus* × *banaticiformis*.

Foliis caulinis mollioribus, graminiformibus, petalis magnis. *D. banaticiformi*, capitulis minoribus, floribus perpauca, sed imprimis calyce brevior.

Reg. Gorj: supra pagum Vârciorova.

× *D. Tzopae* Prod. sp. hybr. nova = *banaticus* × *giganteiformis*.

Caule magis copiose folioso, foliis viridioribus, mollioribus, capitatis, longioribus, maioribus, squamarum aristis latioribus et longioribus. *D. banatico* squamis calycinis internis prope exaristatis, breviter acuminatis nec non externis colore stramineo, floribus minoribus, foliis latioribus *D. giganteiformi* propior.

Reg. Timișoara: cca oppidum Orșova ad Danubium.

EUPHORBIA L.

E. polychroma Kern. var. *latifolia* Prod. var. nova.

Folia caulina (atque floralia) brevia, lata, caulina elliptica, 25 mm lata, 52 mm longa, apice marginata, subtus disperse pilosa, supra glabra. Foliola basis umbellae primariae 4 elliptica, 4 cm longa et 3,5 lata, basin versus cuneata, apice emarginata. Radii primarii umbellae 5,3 cm longi, umbellas parvas 12 mm longas, basi foliolis ellipticis suffultas gerentes.

Reg. Timișoara: «Cazane».

f. *glabra* Prod. f. nova.

Planta alta, robusta; inflorescentia e radiis longissimis et glabris composita.

Reg. Rodna: ad pagum Chiochiș.

f. subepithymoides Prod. f. nova.

Planta habitu humiliore, radiis umbellae brevioribus et firmioribus. Plantae balcanicae *E. epithymoides* nominatae valde simile.

Reg. Timișoara: ad Thermas Herculis.

E. carniolica Jacq. f. **elliptica** Prod. f. nova.

Planta foliis ellipticis.

Reg. Cluj: ad balneas Valea Vinului (leg. Czetz).

E. carniolica Jacq. f. **cordato-bracteata** Prod. f. nova.

Planta bracteis cordatis.

Reg. Cluj: prope oppidum Bistrița.

E. platyphyllos L. f. **typica** Nyár. ex Prod.

Foliis sparsim hirsutis.

Reg. Cluj: ad opp. Cluj frequens.

E. falcata L. f. **gracilis** Prod. f. nova.

Planta gracilis, caule tenui, parum ramosa, inflorescentia parva. Foliola umbellae atque involucelli magis elongata.

Reg. Constanța: inter pagos Tuzla et Movila.

E. falcata L. f. **prostrata** Prod. f. nova.

Caulis prostratus, ramos numerosos tenues vel crassos, omnes floriferos emittens.

Reg. Cluj; Cluj, Cojocna, Boj, Tunelul Cojocnei, Iclod.

E. lucida W. et K. f. **puberula** I. Póp in litt. ad Prod. f. nov.

Foliola involucralia margine et infra imprimis apicem versus pilis mollibus, aliis glandulosis intermixtis tecta. Folia omnia fere uniformia, 5 — 10 cm longa et 1 — 1,3 cm lata.

Reg. Oradea: ad pagum Cefa.

E. virgata W. et K. var. **typica** Nyár. ex Prod.

Foliis lineari lanceolatis, vel anguste lanceolatis. Planta gracilis in parte superiore turionibus sterilibus.

Frequens in « Câmpia Transilvaniei ».

Reg. Pitești: Piatra Olt inter segetes.

E. Esula L. var. **lingulata** Nyár. et Prod. var. nova.

Caulis 20—25 cm altus, eramosus, usque ad apicem pariter crassus, basi arcuatus, mox adscendens, dense et aequaliter foliosus, foliis versus basin deciduis. Foliis magnis, 5 — 6 cm longis, 12 — 15 mm latis, apice rotundatis,

in parte superiore latioribus, in petiolum cuneiformem aequaliter attenuatis, marginibus cartilagineis, integerrimis, una cum caule glabris. In axilla foliorum superiorum turiones steriles, pauci, pedunculis foliis aequilongis, eramosis. Apice caulis umbellato, 7-radiato, bracteis lanceolatis, foliis similibus, sed minoribus. Bracteolae florum longitudine latiores, apice rotundatae. Glandulae transverse ovaes, bicornes.

Reg. Iași: in valle « Jijia » supra oppidum Iași, ubi pons longus vallem decussat.

E. Seguieriana Neck. f. *virgatiformis* Prod. f. nova.

Folia forma et colore illis *E. virgatae* similia. Fructus maximi fere bis majores quam in typo.

Reg. Craiova: Craiova in ditione urbis.

f. *longifolia* Prod. f. nova.

Foliis usque ad 4 cm longis et 4 mm latis.

Reg. Constanța: Agigea, Mamaia.

f. *oblongifolia* Prod. f. nova.

Planta 14 — 20 cm alta, foliis aequilongis, oblongis, basin versus dilatatis, apice obtusis et mucronatis, 12—15 mm longis et 3,5—5,5 mm latis. Foliola umbellae quorundam exemplarium fere rotunda. Umbella brevis, illi *E. platyphyllae* similis.

Reg. Oradea: prope pagum Beiuș. Reg. Stalin: Șeica Mare.

f. *brevifolia* Prod. f. nova.

Planta 40 cm alta. Folia conferta, 16 mm longa et 1 — 2 mm lata, parva, in parte superiore 3 cm lata, radiis brevibus 1,5 — 2,5 cm longis, foliis involuelli solum 5 mm latis.

Reg. Aut. M.; ad pagum Bandul de Câmpie. Reg. Galați: Măcin.

E. agraria M. B. ssp. *Borzae* Prod. ssp. nova.

Caulis altus, gracilis. Folia elliptica vel triangularia (non ovato-elliptica), basi sagittata, 2 — 3 cm longa et 1/2 cm lata, ramis in medio caulis numerosissimis. Ramis sub umbella terminali numerosis. *E. pannonicae* similis, quam etiam inflorescentia latiore et ramis admonet.

Reg. Galați: circa oppidum Tulcea.

× **E. jucula** Prod. sp. hybr. nova = *Esula* × *virgata*.

Foliis lineari-lanceolatis, latiusculis, 4 cm longis et 3—3,5 mm latis, non lucentibus, acutis, foliolis involuelli ± mucronatis. Habitu, colore atroviridi, foliis angustis et inflorescentia et apicem caulis aggregata *E. virgata* ad-

monet. Foliis atque bracteis mollioribus, flavescentibus et inflorescentia minore *E. Esulae* similis.

Reg. Cluj: prope stationem viae ferreae Cluj.

× *E. Guşuleacii* Prod. et Soran sp. hybr. nova = *salicifolia* × *virgata* f. *serotina*.

4. Caulis erectus, pilosus, multiramosus, ramis griseo-pilosis, sub umbella compluribus primum fertilibus, deinde alliis sterilibus. Folia sessilia, linearilanceolata, integra, supra et infra pilosa, marginibus revolutis, nervo prominente lucente. Pars superior plantae atroviridis. Foliola involucelli (bractae) reniformia, subcordata, glabra. Umbellae multiradiatae, radiis bi-trifurcatis, glandis cyathii bicornutis, bruneo-luteis. Capsula punctato-scabra, glabra; semina obovata, non lucentia, griseo-rubescencia. Planta differt ab *E. angustata* Roch. (*virgata* × *salicifolia*) caule valde ramoso, ramis et foliis crebre griseo-pilosis, nervo folii viridi flavescente (flavido) et colore atroviridi partis superioris plantae, dein cyathio semper glabro et glandulis flavido-brunneis.

Reg. Oradea: Vadul Crişului. In ruderalis et arenosis stationis viae ferreae in societ. plantarum *Chaenorhinum minus*, *Lepidium virginicum*, *Vicia lutea*, etc.

× *E. macinensis* Prod. sp. hybr. nova = *pannonica* × (*glareosa* × *agraria*).

4. 40 cm alta, caule terrestri solido, glabro. Folia parva, 3 cm longa et 1 cm lata, sessilia, triangulari-ovata, oblonga, floralia ovato-romboidea, cuspidato-mucronata. Umbella terminalis 10-radiata, radiis 7 cm longis, bifidis, sub umbella terminali multis dichasiis lateralibus 8 — 10 cm longis.

Reg. Galaţi: in collibus ad Măcin.

Planta *E. pannonicae* similis, caule solido, crasso, radiis umbellae terminalis longioribus, dichasiis lateralibus numerosis, supra medium caulis dispositis. Foliis cordatis, multinervis *E. agrariam*, foliis crassis, coriaceis, *E. glareosam* admonet.

× *E. pseudovillosa* Prod. sp. hybr. nova = *villosa* × *virgata*.

Planta primo intuitu caule validiore, rigidiore, minus ramoso, ramis minoribus, sterilibus et foliis latioribus ad *E. virgatam* vergens. Foliis 12 mm latis, coriaceis, supra glabris, elongato-lanceolatis, obtusis vel marginatis, margine subcartilagineis *E. villosae* similis. Foliolis involucelli late-ovatis vel late-cordatis, umbella multiradiata inter parentes intermedia. Glandae cyathii semilunares, bicornutae.

Reg. Cluj.: ad pagum Chiochiş.

PAEONIA L.

P. corallina Retz. var. **triternatiformis** A. Nyár. var. nova.

Foliolis late-ovatis, vel late-obovatis, saepe \pm subrotundatis, apice subacutis, obtusis vel subrotundatis, subtus albo-glaucis, glabris, supra glaucescentibus, \pm coriaceis, \pm cuneatis, raro decurrentibus.

Reg. Timișoara: in declivibus saxosis et dumetosis supra pagum Baziaș.

P. peregrina Mill. var. **typica** A. Nyár. var. nova.

Foliolis alteris integris alteris apice sectatis vel solum dentatis.

Reg. Dolj: Plenița. Reg. Bueurești: in querceto mixto ad pagum Comana, in silva Mihai Bravul; in silva Ghimpați. Reg. Galați: prope Greci; Mt. Consul. Reg. Galați: in silva Găunoasă prope Puțeni, in silva «Rediul Dogarului» prope Băneasa.

P. tenuifolia L. f. **normalis** A. Nyár. f. nova.

Laciniis foliorum linearibus, 1—2 mm latis, vulgo 1,5 — 3 cm longis.

Reg. Mureș: Zăul de Câmpie. Reg. Craiova: Cihala versus Breșnița. Reg. Galați: Greci.

HELLEBORUS L.

H. purpurascens W. et K. f. **grossedentatus** A. Nyár. f. nova.

Segmentis foliorum cum dentibus 5—10 mm longis.

Reg. Mureș: Târgu Mureș.

ACTAEA L.

A. spicata L. f. **bitermata** A. Nyár. f. nova.

Foliis inferioribus et mediis biternatis, petiolis brevibus vel foliis fere subsessilibus. Foliis superioribus ternatis seu solum tripartitis. Inflorescentia elatior quam foliatio. Racemi 2—4, inferiores fructificantes dum superiores tantum florescere incipiunt.

Reg. Iași: in silva Repedea.

AQUILEGIA L.

A. transsylvanica Schur f. **validior** A. Nyár. f. nova.

Folia caulina 1—3, inferiora ternata seu biternata, basalium similia, superiora parva, \pm integra, bracteiformave.

Reg. Stalin: montes Făgărașenses: in cacumine Vârful Moșului.

A. vulgaris L. f. **subscapiformis** A. Nyár. f. nova.

Planta 1—3 (4) flora. Caulis pubescens \pm crassus, erectus, 10—30 cm altus, eramosus vel ramis 2—3 brevibus instructis. Foliis basalibus \pm longe petiolatis, parvis, usque ad $1/3$ caulis. Foliis caulinis bracteiformibus, integris vel ternatis.

Reg. Stalin: Mt. Ōcsém. Reg. Bacău: Mt. Ceahlău.

A. vulgaris L. ssp. **subscaposa** (Borb.) Borza f. **eusubscaposa** A. Nyár. f. nova.

Caulibus eramosis, 1 (2) -floris, foliis caulinis solum bracteiformibus, parvis, lanceolatis, integerrimisve.

Reg. Cluj: in monte Vultureasa supra pagum Poșaga.

f. **virgatoramosa** A. Nyár. f. nova.

Caulibus \pm bifurcato-ramosis, (2) 3—5 floris, ramis longis, \pm patentibus, inferioribus usque ad 15 cm longis. Folia caulina inferiora saepe ternata, rarissime biternata, foliola lato-lanceolata, valde minora quam foliola foliorum basaliū.

Reg. Cluj: in monte Vultureasa supra pagum Poșaga.

DELPHINIUM L.

D. fissum W. et K. var. **dinaricum** (Beck et Szysz.) Hay. f. **latifolium** Prod. et Topa ex A. Nyár. f. nova.

Laciniis foliorum 6—16 mm latis.

Reg. Timișoara: in convallis Cazane prope pagum Plavișevita.

D. intermedium Sol. f. **longepedunculatum** A. Nyár. f. nova.

Planta alta, inflorescentia valde elongata vel rarscente pedunculis inferioribus 5—10 cm longis.

Reg. Cluj: Valea Ordencușii prope pagum Vidra de Sus.

D. Consolida ssp. **paniculatum** (Host) f. **typicum** A. Nyár. f. nova.

Pedunculis eglandulosis; fructibus glabris.

Frequens.

ACONITUM L.

A. moldavicum var. **australe** (Rehb.) G. Grinț. f. **fragile** G. Grinț. f. nova.

Floribus purpureo-violaceis, caule et inflorescentia rigidis, ramis fragilibus.

Reg. Suceava: ad rivulum Pârâul Ferului supra pagum Iacobenii.

var. **Hacquetianum** G. Grinț. var. nova.

Planta \pm subglabra, floribus minus pilosis, ab *A. moldavico*, cui valde affine, imprimis folliculis glabris differt. In iisdem locis una cum var. *australi* in toto territorio.

Reg. Ploești: in lapidinis et in silva ad Lăculețe.

f. **flexuosum** G. Grinț. f. nova.

Planta robusta, usque ad 150 cm alta, glabrescens. Inflorescentia 1 m longa, a basi ramosa, ramis inferioribus reverse arcuatis, flexuosis, superioribus ac pedicellis semicirculo-curbatis. Floribus magnis, circa 25 mm altis, violaceis, rostro piloso.

Reg. Suceava: ad pedem montis Adam supra pagum Pojorâta.

f. **macrocassis** G. Grinț. f. nova.

Caulis ad 70–80 cm altus, a medio ramosus, ramis paucis sursum arcuatis, sicut axis pubescentibus, pilis parvis, arcuatis, reversis. Floribus magnis, circa 42 mm longis, casside 34–35 mm alta, apice conico et prorsus arcuato.

Reg. Pitești: in montibus Cățunul ad pagum Căineni.

f. **piliferum** G. Grinț. f. nova.

Rostrum intus pilis brevibus vel longis exsertis.

Reg. Aut. M.: in rupestribus montis Ōcsém supra pagum Bălan.

var. **confusum** G. Grinț. var. nova.

Planta rigidior, densius pubescens, ceteris characteribus cum *A. moldavico* convenit, distinguitur autem a caeteris varietatibus folliculis dimidio glabris.

Reg. Craiova: in pratis ad pagum Baia de Fier.

f. **variegatum** G. Grinț. f. nova.

Floribus magnis, 31 mm longis, venis obscure-violaceis marmoratis vel albescente-violaceis, maculis caeruleis. Cassis prorsus arcuata, 26 mm longa. Linea basalis 11 mm longa. Rostrum intus pilosum, extus sicut pars media foliolorum perianthii lateralis et inferioris colore luteo-virescente.

Reg. Pitești: in nemoribus alnetis rivuli Păscoaia prope Zaroștea Mare sub monte Băgău.

f. **pilosum** G. Grinț. f. nova.

Rostrum intus pilis brevibus vel longis exsertis.

Reg. Craiova: ad rivulum Suseni in fissura Suseni ad pagum Dobrița.

f. **glaberrimum** G. Grinț. f. nova.

Rostrum cassidis intus glabrum.

Reg. Craiova: ad rivulum Hărăboia prope pagum Schela.

A. Hosteanum Schur var. **geraniifolium** G. Grinț. var. nova.

Rhizoma horizontale descendens, 1—3 ramosum. Caulis ad basin pilis setiformibus, \pm patentibus, 40 cm altus, foliis 4—5, basalibus magnis, reniformibus rotundatis, 9 cm latis, 6 cm longis, sinu valde aperto, 5—7 sectatis, pubescentibus, dentibus latis, obtusis-mucronatis, superioribus apice segmentorum longe triangulari. Inflorescentia simplex pubescens, pilis brevibus arcuatis et reversis. Flores pauci 10—15, glomerati, erecti, glabrescentes, casside 2 cm alta, apice rotundata, medio coarctata, linea basali 12 cm longa, rostro perianthii foliolis lateralibus ac uno inferiore barbularis; ovario et folliculis glabris.

Reg. Pitești: ad rivulum Latorița, ad Ciunget, pagum Malaia.

A. excelsum Rehb. var. **pseudoexcelsum** G. Grinț. var. nova. — *A. lasiostomum* Rehb. b. *excelsius* Zap. Consp. Fl. Galic. crit. II (1908) 210.

A. excelso Rehb. valde similis: caulis 1—1,8 m altus, rectus, \pm debilis, in parte inferiore sicut petioli ac limbus, in parte dorsali pilis setiformibus, patentibus vel reversis instructi. Omnia folia caulis illis *A. moldavici* similia, sed glabra et sinu large aperto. Inflorescentia racemosa, 50—60 cm longa, pubescens, pilis parvis, arcuatis et reversis tecta, simplex raro partim (3—5) ramosa. Pedunculi 6—7 cm longi, declinato ascendentes, bracteis et bracteis plerumque simplicibus, lineari-lanceolatis, basalibus raro incis. Flores magni, distantes, violacei, vel diluto-vel atrocaerulei, casside elongata, apice clavata.

Reg. Bacău: ad saxa cacuminis montis Măgura supra pagum Bistricioara

A. puberulum (Ser.) G. Grinț. f. **versicolor** G. Grinț. f. nova.

Floribus colore vario, imprimis luteo-rubicundo, folliculis glabris.

Reg. Ploesti: ad rivulum Telejenel prope pagum Vărărie.

f. **typicum** G. Grinț. f. nova.

Caulibus rigido-setosis, foliis \pm hirsutis, non nitidis, magnis, usque ad 25 cm longis et ad 35 cm latis. Racemis 20—30 cm longis, hirsutis.

Reg. Ploesti: ad ripam rivi Telejenel sub monte Zăgan.

f. **bracteatum** G. Grinț. f. nova.

Flores lutei, bracteis longis alabastra atque etiam flores apertos superantibus.

Reg. Ploesti: ad rivulum Telejenel prope pagum Vărărie sub monte Zăgan.

A. lasianthum Simk. f. **bracteosum** G. Grinț. f. nova.

Bractee alabastrorum et florum longiores.

Reg. Ploești: ad rivulum Telejenel versus Poiana Greceanu sub monte Zăgan.

f. arcuatum G. Grinț. f. nova.

Alabastra et flores pilis setiformibus, luteis tecti. Bracteae parvae, inter alabastra absconsae. Inflorescentia ramosa, ad basin racemi 1—2 ramis rectis, ceteris arcuato-ascendentibus vel fere circulum formantibus.

Reg. Ploești: ad rivulum Telejenel ad pedem montis Zăgan versus Poiana Greceanu.

f. typicum G. Grinț. f. nova.

Bracteae parvae, alabastris multis minores, inflorescentia ramosa, ramis 1—5, omnibus rectis, nunquam arcuato ascendentibus. Caulis, inflorescentia, flores, folliculi patenter villosi.

Reg. Ploești: ad rivulum Telejenel sub monte Zăgan.

f. pubens G. Grinț. f. nova.

Caulis et petioli ad basin pilis \pm densis, hirsutiformibus, horizontalibus, ceterae partes caulis, inflorescentiae axis et pedunculi pilosi, pilis reversis, arcuatis, parvis vel pubescenti-villosis. Bracteae et flores pilis setiformibus villosis tecti. Axis et folliculae pilis pubescentibus parvis, rectis accumbentibus.

Reg. Ploești: sub Poiana Greceanu in monte Zăgan et una cum aliis formis in Carpathis meridionalibus.

f. mixtum G. Grinț. f. nova.

Caulis basi, petioli et limbus dorso pilis longis setiformibus tecti. Pars media caulis cum foliis et inflorescentia ad basin pilis parvis arcuatis, reversis praediti, axis autem pedicelli, bracteae et bracteoli pilis densis villosis obtecti. Flores et folliculi pilosi, pilis setiformibus patentibus.

Reg. Ploești: Poiana Greceanu ad rivulum Telejenel sub monte Zăgan et in Carpathis septentrionalibus.

A. dasytrichum (Deg. et Gáy.) G. Grinț. comb. nova. — *A. ranunculifolium* f. *A. dasytrichum* Deg. et Gáy. in MBL (1907) 119 et (1908) 318.

f. typicum G. Grinț. f. nova.

Inflorescentia erecta, simplex vel ramosa, ramis 1—2 basalibus. Axis brevis 10—12 cm, pedicelli 15—25 mm longi, bracteae pedicellis aequilongae vel longiores flores non excedunt. Cassis conica, medio stricta, apice clavata, recta vel parum prorsus proclinata, pilosa, pilis densis setiformibus sicut in folliculis.

Reg. Pitești: in pratis montanis Mateiaș et Sturu.

f. ranunculiforme G. Grinț. f. nova.

Inflorescentia recta, simplex vel ramosa, ramis basalibus 1—4, axis ultra 20 cm longus, bracteae pedicellis \pm aequilongae, flores casside 30—35 mm longa, arcuata et valde versus rostrum proclinata. Nectarium breve, tertiam partem cassidis attingit.

Reg. Pitești: in pratis montanis Mateiaș et Sturu.

f. flexuosum G. Grinț. f. nova.

Inflorescentia ad 40 cm longa. Bracteae basales longae. Axis flexuosus. Cassis clavata vel conico-cylindracea, 30—35 mm longa, prorsus proclinata. Nectaria casside multo breviora quam in forma *ranunculiforme*. Rostrum et foliola perianthii lateralialia et inferiora pilis setiformibus flavis tecta.

Reg. Pitești: in pratis montanis Mateiaș et Sturu.

f. pedunculatum G. Grinț. f. nova.

Cassis proclinata, nectario \pm longior.

Reg. Pitești: in pratis montanis Mateiaș et Sturu.

f. cylindraceum G. Grinț. f. nova.

Flores densi, cassis 30 mm alta, cylindro-conica, apice rotundato.

Reg. Pitești: in pratis montanis Mateiaș et Sturu.

f. laxum G. Grinț. f. nova.

Flores laxi vel distantes, antice arcuati, apice cassidis dorsum versus proclinato.

Reg. Pitești: in pratis montanis Mateiaș et Sturu.

A. Baumgartenianum Simk. f. **ambiguum** G. Grinț. f. nova.

Planta habitu et florum colore violaceo, pubescentia inflorescentiae, folliculorum indumento breviter adpresso ad *A. moldavicum* var. *australe* spectat; colore violaceo basin versus cassidis in caeruleo luteum transeunte, gemmae ore viridi-luteo indumento denso setiformi et colore luteo, ad *A. lasianthum* vergens.

Reg. Pitești: ad rivulum Telejenel in Poiana Greceanu.

f. obscurum G. Grinț. f. nova.

Habitu et colore obscure vel dilute violaceo, sicut folliculis omnino glabris vel solum ad basin pilosis *A. moldavico* var. *Hacquetiano* propinquum est; perianthii foliolis lateralibus et inferioribus autem, indumento disperse setiformi, luteo in parte inferiore cassidis et rostri, affinitatem *A. lasianthi* tradit.

Reg. Pitești: in silva Boișoara ad rivulum Sălătruc. Reg. Ploești: in colle Lăculețe ad lapicidinem.

× *A. aberratum* G. Grinț sp. hybr. nova = *moldavicum* var. *australe* × *puberulum*.

Planta foliis discoloribus, glabrescentibus, caulis ac petioli foliorum basaliū pro parte glabrescentes, pilis setiformibus albescentibus praediti. Cassis et rostrum atque perianthii foliola lateralia et inferiora albescenti setiformi pilosa. Margo perianthii foliolorum inferiorum luteo-viridis; his characteribus affinitatem *A. puberuli* ostendit; inflorescentia autem pilis reversis pubescente, floribus ± intense violaceis, folliculis pro parte pubescentibus, pilis rectis decumbentibus affinitatem *A. moldavici* var. *australis* defert.

Reg. Pitești: ad rivulum Telejenel inter Triunghiū et Poiana Greceanu-

× *A. setiferum* G. Grinț, sp. hybr. nova = *moldavicum* var. *australe* × *velutinum*.

Habitu, florum colore violaceo, inflorescentiae ac pedicellorum indumento pubescente, pilis parvis accumbentibus, ± rectis et densis, ad *A. moldavicum* var. *australe* pertinet. Carpellis autem pubescentibus, pilis raris setiformibus dorso praeditis, dein casside conico-cylindracea in rostrum evidenter arcuatum protracta, nec non indumento perianthii quod ex pilis setiformibus aliis minoribus intermixtis arcuatis reversis constat, denique pedicello pubescente villosa *A. velutino* affinis.

Reg. Suceava: in fissura montis Barnaru.

× *A. erronatum* G. Grinț. sp. hybr. nova = *lasianthum* × *vulparia*. — *A. vulparia* Rehb. f. *barbatum* Nyár. in BK (1941) 137, Kv. fl. III (1942) 215 et in Bul. șt. Acad. R.P.R. Sect. șt. biol. tom. III, nr. 1 (1951) 29.

Caule pilis longis setiformibus patentibus praedito, floribus sordide flavis, sparse setiforme-pilosis, rostro intus barbulato ad *A. lasianthum* spectat; folliculis glabris, foliis late sectatis *A. vulpario* affinis.

Reg. Cluj: in dumetosis vallis Plecica prope opp. Cluj.

× *A. setosum* G. Grinț. sp. hybr. nova = *lasianthum* × *puberulum*.

Foliis glabrescentibus et lucentibus, folliculis nigris, nonnullis omnino glabris vel pro parte glabris ad *A. puberulum* spectat; altera parte folliculorum omnino vel pro parte pubescente, pilis setiformibus intermixtis ad *A. lasianthum* vergit.

Reg. Ploesti: ad rivulum Telejenel versus Poiana Greceanu sub monte Zăgan.

× *A. sturiense* G. Grinț. sp. hybr. nova = *dasytrichum* × *moldavicum* var. *australe*.

Colore florum violaceo ad *A. moldavicum* var. *australem* pertinet; foliis fere ad petiolum sectatis, coriaceis, nervis dorsalibus prominentibus, gemmis

et floribus setiforme-pilosis, folliculis pilis rectis, villosis, \pm patentibus tectis ad *A. dasytrichum* spectat.

Reg. Pitești: in pratis montanis Mateiaș et Sturu.

A. romanicum Wol. f. **flexuosum** G. Grinț. f. nova.

Inflorescentia non ramosa, \pm flexuosa, pedicellis 3—5 cm longis, nutantibus vel curvatis, ubique obliquis, \pm unilateralibus.

Reg. Suceava: in monte Muncel in depressione inter montes Adam et Eva.

A. callibotryon ssp. **Scărișorensis** f. **bicolor** G. Grinț. f. nova.

Flores caeruleo-violacei, perianthii versus stipitem macula magna, alba, 3—4 mm longa et 2—2,5 mm lata praeditis.

Reg. Oradea: in locis petrosis et humidis ad rivulum sub monte Vlădeasa.

f. **flexuosum** G. Grinț. f. nova.

Inflorescentia valde flexuosa, 45 cm longa, pedicellis arcuatis, inferioribus 3 cm longis; capsulis \pm numerosis, a dimidio divergentibus, 2—2,5 cm longis, 6 mm latis, dorsum versus \pm recurvatis. — Una cum praecedente.

A. callibotryon ssp. **corbense** G. Grinț. ssp. nova.

Caulis crassus, 5—6 cm in diam., gradatim decrescens, glaber, rectus, ultra 1 m altus, sparse foliatus; folia petiolo 5—7 cm longo, limbo gracili, 5-fido, segmento medio \pm petiolato, iteratim trisectato, laciniis divergentibus, integris, 3—6 mm latis, acute lanceolatis, sinu foliorum aperto. Inflorescentia glabra, simplex vel ramosa, \pm longa, in exemplaribus umbrosis nutans, usque ad 40 cm longa, ramis 5—10, tenuibus, 10—20 cm longis, arcuate ascendentibus, 4—6-floris; pedunculis rectis vel obliquis vel arcuatis unilateralibus, nutantibus quam flores longioribus vel casside duplo longioribus, aequicrassis; bracteis 3-segmentatis, superioribus fere integris, lanceolatis; bracteolis lanceolatis. Flores magni, 3—3,5 cm longi, perianthii foliolis casside tectis vel sub fructu apertis, glabris; casside recta (ad stipitem), dorso et fronte recto, rostro obliquo, deorsum flexo, parum prominente, linea basali \pm arcuata; inferioribus elliptico-lanceolatis, deorsum arcuatis. Nectariis capitatis, capite violaceo-luteo, unguicula et dorso ciliato. Stamina simplicia vel 1—2 dentata, alata, longa et dense pilosa, alteris glabris, disperse ciliatis intermixtis. Folliculi maturi magni, 2—2,5 cm longi, 5—7 mm lati, stylo \pm arcuato, 3—4 mm longo, seminibus triangularibus, lateribus angulo alato junctis, hilo latere nitido fixo, dorso parum ondulato-angulato.

Reg. Bacău: ad Piatra Corbului et ad plantationem coniferarum prope rivulum Bicz.

f. acephalum G. Grinț. f. nova.

Caulis usque ad 90 cm altus, sparse foliatus. Inflorescentia usque ad 20 cm alta, non foliosa, vel bracteis foliiformibus praedita; flores \pm magni, pedunculis 1,5–2,5 mm longis; cassis 14 mm lata, linea basali 15 mm longa, fere recta, hemisphaerio-fornicata. Stamina simpliciter alata vel uni-bidentata, filamentis ad basin \pm ciliatis; nectarium intus plus, ad stipitem, labrum et dorso minus ciliatum. — Una cum praecedente.

f. microcassis G. Grinț. f. nova.

Caulis usque ad 70 cm altus, sparse foliosus. Inflorescentia 10–20 cm longa, raro longior, simplex ramosa; pedicellis 3,5–5 cm longis, raro longioribus, cassis 14 mm alta, 9 mm lata, fornicata, cymbiformis, linea basali 14 mm longa, \pm recta, nectario capite intus ciliato; stamina alata, simplicia, raro uni-bidentata, filamentis sub medio \pm ciliatis.

Reg. Suceava: inter saxa ad montem Muncel supra pagum Pojorâta.

f. ramosum G. Grinț. f. nova.

Caulis usque ad 1 m altus, \pm ramosus, folia constanter per caulem dispersa; segmento medio \pm petiolulato et usque ad 10 cm longo. Inflorescentia 20–40 cm longa, una cum pedicellis glabra. Flores unilaterales, nutante vel recti, 3,5 cm longi, casside 2,5 cm alta et 1 cm lata, linea basali arcuata, 2 cm longa, fornicata. Stamina late alata, simplicia vel uni-bidentata, dense ciliata vel sparse 3–5–7 ciliis praedita. Nectarium capite erecto, intus piloso, pedicello, labro et dorso \pm parum piloso. Folliculi recti, non vel \pm divergentes, 7 mm lati, 18 mm alti. Semina triangularia, duobus lateribus in angulum alatum junctis, hylo latere nitido sito, dorso seminis leviter undulato-angulato.

Reg. Bacău. Piatra Corbului et ad plantationem coniferarum prope rivulum Bicaz.

f. elegans G. Grinț. f. nova.

Caulis gracilis, usque ad 1 m altus, tenuis. Folia remote dentata, segmento medio saepe petiolato, cuneiformi vel romboideo. Inflorescentia ultra 25 cm longa, glabra. Pedicelli usque ad 4 cm longi, erecti vel nutantes, unilaterales, 2,5 cm longi, casside 2 cm longa, 1,5 cm lata, perianthii foliola lateralia tegente, linea basali arcuata. Stamina alata, simplicia vel uni-bidentata, filamentis dense pilosis vel raro ciliatis. Nectarium capite erecto intus plus, dorso, stipite et labro minus ciliato. — Una cum praecedente.

A. callibotryon Rehb. ssp. **rigidum** (Rehb.) G. Grinț. f. **glabrum** G. Grinț. f. nova.

Folliculis glabris. Forma valde variabilis: stamina simpliciter vel crispule pilosa aut ciliata aut glabra antheris glabris aut raro ciliatis. Nectarium

capitatum, glabrum vel intus ciliatum. Pedunculi setis horizontalibus vel pilis glutinosis et glandulosis intermixtis. Inflorescentia ramosa vel simplex, semper pilosa. Floribus laxis vel compactis, proportionaliter parvis, ad 30 mm longis. Caulis in parte inferiore glaber; petioli limbo aequilongi vel paulo longiores, limbo 5-diviso, segmentis angustis ac petiolatis et ad basin coalitis.

Reg. Suceava: in monte Suhard, in valle rivi Haju, in valle Izvorul Alb, omnia sub monte Ouşor. In valle Poiana Negri.

f. pubescens G. Grinţ. f. nova.

Folliculi pilosi. Forma valde variabilis: stamina pilosa, sparse ciliata, glabra vel pilosa, aliis ciliatis intermixta. Nectarium capitatum, ciliatum. Pedunculi pilosi, pilis setiformibus, inaequalibus, aut parvis arcuatis, aliis glandulosis et glutinosis intermixtis. Inflorescentia ramosa vel simplex, pilosa, floribus laxis, vel compactis; axis et rami flexuosi vel recti.

Reg. Suceava: Poiana Negri. In monte Pripor ad Dorna Căndreni, in monte Suhard.

A. callibotryon Rehb. ssp. *bucovinense* (Zap.) G. Grinţ. f. *pilosum* G. Grinţ. f. nova.

Segmentum medium foliorum magnum, 8,5 cm longum, 4 cm latum, petiolatum, laciniis acuto-lanceolatis. Flores \pm magni (25—28 mm), casside 20 mm alta, 11—14 mm lata, linea basali 10—15 mm longa, valde arcuata. Stamina ad basin filamentorum vel per totum dense pilosa, pilis simplicibus, aliis uni-bi-entatis intermixtis. Inflorescentia pilosa, pilis simplicibus, aliis glandulosis intermixtis. Ovarium sparse pilosum (5—6 pili).

Reg. Suceava: in valle Haju sub monte Ouşor, in monte Suhard.

f. glaberrimum G. Grinţ. f. nova.

Folia magna, segmento medio 13,5 cm longo, 8 cm lato, *rhombeo*, laciniis sicut dentibus, rectis, lateralibus \pm divergentibus, basi late apertis. Inflorescentia longa, pedicellis basalibus quam flores multo longioribus, pilosis, pilis simplicibus, aliis glandulosis intermixtis, vel trichomis tantum tectis. Cassis 15 cm alta, 13 mm lata, linea basalis 15 mm longa. Stamina glabra, aliis per totum pilosis intermixtis. Labrum glabrum, emarginatum, raro ciliatum. Folliculae ciliatae, nervis atris marmoratae, 15 mm altae, 4 mm latae, pilis terminalibus crispis.

Reg. Suceava: in pratis humidis, locis petrosis montis Suhard, montis Maeruş, ad ripas rivi Bistriţa ad vicum Argestru; in monte Lucina.

f. laxum G. Grinț. f. nova.

Flores 23 mm alti, casside 18—20 mm alta, 12 mm lata, linea basali 12 mm longa. Stamina simplicia, antheris ciliatis, filamentis dense pilosis, nectarium intus pilosum, labro emarginato, dorso ciliato.

Reg. Suceava: ad rivulum Alb sub monte Oușor; sub monte Măeruș.

f. densum G. Grinț. f. nova.

Inflorescentia 30 cm longa, ad basin ramosa, ramis 7—10 cm longis, 3—7-floris, pedicellis casside longioribus pilosis, pilis simplicibus aliis glandulosis intermixtis. Flores 3,5 cm alti, casside 2 cm alta, lateribus convexis, apice lata et arcuata, perianthii foliolis lateralibus et inferioribus extus refractis, linea basali 16 mm longa, longe arcuata.

Reg. Suceava: in declivibus montis Suhard.

f. pyramidatum G. Grinț. f. nova.

Caulis validus, ramosus, ramis longis, rectis vel flexuosis; pedicelli folliculis maturis multo longiores. Stamina glabra, aliis ciliatis intermixtis, simplicia vel uni-bidentata. Nectarium capitatum, capite et labro glabro. Semina triangularia, hylo parte nitida et lata, margine crenata circumdato, facie valde angulata et undulata.

Reg. Suceava: ad ripas rivi Bistrița prope Argestru.

f. altum G. Grinț. f. nova.

Antherae glabra, aliis sparse ciliatis intermixtis. Nectarium ad caput, stipitem et labrum pilosum.

Reg. Suceava: in petrosis ad rivulum Haju sub monte Oușor prope Dorna Căndreni.

× **A. abnorme** G. Grinț. sp. hybr. nova = *callibotryon* ssp. *bucovinense* × *romanicum*.

Glabritie caulis, nodositate, foliis sub racemo ± longe aggregatis, foliis quinque partitis, floribus paucis hemisphaericis, pedicellis brevibus vel aequalibus, perianthio glabrio, 15—18 mm in diam. *A. románico* propius. Altitudine (45—60 cm), ramis ± compluribus, segmentis foliorum difforibus, laciniis ac dentibus ± brevibus, arcuatis vel drepaniformibus, nigris, foliaceis. Casside ± aperta. Staminibus glabris cum ciliatis intermixtis, simplicibus vel 1—2-dentatis. Nectario apice intus ac dorso ciliato. Seminibus triangularibus in angulo alatis, latis, dorso undulato-angulatis propius *A. bucovinensi*.

Reg. Suceava: in lapicidinis versus montes Muncel et Adam.

A. maximum Rehb. var. **asiaticum** G. Grinț. var. nova.

Caulis validus, glaber, 1/2—3 m altus. Folia magna, constanter per caulem dispersa, 3- raro 5-segmentata, segmentis basin \pm confluentibus, segmento medio 17 cm longo et 9 cm lato, iteratim 2—3- sectato, lobis uno vel duobus dentibus brevibus ac latis praeditis, dorso parce pubescentibus, pilis arcuato-reversis. Inflorescentia 1,2 m longa, pubescens, ramosa, ramis 3—4 remotis, in parte inferiore nudis, in parte superiore bracteatis, 7—8-floris, aliis bifloris tantum intermixtis; axe ramis multo longiore, floribus remotis; pedicellis 5—10 (17) cm longis, inferioribus rectis, superioribus arcuatis, unifloris; bracteolis magnis supra medium pedicellorum sitis, integris vel sectatis. Flores 4,5 cm longi, pubescentes, casside dorso 2,5 cm alta, ad medium transversum 1,5 cm lata, linea basali recta, 2,5 cm longa, fronte oblique recta vel arcuata, casside pileiformi, dorso arcuata refracta; staminibus glabris, bidentatis; nectario recto, \pm sigmoideo, capite dorsaliter inclinato, antice gibbero, glabro. Folliculi tres, nigri, serialiter albo pubescentes.

Ab *A. maximo* Rehb. cui valde similis differt inflorescentia magna (1,2 m) axe longo (55 cm), floribus magnis (4,5 cm), casside alta (2,5 cm) linea basali \pm recta, nec non folliculis serialiter albo pubescentibus.

Planta culta in horto ad Dărmănești (Reg. Bacău).

ATRAGENE L.

Atragene alpina L. f. **aemulans** A. Nyár. f. nova

Nectaria pro maxima parte lata, apice rotundata, \pm caerulea, perianthii foliola majora aemulantia.

Reg. Ploești: Peștera Ialomiței in montibus Bucegi.

RANUNCULUS L.

R. auricomus L. f. **fissus** Nyár. ex. A. Nyár. f. nova.

Segmentis foliorum caulinorum \pm profundo fidatis.

Circa oppidum Cluj.

R. cassubicus L. f. **stipitatus** Nyár. ex. A. Nyár f. nova.

Segmentis foliorum caulinorum obovatis, in petiolos \pm longos abrupte attenuatis.

Circa oppidum Cluj.

f. **fissus** Nyár. ex A. Nyár. f. nova.

Dentibus segmentorum foliorum caulis \pm longis, fidatisve.

Cluj.

f. **acuminatus** Nyár. ex A. Nyár. f. nova. Segmentis foliorum caulis longe acuminatis.

Cluj.

R. repens L. f. **aerostolonus** A. Nyár. f. nova.

Stolonibus ex axillis foliorum inferiorum orientibus. Stolones basales desunt.

Reg. Bacău: Pâr. Bârnova. Mt. Căzătura Ungurului, Schitul Durău;
Reg. Iași: Bârnova, Cucuteni.

R. carpaticus Herbich f. **flabellatus** A. Nyár. f. nova.

Folia inferiora rotunda, aspectu indivisa, ad 1/3 partem flabelliforme fissa, lobis dentatis.

Reg. Aut. M.: in monte Scaunul (1200 m) supra pagum. Deda.

f. **anomalus** A. Nyár. f. nova.

Sepalis petala aequantibus aut longioribus, tridentatis trifidatisve. Planta humilis.

Reg. Aut. M.: V. Gurghiului ad coloniam Lăpușna.

THALICTRUM L.

Th. aquilegifolium L. var. **acutidentatum** A. Nyár. var. nova.

Similis var. typice sed foliolis foliorum caulium multidentatis seu parvilobatis, dentibus lobisve \pm elongatis acutis, solum nonnullis subobtusiusculis.

Reg. Aut. M.: ad oppid. Tg. Mureș versus cimeteria «Máriaffy».

Th. minus L. var. **elatum** (Jacq.) Schinz. et Kell. f. **subintegrum** A. Nyár. f. nova.

Foliis plurimis integerrimis, vel solum 1—2 dentibus obtusiusculis praeditis.

Reg. Stalin: prope pagum Săscior.

Th. simplex L. ssp. **eusimplex** A. Nyár ssp. nova. s.l.

Foliculis \pm oblanceolatis, apice trilobatis, foliis inferioribus latioribus.

var. **normale** Nyár. ex. A. Nyár.

Basis loborum foliorum 6—12 mm latum, foliis viridibus 15—25 mm longis.

Reg. Cluj; ad pag. Zăul de Câmpie, Cluj in silva Hoia ad «Fânațele Clujului».

Th. lucidum L. var. **laserpitiifolium** (Willd.) Hay. f. **glabrum** Nyár. ex. A. Nyár.

Foliis subtus glabris.

Reg. Cluj: Apahida.

ADONIS L.

A. aestivalis L. f. **typica** A. Nyár f. nova.

Floribus magnis cca 15—35 mm diam. latis, petalis sepala multo superantibus, ad basin petalorum cum vel sine maculis nigris.

Frequens.

f. **reducta** A. Nyár f. nova.

Caulis 15—30 cm altus, vulgo eramosus, gracilis debilisve, 1—2 (3)-florus.

Reg. Cluj: inter segetes ad fissuram Cheia Turzii. Reg. Craiova: Coțofenii din Față. Reg. Constanța: Medgidia. Reg. Iași: Bârnova, Mânzătești, Voinești.

INDEX ALFABETIC

al claselor, ordinelor, familiilor, genurilor și speciilor cu sinonimiile lor

	Pag.		Pag.
<i>Aconitum</i> L.	460	<i>Aconitum neomontanum</i> Baumg. . .	489
» × <i>aberratum</i> G. Grinț. . .	508	» » Willd.	491
» × <i>abnorme</i> G. Grinț. . .	508	» <i>paniculatum</i> Lam.	486
» <i>Anthora</i> L.	462	» × <i>patentipilum</i> (Gáy.) G. Grinț.	509
» <i>australe</i> Rchb.	496	» <i>phallacinum</i> Blocki	495
» × <i>Baumgartenianum</i> Simk. .	508	» <i>platanifolium</i> Deg. et Gáy. .	506
» <i>Bernhardianum</i> Rchb. . . .	482	» <i>puberulum</i> (Ser.) G. Grinț. .	504
» <i>callibotryon</i> Rchb.	476	» <i>romanicum</i> Wol.	468
» <i>Cammarum</i> L.	491	» <i>rostratum</i> Bernh.	483
» » Jacq.	485	» <i>Schurii</i> Beck	490
» <i>cernuum</i> Host	486	» × <i>setiferum</i> G. Grinț. . .	509
» <i>Clusianum</i> Rchb.	480	» × <i>setosum</i> G. Grinț. . .	510
» <i>commutatum</i> Rchb.	482	» <i>septentrionale</i> Baumg. . .	495
» <i>dasytrichum</i> (Deg. et Gáy.)		» × <i>Simonkaianum</i> (Gáy.)	
» G. Grinț.	506	» G. Grinț.	509
» <i>Degeni</i> Gáy.	489	» <i>Skerisorae</i> Gáy.	480
» <i>diabolicum</i> Gáy.	490	» <i>Stoerkianum</i> Rchb.	491
» <i>dolomiticum</i> Hay.	475	» × <i>sturiense</i> G. Grinț. . .	510
» » A. Kern.	472	» <i>taurericum</i> Rchb.	472
» × <i>erronatum</i> G. Grinț. . .	510	» <i>tauricum</i> Auct. transs. . .	475
» <i>excelsum</i> Rchb. ssp. <i>pseudoescelsum</i> G. Grinț. .	499	» <i>tauricum</i> Rchb.	472
» <i>firmum</i> Auct.	476, 482	» <i>tauricum</i> Wulf.	471
» <i>fissurae</i> Nyár	479	» <i>toxicum</i> Rchb.	489
» <i>galectonum</i> Rchb.	504	» <i>thyraicum</i> Blocki	497
» <i>gracile</i> Rchb.	484	» <i>transsilvanicum</i> Lerch. . .	495
» <i>Hosteanum</i> Schur	499	» <i>trichocarpum</i> Rchb. . . .	475
» <i>hunyardense</i> Deg.	479	» × <i>triste</i> (Fisch.) Gáy. . .	510
» <i>intermedium</i> DC.	491	» <i>umbraticola</i> Schur	504
» <i>Jacquianum</i> Host	495	» <i>variegatum</i> L.	483
» <i>Koelleianum</i> Rchb.	472	» <i>variegatum</i> Wulf.	486
» <i>laetum</i> Rchb.	482	» <i>velutinum</i> (Rchb.) G. Grinț. .	503
» <i>lasianthum</i> (Rchb.) Simk. .	505	» <i>vulparia</i> Rchb.	503
» <i>lasiostomum</i> Rchb.	500	» × <i>Zenoniae</i> Wol.	508
» <i>Luparia</i> Rchb.	504	<i>Actaea</i> L.	437
» <i>Matthioli</i> Rchb.	486	» <i>cimicifuga</i> Auct. rom. . . .	441
» <i>maximum</i> Pall.	492	» <i>racemosa</i> Auct. rom. . . .	441
» <i>microstachyum</i> Rchb. . . .	475	» <i>spicata</i> L.	437
» <i>moldavicum</i> Hacq.	495	<i>Adonis</i> L.	653
» <i>multifidum</i> Gáy.	479	» <i>aestivalis</i> L.	659
» » Rchb.	479	» <i>autumnalis</i> L.	660
» <i>Napellus</i> L.	491	» <i>caudata</i> Jka.	658
» » Auct.	482	» <i>citrina</i> Hoffm.	660
» <i>nasutum</i> Fisch.	491	» <i>flammea</i> Jacq.	658

× <i>Adonis hybrida</i> Wolff.	660	<i>Aquilegia</i> <i>Haenkeana</i> Auct.	447
» <i>miniata</i> Jacq.	660	» <i>Kitabelii</i> Auct.	445
» <i>parviflora</i> Fisch.	659	» <i>nigricans</i> Baumg.	447
» <i>perramosa</i> Schur	660	» <i>nivea</i> Baumg.	446
» <i>phoenicea</i> Borb.	659	» <i>paraplesia</i> Schur	445
» <i>soproniensis</i> Mygind.	657	» <i>sibirica</i> Schur.	445
» <i>squarrosa</i> Jka.	659	» <i>subscaposa</i> Borb.	447
» <i>vernalis</i> L.	654	» <i>transsilvanica</i> Schur	445
» <i>volgensis</i> Stev.	657	» <i>vulgaris</i> L.	446
» <i>Walziana</i> Grec.	657	» <i>vulgaris</i> Auct.	446
<i>Agrostemma</i> L.	123	<i>Arenaria</i> L.	90
» <i>Coronaria</i> L.	129	» <i>austriaca</i> Jacq.	84
» <i>Githago</i> L.	124	» <i>Biebersteinii</i> Schlecht.	94
» <i>nivalis</i> G. Don.	141	» <i>biflora</i> L.	95
<i>Alsine</i> <i>Anatolica</i> Boiss.	80	» <i>biflora</i> Gris.	96
» <i>Arduini</i> Fenzl.	83	» <i>caespitosa</i> Ehrh.	86
» <i>fasciculata</i> Wahlenb.	79	» <i>ciliata</i> L.	95
» <i>glomerata</i> Fenzl.	89	» Auct.	95
» <i>graminifolia</i> J. F. Gmel.	83	» <i>fasciculata</i> L.	79
» <i>Jacquini</i> Koch.	79	» <i>fastigiata</i> Sm.	79
» <i>Kitabelii</i> Nym.	83	» <i>frutescens</i> Kit.	87
» <i>media</i> L.	32	» <i>Gerardii</i> Willd.	86
» <i>Messogitana</i> Boiss.	88	» <i>glomerata</i> M.B.	66
» <i>oxypetala</i> Wol.	86	» <i>glutinosa</i> M. B.	66
» <i>pallida</i> Dumort.	33	» <i>graminifolia</i> Ard.	83
» <i>setacea</i> Mert. et Koch	79	» <i>graminifolia</i> Schrad.	94
» <i>subnivalis</i> Hegetschw.	86	» <i>halophila</i> Bge.	109
» <i>verna</i> (L.) Wahlenb.	84	» <i>laricifolia</i> L.	80
» <i>viscosa</i> Schreb.	88	» <i>leptoclados</i> Guss.	94
» <i>Zareneczny</i> Zap.	86	» <i>marginata</i> DC.	109
<i>Anemone</i> L.	511	» <i>multicaulis</i> Auct.	95
» <i>aestivalis</i> Brandza	659	» <i>patula</i> Martzin-Donos	93
» <i>alpina</i> L.	524	» <i>pendula</i> W. et K.	100
» <i>autumnalis</i> Brandza	660	» <i>ramosissima</i> Willd.	85
» <i>baldensis</i> L.	514	» <i>recurva</i> All.	87
» <i>coronaria</i> L.	519	» <i>rigida</i> M.B.	96
» <i>dubia</i> Bellardi	518	» <i>rubra</i> L.	107, 108
» <i>fasciculata</i> L.	518	» <i>rotundifolia</i> M.B.	96
» <i>Hepatica</i> L.	520	» <i>serpyllifolia</i> L.	93
» <i>Jankae</i> F. Schultz.	529	» <i>setacea</i> Thuill.	79
» <i>japonica</i> Sieb. et Zucc.	519	» <i>tenella</i> Kit.	95
» <i>montana</i> Hoppe	528	» <i>tenuifolia</i> L.	88
» <i>narcissiflora</i> L.	518	» <i>transsilvanica</i> Simk.	96
» <i>nemorosa</i> L.	513	» <i>trinervia</i> L.	99
» <i>nigricans</i> Strass.	527	» <i>verna</i> L.	84
» <i>ochotensis</i> Schur	514	» <i>viscida</i> Lois.	93
» <i>patens</i> L.	530	<i>Atragene</i> L.	532
» <i>pratensis</i> L.	528	» <i>alpina</i> L.	532
» <i>pratensis</i> Auct.	527	<i>Banffya petraea</i> Baumg.	208
» <i>Pulsatilla</i> Auct.	531	<i>Batrachium</i> (DC.) S. F. Gray.	548
» <i>ranunculoides</i> L.	512	» <i>aquatile</i> (L.) Dumort.	553
» <i>rhaetica</i> Brugg.	521	» <i>carinatum</i> Schur	555
» <i>silvestris</i> L.	514	» <i>circinatum</i> Fuss	556
» <i>transsilvanica</i> Heuff.	522	» <i>divaricatum</i> (Schrk.)	553
» <i>triloba</i> Stokes	520	» Schur	553
<i>Aquilegia</i> L.	442	» <i>divaricatum</i> Wimm.	553
» <i>alpina</i> Baumg	445	» <i>fluitans</i> (Lam.) Wimm.	556
» Auct.	447	» <i>foeniculaceum</i> (Gilib.) V.	553
» <i>Baumgartenii</i> Schur	445	Krecz.	553
» <i>Fussi</i> Zimmet.	445	» <i>Giliberti</i> V. Krecz.	549
» <i>glandulosa</i> Jka.	445, 447		

<i>Batrachium paucistamineus</i> F. Schultz	554	<i>Caltha cornuta</i> S., Ny. et Ky.	417
» <i>Petiveri</i> Bossche	550	» <i>grosseserata</i> Pant.	417
» <i>radicans</i> Revel	549	» <i>intermedia</i> S., Ny. et Ky.	420
» <i>rigidum</i> Dumort.	554	» <i>laeta</i> S., Ny. et Ky.	417
» <i>Rionii</i> (Lagg.) Nym.	556	» <i>latifolia</i> S., Ny. et Ky.	417
» <i>trichophyllum</i> (Chaix)		» <i>palustris</i> L.	420
» Bossche.	555	» <i>palustris</i> Auct.	417
» <i>tripartitum</i> (Nolte) Schur	550	» <i>pumila</i> Schur	419
» <i>triphyllum</i> (Wallr.)		» <i>ranunculoides</i> Schur	419
Dumort.	550	» <i>rostrata</i> Borb.	418
Behen Mnch.	131	» <i>rotundifolia</i> Schur	419
» <i>alpinus</i> (Lam.) Guşul.	140	Calycanthaceae Lindl.	384
» <i>brachiatus</i> Fourr.	136	Calycanthus L.	384
» <i>Csereii</i> (Baumg.) Guşul.	131	» <i>floridus</i> L.	384
» <i>glareosus</i> Fourr.	136	» <i>occidentalis</i> Hook. et Arn.	387
» <i>puberulus</i> Fourr.	136	Caryophyllaceae Juss.	23
» <i>vesicarius</i> Fourr.	135	Centrospermae (cont.)	23
» <i>vulgaris</i> Mnch.	132	<i>Centunculus rigidus</i> Scop.	63
<i>Behenantha Csereii</i> Schur	131	Cerastium L.	39
» <i>inflata</i> Schur	135	» <i>acutifolium</i> Schur	61
Buffonia L.	76	» <i>alpinum</i> L.	56
» <i>parviflora</i> Gris.	76	» <i>anomalum</i> W. et K.	41
» <i>tenuifolia</i> L.	76	» <i>aquaticum</i> L.	27
<i>Butneria florida</i> Kearney	384	» <i>arvense</i> L.	61
» <i>occidentalis</i> Greene	387	» <i>banaticum</i> (Roch.) Heuff.	56
Buxaceae Dumort.	373	» <i>Beckianum</i> Hand.-Mazz.	63
Buxus L.	374	» <i>Biebersteinii</i> DC.	65
» <i>myrtifolia</i> Lam.	376	» <i>Boissieri</i> Gren.	64
» <i>sempervirens</i> L.	375	» <i>brachypetalum</i> Desp.	45
Callianthemum C. A. Mey	548	» <i>bulgaricum</i> Uechtr.	55
» <i>anemonoides</i> Auct.	548	» <i>caespitosum</i> Gilib.	50
» <i>coriandriifolium</i> Rehb.	548	» <i>candidissimum</i> Corr.	64
» <i>rutaefolium</i> Auct.	548	» <i>Cerastoides</i> (L.) Britt.	41
Callitrichaceae Lindl.	376	» <i>ciarcanense</i> Zap.	64
Callitriche L.	376	» <i>ciliatum</i> W. et K.	63
» <i>aestivalis</i> Schur	381	» <i>coronense</i> Schur	62
» <i>androgyna</i> L.	382	» <i>fontanum</i> Baumg.	54
» <i>angustifolia</i> Gilib.	377	» <i>glandulosum</i> (Kit.) Jav.	63
» <i>angustifolia</i> Hoppe	383	» <i>glomeratum</i> Thuill.	42
» » Kütz.	378	» <i>glutinosum</i> Fries.	49
» <i>autumnalis</i> L.	377	» <i>gramineum</i> Cr.	37
» <i>caespitosa</i> Schultz	383	» <i>grandiflorum</i> W. et K.	64
» <i>cophocarpa</i> Sendtn.	381	» <i>holosteoides</i> Fries.	53
» <i>dioica</i> Schur	381	» <i>lanatum</i> Lam.	57
» <i>fontana</i> Scop.	383	» <i>latifolium</i> L.	58
» <i>hamulata</i> Kütz.	378	» <i>latifolium</i> Lam.	56
» <i>hamulata</i> Ldb.	377	» <i>Lerchenfeldiamum</i> Schur.	63
» » Auct.	381	» <i>litigiosum</i> De Lens	58
» <i>hermaphrodita</i> L.	377	» <i>macrocarpum</i> Schur	53, 55
» <i>palustris</i> L.	382	» <i>matrense</i> Kit.	62
» <i>platycarpa</i> Kütz.	377	» <i>microcarpum</i> Kit.	55
» <i>polymorpha</i> Lonner	381	» <i>nemorum</i> Cr.	28
» <i>stagnalis</i> Scop.	377	» <i>obscureum</i> Chaub.	49
» <i>stellata</i> Hoppe	383	» <i>pallens</i> F. W. Schultz	50
» <i>transsilvanica</i> Schur	381	» <i>petrosum</i> Schur	61
» <i>vena</i> L.	382	» <i>pietrosuanum</i> Zap.	58
» <i>virens</i> Goldb.	377	» <i>pumilum</i> Curt.	49
Caltha L.	414	» <i>rigidum</i> Witm.	63
» <i>alpestris</i> S., Ny. et Ky.	419	» <i>semidecandrum</i> L.	46
» » Auct.	418	» <i>silvaticum</i> W. et K.	55
		» <i>Soleirolii</i> Ser.	58

<i>Cerastium Soleirolii</i> Auct.	58	<i>Delphinium</i> L.	448
» <i>Tatrae</i> Borb.	63	» <i>Ajaci</i> L.	453
» <i>tauricum</i> Spreng.	46	» <i>alpinum</i> W. et K.	458
» <i>tetragonum</i> Baumg.	31	» <i>Consolida</i> L.	451
» <i>tomentosum</i> L.	65	» <i>divaricatum</i> Ldb.	452
» <i>transsilvanicum</i> Schur	61	» <i>elatum</i> L.	458
» × <i>triculinum</i> Nyár. et Prod.	64	» <i>fissum</i> W. et K.	457
» <i>trigynum</i> Vill.	41	» <i>intermedium</i> Soland.	458
» <i>triviale</i> Link.	50	» <i>leiocarpum</i> Huth.	457
» <i>villosum</i> Baumg.	57	» <i>nacladense</i> Zap.	459
» <i>viscosissimum</i> Schur	57	» <i>orientale</i> J. Gay.	454
» <i>viscosum</i> Poll.	45	» <i>pyramidatum</i> Auct.	459
» » L.	42,50	» <i>Simonkaianum</i> Pawl.	459
» <i>vulgatum</i> L.	50	» <i>velutinum</i> Bertol.	457
<i>Ceratocephalus</i> Mnh.	544	<i>Dianthus</i> L.	217
» <i>falcatus</i> Baumg.	547	» <i>Armeria</i> L.	223
» <i>falcatus</i> (L.) Pers.	547	» <i>armeriastrum</i> Wolfn.	224
» <i>orthoceras</i> DC.	547	» × <i>banaticiformis</i> Prod.	287
» <i>testiculatus</i> (Cr.) Pernh.	547	» <i>banaticus</i> (Heuff.) Borb.	245
<i>Ceratosanthus</i> <i>Ajaci</i> Schur	453	» <i>barbatus</i> L.	227
» <i>Consolida</i> Schur	451	» <i>barbatus</i> Baumg.	228
» <i>paniculatus</i> Schur	452	» <i>biernatus</i> Schur	248
» <i>divaricatus</i> Schur	452	» × <i>Borzeanus</i> Prod.	287
<i>Cherleria Sedoides</i> L.	78	» <i>Brandzae</i> Panč.	250
<i>Cimicifuga</i> L.	441	» × <i>Burciae</i> Pét. et Gürtl.	289
» <i>europaea</i> N. Schpz.	441	» × <i>Caliacrae</i> Prod.	288
» <i>foetida</i> Auct.	441	» <i>callizonus</i> Schott et Ky.	283
<i>Clematis</i> L.	535	» <i>campestris</i> M. B.	277
» <i>alpina</i> Mill.	532	» <i>capitatus</i> Balb.	258
» <i>Flammula</i> L.	540	» × <i>carpaticus</i> Borb.	289
» <i>integrifolia</i> L.	536	» <i>carthusianorum</i> L.	250
» × <i>Jackmanii</i> Jacqm.	543	» <i>Caryophyllus</i> L.	289
» <i>recta</i> L.	539	» <i>chinensis</i> L.	290
» <i>taurica</i> Bess.	538	» <i>collinus</i> W. et K.	271
» <i>Vitalba</i> L.	538	» × <i>Comanae</i> Prod.	284
» <i>Viticella</i> L.	540	» <i>compactus</i> Kit.	228
<i>Consolida</i> <i>Ajaci</i> Schur	453	» <i>coronarius</i> Lam.	289
» <i>arvensis</i> Opiz	452	» <i>deltoides</i> L.	271
» <i>orientalis</i> Schröd.	454	» <i>deserti</i> Prod.	232
» <i>paniculata</i> Schur	452	» <i>diutinus</i> Kit.	238
» <i>regalis</i> S.F. Gray.	451	» <i>dobrogensis</i> Prod.	257
» <i>segetum</i> Schur	451	» × <i>Domugledi</i> Prod.	288
<i>Coronaria coriacea</i> (Mnh.) Schischk.	129	» <i>Emilii-Popii</i> Prod.	289
» <i>Flos-cuculi</i> A. Br.	129	» <i>erythrocalyx</i> Schott	267
<i>Cucubalus</i> L.	198	» <i>eu-ponticus</i> Schischk.	256
» <i>acaulis</i> L.	159	» <i>gelidus</i> S., Ny. et Ky.	280
» <i>alpinus</i> Lam.	140	» <i>giganteformis</i> Borb.	242
» <i>Antelopum</i> (Vest) Grec.	136	» <i>giganteus</i> D'Urv.	246
» <i>baccifer</i> L.	198	» <i>glabriusculus</i> (Kit.) Borb.	233
» <i>Behen</i> L.	132	» <i>glacialis</i> Haenke	280
» <i>chloranthus</i> Willd.	167	» <i>glaucophyllus</i> Hornem.	246
» <i>italicus</i> L.	172	» × <i>Grintzescui</i> Prod.	284
» <i>multiflorus</i> Ehrh.	168	» <i>guttatus</i> M. B.	273
» <i>Oites</i> L.	180	» <i>Henteri</i> Heuff.	249
» <i>parviflorus</i> Ehrh.	183	» <i>heptaneurus</i> Gris. et Schenk.	232
» <i>pilosus</i> Willd.	173	» <i>integripetalus</i> Schur	267
» <i>quadrifidus</i> L.	184	» » Simk.	267
» <i>silvestris</i> Lam.	165	» » G. et J. Wolff	267
» <i>viscosus</i> L.	194	» × <i>Javorkae</i> Kárp.	284
		» × <i>Julii-Wolffii</i> Pét.	288
		» <i>Kitaibellii</i> Jka.	268

- Dianthus* *kladovanus* Deg. 261
 » *leptopetalus* Willd. 279
 » *Marisensis* Simk. 237
 » *membranaceus* Borb. 257
 » » Blocki 256
 » × *muresensis* Prod. 283
 » *nardiformis* Jka. 278
 » *pallens* Sibth. et Sm. 279
 » *petraeus* W. et K. 268
 » *Piatra-Neamtzui* Prod. 234
 » *pinifolius* Sibth. et Sm. 248
 » *polonicus* Zap. 254
 » • *polymorphus* M. B. 238
 » » Panč. 261
 » *Pontederæ* Kern. 241
 » *pratensis* M. B. 273
 » *pratensis* Auct. 272
 » *prolifer* L. 212
 » *pseudarmeria* M. B. 224
 » *pseudobarbatus* Bess. 256
 » *Pseudo-Grisebachii* Grec. 274
 » *puberulus* (Simk.) Kern. 237
 » *Racovitzae* Prod. 272
 » *Rehmannii* Blocki 256
 » *sabuletorum* Heuff. 242
 » *Saxifragus* L. 212
 » *Șerbanii* Prod. 277
 » *serbicus* Wettst. 248
 » *serotinus* W. et K. 263
 » *Simonkaianus* Pét. 267
 » *Smithii* Wettst. 248
 » *sylvaticus* Hoppe. 271
 » *spiculifolius* Schur 264
 » *subbarbatus* Schur 231
 » *subkladovanus* Prod. 261
 » *subneglectus* Schur 255
 » × *subtrifasciculatus* Prod. 284
 » *superbus* L. 262
 » × *szebenensis* Kárp. 284
 » *tenuifolius* Schur 255
 » *transsilvanicus* Schur 232
 » *trifasciculatus* Kit. 231
 » × *Tzopae* Prod. 287
 » *urziceniensis* Prod. 242
 » *Vandasii* Velen. 262
 » × *vârciorovens* Prod. 287
 » *Wolffii* Jka. 288
- Eranthis* *Salisb.* 430
 » *hiemalis* (L.) *Salisb.* 430
- Euphorbia* *L.* 296
 » *acuminata* L. 330
 » *agraria* M. B. 351
 » *ambigua* W. et K. 321
 » *amygdaloides* L. 355
 » *angulata* Jacq. 317
 » × *angustata* (Roch.) Borza 363
 » × *angustifrons* Borb. 359
 » *basarabica* Prod. 355
 » *bazargica* Prod. 349
 » *Cadrilateri* Prod. 350
- Euphorbia* *carniolica* Jacq. 321
 » *carpatica* Wol. 313
 » *Chamaesyce* L. 305
 » × *Csató* (Simk.) Borza 367
 » *curtifolia* Chaub. 355
 » *Cyparissias* L. 341
 » *dobrogensis* Prod. 349
 » *dulcis* L. 318
 » *epithymoides* Jacq. 314
 » *erythrosperma* Borb. 330
 » *Esula* L. 338
 » *cupoea* Hal. 352
 » *exigua* L. 326
 » *expansa* Jka. 322
 » *falcata* L. 330
 » *Gerardiana* Jacq. 342
 » *glareosa* Auct. 345, 346
 » *gracilis* Bess. 341
 » *graeca* Boiss. et Sprun. 329
 » × *Guşuleacii* Prod. 364
 » *helioscopia* L. 325
 » *humifusa* Willd. 305
 » *hypericifolia* Jan. 302
 » *intercedens* Podp. 363
 » × *jucula* Prod. 364
 » *Lathyris* L. 309
 » *leptocaula* Boiss. 337
 » *lingulata* Heuff. 318
 » *literata* Jacq. 325
 » *lucida* W. et K. 333
 » × *măciniensis* Prod. 367
 » *maculata* L. 306
 » *maculata* L. 302
 » *marginata* Pursh. 359
 » *Myrsinites* L. 356
 » *nicaeensis* Barth. 345
 » *nutans* Lag. 302
 » *obscura* Lois. 330
 » *palustris* L. 313
 » *pannonica* Host 345
 » *pannonica* Auct. 346
 » × *paradoxa* (Schur) Podp. 360
 » *Paralias* L. 355
 » × *Peisonis* K. Rech. 364
 » *Peplis* L. 305
 » *Peplus* L. 329
 » *pilosa* Neilr. 309
 » *platyphyllos* L. 322
 » *polychroma* Kerner 314
 » *Preslii* Guss. 302
 » *procera* M. B. 309
 » × *Procopianii* Săvul. et Rayss 359
 » × *pseudoesula* Schur 360
 » × *pseudolucida* Schur 360
 » × *pseudovillosa* Prod. 367
 » × *pseudovirgata* (Schur) Soó 363
 » *retusa* L. 329
 » *salicifolia* Host. 334
 » × *Schurii* Simk. 364

<i>Euphorbia</i> <i>segetalis</i> L.	356	<i>Helleborus</i> <i>niger</i> Baumg.	423
» <i>segetalis</i> Kit.	329	» <i>odorus</i> W. et K.	426
» <i>Seguieriana</i> Neck.	342	» <i>purpurascens</i> W. et K.	423
» <i>stepposa</i> Zoz.	346	» <i>viridis</i> Baumg.	424
» <i>stricta</i> L.	325	<i>Hepatica</i> Mill.	519
» <i>subhastata</i> Vis. et Panč.	364	» <i>alba</i> Mill.	521
» <i>tenuifolia</i> M. B.	337	» <i>angulosa</i> Schott et Ky.	522
» <i>transsilvanica</i> Schur	351	» <i>Hepatica</i> Karst.	520
» <i>tricuspidata</i> Lapeyr.	329	» × <i>media</i> Simk.	523
» <i>tristis</i> Bess.	341	» <i>multiloba</i> Schur	522
» <i>valdevillosocarpa</i> Arv. et Nyár.	313	» <i>nobilis</i> Mill.	520
» <i>variegata</i> Sm.	359	» <i>plena</i> Mill.	521
» <i>verrucosa</i> L.	321	» <i>transsilvanica</i> Fuss	522
» <i>villosa</i> W. et K.	309	» <i>triloba</i> Gilib.	520
» <i>virgata</i> W. et K.	334	<i>Herniaria</i> L.	113
» × <i>Wagneri</i> Soó	363	» <i>Besseri</i> Fisch.	114
» <i>Wimmeriana</i> Wagn.	363	» <i>glabra</i> L.	115
<i>Euphorbiaceae</i>	295	» <i>hirsuta</i> L.	116
<i>Ficaria</i> <i>Adans</i>	559	» <i>incana</i> Lam.	114
» <i>calthaeifolia</i> Rchb.	560	<i>Holosteum</i> L.	65
» <i>intermedia</i> Schur	560	» <i>Heuffeli</i> Wierzb.	66
» <i>nudicaulis</i> Kern.	560	» <i>umbellatum</i> L.	65
» <i>ranunculoides</i> Mnh.	559	<i>Homalocarpus</i> <i>narcissiflorus</i> Schur	518
» <i>transsilvanica</i> Schur	560	<i>Illecebrum</i> <i>cephalotes</i> M. B.	110
» <i>verna</i> Huds.	559	<i>Isopyrum</i> L.	436
<i>Githago</i> <i>nicaeensis</i> Link.	124	» <i>thalictroides</i> L.	436
<i>Gypsophila</i> L.	201	<i>Kohlrauschia</i> <i>prolifera</i> Kunth.	212
» <i>acutifolia</i> Fisch.	208	<i>Lauraceae</i> Lindl.	397
» <i>altissima</i> L.	208	<i>Laurus</i> L.	388
» <i>arenaria</i> W. et K.	204	» <i>nobilis</i> L.	388
» <i>fastigiata</i> L.	203	<i>Liriodendron</i> L.	395
» <i>glomerata</i> Pall.	207	» <i>Tulipifera</i> L.	395
» <i>Haynaldiana</i> Jka.	215	<i>Lychnis</i> L.	128
» <i>muralis</i> L.	202	» <i>alba</i> Mill.	190
» <i>paniculata</i> L.	204	» <i>chalconica</i> L.	130
» <i>petraea</i> (Baumg.) Rchb.	208	» <i>Coronaria</i> (L.) Desr.	129
» <i>repens</i> L.	203	» <i>dioica</i> L.	189
» <i>scorzonerifolia</i> Ser.	204	» <i>diurna</i> Sibth.	189
» <i>serotina</i> Hayne	202	» <i>Flos-cuculi</i> L.	129
» <i>transsilvanica</i> Spreng.	208	» <i>laciniata</i> Lam.	129
<i>Heccatonia</i> <i>aconitifolia</i> Schur	554	» <i>nemoralis</i> Heuff.	193
» <i>alpestris</i> Schur	567	» <i>nivalis</i> Kit.	141
» <i>crenata</i> Schur	568	» <i>quadridentata</i> Murr.	184
» <i>glacialis</i> Schur	567	» <i>Siegeriana</i> Schur	141
» <i>Traunfellneri</i> Schur	567	» <i>vespertina</i> Sibth.	190
<i>Heliosperma</i> (Rchb.) Pax	184	<i>Magnolia</i> L.	391
» <i>alpestre</i> (Jacq.) Rchb.	186	» <i>acuminata</i> L.	392
» <i>auriculata</i> G. Grinf.	186	» <i>glauca</i> L.	394
» <i>pubibundum</i> Griseb.	185	» <i>hypoleuca</i> Sieb. et Zucc.	393
» <i>quadrididum</i> (L.) Rchb.	184	» <i>Kobus</i> DC.	393
<i>Helleborus</i> L.	423	» <i>liliflora</i> Desr.	395
» <i>antiquorum</i> Lerch.	424	» <i>macrophylla</i> Michx.	395
» <i>atrorubens</i> Schur	424	» <i>obovata</i> Thunb.	393
» <i>Bocconi</i> Schur	425	» <i>stellata</i> Maxim.	394
» <i>dumetorum</i> W. et K.	429	» × <i>Soulangeana</i> Soulange-Bodin	394
» <i>hyemalis</i> L.	430	» <i>tripetala</i> L.	395
» <i>multifidus</i> Vis.	426		

<i>Magnolia</i> Yulan Desf.	395	<i>Pachysandra</i> L. C. Rich.	374
<i>Magnoliaceae</i> Jaume St. Hill. . . .	398	» <i>terminalis</i> Sieb. et Zucc. . . .	374
<i>Malachia aquatica</i> Fries	27	<i>Paeonia</i> L.	400
<i>Malachium aquaticum</i> Rehb.	27	» <i>banatica</i> Roch.	406
<i>Melandrium</i> Röhl.	186	» » Auct.	403
» <i>album</i> (Mill.) Garcke	190	» <i>Biebersteiniana</i> Rupr.	401
» <i>diurnum</i> (Sibth.) Fr.	189	» <i>corallina</i> Retz.	403
» × <i>dubium</i> Hampe	197	» <i>decora</i> Anders.	404
» <i>ericalycinum</i> Boiss.	193	» » Brandza	404
» <i>Flos-cuculi</i> Röhl.	129	» <i>mascula</i> Mill.	407
» <i>nemorale</i> (Heuff.) A.Br.	193	» <i>officinalis</i> L.	407
» <i>nivale</i> Nym.	141	» <i>officinalis</i> Auct.	404
» <i>noctiflorum</i> (L.) Fries.	194	» <i>peregrina</i> Mill.	404
» <i>rubrum</i> (Weig) Garcke	189	» <i>romantica</i> Brandza	404
» <i>silvestre</i> Röhl.	189	» <i>tenuifolia</i> L.	408
» × <i>subnemorale</i> Simk.	198	» <i>triterinata</i> Pall.	403
» <i>viscosum</i> (L.) Čelak.	194	<i>Paronychia</i> Adans.	110
» <i>Zawadzki</i> (Herb.) A.Br.	197	» <i>cephalotes</i> (M.B.) Bess. . . .	110
<i>Mercurialis</i> L.	367	» <i>Kapela</i> A. Kern.	110
» <i>annua</i> L.	368	<i>Petrosilene saxifragum</i> Fourr. . .	151
» <i>ovata</i> Sternb. et Hoppe	371	<i>Polyschemone</i> S., Nym. et Ky. . .	141
» <i>perennis</i> L.	371	» <i>nivalis</i> S., Nym. et	141
<i>Minuartia</i> L.	76	<i>Pulsatilla</i> Mill.	523
» <i>austriaca</i> (Jacq.) Hay.	84	» <i>alba</i> Rehb.	524
» <i>caespitosa</i> (Ehrh.) Deg.	84	» <i>alpina</i> Delarb.	527
» <i>cataractarum</i> Jka.	87	» <i>balcana</i> Vel.	530
» <i>fasciculata</i> (L.) Hiern	79	» <i>baldensis</i> Delarb.	514
» <i>fastigiata</i> Rehb.	79	» × <i>Gayeri</i> Simk.	532
» <i>frutescens</i> (Kit.) Tuzson	87	» <i>grandis</i> Wender.	531
» <i>Gerardii</i> (Willd.) Hay.	86	» × <i>Hackeli</i> Auct.	532
» <i>glomerata</i> (M.B.) Deg.	89	» <i>Jankae</i> Schur	529
» <i>graminifolia</i> (Ard.) Jáv.	83	» <i>montana</i> (Hoppe) Rehb.	528
» <i>laricifolia</i> (L.) Schinz et . . .		» <i>nigricans</i> Störck.	527
» <i>Thell.</i>	80	» <i>patens</i> (L.) Mill.	530
» <i>recurva</i> (All.) Schinz et		» <i>pratensis</i> (L.) Mill.	528
» <i>Thell.</i>	87	» <i>transsilvanica</i> Schur	529
» <i>sedoides</i> (L.) Hiern	78	» <i>vernalis</i> Mill.	532
» <i>setacea</i> (Thuill.) Hay.	79	» <i>vulgaris</i> Auct.	531
» <i>tenuifolia</i> (L.) Hiern	88		
» <i>verna</i> (L.) Hiern	84		
» <i>viscosa</i> (Schreb.) Schinz			
» <i>et Thell.</i>	88		
<i>Moehringia</i> L.	96	<i>Ranales</i>	384
» <i>Grisebachii</i> Jka.	102	<i>Ranunculaceae</i> A. L. Juss. . . .	396
» <i>Jankae</i> Gris.	102	<i>Ranunculus</i> L.	561
» <i>muscosa</i> L.	101	» <i>acer</i> L.	612
» <i>pendula</i> (W. et K.) Fenzl.	100	» <i>aconitifolius</i> Auct.	566
» <i>trinervia</i> (L.) Clairv.	99	» × <i>alliarifolius</i> (Rehb.)	
<i>Moenchia</i> Ehrh.	66	» <i>A. Nyár.</i>	586
» <i>erecta</i> Gaertn., Mey et		» × <i>ambiguus</i> (Schur) A.	
» <i>Scherb.</i>	69	» <i>Nyár.</i>	589
» <i>mantica</i> (L.) Bartl.	69	» <i>alpestris</i> L.	567
<i>Myosurus</i> L.	543	» <i>aquatilis</i> L.	553
» <i>minimus</i> L.	543	» <i>arvensis</i> L.	621
		» <i>astrantiaefolius</i> Schur	606
		» <i>aureus</i> Schleich.	606
		» × <i>auricomoides</i> A. Nyár.	
		» <i>et L. Alex.</i>	589
<i>Nigella</i> L.	430	» <i>auricomus</i> L.	578
» <i>arvensis</i> L.	431	» <i>auricomus</i> Rehb.	587
» <i>damascena</i> L.	435	» <i>Barthii</i> Schur	612
» <i>sativa</i> L.	432	» <i>binatus</i> Kit.	577
		» <i>brachiatus</i> Schur	606
<i>Oxygraphis vulgaris</i> Freyn	567		

<i>Ranunculus Breyninus</i> Cr.	605	<i>Ranunculus oxyspermus</i> M.B. . . .	622
» Kern. et Auct.	597	» <i>parvulus</i> Clairv.	615
» <i>bulbosus</i> L.	606	» L.	608
» <i>calthaeifolius</i> Jord.	559	» <i>paucistamineus</i> Freyn	555
» <i>carinatus</i> Simk.	555	» Tausch.	615
» <i>carinthiacus</i> Hoppe	601	» <i>pedatus</i> W. et K.	625
» <i>carpaticus</i> Herb.	619	» <i>peltatus</i> Schrank	553
» <i>carpaticus</i> Griseb.	592	» <i>Petiveri</i> Koch	550
» <i>cassubicus</i> L.	581	» <i>Philonotis</i> Ehrh.	607
» <i>circinatus</i> Sibth.	553	» <i>platanifolius</i> L.	566
» <i>constantinopolitanus</i>		» <i>polyanthemoides</i> Bor.	605
» D'Urv.	608	» Schur	601
» <i>Crantzii</i> Baumg.	606	» <i>polyanthemos</i> L.	601
» <i>crenatus</i> W. et K.	568	» <i>polyphyllus</i> W. et K.	571
» <i>Csatoi</i> Schur	615	» × <i>pseudoacris</i> Schur	627
» <i>divaricatus</i> Baumg.	556	» <i>pseudoacris</i> Simk.	627
» Schrank	553	» <i>pseudobulbosus</i> Schur	607
» <i>falcatus</i> L.	547	» <i>Pseudohirsutus</i> Schur	607
» × <i>fallax</i> Wimm. et Grab.	586	» <i>pseudomontanus</i> Schur.	598
» <i>Ficaria</i> L.	559	» <i>Pseudo-Villarsii</i> Schur	597
» <i>flabellifolius</i> Heuff.	585	» <i>repens</i> L.	595
» <i>Flammula</i> L.	575	» <i>reptans</i> L.	576
» <i>fluitans</i> Lam.	556	» <i>rigidus</i> Pers.	554
» <i>foeniculaceus</i> Gilib.	553	» <i>Rionii</i> Lagg.	556
» <i>Frieseanus</i> Jord.	619	» <i>rutaeifolius</i> L.	548
» <i>garganicus</i> Ten.	626	» <i>sardous</i> Cr.	607
» <i>gelidus</i> Schur	598	» <i>sceleratus</i> L.	591
» <i>geraniifolius</i> Baumg.	605	» × <i>silvicolus</i> (Wimm. et	
» Schur	616	» Grab.) A. Nyár.	590
» <i>glacialis</i> L.	567	» <i>Stevenii</i> Andr.	615
» <i>Gouani</i> Baumg.	619	» <i>strigosus</i> Schur	615, 616
» <i>gracilis</i> Schleich.	601	» <i>subtilis</i> Schur	612
» <i>gruinialis</i> Schott Ny. et		» <i>Tatrae</i> Borb.	595
» Ky.	598	» <i>tenuifolius</i> Schleich.	601
» <i>Haynaldi</i> Menyh.	596	» <i>testiculatus</i> Cr.	547
» <i>hederaceus</i> Baumg.	550	» <i>Thora</i> L.	592
» <i>heterophyllus</i> Web. in		» <i>trachyticus</i> Schur	612
» Wigg.	553	» <i>trichophyllus</i> Chaix	555
» <i>homophyllus</i> Ilazsl.	555	» <i>triphyllus</i> Wallr.	550
» <i>Hornschuchii</i> Hoppe	597	» <i>tuberculatus</i> DC.	622
» <i>hybridus</i> Biria	595	» <i>vaginatus</i> Somm.	568
» <i>illyricus</i> L.	625	» × <i>variifolius</i> (Schur) A.	
» × <i>intercedens</i> Domin	627	» Nyár.	590
» <i>Kayseri</i> Schur	615	» <i>verrucosus</i> Schur	612
» <i>laciniatus</i> Baumg.	601	» <i>Villarsii</i> Koch et Auct.	597
» <i>lanatus</i> Schur	601	<i>Ricinus</i> L.	372
» <i>lanuginosus</i> L.	611	» <i>communis</i> L.	372
» <i>lateriflorus</i> DC.	620	<i>Satulina tenella</i> Schur	86
» <i>Lerchenfeldianus</i> Schur	619	<i>Sagina</i> L.	69
» <i>Lingua</i> L.	572	» <i>apetala</i> Ard.	71
» <i>malacophyllus</i> Schur	615, 619	» <i>apetala</i> L.	71
» × <i>malomvölgensis</i> Nyár.	627	» <i>ciliata</i> Fries	71
» <i>millefoliatus</i> Vahl.	626	» <i>depressa</i> C. F. Schultz	71
» <i>montanus</i> Baumg.	619	» <i>Linnaei</i> Presl.	72
» <i>montanus</i> Willd.	598	» <i>nodosa</i> (L.) Fenzl.	75
» <i>muricatus</i> L.	622	» <i>procumbens</i> L.	70
» <i>napellifolius</i> Cr.	615	» <i>saginoides</i> (L.) D.T.	72
» <i>nemorosus</i> DC.	605	» <i>subulata</i> (Sw.) Presl	75
» <i>nodiflorus</i> W. et K.	620	<i>Saponaria</i> L.	290
» <i>ophioglossifolius</i> Vill.	576	» <i>Baumgarteni</i> Jka.	156
» <i>oreophilus</i> M.B.	597		

Saponaria	belidifolia Sm.	294
»	glutinosa M.B.	295
»	illyrica Ard.	215
»	officinalis L.	293
»	pumila (St. Lag.) Janch.	294
»	Vaccaria L.	216
Scleranthus	L.	116
»	annuus L.	121
»	collinus Schur	121
»	» Hornung.	122
»	comosus Dumort.	121
»	Delortii Gren.	122
»	dichotomus Schur	120
»	dicanifolius Rchb.	120
»	marginatus Guss.	123
»	neglectus Roch.	123
»	perennis L.	119
»	polycarpus Torn.	122
»	uncinatus Schur	122
Silene	L.	142
»	acaulis L.	159
»	alpina Thomas	140
»	anglica L.	165
»	» Rchb.	165
»	Armeria L.	160
»	Armeria M. B.	161
»	Baumgarteni Schott et Ky.	156
»	Behen L.	132
»	brachiata Jord.	136
»	brachyantha Schur	140
»	chlorantha (Willd.) Ehrh.	167
»	compacta Fisch.	161
»	conica L.	150
»	conoidea Huds.	150
»	Csereii Schur	139
»	» Baumg.	131
»	Cucubalus Wib.	132
»	cylindriflora Gris.	150
»	densiflora D'Urv.	184
»	» Proc.-Proc.	183
»	depressa Baumg.	156
»	dichotoma Ehrh.	161
»	dinarica Spreng.	156
»	dubia Herb.	178
»	effusa Otth	183
»	emarginata Panfu et Proc.	185
»	flavescens W. et K.	155
»	gallica L.	165
»	gallica Rchb.	165
»	Gallinyi Heuff.	162
»	glareosa Jord.	140
»	Grecescui Guşul.	178
»	infracta W. et K.	177
»	italica (L.) Pers.	172
»	junce Roth.	167
»	Jundzillii Zap.	172
»	latifolia (Mill.) Rendle et Britt.	135
»	latifolia Hornem.	174
»	Lerchenfeldiana Baumg.	155
»	lituanica Zap.	160
»	livida Willd.	177

Silene	livida Grec.	173
»	longiflora Ehrh.	166
»	longiflora Schur	166
»	Lotriensis Grec.	156
»	lusitanica L.	165
»	macedonica Formanek	155
»	multiflora (Ehrh.) Pers.	168
»	nana Fritsch.	295
»	nemoralis W. et K.	172
»	nivalis (Kit.) Rohrb.	141
»	noctiflora L.	195
»	nutans L.	174
»	oleracea Bor.	136
»	Otites (L.) Wib.	180
»	pannonica Vierh.	160
»	parviflora Pers.	183
»	pendula L.	165
»	petraea W. et K.	152
»	pilosa Spreng.	173
»	polyphylla Baumg.	167
»	pontica Brandza	168
»	pseudonutans (Panč.) Guşul.	178
»	× pseudonutans Panč.	178
»	Pseud-Otites Bess.	183
»	pubibunda Hfsgg.	185
»	pumila St. Lager	294
»	pusilla W. et K.	185
»	quadridentata Pers.	184
»	quadrifida L.	184
»	quinquevulnera L.	165
»	racemosa Otth	161
»	rupestris L.	151
»	saponariaefolia Schott	139
»	» Rchb.	131
»	Schottiana Schur	131
»	Saxifraga L.	151
»	saxatilis Schur	178
»	Siegeri Baumg.	141
»	silvestris Schott	165
»	spergulifolia Rchb.	171
»	subconica Friv.	150
»	subspathulata Schur	167
»	supina M. B.	171
»	transsilvanica Schur	178
»	trinervia Seb. et Mauri	162
»	thymifolia Sibth. et Sm.	168
»	venosa (Gilib.) Aschers.	132
»	viridiflora L.	173
»	viscosa Pers.	194
»	Wolgensis Otth	183, 184
»	vulgaris Garcke	135
»	Zawadzki Herb.	197
Spergula	L.	102
»	arvensis L.	105
»	laricina Wulf.	106
»	maxima Weihe	106
»	micrantha Bge	72
»	Morisonii Bor.	106
»	nodosa L.	75
»	pentandra L.	106
»	refracta Dethard	106

<i>Spérghula saginoides</i> L.	72	<i>Thalictrum flavum</i> L.	645
» <i>subulata</i> Sw.	75	» <i>flexuosum</i> Bernh.	638
» <i>vernalis</i> Willd.	106	» <i>foetidum</i> L.	633
» <i>vulgaris</i> Boenningh.	105	» <i>galioides</i> Nestl.	642
<i>Spergularia</i> (Pers.) J. et C. Presl	107	» <i>glaucescens</i> Willd.	641
» <i>marginata</i> (DC.) Kitt.	109	» <i>× iodostemon</i> Borb.	653
» <i>marina</i> (Pall.) Gris.	108	» <i>Jaquinianum</i> Koch.	638
» <i>rubra</i> (L.) J. et C. Presl	107	» <i>laserpitifolium</i> Willd.	650
» <i>salina</i> J. et C. Presl	108	» <i>lucidum</i> L.	646
» <i>× salontana</i> J. Pop	109	» <i>medium</i> Jacq.	641
<i>Stellaria</i> L.	26	» <i>minus</i> L.	634
» <i>Alsine</i> Grimm.	37	» <i>nigricans</i> DC.	650
» <i>anomala</i> Rchb.	42	» » Schur	645
» <i>apetala</i> (Ucria) Mert. et Koch	32	» » Scop.	650
» <i>aquatica</i> (L.) Scop.	27	» <i>perrobustum</i> Borb.	645
» <i>Barthiana</i> Schur	38	» <i>petaloideum</i> L.	630
» <i>Boreana</i> Jord.	33	» <i>petrosum</i> Schur	638
» <i>Cerastoides</i> L.	41	» <i>peucedanifolium</i> Griseb.	
» <i>decandra</i> Schur	32	» et Schenk	649
» <i>diffusa</i> Willd.	34	» <i>rufinerve</i> Lej. et Court.	646
» <i>Friesiana</i> Ser.	34	» <i>saxatile</i> Schleich.	637
» <i>glandulosa</i> Kit.	63	» » Schur	638
» <i>graminea</i> L.	37	» <i>silvaticum</i> Heuff.	641
» <i>Holostea</i> L.	33	» » Schur	641
» <i>Laxmannii</i> Fisch.	38	» <i>simplex</i> L.	642
» <i>longifolia</i> Mühlenb.	34	» <i>strictum</i> Auct.	645
» <i>media</i> (L.) Cyr.	32	» <i>× subcorymbosum</i> Borb.	653
» <i>mosquensis</i> M.B.	34	» <i>transilvanicum</i> Schur	637
» <i>neglecta</i> Weihe	32	<i>Tricoccae</i>	295
» <i>nemorum</i> L.	28	<i>Tripterium aquilegifolium</i> Schur	629
» <i>pallida</i> Piré	33	» <i>pauciflorum</i> Schur	629
» <i>palustris</i> Ehrh.	38	<i>Trollius</i> L.	412
» <i>serpyllifolia</i> Scop.	93	» <i>altissimus</i> Cr.	413
» <i>uliginosa</i> Murr.	37	» <i>europaeus</i> L.	412
» <i>viscida</i> M.B.	42	» <i>humilis</i> Cr.	413
<i>Thalictrum</i> L.	627	» <i>medius</i> Wender	414
» <i>alpinum</i> L.	630	» <i>transilvanicus</i> Schur	412
» <i>angustifolium</i> L.	642	» <i>viridis</i> Mielchhof.	413
» » Jacq.	649	<i>Tunica</i> Scop.	211
» <i>angustissimum</i> Jacq.	649	» <i>Haynaldiana</i> Borb.	215
» <i>aquilegifolium</i> L.	629	» <i>illyrica</i> (Ard.) Fisch. et Mey.	215
» <i>Arpadianum</i> Borb.	637	» <i>prolifera</i> (L.) Scop.	212
» <i>atropurpureum</i> Jacq.	629	» <i>saxifraga</i> (L.) Scop.	212
» <i>australe</i> Bornm.	629	<i>Vaccaria</i> (DC.) Medik.	216
» <i>axilliflorum</i> Schur	645	» <i>pyramidata</i> Medik.	216
» <i>Barthii</i> Schur	641	» <i>segetalis</i> (Neck.) Garcke.	216
» <i>Bauhini</i> Cr.	642	<i>Viscaria</i> Röhl.	127
» <i>capillare</i> Schur	641	» <i>albiflora</i> Sweetz.	128
» <i>collinum</i> Wallr.	638	» <i>atropurpurea</i> Gris.	128
» <i>Csatoii</i> Schur	638	» <i>nivalis</i> Simk.	141
» <i>elatum</i> Jacq.	641	» <i>Siegeri</i> Gris. et Schenk	141
» <i>exaltatum</i> Schur	645	» <i>viscosa</i> (Scop.) Asch.	127
» <i>expansum</i> Jord.	637	» <i>vulgaris</i> Röhl.	127

CONȚINUTUL ȘI COLABORATORII VOLUMULUI "II

Prefață.....	Redacția
Fam. Caryophyllaceae: genurile <i>Stellaria</i> , <i>Cerastium</i> , <i>Holosteum</i> , <i>Moenchia</i> , <i>Sagina</i> , <i>Buffonia</i> , <i>Minuartia</i> , <i>Arenaria</i> , <i>Moehringia</i> , <i>Spergula</i> , <i>Spergularia</i> , <i>Paronychia</i> , <i>Herniaria</i> , <i>Scleranthus</i> , <i>Agrostemma</i> , <i>Viscaria</i> , <i>Lychnis</i> , <i>Melandryum</i> , <i>Cucubalus</i> , <i>Gypsophila</i> , <i>Tunica</i> , <i>Vaccaria</i> , <i>Dianthus</i> , <i>Saponaria</i>	I. Prodan
Fam. Caryophyllaceae: genurile <i>Behen</i> , <i>Polyschemone</i> , <i>Silene</i> , <i>Heliosperma</i> ..	M. Gușuleac
Fam. Euphorbiaceae	I. Prodan
Fam. Buxaceae, Callitrichaceae, Calycanthaceae	Em. Țopa
Fam. Lauraceae	St. Csűrös
Fam. Magnoliaceae	E. Ghișa
Fam. Ranunculaceae: genurile <i>Paeonia</i> , <i>Trollius</i> , <i>Caltha</i> , <i>Helleborus</i> , <i>Eranthis</i> , <i>Nigella</i> , <i>Isopyrum</i> , <i>Actaea</i> , <i>Cimicifuga</i> , <i>Aquilegia</i> , <i>Delphinium</i> , <i>Anemone</i> , <i>Hepatica</i> , <i>Pulsatilla</i> , <i>Atragene</i> , <i>Clematis</i> , <i>Myosurus</i> , <i>Ceratocephalus</i> , <i>Callianthemum</i> , <i>Batrachium</i> , <i>Ficaria</i> , <i>Ranunculus</i> , <i>Thalictrum</i> , <i>Adonis</i>	A. Nyárády
Fam. Ranunculaceae: genul <i>Aconitum</i>	Gh. Grințescu
Addenda diagnoses plantarum novarum in tomo II Florae R.P.R. commemoratarum	M. Gușuleac
Executarea desenelor:	
Planșele: 1, 2, 7—9, 12, 13, 18, 20, 23, 25, 33, 34, 39, 40, 44, 45, 47— 49, 51, 58, 59, 61, 67, 68, 72, 99, 106, 107	Aurelia Dózsa
Planșele: 3—6, 10, 11, 14, 15, 19, 21, 22, 24, 28—32, 38, 41, 42, 46, 50, 52, 53, 55—57, 60, 65, 66, 69—71, 73—75, 83, 88—98, 108....	Elena Lazányi
Planșele: 16, 17, 35—37, 43, 54, 62, 64, 84—87, 100, 101	Acațiu Macskási
Planșele: 18a	Lucreția Câmpceanu
Planșele: 26, 27	Maria Király
Planșele: 63	Lucia Văleanu
Planșele: 76—82	Margareta Váczi
Planșele: 102—104	Francisc Incze
Planșele: 105	Acad. E. I. Nyárády

ADĂUGIRI ȘI INDREPTĂRI
LA VOL. I AL FLOREI R. P. R.

La pag. 273, după *Populus nigra*, se va adăuga:

Secția III. TACAMAHACA Spach in Ann. Sc. nat. (1841) 32.

Arbori cu ritidom. Muguri vâscoși și aromatici. Scvamele amenților neciliate, căzătoare în timpul înfloririi. Frunze mai lungi decât late, pe dos albicioase sau cu luciu metalic.

✱ *P. balsamifera* L. Sp. pl. ed. I (1753) 1034. — *P. tacamahaca* Mill. Gard. Dict. ed. VIII (1768) nr. 6.

Arbore — 30 m, cu coroana îngustă, rară, la maturitate cu ritidom adânc brăzdat, cenușiu. Lujeri anuali glabri, netezi, la început bruni, apoi verzi sau cenușii. Muguri alungiți, ascuțiți, alipiți de lujer, vâscoși, aromatici, de 12—15 mm lungime. Frunze lat ovate până la ovat lanceolate, la vârf scurt acuminate, la bază rotunzite, de 8—12 cm lungime, pe margini foarte mărunț serate, groase, ± pielose, glabre, pe față verzi întunecate, pe dos alburii, cu aspect metalic. Pețoli de 2—5 cm lungime, în secțiune rotunzi sau slab patrunghiulari, brăzdați. Amenți masculi de 5—7 cm lungime cu flori cu câte 12—20 stamine; cei femeli laxi, la maturitate de 12—14 cm lungime. IV.

Cultivat sporadic. La Băile Borsec comun și subspontan.

Răsp. gen: America de N.

La pag. 343, după *Ulmus ambigua*, se va adăuga:

U. minor Mill. Gard. Dict. ed. VIII (1786) nr. 6; Rehb. Ic. fl. germ. XII (1850) 660. — *U. glabra* Mill. var. *minor* Ley. in Journ. Bot. XLVIII (1910) 70. — *U. sativa* Moss in Gard. Chron. LI (1912) 212 non Mill. — *U. vulgaris* Dippel Handb. Laubholzk. (1812) 23.

Arbore de 10—25 (30) m. Coroana cu înfățișare particulară, ovoid globuloasă, deasă, cu vârful ușor aplecat într-o parte, cu ramurile ascendente sau divergente și lujerii ușor pendenți. Lujeri anuali bruni-verzui, la început mărunț pubescenti, apoi glabri, uneori cu muchii de plută. Muguri mici, globuloși. Frunze eliptice până la ovate eliptice, de (2) 3—6 (7) cm lungime și 1,5 — 4 cm lățime, la vârf acuminate, la bază asimetrice și adesea cordate, coriacei, pe față netede, glabre, pe dos la început pubescente, apoi numai cu smocuri de peri albi în subțioara nervurilor, în rest glabre, cu (6) 8—13 (15) perechi de nervuri laterale. Samara îngust obovată, mai rar eliptică obovată, de (10) 12—14 (16) mm lungime și 6—8 (10) mm lățime, la vârf adânc știrbită, cu sămânța așezată spre vârf, sub știrbitură. III—IV.

Stațiunea. În regiunea de câmpie și dealuri, în grupuri mici sau exemplare izolate, pe coaste râpoase, pe marginea viroagelor, la margini de păduri, prin fânețe de coaste și pe marginea terenurilor de cultură.

Răsp. în țară: *Reg. Ploști*: pe dealurile dintre Cărpiniștea și Beceni, dela gura pârâului Beciu până la Păd. Ocea, în Păd. Ojasca-Crivina (r. Beceni). *Reg. Galați*: Delta Dunării în Păd. Letea.

Variabilitatea speciei

f. *suberifera* Morariu f. nova.

Lujeri de doi ani și mai bătrâni cu muchii sau aripi late de plută. — Impreună cu specia tipică.

Răsp. gen.: Europa de SE.

La pag. 203 rândul 1: În loc de *solzi lemnoși*, se va ceti *solzi membranoși*.

La pag. 339 (Planșa 49), fructul din fig. 1 c are marginea *des* și *scurt ciliată*.

La pag. 614: Determinarea genurilor din familia *Portulacaceae*, se va modifica după cum urmează:

- | | | |
|-----|---|------------------|
| 1 a | Caliciu bifidat, cu sepale căzătoare. Stamine 4—multe. Capsula cu numeroase semințe | Portulaca |
| 1 b | Caliciu bifidat, cu sepale persistente. Stamine 3. Capsula cu 2—3 semințe | Montia |

*Dat la cules 15/VII/1953. Bun de tipar 16/XII/1953. Tiraj
3000. Hârtie velină satinată 80 g.mp., format 70/100/16. Coli
editoriale 49,3. Coli tipar 44. Prețul unui exemplar 23,60 Lei.*

Comanda 1071 A 3113.

Pentru bibliotecile mici indicele de clasificare 58 (R)

Pentru bibliotecile mari indicele de clasificare:

58,9 (498) (021) = 59

*Tiparul executat la Centrul Poligrafic Nr. 4.
Calea Șerban Vodă Nr. 133—135, București—R.P.R.*

